





12-4-C-1



B V 7 6 ~ 3



FRANC. BOISSIER DE SAUVAGES  
NOSOLOGIA METHODICA  
*S I S T E N S*  
MORBORUM CLASSES,  
GENERA ET SPECIES.  
T O M I D U O.

PROBATION DEPARTMENT  
BOSTON, MASS.

2000

RECEIVED  
JANUARY 10, 1900

U. S. DEPT. OF JUSTICE

NOSOLOGIA METHODICA  
S I S T E N S  
MORBORUM CLASSES

Juxta Sydenhami mentem & Botanicorum ordinem.


A U C T O R E

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES

*Regis Consiliario ac Medico, in Monspelienſi Univerſitate Medicina, olimque Botanices, Profefſore Regio; Academia Scientiarum Monspelienſis, Londinenſis, Upſalienſis, Berolinenſis, Florentinae, Phyſico-Botanicae, Suecicae, Naturae curioſorum, & Inſtituti Bononiienſis Socio.*

EDITIO ULTIMA, AUCTIONIOR, ET EMENDATIO.

T O M U S P R I M U S



V E N E T I I S,  
APUD FRANCISCUM EX NICOLAO PEZZANA.

---

M D C C L X X I I I  
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

*Si morbi cujuslibet historiam diligenter perspectam haberem, par malo remedium  
numquam non scirem adferre. Sydenham. in Præf. pag. 10.*

# AD LECTOREM TYPOGRAPHUS.



VERBIS agerem quod factum jam comprobatum est, si in laudes divagarer, & encomia libri, non citius in lucem editi quam venditi canerem. Paucis igitur monēbio auctorem nostrum integro triennio nervos intendisse in castigando & augendo opere, quod perductum, ad eum quo nunc prostat maturitatis gradum, publici juris facere gestiebat, cum morte præreptus, meritis honoribus lauri apollinaris defraudatus est. Porro scientiæ medicæ amantes arcebantur a colligenda segete altera, opima quidem, quam novissime demessam post se relinquebat VIR CELEBERRIMUS. Ast providus, tantæ obstitit jacturæ colendus amicus noster JOANNES ANTONIUS CRAMER Medicinæ Doctor, qui licet praxi valedixerit, theoriæ intentus non destitit de arte bene mereri. Ille est LECTOR BENEVOLE cui acceptas referre debeas posteriores D. D. FRANCISCI BOISSIER DE SAUVAGES disquisitiones in meliorem ordinem redactas, defæcatas, & indice perspicuo ac fideli exornatas: Quare etiam æquum est CRAMERUS veniat in partem grāti animi sensus, quo me erga auctorem principalem affectum profiteor, Lectores quoslibet erga utrumque affecturos iri non dubito.

Atque ut nihil desiderandum superesset, auctoris subjunxi panegyrim exaratam & humanissime communicatam a D. DE RATTE celeberrimo Academiæ Monspeliensis Scriba. Tot commoda in hanc editionem cumulata me persuasum habent, eam non minus ac primam Publico gratam esse futuram, & magis magisque ejusdem benevolentiam in me conversuram esse.

# D E D I C A T I O .

## A B A U C T O R E P R I M Æ E D I T I O N I

### P R Æ F I X A .

DOCTISSIMÆ ET NOBILISSIMÆ MARI-ANGELÆ ARDINGHELI APUD NEAPOLITANOS ÆVI ET SEXUS SUI DECORI AC ORNAMENTO SALUTEM.



**M**ULTUM tibi debent, Illustrissima ARDINGHELI, Medicinæ & Physicæ cultores, quod eximia Halesii opera Italicæ Linguae leporibus, doctissimisque tuis notis disaveris. Quaecumque sunt in Phylosophia & Mathematicis pulchra & utilia, crepundiorum vice, vix annos sexdecim nata tractasti; styli tui gratiis, Musarum floribus, similiter meos de febre, de inflammatione & de hæmorrhagica Commentarios hac ætate adornasti; hinc factum est ut exemplo tuo ductus Ill. Professor Manetti Florentinus meas de aere & de medicamentis Dissertationes doctis suis commentariis auxerit, alique eruditi viri opusculum de electricitate Medica, de Bombicibus Itala Lingua donaverint, & demum tuo suffragio commoti tum Florentina & Physico-Botanica, cum Institutum Bononiensis Academia Socii, me antea ignotum & peregrinum in suorum sodalium numerum cooperarint, pro qua benignitate ipsis quidem multum, tibi vero non parum debeo: ne mireris itaque Illustrissima MARI-ANGELA quod pro suis beneficiis, tibi grates publicas rependam. Vale.



# I N D E X

## CLASSIUM, ORDINUM ET GENERUM

### MORBORUM &c.

#### T O M I P R I M I.

<b>P</b> rolegomena.	2		<b>IV. Excreſcentia. p. 83.</b>	
Nofologiæ hiftoricæ fundamenta.	7			
De Methodo Nofologica.	ibid.	Sarcoma.		ibid.
Conſpectus Methodi Joſtoni & Sennertl.	8	Condyloma.		84
Nomenclatura Nofologica.	15	Verruca.		ibid.
Nofologiæ Philoſophicæ fundamenta.	19	Pterygium.		85
de Viribus animatis.	27	Hordeolum.		ibid.
de Viribus inanimatis.	33	Bronchocele.		ibid.
de Morborum principiis.	39	Exoftoſis.		86
Clavis Claffium.	43	Gibboſitas.		87
Methodus morbi detegendi.	44	Lordoſis.		ibid.
Leſori Philiatro.	47		<b>V. Cyſtides. p. 88.</b>	
Synopſis Claffium & Ordinum.	52			
		Aneurysma.		ibid.
<b>CLASSIS I. Synopſis, p. 54.</b>		Varix.		ibid.
<b>VITIA p. 56.</b>		Marifca.		89
<b>ORDO I. Macula p. 69.</b>		Hydatis.		ibid.
Leucoma.	ibid.	Staphyloma.		ibid.
Vitiligo.	70	Lupia.		ibid.
Ephelis.	71	Hydarchrus.		ibid.
Gutta-roſea.	ibid.	Apoſtema.		90
Nævus.	72	Exomphalus.		ibid.
Ecchymoma.	ibid.	Oſcheocele.		91
			<b>VI. Eſtopia, p. 92.</b>	
<b>II. Eſſeſcentia, p. 72.</b>		Exophthalmia.		93
Puſtula, Papula, Phlyſæna,	ibid.	Blepharoptoſis.		95
Varus.	ibid.	Hypoſtaphyle.		96
Herpes.	ibid.	Paragloſſe.		ibid.
Epinyſtis.	74	Proptoma.		97
Plydracia.	ibid.	Exania.		98
Hidroa.	75	Exocyſte.		99
		Hyſteroptroſis.		ibid.
<b>III. Phymata, p. 75.</b>		Enterocele.		102
Erythema.	ibid.	Epiplocele.		108
Oedema.	77	Gaſtrocele.		111
Emphyſema.	78	Hepatocele.		ibid.
Scirrhus.	ibid.	Splenoccele.		112
Phlegmone.	79	Hyſteroccele.		ibid.
Bubo.	ibid.	Cyſtocele.		113
Parotis.	80	Encephaloccele.		116
Furunculus.	ibid.	Hyſteroloxia.		118
Anthrax.	ibid.	Patorchidium.		119
Cancer.	81	Exarthrema.		120
Paronychia.	ibid.	Diaſtaſis.		123
Phimofis.	82	Loxarthrus.		124
			<b>VII. Plaga, p. 125.</b>	
		Vulnus.		126

Punctura.	ibid.	Epiploitis.	233
Excoriatio.	127	Metritis.	ibid.
Contusio.	ibid.	Cystitis.	254
FRACTURA.	128		
Fistula.	ibid.	III. <i>Parenchymatosa</i> , p. 255.	
Ruptura.	ibid.	Cephalitis.	ibid.
Amputatura.	ibid.	Cynanche.	257
Ulcus.	ibid.	Carditis.	260
Exulceratio.	ibid.	Peripneumonia.	261
Sinus.	ibid.	Hepatitis.	263
Fistula.	129	Splenitis.	265
Rhagis.	ibid.	Nephritis.	ibid.
Eschara.	ibid.		
Caries.	ibid.	CLASSIS IV. <i>Synopsis</i> , 267.	
Arthrocaec.	ibid.	SPASMI p. ibid.	
		ORDO I. <i>Tonici partiales</i> , p. 277	
CLASSIS II. <i>Synopsis</i> , 130.		Strabismus.	ibid.
FEBRES p. ibid.		Trismus.	279
ORDO I. <i>Continua</i> , p. 149		Ostipitas.	282
Ephemera.	151	Contractura.	283
Synocha.	157	Crampus.	284
Synochus.	159	Priapismus.	ibid.
Typhus.	161		
Hæctica.	167	II. <i>Tonici generales</i> , p. 284.	
II. <i>Remittentes</i> , p. 169.		Tetanus.	285
Amphimerina.	170	Catochus.	287
Tritæophya.	176		
Tetartophya.	180	III. <i>Clonici partiales</i> , p. 288.	
III. <i>Intermittentes</i> , p. 181.		Nyctagmus.	ibid.
Quotidiana.	183	Carphologia.	ibid.
Tertiana.	184	Pandiculatio.	289
Quartana.	187	Apomytosis.	ibid.
Erratica.	189	Convulsio.	ibid.
CLASSIS III. <i>Synopsis</i> , 292.		Tremor.	291
PHLEGMASIÆ p. ibid.		Palpitatio.	294
ORDO I. <i>Exanthematica</i> , p. 216		Cladocatio.	297
Peltis.	218	IV. <i>Clonici generales</i> , p. 298.	
Variola.	222	Rigor.	ibid.
Pemphigus.	226	Eclampsia.	299
Rubeola.	227	Epilepsia.	303
Miliaris.	229	Hysteria.	307
Purpura.	235	Scelotyrbe.	310
Erysipelas.	237	Berberia.	311
Scarlatina.	239		
Essera.	ibid.	CLASSIS V. <i>Synopsis</i> , 312.	
Aphthæ.	240	ANHELATIONES, p. ibid.	
II. <i>Membranosa</i> , p. 241.		ORDO I. <i>Spasmodica</i> , p. 319	
Phrenitis.	ibid.	Ephialtes.	ibid.
Paraphrenitis.	244	Sternutatio.	331
Pleuritis.	245	Ofcedo.	ibid.
Gastritis.	251	Singultus.	332
Enteritis.	252	Tussis.	339

II. *Oppressiva* p. 341.

Stertor.	ibid.
Dyspnœa.	344
Œthma.	347
Orthopnœa.	351
Angina.	354
Pleurodyne.	357
Rheuma.	360
Hydrothorax.	ibid.
Empyema.	363

## CLASSIS VI. Synopsis. 365.

## DEBILITATES p. 365.

ORDO I. *Dysæsthesia*, p. 376.

Cataracta.	ibid.
Caligo.	379
Amblyopia.	382
Amaurosis.	390
Anosmia.	392
Agæusia.	393
Dysæcœa.	ibid.
Paracusis.	395
Cophosis.	396
Anæsthesia.	399

II. *Anæsthesia* p. 400.

Anorexia.	ibid.
Adipsia.	403
Anaphrodisia.	ibid.

III. *Dyscrasia*, p. 404.

Mutitas.	405
Aphonia.	407
Picillismus.	408
Paraphonia.	409
Paralyfis.	412
Hemiplegia.	414
Paraplexia.	417

IV. *Lipopsychia* p. 423.

Athēnia.	419
Lipothymia.	422
Syncope.	ibid.
Alphyxia.	426

V. *Comata* &c. p. 430.

Cataleptis.	432
Ectasis.	433
Typhomania.	434
Lethargos.	435
Cataphora.	437
Carus.	ibid.
Apoplexia.	441



# I N D E X

## T O M I S E C U N D I.

CLASSIS VII. Synopsis, p. 1.

DOLORS. p. 4.

ORDO I. *Vagi* p. 13.

Arthritis.	13
Ostocopus.	16
Rheumatismus.	17
Catarrhus.	21
Anxietas.	22
Lassitudo.	23
Stupor.	24
Pruritus.	25
Algor.	26
Ardor.	26

II. *Capitis* p. 27.

Cephalalgia.	28
Cephalæa.	30
Hemicrania.	31
Ophthalmia.	33
Otalgia.	40
Odontalgia.	41

III. *Pectoris*, p. 43.

Dysphagia.	43
Pyrosis.	46
Cardiognus.	47

IV. *Abdominales interni*, p. 49.

Cardialgia.	49
Costrodynia.	51
Colica.	54
Hepatalgia.	58
Splenalgia.	61
Nephralgia.	ibid.
Dystocia.	63
Hysteralgia.	66

V. *Partium externarum*, p. 69.

Mastodynia.	69
Rachialgia.	71
Lumbago.	74
Ischias.	76
Proctalgia.	78
Pudendagra.	79

CLASSIS VIII. Synopsis, 82.

VESANIÆ p. 82.

ORDO I. *Hallucinationes* p. 87.

Vertigo.	89
Suffusio.	93
Diplopia.	101
Syrignus.	103
Hypochondriasis.	106
Somnambulismus.	109

II. *Moresitatus* p. 110.

Pica.	112
Bulimia.	114
Polydipsia.	116
Antipathia.	117
Nosalgia.	ibid.
Panophobia.	118
Satyriasis.	119
Nymphomania.	120
Tarantismus.	121
Hydrophobia.	123

III. *Deliria* p. 116.

Paraphrosyne.	118
Amentia.	122
Melancholia.	123
Dæmonomania.	128
Mania.	140

IV. *Vesania anomala* p. 142.

Amnesia.	143
Agrypnia.	144

CLASSIS IX. Synopsis, 146.

FLUXUS p. 148.

ORDO I. *Sanguifluxus*, p. 150.

Hæmorrhagia.	151
Hæmoptylis.	152
Stomachæ.	157
Hæmatemesis.	ibid.
Hæmaturia.	159
Menorrhagia.	162
Abortus.	165

II. *Alvi fluxus sanguinolenti*, p. 167.

Hepatirrhœa.	170
Hæmorrhoids.	171
Dysenteria.	172
Melæna.	176

*Alvi fluxus non sanguinolenti*

Nausea.	177
Vomitus.	178
Ileus.	182
Cholera.	186
Diarrhœa.	188
Cœliaca.	191
Lienteria.	ibid.
Tenesmus.	192

III. *Seri fluxus* p. 193.

Epidrosis.	195
Epiphora.	197
Coryza.	199
Ptyalismus.	ibid.

Ana.

Anacathasis	202
Diabetes	203
Enuresis	204
Dysuria	205
Pyuria	206
Leucorrhœa	210
Gonorrhœa	212
Dyspermatismus	214
Galaorrhœa	217
Orophœa	218

IV. *Acri fluxus*, p. 218.

Flatulentia	ibid.
Ædoposophia	220
Dysodia	221

CLASSIS X. *Synopsis*, 233.

MORBI CACHÉCTICI, p. 235.

ORDO I. *Macies*, ibid.

Tabes	236
Phthisis	238
Atrophia	241
Ardura	245

II. *Intumescencia*, p. 245.

Polyfarcia	246
Pneumatosis	247
Anafarcia	248
Phlegmatia	250
Phylconia	252
Graviditas	259

III. *Hydrops partialis*, p. 262.

Hydrocephalus	262
Physocephalus	ibid.
Hydrocrachitis	263
Alcites	ibid.
Hydrometra	269
Physometra	271
Tympanites	ibid.
Meteorismus	274
Ichuria	275

IV. *Tuberc*, p. 285.

Rachitis	285
Scrophula	287
Carcinoma	289
Leontiasis	290
Malis	291
Frampesia	293

V. *Impetigines*, p. 295.

Syphilis	295
Scorbutus	298
Elephantiasis	300
Lepros	302

Scabies	304
Tinea	306

VI. *Heretia*, p. 308.

Aurigo	309
Melafiderus	313
Phenogynus	314
Chlorosis	315

VII. *Cachexia anemala*, p. 318.

Phthiriasis	318
Trichoma	319
Alopecia	321
Elcosis	322
Gangræna	324
Necrosis	329

CLASSES MORBORUM  
ÆTIOLOGICÆ, 333.

CLASSIS I. Morbi venenati	337
II. Morbi virulenti	339
III. Morbi exanthematici	341
IV. Morbi metastatici	343
V. Morbi febriales	344
VI. Morbi miasmatici	345
VII. Morbi phlogistici	348
VIII. Morbi sanguinei	349
IX. Morbi biliosi	351
X. Morbi saburrales	352
XI. Morbi pituitosi	353
XII. Morbi catarrhales	354
XIII. Morbi lactei	355
XIV. Morbi serosi	356
XV. Morbi flatulenti	357
XVI. Morbi purulenti	359
XVII. Morbi acrimonioli	360
XVIII. Morbi organici	361
XIX. Morbi vulnerarii	362
XX. Morbi emphratici	364
XXI. Morbi verminosi	365
XXII. Morbi calcipoli	366
XXIII. Morbi spasmodici	367
XXIV. Morbi atoni	368
XXV. Morbi morales	370

METHODUS ANATOMICA  
MORBORUM, p. 373.

CLASSIS I. Morbi Cutanei universales	373
II. Morbi cutanei partiales	ibid.
III. Morbi artuum	374
IV. Morbi sexuum	375
V. Morbi sensuum	ibid.
VI. Morbi capitis	376
VII. Morbi pectoris	ibid.
VIII. Morbi abdominis	ibid.
IX. Morbi ætatum	377
Table de noms françois des maladies	379

# E L O G E DE MONSIEUR DE SAUVAGES.

*Lue dans une Assemblée publique de la Société Royale des Sciences de Montpellier, par M. DE RATTE, Secrétaire perpétuel de cette Compagnie.*



**F**RANÇOIS BOISSIER DE SAUVAGES DE LA CROIX, sixième fils de François Boissier, Seigneur de Sauvages, ancien Capitaine au Régiment de Flandres, & de Gillette Blanchier, naquit à Alais le 12. Mai 1706. jour fameux dans l'Histoire de la Société royale par une éclipse totale de soleil, époque de nos premiers travaux. Ce qu'il y eût ici de plus remarquable, c'est qu'il vint au monde au moment précis où le soleil disparut entièrement ; circonstance qui n'eût pas passé pour indifférente dans ces temps où les astres, préposés par l'avengle ignorance au gouvernement des choses d'ici bas, présidoient particulièrement à la naissance des hommes célèbres, & se faisoient un devoir aux yeux du préjugé d'annoncer leurs destinées.

Les dispositions naturelles de M. de Sauvages firent naître en sa faveur des présages plus sûrs que tous ceux qu'on tiroit autre fois des comètes & des éclipses. Il fut aisé de s'apercevoir qu'il méritoit une excellente éducation : celle qu'il reçut à Alais fut cependant assez défectueuse ; on n'y avoit pas encore établi de Collège public, & il n'eût pour guide dans les Humanités & la Philosophie que des Maîtres d'un mérite obscur, plus propres à nuire qu'à contribuer aux progrès de leurs Disciples. Ce desavantage, très-grand en lui-même, le fut moins pour l'Académicien que nous regrettons : ses talents surent le réparer ; ils applanissoient par d'heureux efforts les difficultés les plus considérables, & embellissoient les différentes routes qu'il étoit obligé de se frayer.

Ces premiers succès excitèrent vivement la tendresse d'un père dont les soins pour l'éducation de ses enfants se trouvoient malheureusement bornés par sa fortune, qu'un procès de trente ans, qu'on lui avoit injustement suscité, avoit fort dérangée. Dans cette situation, il étoit espérer, & ce n'étoit pas sans fondement, que le mérite & les talents, suppléant par eux-mêmes à l'imperfection de leur première culture, relèveroient une famille originairement noble & très-bien alliée pleine d'honneur & de vertu, jouissant depuis plus de trois siècles de l'estime & de la considération publique, comme par un droit héréditaire.

Déterminé par un penchant qu'on étoit bien éloigné de combattre, Mr. de Sauvages, après la Philosophie, vint étudier en Médecine à Montpellier : ce fut au commencement de 1722. L'Université de cette Ville comptoit alors, entre les Professeurs à qui le dépôt de sa réputation avoit été confié, Mrs. Astruc, Dejdier, Hagnenot, Chiscyneau. Mr. de Sauvages saisit avidement & recueillit avec soin les instructions de ces grands Maîtres ;

tres; & l'on peut dire qu'après la nature, ils eurent, à certains égards, la gloire de l'avoir formé.

Du caractère dont il étoit, il ne pouvoit se permettre des progrès médiocres; il eût voulu tout épuiser, du moins tout approfondir. L'Anatomie, la Chymie, la Botanique, pour laquelle il prit une forte passion, toutes les connoissances, qui sont la base naturelle de la profession qu'il devoit exercer, ne lui suffisoient pas. Des recherches, que beaucoup d'autres négligeoient sans scrupole, lui paroissent importantes & même nécessaires: par-tout il découvroit des rapports plus ou moins sensibles avec l'art de guérir. Il suivit la Physique dans toutes ses branches & jusques dans ses moindres détails; & à l'égard des Mathématiques, dont son frere aîné, qui ne se contente pas d'en connoître le prix, lui avoit déjà communiqué le goût, il les apprenoit de lui-même, & s'y livroit totalement dans le temps des vacances qu'il alloit passer à Alais: il se rendoit insensiblement la Géométrie assez familière pour être en état de l'appliquer à la Médecine, comme il a fait depuis avec tant de succès dans une multitude d'Ecrits.

Il fut reçu Docteur de Montpellier en 1726. Sa Thèse de Licence fit du bruit; il agita cette question: *Si l'amour peut être guéri par des remèdes tirés des plantes*; matière très-susceptible d'agrément, & dont le choix seul pouvoit indiquer un amateur de la Botanique. La maladie, dont il osoit attaquer les funestes symptomes, souvent plus dangereuse que les fièvres les plus violentes, n'est pas communément comprise dans ce qui fait proprement l'objet de la Médecine: il est vrai que le Médecin du jeune Antiochus découvrit la folle passion de ce Prince par l'application des règles de son art; mais il ne s'aviseroit guère de soupçonner que les plantes en pareil cas puissent avoir l'honneur de la guérison, & le remède qu'il proposa, comme seul infailible, s'offrit sans doute plus naturellement. Comme tout intéresse dans la vie des hommes d'un mérite rare & distingué, nous ne ferons nulle difficulté de dire ici que la Thèse de M. de Sauvages lui valut pour quelque temps le surnom de *Médecin de l'amour*. Ce n'est pas sous ce titre que l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre & les autres Pays sçavants l'ont connu depuis.

M. de Sauvages, dans sa patrie plus qu'ailleurs, fut le Médecin de l'amour: il eut dans sa jeunesse, ou parut avoir le cœur tendre; il faisoit des vers, & on ne parloit à Alais que des pièces de Poésie qui lui échappoient fréquemment, pour ou contre le beau sexe, selon qu'il en étoit bien ou mal traité. Les pièces qu'un peu de dépit lui attrachoit, tenoient souvent lieu de remède pour une guérison que les plantes n'auroient pas opérée, & justifioient en quelque sorte le nom dont on l'avoit décoré. On peut juger de son talent pour les vers par plusieurs morceaux de sa composition insérés dans les *Mercures* de ce temps-là: ce sont des Madrigaux, des Epigrammes, des Sonnets, des Elégies, & d'autres Ouvrages de cette espèce, tous assez bons pour permettre à leur Auteur d'aspirer à la réputation de Poète; mais il eût le courage de renoncer à cette gloire, dont l'appas est si séduisant. Sa profession, qu'il ne perdoit point de vue, l'occupa bientôt plus que jamais; il regarda comme des distractions importantes tout ce qui pouvoit se détourner de cet objet principal: les petits vers furent sacrifiés à son devoir; il les bannit impitoyablement de ses amusements, & le Dieu du Parnasse ne fut plus pour lui que le Dieu de la Médecine.

Les grands talens doivent se perfectionner dans la Capitale. M. de Sauvages, qui s'y rendit vers 1730, y passa environ quinze mois au milieu des Sciences & des Sçavans, & probablement il s'y seroit fixé, si les attaques fréquentes d'un mal d'yeux, mal trop cruel pour un homme de lettres, ne l'eussent ramené malgré lui dans sa patrie. Il attribuoit à l'air & au climat de Paris cette incommodité qui, en se dissipant, lui laissa le reste de ses jours un peu de foiblesse dans l'organe de la vue : peut-être devoit-il s'en prendre à sa grande application au travail, prodigieusement redoublée dans la Capitale par les occasions plus multipliées de s'instruire; mais il est rare que ceux qui ont commis des excès en ce genre, s'en accusent de bonne foi.

Ce qui est certain, c'est que pendant ce séjour de Paris il conçut & exécuta l'heureuse idée d'un Ouvrage, où les maladies, exactement distinguées par leurs genres & leurs espèces, se trouvent distribuées en différentes classes, suivant la méthode employée pour les plantes par les Botanistes. Il avoit d'abord communiqué son plan à l'illustre M. de Boerhaave, qui, en louant le projet, n'avoit point dissimulé les difficultés de l'exécution; mais les obstacles, loin de rebuter M. de Sauvages, servoient à l'animer : il poursuivit son entreprise avec vivacité; il lut une infinité de livres que les nombreuses bibliothèques de Paris lui fournissoient; il consulta les personnes les plus expérimentées dans la profession; il amassa des matériaux; il les mit en œuvres. Tout cela se fit en peu de temps; & à peine fut-il de retour en Province, que le Public reçut de lui le *Traité des Classes des Maladies*, en un volume in-12, composé en français.

Ici commence la réputation de M. de Sauvages parmi ses Confrères & dans le monde sçavant. Son livre, qui n'est que le germe d'un autre beaucoup plus considérable qu'il a publié dans la suite sur la même matière, le fit connoître dès lors avantageusement. Il n'eut pas besoin d'un autre titre pour monter en grade de Professeur en Médecine dans l'Université de Montpellier, sans passer par les épreuves ordinaires du concours & de la dispute. Les Classes de Maladies parurent en 1731. & trois ans après le Roi lui donna la survivance de la Chaire qu'occupoit dans cette Université son M. Marcot, l'un de nos Académiciens, premier Médecin ordinaire de S. M. & Médecin des Enfants de France.

Placé à 28. ans à côté de ceux qu'il avoit eu pour Maîtres, destiné à former comme eux de dignes Elèves, il jugea bientôt que, pour donner sur toutes les parties de la Médecine d'utiles instructions, il falloit en rectifier d'abord la théorie, étrangement défigurée par plusieurs opinions, dont la raison & l'expérience conspirent également à démontrer la fausseté. Ces opinions, on est forcé de le dire, dominoient dans l'Université de Montpellier : M. de Sauvages les y avoit trouvées lorsqu'il étoit venu pour y étudier en Médecine : lui-même, dans les commencemens, les avoit peut-être adoptées sur la foi d'autrui : mais au moins on lui doit cette justice, qu'il s'en est bientôt dérompé, sans abandonner, sur une infinité d'autres points très-essentiels, la doctrine constante de cette même Ecole, doctrine qu'il avoit reçue avidement & soigneusement recueillie, comme nous l'avons déjà dit. Il est nécessaire d'observer que les opinions spéculatives, qui le choquoient tant, n'étoient point particulières à cette Ecole si renommée; c'étoient les dogmes favoris de beaucoup d'autres Facultés, enseignés par des hommes célèbres, à qui la Médecine a d'ailleurs les plus gran-  
des



des obligations. Ces autorités respectables n'imposoient plus à M. de Sauvages : l'erreur lui parut au contraire plus dangereuse par le crédit que lui prêtoient des noms révévés.

Les Médecins, qui soutenoient avec le plus de confiance la fausse doctrine dont nous parlons, se paroient volontiers du titre de Médecins Mécaniciens, se distinguant par là de cent de leurs prédécesseurs qui n'avoient vu, dans les phénomènes de l'économie animale, qu'une fermentation imaginaire, un combat chimérique des alkalis avec les acides. Pour eux, ils faisoient profession de n'admettre que des idées claires, des principes distinctement connus. Ils appelloient à leurs secours la Physique expérimentale, la mécanique hydraulique, la Géométrie, mais par malheur ils en abusoient, & c'étoit la source de leurs égarements. Ils tiroient fautive d'une expérience certaine ou d'un principe vrai, des fausses conséquences : souvent aussi la méprise & l'erreur venoit du principe même. On mettoit sur le compte des Mécaniques & de la Géométrie, des théorèmes prétendus, des axiomes qui ne le furent jamais ; espèce d'outrage que l'on faisoit impunément à des sciences dont le partage est la certitude.

On avançoit avec une entière assurance qu'un fluide, mu par une force donnée, reçoit toujours sur son passage un accroissement de vitesse, à mesure que ce passage est plus rétréci : on soutenoit que les machines augmentent les forces, tandis qu'elles ne font que les appliquer & les modifier : on ne vouloit tenir aucun compte des pertes causées par les frottements : on admettoit des ressorts supérieurs à la force qui les avoit comprimés, des mouvements sans moteurs, des effets plus grands que leurs causes. Ainsi, quand il étoit question d'expliquer comment le mouvement du sang continu, nonobstant les résistances accumulées qui devoient, ce semble, en peu d'instants l'arrêter ; on disoit qu'en vertu de la structure particulière du cœur, ce mouvement une fois imprimé devoit, à l'aide des aliments que nous prenons, de l'air qui nous environne & que nous respirons, durer toute la vie : & si l'on sentoit malgré cela la nécessité de remonter la machine, on attribuoit cette fonction au fluide nerveux, qui s'en acquittoit miraculeusement ; car on étoit bien éloigné de penser que ce fluide, qui, empruntant sa vitesse du sang, n'a pu prendre d'ailleurs, dans les suppositions les plus favorables, qu'une petite portion de la force que le sang a perdue, ne peut lui rendre, selon les loix ordinaires de la nature, plus de mouvement qu'il n'en a reçu. Pour rendre raison de l'augmentation du mouvement du sang dans la fièvre, on disoit que les obstructions des petits vaisseaux, de cela sent qu'elles rétrécissoient & gênoient le passage de ce liquide, lui donnoient plus de vitesse ; & si l'on avoit quelque honte de faire naître si mal adroitement la force de la résistance même, on faisoit réagir les vaisseaux sur le sang, en supposant dans le tissu de leurs fibres un ressort si merveilleux & si parfait, que nul effort n'étoit capable de tenir ces vaisseaux distendus, ou du moins de les empêcher de se rétablir. La rhéorie ordinaire de l'inflammation n'étoit pas moins vicieuse : la même illusion régnoit partout ; les mêmes principes, par un enchaînement nécessaire, mais malheureux, ramenoient toujours les mêmes conséquences.

L'amour de la vérité dominoit dans M. de Sauvages. Il suivit la pente de son caractère

re, quand il prit la généreuse résolution de combattre ces erreurs, depuis long temps accréditées. Quelque déterminé qu'il fût à les poursuivre sans relâche, & s'il étoit possible, jusqu'à leur entière extinction, il cachâ d'abord une partie de son projet par égard pour les Professeurs, ses Confrères, qu'il voyoit tous plus ou moins attachés à ses fausses explications. Rien de plus simple en apparence que son début: il proposoit avec la modestie d'un nouveau venu quelques difficultés en forme d'éclaircissements. Bientôt il se montra plus hardi, & comme on avoit dû le prévoir, on ne fut pas long-temps sans en venir de part & d'autre à une guerre déclarée. M. de Sauvages attaquant toujours, & ses adversaires mettant en œuvres tout ce qu'ils avoient de ressources pour se défendre, la dispute s'anima de plus en plus, les subterfuges & le bruit de l'école troublèrent plus d'une fois la marche compassée & géométrique de M. de Sauvages; mais il ne se contentoit pas d'argumenter sur les bancs, il exposoit ses prétentions dans plusieurs Dissertations imprimées, qui se succédoient les unes aux autres avec rapidité, en sorte que ceux qui avoient refusé de l'écouter, se trouvoient forcés de le lire. Insensiblement il gagna du terrain; ses adversaires, malgré la bonne contenance qu'ils affectoient, étoient poussés de poste en poste: leur embarras, dans de certains moments, étoit extrême; ils ne vouloient pas résister la fermentation pour jamais abolie, & ils ne savoient guère plus où se réfugier.

Il fallut reconnoître que M. de Sauvages avoit raison sur bien des points, & que plusieurs des explications qu'il combattoit, pouvoient sans le moindre inconvénient lui être sacrifiées; on lui demanda seulement ce qu'il prétendoit mettre à la place. Il pouvoit répondre, & il le fit d'abord, qu'une erreur n'est ni plus ni moins erreur, soit qu'on la remplace ou non par des vérités; mais il comprit bientôt que, dans la position où il étoit, cette réponse, si solide, si vraie, ne feroit pas long-temps satisfaisante. Le personnage de simple dessinateur n'est pas toujours propre à soumettre ou à gagner les esprits: on n'habite pas volontiers sur un tas de ruine; on cherche un petit édifice, où l'on puisse loger avec quelque sûreté. Pressé par cette considération, il se résolut enfin à mettre au jour son sentiment sur toute cette matière, tel que nous allons l'exposer.

Les phénomènes de l'économie animale, en présentant à chaque instant une force qui croît comme la résistance même, se montrent supérieurs aux loix ordinaires de la mécanique; il est d'ailleurs fort naturel que des puissances animées augmentent leur effort à mesure qu'on leur résiste, & dans l'homme corporel & spirituel tout ensemble, il existe certainement une puissance de cette espèce. L'ame, de l'aveu de tout le monde, est le principe des mouvements volontaires du corps humain; elle l'est aussi, selon M. de Sauvages, des mouvements involontaires & naturels. Excitée par le sentiment confus de ses besoins, occupée en tout temps de la conservation du corps auquel elle est unie, poussée par le desir inné d'éloigner le terme fatal qui doit rompre cette union, elle agit dans cette vue par une espèce d'instinct, sans se rendre sensiblement témoignage de son action; elle est le moteur qui remonte la machine, elle combat efficacement les résistances ordinaires, qui tendent à supprimer le cours de nos liquides; elle fait circuler le sang: à de nouveaux obstacles, elle oppose de nouveaux efforts, & c'est dans ces sortes d'efforts redoublés que consiste la fièvre; efforts heureux ou malheureux selon

selon les circonstances ; effort dont l'unique but est notre guérison même : on reconnoît ici cette nature , dont le Médecin doit étudier la marche & seconder les opérations . Tel est le système que M. de Sauvages se fit une gloire d'adopter . A peine s'étoit-il expliqué dans une Dissertation qui en promettoit beaucoup d'autres, que ses adversaires, à qui la guerre défensive avoit assez mal réussi , furent agresseurs à leur tour, se flattant de prendre bientôt leur revanche . Les objections ne manquèrent pas : ils opposèrent à M. de Sauvages que son opinion le conduisoit à donner non seulement aux bêtes, mais aux plantes même, une ame intelligente ; il répondit, & de vive voix , & dans plusieurs Theses ou Dissertations imprimées, qu'il n'avoit jamais cru que les bêtes fussent de pures machines , & qu'à l'égard des phénomènes de la végétation, on savoit assez que la chaleur du soleil, celle des feux souterrains, l'action des suc de la terre, en étoient, sans autre principe moteur, les véritables causes ; on lui nia que l'ame peut agir sans s'apercevoir de son action . Il eut recour alors à tout ce que la Métaphysique pouvoit lui fournir sur les perceptions obscures & les affections confuses de l'ame ; il cita l'exemple des passions, dont les effets les plus soudains & les plus indépendants de la volonté sont si sensibles sur nos organes . Si l'obscurité du sujet faisoit naître des objections, elle les rendoit moins concluantes . L'incertitude des coups portés pendant la nuit est souvent une ressource heureuse pour les éviter : on est vivement pressé, & l'on échappe à la faveur des ténèbres .

M. de Sauvages n'avoit pas le premier proposé cette opinion , qui étoit celle de plusieurs modernes , sans parler de tous les sectateurs qu'elle a eu dans l'antiquité ; mais , s'il n'est pas l'inventeur du système, il se l'est rendu propre, en lui donnant une nouvelle forme, en cherchant à l'appuyer par des preuves nouvelles, en travaillant plus que personne à la mettre en crédit : il s'en est occupé dans la plupart de ses ouvrages , il y revenoit continuellement ; il en a tant parlé qu'il nous a mis dans la nécessité d'en parler beaucoup nous-mêmes .

Après plusieurs années que dura cette dispute , les esprits agités se calmèrent . Qu'a-t-il enfin résulté de cette controverse d'école ? Rien d'utile pour la pratique, il le faut avouer : les Médecins, *Animistes* ou non, emploient dans les mêmes occasions les mêmes remèdes ; & de son côté, l'ame, si l'on veut, n'en fait ni plus ni moins . Pour la Théorie de la Médecine, M. de Sauvages l'a réformée, comme il l'avoit projeté ; la fausse doctrine, qu'il a combattue, est aujourd'hui totalement décréditée à Montpellier, & il n'y a pas d'apparence qu'elle s'y relève jamais . A l'égard du système qui attribue à l'action de l'ame le mouvement même du cœur & la circulation du sang, on peut croire aussi qu'il ne sera jamais universellement reçu ; il est plus aisé de le défendre, quand on a bonne envie de le soutenir, que de persuader ceux qui seroient naturellement portés à le rejeter . La plupart des Médecins se contenteront de reconnoître en général un principe des mouvemens vitaux, supérieurs au mécanisme ordinaire : quel que soit ce principe, si existe, c'est assez ; la curiosité bien réglée se dispensera d'aller plus loin .

Et au fond, c'est ici la marque & l'esprit de la Physique moderne ; tout s'y réduit en dernière analyse à quelques principes d'expérience, inconnus en eux-mêmes, ainsi que dans leur liaison avec la cause première, & manifestés seulement par leurs effets . De là le progrès  
che

cha de renouveller les qualités occultes ; reprocha dont on est aujourd'hui fort peu touché. M. de Sauvages admettoit trois Principes de ce genre : l'impulsion ; elle est obscure, quoiqu'elle tombe sous les sens : l'attraction ; la raison & l'expérience l'avoit fait Neptunien, avant que la mode même invitât de l'être : la faculté motrice de l'ame ; elle se découvre dans les mouvemens volontaires, & nous avons vu qu'il faisoit dépendre de la même cause les mouvemens nécessaires & naturels.

Pendant qu'il étoit le plus occupé de la contestation dont nous venons de rendre compte, il se ménageoit du temps pour apprendre l'Anglois, devenu si utile à ceux qui ambitionnent la gloire d'exceller dans les sciences ; & , en l'apprenant, il traduisit en François l'Hémastatique, ou la Statique des Animaux du célèbre M. Hales. Il y joignit un Commentaire, qui fut imprimé à Geneve en 1744. avec la traduction du texte, & deux Dissertations du Traducteur, l'une sur la fièvre & l'autre sur l'inflammation. L'insuffisance des explications prétendues mécaniques est démontrée dans ces Dissertations, où l'ame, principe des mouvemens du cœur, paroît jouer le principal rôle. M. de Sauvages développe ici les mêmes idées qu'il vouloit faire régner dans l'école, & il les expose à l'Univers sçavant.

Sa Traduction de l'Hémastatique ne pouvoit être d'ailleurs que favorablement accueillie. Elle fut, avec tout ce qui l'accompagne, mise à son tour en Italien par une jeune Napolitaine, & en Allemand à Leipzig, avec les notes particulières que Mademoiselle Ardinghelli, c'est le nom de cette sçavante Italienne, avoit ajoutées à celles du Traducteur François.

En 1740. M. de Sauvages fut nommé par le Roi pour faire, à la place de M. Chicoyneau le fils, qui venoit de mourir, les démonstrations des plantes au Jardin royal de cette Ville, alternativement avec M. Fitz Gerald, qui, étant mort lui-même en 1748. le laissa pour plusieurs années chargé de tout ce travail. Il eut en 1752. un Brevet de Sa Majesté, qui, avec le titre de Professeur royal de Botanique, lui en attribuoit plus particulièrement les fonctions pendant la jeunesse de celui que ces mêmes fonctions regardoient naturellement. C. étoit servir M. de Sauvages que de fournir de l'aliment, & de l'exercice au goût qu'il avoit toujours témoigné pour la Botanique. Ses leçons sur cette science eurent beaucoup d'éclat : on couroit en foule pour l'entendre ; on se suivoit dans ses herborisations à la campagne, d'où il rapportoit de temps en temps différentes plantes, dont ce pays s'étoit crû jusqu'alors dépourvu. Il en faisoit venir en même temps quantité d'étrangères. Avec nos richesses, croissoit le nombre de ceux qu'il rendoit capables d'en faire usage : on voyoit naître sur les pas des plantes & de Botanistes.

Il fit paroître en 1751. son Ouvrage, intitulé *Methodus Foliorum*, ou Exposition d'une nouvelle Méthode pour connoître les especes par les feuilles. Là se trouve le Catalogue d'environ 300. plantes des environs de Montpellier, qui manquent dans le *Botanicum Montpelicense* de M. Magnol. Ce même Catalogue, sous le nom de *Flora Montpelicensis*, est encore inséré dans le IV. Tome des *Amanitates Academicæ* de M. Linnæus. Cet illustre Chef des Botanistes des nos jours, déjà depuis long temps en correspondance avec M. de Sauvages, marquoit publiquement en toute occasion l'estime qu'il avoit pour lui. Il faut remar-

remarquer que des 300. plantes dont nous parlons, il y en a plusieurs que M. de Sauvages a caractérisées & nommées. Il a fait cinq genres nouveaux, le *Triant hennum*, l'*Ebennus*, le *Camphorosina*, le *Buffonia* & le *Reaumuria*; ces deux derniers sont consacrés à deux hommes célèbres: les Botanistes font dans l'usage de faire de ces sortes de présents, non seulement à leurs pareils, mais encore à d'autres personnes distinguées. Il étoit juste que M. de Sauvages en eut un de cette espèce; il le dût à M. LINNÆUS, qui donna le nom de *Sauvagesia* à une plante venue de la Cayenne. M. Boerhaave avoit de même autrefois gravé sur une plante le nom de son M. Nissolle, un des plus sçavans Botanistes de cette Compagnie.

L'ordre chronologique des productions de M. de Sauvages nous conduit à ses *Elémens de Physiologie* & à sa *Pathologie méthodique*, deux *Traités* où la force motrice de l'ame n'est pas publiée, composés en Latin pour l'instruction principalement des Etudiants en Médecine, & publiés en 1755. & 1759. Nous trouvons de plus, en négligeant ou confondant les dates, un grand nombre de Dissertations latines sur des sujets particuliers très intéressants. Tantôt il y ouvre de nouvelles sources de pronostics pour les maladies: tantôt il examine les avantages que peut avoir la manière dont on pratique la Médecine chez les Chinois: ici son objet est d'établir l'influence des astres sur le corps humain; influence Physique, bien différentes de celle que nous avons traitée, au commencement de cet Eloge, d'aveugle superstition: là, voulant dévoiler la nature du fluide nerveux, il imagine le premier, & prouve, autant qu'on le peut, par la plus exacte analogie, que ce fluide est le même que le fluide électrique; sentiment adopté depuis presque universellement, & qui compte entre ses partisans le fameux Physicien de Philadelphie, M. Franklin, dont le suffrage, dans tout ce qui concerne l'Electricité, ne peut être que d'un grand poids.

On trouvera dans le quatrième tome de la Collection de M. de Haller une Dissertation de M. de Sauvages (\*), où il a rassemblé tout ce qu'il avoit dit ailleurs de plus fort pour établir son système de l'action de l'ame, comme principe des mouvements du cœur. Cet Ecrit lui attira une critique très-polie de M. Eberhard, Professeur de Mathématiques à VVittemberg, & aujourd'hui de Médecine à Hall en Saxe. M. de Sauvages répondit avec la même politesse, aussi éloignée de l'ancien ton des Ecoles, qu'assortie au ton moderne des Académies.

Il avoit pris ce ton de bonne heure, & il avoit aisément acquis toute la perfection. Il s'étoit vu dès 1731. attaché, sous le titre de Correspondant, à la Société royale des Sciences, qui, l'ayant nommé Adjoint quelque temps après, l'avoit enfin élevé en 1740. au grade d'Associé dans la classe des Botanistes. Peu d'Académiciens, nous pouvons le dire, ont été plus assidus que lui, & ce qui est tout autrement important, plus utiles à nos Conférences. Il se présentoit rarement les mains vuides; il rendoit la plupart de nos Séances intéressantes, ou par ses propres ouvrages, ou par ceux que lui envoyoient continuellement divers Sçavans de l'Europe, ses Correspondans.

Un caractère d'utilité, plus prochaine & plus sensible, distingue, entre tous les différens

Mé.

(\*) Cette Dissertation est intitulée: *De Natura redivivum seu de imperio anima in cor.*

Mémoires que nous avons de lui, son Ecrit sur la maladie des Boeufs du Vivarais, ses Observations sur les Eaux minérales d'Alais, le détail qu'il nous a donné des guérisons opérées à Montpellier par le moyen de l'Electricité, son Memoire sur la maniere d'élever les vers à soie, sujet qu'il abandonna bientôt à M. l'Abbé de Sauvages, son frere, qui l'a traité, comme l'on fait, avec le plus grand succès.

Les Recueils de l'Académie des Sciences de Paris offrent deux Mémoires de M. de Sauvages, envoyés en 1739. & 1742. pour notre tribut annuel. L'un de ces Mémoires met en évidence les qualités nuisibles de certaines plantes; l'autre est la Relation de la maladie d'une fille, tout à la fois somnambule & cataleptique.

Un fait particulier à notre Académicien, c'est qu'après la mort de M. de Plantade, la place de Secrétaire ayant vagné dans la Compagnie environ un an & demi, il en fit durant ce temps-là les fonctions, sans que le soin qu'il prenoit de rassembler & de mettre en ordre les productions des autres, l'empêchât de produire beaucoup lui même.

Quoique ses recherches se soient étendues sur presque toutes nos Sciences, nos volumes prouveront que, même dans l'Académie, l'application des Mathématiques à la Médecine fut toujours un de ses grands objets; ce qui lui donna plus d'une fois occasion de nous entretenir de ses disputes avec les Professeurs; ses Confrères, dont plusieurs étoient aussi les nôtres, comme Académiciens. La Société, prise pour juge de certains points contestés, décida toujours en faveur de M. de Sauvages, en s'abstenant de toucher à des questions métaphysiques, qui ne sont nullement de son ressort.

Les Compagnies sçavantes étrangères ornent leurs listes du nom de M. de Sauvages. Il étoit des Sociétés royales de Londres, d'Upsal & de Stockholm, de l'Académie de Berlin, de celle de l'Institut de Bologne, des trois Sociétés établies à Florence, de l'Académie Imperiale des Curieux de la Nature, qui, en l'aggrégeant, lui donna le nom de Straton second.

Ces différentes adoptions académiques, en le rendant plus célèbre, augmentoient le nombre de ceux qui recherchoient sa correspondance. On ne finiroit point, si l'on vouloit simplement nommer les Sçavants, tant du Royaume que des Pays étrangers, qui se faisoient honneur d'être en commerce avec lui.

Aux Académies empressées de se l'associer, il faut joindre celles qui couronnerent ses travaux. Il remporta le prix en 1748. au jugement de l'Académie des Sciences & Belles Lettres des Toulouses, par une Dissertation sur la rage. Deux sçavants Traités, dont l'un a pour objet l'action des médicaments, & l'autre les effets de l'air sur le corps humain, lui firent décerner les mêmes récompenses littéraires par l'Académie de Bourdeaux. Celle de Rouen lui donna une semblable couronne pour l'Ecrit qu'il lui avoit envoyé sur les animaux venimeux de France. Il concourut pour le prix proposé par l'Académie de Berlin, sur la question célèbre de la cause du mouvement musculaire, & l'Ouvrage qu'il avoit présenté fut imprimé à la suite de celui qui avoit eu la préférence.

Nous ne faisons qu'indiquer des Ecrits suffisamment connus. Les deux Dissertations couronnées à Bourdeaux, ont été traduites en Italien, & commentées par M. Manetti, sçavant Professeur de Florence. La Dissertation sur la rage a reçu jusqu'à trois fois l'honneur des éditions postérieures.

On demandoit à M. de Sauvages depuis long-temps une nouvelle édition du Traité des Classes des Maladies, qui étoit devenu rare, & il avoit promis de la donner: il fit bien plus que de tenir simplement sa parole, lorsqu'il publia son grand Ouvrage, intitulé: *Nosologia methodica sistens Morborum classes, genera & species*, &c. en cinq volumes in 8, imprimé à Amsterdam, en 1763.

Il est visible en effet que ce dernier Ouvrage l'emporte infiniment sur celui que l'on avoit redemandé: c'est toujours le même projet d'une distribution méthodique des maladies en classes, en genres & en espèces; mais ici la matière s'est prodigieusement accrue dans l'exécution, & la forme est presque nouvelle. L'arrangement total est mieux entendu; les observations sont en bien plus grand nombre & plus variées. L'Auteur indique les sources où il a puisé: il a reçu des secours d'un de ses Confreres dans l'Académie, M. Cusson, Docteur en Médecine de Montpellier, qui lui a fourni l'idée & les principaux détails d'une des Classes, avec certaines espèces & certains genres dans les autres Classes, & quelques ordres particuliers.

Dix classes comprennent 195. genres, sous lesquels viennent se ranger environ 1400. espèces de maladies jusqu'ici observées. Quel nombre prodigieux d'ennemis! M. de Sauvages ne se flattoit cependant pas de les connoître tous.

Sa Nosologie est dédiée à la sçavante Mademoiselle Ardingheli: il se souvenoit d'avoir été traduit par elle, & même embell.

On peut dire avec vérité que M. de Sauvages a donné, dans sa Nosologie méthodique, un Dictionnaire des maladies universel & raisonné: une introduction générale à leur connoissance; un Traité, qui tient le milieu entre la Pathologie, qui considère nos maux, & la Thérapeutique, qui s'applique à les guérir; un Ouvrage vraiment classique, nécessaire aux Commencans; & que les plus expérimentés dans l'Art doivent eux-mêmes sans cesse consulter; le Breviaire des Médecins, comme on a dit autrefois d'une des Tragédies du grand Corneille, qu'elle étoit le Breviaire des Courtisans.

Doit-on s'étonner après cela que la réimpression de cet Ouvrage ait été des plus marquées; qu'on l'ait imprimé déjà plus d'une fois; que plusieurs fameux Professeurs se soient empressés d'en adopter entièrement l'esprit & la méthode; que le célèbre M. Linnæus ait pris la Nosologie méthodique pour base de ses leçons de Médecine dans l'Université d'Upsal.

Ce Sçavant Suédois, l'un de nos Associés étrangers, avec qui M. de Sauvages entretenoit toujours une exacte correspondance, doit fixer ici plus particulièrement notre attention. Il admiroit les Ouvrages dont nous avons parlé: il aimoit tendrement & même passionnément l'Auteur, qui de son côté lui avoit voué les mêmes sentimens: c'est une espèce de phénomène que cette vive amitié de deux personnes, qui ne s'étoient jamais vues. Nous ne doutons point que M. Linnæus n'ait donné des larmes sur une perte que nous avons tant de sujets de deplorer. Il parloit sans cesse de M. de Sauvages, comme d'un des plus grands ornemens qu'ait jamais eu la Faculté de Montpellier; il le préféroit sans héiter à des hommes sublimes, qui ont fait aussi la gloire de ce siècle. En lui écrivant, c'étoit tantôt, *au grand*, à l'*illustre Sauvages*, tantôt, *au Prince de Medecus*. Il savoit bien qu'il bleteroit par là l'extrême modestie de son ami; mais il ne pouvoit le ré-

se refondre à supprimer l'hommage qu'il croyoit devoir en toute occasion à un mérite si éminent.

Il étoit ordinaire à notre Académicien de recevoir ces épithètes honorables des étrangers, dont plusieurs, voyageant dans d'autres parties de la France, se détournèrent pour le venir voir à Montpellier, où sa chaire de Professeur le fixoit.

On se souvient encore d'un Seigneur Prussien, qui, en arrivant dans cette ville, demanda qu'on le conduisît chez celui qu'il appelloit *le Grand Sauvages*, & qui témoigna sa surprise & son indignation même, en voyant que ceux à qui il s'adreffoit, ne savoient d'abord à quel personnage il donnoit ce nom.

Les Ecrits qui lui avoient acquis cette réputation, étoient les résultats précieux de sa vaste lecture, de ses méditations profondes, de ses observations sur son art, de ses calculs mathématiques, d'un grand nombre d'expériences de Physique & d'Hydraulique, souvent faites par lui-même. Il composoit du reste avec une extrême facilité. Dès qu'il avoit une fois conçu & bien mesuré son sujet, il laissoit aller sa plume avec une rapidité prodigieuse; de là des négligences dans son style, qui pourroit en général être plus châtié. Il suivoit d'ailleurs très-scrupuleusement, en écrivant sur les Sciences, certains principes rigoureux qu'il s'étoit faits; il rejettoit, au mépris de son ancienne poésie, la plupart des expressions figurées, plusieurs métaphores même, dont l'usage est familier, & qui donnent au discours plus d'agrément & de vivacité: ce défaut d'ornemens étoit au fond un inconvénient assez médiocre, & les étrangers sur tout n'en ont jamais paru choqués.

Quelqu'attaché qu'il fût à son cabinet, à ses livres, à ses expériences, il quittoit souvent les malades qui reclamoient son secours. Ils furent d'abord en petit nombre: ce n'est pas qu'il n'eût du talent pour la pratique; mais il ignoroit entièrement l'art de se faire valoir, & il falloit du temps pour réduire au silence ceux qui prétendoient borner son mérite à la simple spéculation. Les étrangers lui rendirent bientôt justice: il lui venoit de toutes parts un nombre infini de consultations, & même il commençoit à pratiquer dans la ville plus qu'auparavant, lorsque la mort nous l'a enlevé.

Sa maladie, qui dura près de deux ans, se manifesta par une difficulté de respirer, qui, résistant à tous les remèdes, & augmentant toujours, ne l'empêcha pas néanmoins de vaquer, pendant un temps, à ses travaux ordinaires. Il continua de fréquenter & les Ecoles de Médecine & l'Académie; il prépara quelques augmentations pour une nouvelle édition de la Nosophologie méthodique; il mit la dernière main à un grand nombre de Mémoires, destinés par cette Compagnie à l'impression: ces Mémoires, ainsi perfectionnés, ont été remis par lui-même deux mois avant sa mort.

Il étoit alors obligé de garder la chambre, & enfin il fut forcé de s'alliter: sa poitrine, vivement atteinte, fit prononcer qu'il étoit sans ressource. Il ne s'occupoit plus que de l'autre vie; & muni des secours de la Religion, il mourut dans les dispositions les plus édifiantes, le 19. Février 1767. âgé de 60. ans & 9. mois. Il avoit enseigné la Médecine dans la Faculté de Montpellier pendant près de 33. ans, soit en qualité de survivancier de M. Marcot, soit après la mort de ce dernier, comme Professeur Titulaire.

Les sentimens qu'il a fait paroître en finissant, étoient la suite de ceux qu'il avoit eus toute



toute sa vie. Les vérités de la Foi le trouvant dans tous les temps plein de respect & de soumission. Il avoit étudié les preuves du Christianisme, pour être en état de montrer, dans l'occasion, qu'elles sont dans leur genre aussi concluantes que les démonstrations géométriques : il ne s'en étoit pas tenu, sur cette importante matière, à la théorie ; & long-temps avant sa mort, on l'a vu vivre, non seulement en honnête homme, mais encore en très-bon Chrétien.

Il étoit simple dans ses mœurs comme dans son caractère. Il communiquoit sans peine ce qu'il savoit, & il recevoit des autres aussi volontiers ce qu'ils étoient en état de lui apprendre. Ses connoissances passaient sans faste dans ses conversations ; nulle envie d'éaler. Il portoit quelquefois dans le monde cet air que l'on prend dans le Cabinet, & qui s'oppose si souvent malgré nous à l'enjouement & aux graces.

Il avoit épousé en 1748. Jeanne Yolande Foucard d'Olimpies, fille de Nicolas Foucard d'Olimpies, Capitaine au Régiment Dauphin, Dragons, Chevalier de Saint Louis, & sœur de Monsieur le Lieutenant de Roi de Montpellier, avec la quelle il a vécu dans la plus parfaite union. Il en a laissé deux fils & quatre filles.

Plusieurs freres qu'il avoit se sont tous distingués dans différentes professions : on a déjà parlé du goût de l'aîné pour les Mathématiques. M. l'Abbé de Sauvages, l'un d'eux, connu par plusieurs Ouvrages, est Associé Vétéran dans cette Compagnie : il est fâcheux pour nous que, retenu par d'importants devoirs, il ne puisse nous consoler par la présence de la perte d'un frere, dont nous regretterons long-temps, & les talents sublimes, & l'utile assiduité.



## NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

**A** Vendo veduto per la fede di Revisione, ed Approvazione del P. Fr. Filippo Rosa Lanzi Inquisitor General del Santo Officio di Venezia, nel Libro Intitolato *Nosologia methodica sistens morborum classes, genera & species &c. Auctore Fr. Boissier de Sauvages*, non v'esser contra alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a Niccolò Pezzana, che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 19. Dicembre 1763.

( SEBASTIAN ZUSTINIAN RIFOR.

( ALVISE VALARESSO RIFOR.

( FRANCESCO MOROSINI 2. CAV. RIFOR.

Registrato in Libro a Carte 189. al Num. 1063.

Davide Marchesini Segr.

Adi 24. Dicembre 1763.

Registrato in Libro del Magistrato Eccellentiss. de' Signori Esecutori contro la Bestemmia.

Francesco Gadaldini Segr.

## NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

**C** Oncediamo Licenza a Francesco di Niccolò Pezzana Stampator di Venezia di poter ristampare il Libro intitolato *Nosologia Methodica Sistens, Morborum Classes, genera, & Species, Auctore Fr. Boissier de Sauvages*, osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, & presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 14. Aprile 1773.

( SEBASTIAN ZUSTINIAN RIFOR.

( ALVISE VALARESSO RIFOR.

( FRANCESCO MOROSINI 2. CAV. PROC. RIFOR.

Registrato in Libro a Carte 93. al Num. 769.

Davide Marchesini Segr.



# M O R B O R U M C L A S S E S.

## P R O L E G O M E N A.

1. **N**ullus est qui, vulgaribus Medicinæ principiis imbutus, animum paulo attentius ad praxim appulerit, cuius ob oculos infinitæ fere quoties diebus non observatæ fuerint difficultates, quemque vel morborum diversitas, vel signorum confusio, vel nova symptomatum facies, vel Auctorem dissenso, at millena alia mittam, hærentem & ancipitem non detinuerint. Ego quidem ad has redactus angustias, si Collegas consulēbam, ad longiorem usum & diuturniorem experientiam brevi dimittebam: si Auctores evolvebam, in ipsorum scriptis bene multa quidem inveniebam, sed ad rem non attinentia: id enim solemne nimis est, quidquid in libris illis non quæritur, illud ubique obvium est; quidquid vero quæritur, hoc nusquam adest. Demum reperi sorte Præcticos eximios, simulque antiquæ fidei viros qui se similibus olim nodis irretitos fuisse dicebant, & ita his oppressos, ut fere Medicinæ vale dixissent, nisi vel amica quædam manus suppetias tulisset, aut se communi omnibus novitiis infortunio laborare sensissent. Hoc est utique exiguum, sed unicuique ferme miseris solatium, quod tamen mentem meam hoc onere non penitus liberavit, unde sedulus semper Ariadneum quoddam inquisivi filum, cuius ope ab illo praxeos labyrintho me possem extricare.

2. Primam in cognoscenda morbi curandi specie sitam esse difficultatem sensi facile; alteram in detegenda indicatione, aut methodo ad eam speciem curandam accommodata, jacere non difficiliter intellexi: verum deficere libris ex quibus morbi cuiusvis species pateat, & propria

*Sauvages Nosologia Methodica. Tom. I.*

cuiuslibet medendi methodus deduci possit, hoc nemo Medicorum inficiabitur; notum siquidem est hunc esse, si Auctoris fides sit, usum theoriæ Medicæ, ut in diversis & infinitis casibus, quos praxis exhibet, Medici gressus dirigat, atque observationum pennam suppleat, ita ut huius ope munitus tyro, quotquot species morborum reperit, possit ex suo systemate non solum apte distinguere, sed etiam deductis ex eodem fonte indicationibus curare: tantum autem invaluit hæc opinio, ut omnis candidatus, vix e scholis egressus, verbis, distinctionibus, & quibusdam hypothesebus munitus, omnes ferme spernat Auctores, *Hippocratem* & *Galenum* derideat, sequi in medium morborum aciem, velut omnes, vi suæ theoriæ superaturus, audacter immittat. Ad imbellem tot hostes circumdant, tot sistunt obices, ut brevi temeritatem suam sentiat, terga vertere tamen erubescat, ad artis magistrum reverti nesciat; quid sit? ex desperatione crescit audacia, maxime si medicallos, planos, sibi famam & opes verbosis strophis, & arte veteratoria comparantes, observaverit, quod heu! nimis frequens est; illeam init viam tyrunculus, & vultu, gestu ad gravitatem composito, suam cum ignorantiam tum diffidentiam, ficta velans audacia, venales phrasas ore docturali profundit, & cum diu aliis sciens & volens imposuerit, semetipsum tandem deludit, ipse salitur, & se magni momenti personam exilitat.

3. Qui non stupore vulgi sibi quæsum facere, sed Artis prudentiam honestis studiis comparare contendunt, illi non a quacumque theoria in Medicinæ praxim duci se patientur, nec omnem Empyricorum in illar theoriarum abijcient: hanc

A

qui-

quidem sedulo vites, cujus principia precaria ex phantasia, potius quam ex repetita experientia, deducuntur, quæque in possibilitatibus subsistens, factis sen experimentis indubitatis non undequaque fulcitur; eaetenim pro basi artis Medicæ non licet assumere, de quibus adeo fumus incertus, ut nemo de bonis suis tam incertus esse velit; non enim vitæ minor quam pecuniæ habendæ debet esse cura: non itaque pro certis obtrudenda sunt de quibus inter vivos & mathematicæ Doctos, & minimis præjudiciis irretitos disputatur, siue quæ sensu perceptis certitudine se non exæquant, ut monet *Piternius*.

4. Sed quantum abest ut similibus principiis hæstent superstrudita sit theoria Medica! eam, antequam decreta fuisset circulatio, falsam & erroribus plenam fuisse facile concedetis. O systematici! eam ante hoc sæculum furnorum Chymicorum fumo obnubilatam, & a veritate multum alienam esse clamabitis omnes, qui hodie primas tenetis, mechanicæ scilicet fautores, superest itaque ut vestra theoria, mechanicæ titulo condecorata, veritatis scopum certius attigerit, & ita tuta sit, ut praxi viam brevem & planam sternat, quam tyronibus, non operoso & longo usu eruditis, sequi sufficiat. Inde tamen sequitur veteres saltem theorias, utpote fallaces & erroneas, praxi Medicæ promovendæ inutiles fuisse, adeoque hallucinatos esse harum sedarum patronos qui ad hæc usque tempora Medicinæ culmen attigisse putabant, ut gloriarentur hodierni Mechanici.

5. Sit amen quod res est effari liceat, utcumque Neoterici concedam paulo feliciorum esse nostris quam antiquis temporibus praxim Medicam, hoc tamen theoriæ præstantiori tribuendum non est, sed tantum anæstori, & cumulatae sensum practicoꝝ experientie; principia siquidem quæ pro mechanicis jactantur, ita sunt a veris mechanicis principiis aliena, ita sunt erronea, ut ea veterum Galenicorum & potissimum *Baltonii*, *Duretii*, ac *Riverii* principia nequaquam anteposenda videantur: cordis machinam ad instar mobilis perpetui sine motore moveri & proinde a fluidorum inertia & viscositate, vasorumque affluibus nequaquam retardari, quin a resistentis motum adaugeri, vulgo pronunciant Neoterici; elastica corpora cum prementibus repagulis minime æquilibrari, sed quo fortius distenduntur, eo facilius restitui putant; fluida vero in locis angustioribus non respectiva, sed absolute majorem velocitatem obinere contendunt, quamquam vis pellens solito major non fuerit: ex legibus sympathiæ, stimulorum, nullibi promulgatis, sed comicæ, æconomiam animale regi, seu quod idem est, sato quodam cæco gubernari voluit nuperi, & hanc lepidam theoriæ, licet mechanicæ in scientia-

rum Academiis cognita: profus contrariam a mechanicæ epitheto condecorat.

6. Nec mirum est ipsos Neotericos, licet eisdem scilicet mancipatos, inter se tantum dissidere, quantum omnes a veris Geometris dissident, & non solum in diversis Regionibus, sed etiam in eadem Schola, circa eundem morbum, ipsorum sententias sibi invicem repugnare. Febris, morborum classis in exemplum afferatur: hanc ab irritato & vellicato corde primus; alter ab eo corde intus presso & a sanguine distenso; tertius ab obstructis extremis sanguinibus; quartus a lymphaticis arteriosis impeditis; quintus a venis majoribus compressis; sextus a fluidi nervi prava indole; septimus a systematis nervi tensione & commotione, &c. deducere conatur. Quænam ex illis est theoria quæ, inconcussa Anatomie & Hydraulicæ principii innixa, cunctis satisfaciat phenomenonis, & praxi solidam, tutamque basim sternat? Omnes a decennio eliceret caput extulere; contravertuntur a Geometris singulæ, nullam ex his sufficienti tempore, praxi nemlem aut necessariam esse probavit experientia, quæ rerum est magistra; imo qui diversa sentiunt in theoria, non inde diversis auxiliis in praxi febrem impugnant; idem enim Medicus, si ex lanionum turba fuerit, febrem repetitis phlebotomiis aggreditur; quam si stercorarius sit, ut cum *Gadeno Harvey* loquar, repetitis catharticis & clysmatis insequitur, licet eam nenter a plethora, nec a cacochoylia, sed a missimorum vaporum obstructione, factam arbitretur. Eximium & non pridem sato fundum hic novimus praticum (*D. Verray*) qui, licet omnes morbos tum acutos, tum chronicos chylis crassiori tribueret, hos tamen eadem oppugnabat methodo, qua cæteri, diversis omnino opinionibus imbuti, quales Illustrissimi *Vissens* & *Chirac*, qui morbos omnes fermentationi, & Illustr. *Deidier*, qui eos turbatæ circulationi, tanquam causæ accensebant.

7. Nulla est ergo hæc inter theoriam & praxim connexio; praxis traditione comparatur, & nemo ita de suis principiis theoreticis certus est, ut ab illis, dum decorio humano agitur, dirigi se patiatur. & merito quidem, cum hæc paucula sint principia de quibus ita parum dubitari possit ac in re gravi & seria necessum esset: undenam vero accidit ut Ars Medica, omnium nobilissima & antiquissima, tam exiguis progressus fecerit, ut theoria nondum ad praxim candidatos manuducere possit, seu tam pauca principia certa & indubitata suppediet? hocce infortunium & Artis difficultatem summam, & artificum negligentiam & incuriam forte majorem arguit. Non multi sunt artifices qui veram scientiam sibi comparare debita saltem methodo studeant \* cum ipsa plebs crassa & ine-

\* Nisi magis quæpiam minusque morato humanarum rerum sit, actum de bonis studiis est, aperte confusi ac corroti, ac ne veritatem ipsam, sed tantum scientiam suam quærent. Legimus methodum & Mathematicis demonstrationibus legant plurimam, aut cum gravitate sacrum interpretari, aut scire aliquid committere, aut in ritum, sineque disputatione adepere. Si quæ sermone, hæc de demonstrationibus audire audeat, in vel non omnino intelligit, aut si intelligit quod degmatibus imponitur, illico hæc cur & de veris dialecticis. *Gal. M. B. Med. 1. 2.*

& inerudita de Medicis iudicium suum interponat, ipsi placere operæ præcium reputant qui famæ & quæstui tantum inhiant, cum vero non altior veritatis inquisitio, nec ipsa veritas populo unquam ardeat, hanc viam inire caveat Medicus, qui, si muliercularum & Pharmacopolarum præiudiciis obtemperet, famæ cultum citius multo adepturus est.

8. Principia ea tantum in re Medica debent admitti, de quibus ita certi sumus ac de iis quæ sensus evidenter demonstrat; ea vero nihil aliud sunt quam experimenta & syllogismi geometrice concatenati.

9. *Experiri* dicimus ea quæ ad nostras sensationes attentè perspicimus: si facta universi spontanea attente observemus opæ visus, tactus, auditus, &c. hæc observatio vocatur *experientia*: si vero ad hæc facta spontanea concurrat opera nostra sine quæ facta illa non acciderent, hæc observatio *experimentum* nuncupatur: facta quælibet quatenus in sensus nostros incurrunt sive sponte sive arte fiant, vocantur *phænomena*. *Experientia* itaque nihil aliud est quam phænomenorum cognitio ex sensatione orta; idem itaque sonat, ac attenta observatio, quæ dicitur *constans*, si sit cognitio phænomeni cum circumstantiis necessario connexis; *contingens* vero, quando adiunt tantum circumstantiæ ipsi contingenter connexæ; *falsa* vero cum necessaria experientia requisita deficiant, ut cum in experientia exprimitur quæ sensibus non sunt percepta, vel percipi non poterunt, vel quædam circumstantiæ necessario connexæ omittuntur. Errores autem qui in formanda constanter experientia committi possunt, sunt 1. Si accenseantur circumstantiæ sine quibus phænomenum semper dari potest, adeoque supervacue. 2. Si pauciores & non omnes, quæ phænomeno sunt necessario connexæ, referantur circumstantiæ. 3. Si non asseratur quantitas determinata circumstantiarum, quæ datum phænomenum demonstrent.

10. Error autem familiarissimus est iudicium suum cum experientia confundere; hic vero admittitur error quociens phænomenum talibus verbis exprimimus, quibus aliquid vel tanquam causam, vel tanquam effectus prædicatur, imo tanquam principium alterius. Nequaquam enim patet sensibus solis connexio inter causam & effectum, seu nulla causa, quatenus causa est, a sensibus percipi potest. Alias experientia leges videtis in *Oratione inaugurali Clariss. M. Scheubrockii*, & *Hambergeri præfatione ad Physicam*. Si data quædam propositio ex aliis tanquam notioribus per syllogismos colligitur, *probari* dicitur: probatio autem dicitur *demonstratio*, si in syllogismis, quos inter se concatenamus, non utamur præmissis, nisi definitionibus, experimentis indubitat, axiomatibus & propositionibus jam ante demonstratis.

11. *Definitio* est numeratio notarum, quarum ope quidpiam cognoscimus & ab aliis distinguimus. Si itaque morbi debite observati phænomena enumeremus, quæ ipsi propria sunt, &

quorum ope a consimilibus potest dignosci, morbi illius definitionem obtinemus.

Propositio theoria indemonstrabilis, seu cuius veritas simpliciter terminorum valore percepto cognoscitur, *axioma* vocatur, quales sunt propositiones in quibus de subiecto pronuntiatur tantum quod in eius definitione continetur, ut *totum est majus sua parte*. Quidquid de genere affirmari potest, illud etiam affirmatur de quovis sub illo genere contento, & huic axiomati innititur omnis syllogismus.

12. Demum *Ars Medica* a Philosophia, Mechanica, Geometria & aliis Scientiis generalibus terminis non solum, sed etiam principia, debet mutuari, adeoque ex illis Medicis debent assumere propositiones demonstratas, nec eas demonstrare eorum est.

13. Quamdiu methodum demonstrativam negligunt Medicæ cultores; non mirum erit *Uti* Artis hujus principia nulla sint, quæ ea certitudine, qualis ad praxim est necessaria, polleant; Medica theoria semper fluctuabit, & cuiusvis opinio, prout tuentis ingenium & auctoritas valuerit, ipsa in Medico orbe valebit.

14. Hæc est, ni fallor, errorum & ineptiarum communis origo, quod scilicet spretis observationibus obvis, & phænomenis vulgarissimis, ex quibus lege rationis corollaria certa & utilia deduci possent, Medici ad abdita & sublimia continuo tendant; eaque, quo magis ab intellectu remota sunt, eo vi suæ imaginationis attingere, divinare, aut verbis exponere pertinacius conentur. Quænam sint hujus vel illius morbi phænomena, hoc attenta folium docet observatio, ob oculos cuiusvis id est positum, & nullum ingenii conatum exigat, atque propter nimiam facilitatem symptomatum cuiusvis morbi accurata contemnatur Historia, nulla serme nisi oscitanter & raptim traditur, licet ea sola, velut ex veritatis fonte, possit optima deduci theoria, ut ex accurata Cælestium phænomenorum observatione optima systemata deducere Astronomi: verum si de abditissimis & nostrum captum longè superantibus causis differendum sit, milleni illico præsto sunt ædipi, qui assumptis ex phantasia, non vero ex ipsa re, principiis verbosas necnon ingeniosas committuntur hypotheses, quas si quis negaverit, nemo possit comprobare, quæ tamen velut norma praxeos a multis habentur. Sic, ut explicaret *Vilvisius* quare in Apoplexia sensus & motus voluntarii sentiantur, dum motus vitales vigent & augentur, is finxit nervos voluntariis motibus destinatos a cerebro, ad vitalibus munitis dictos a cerebello ortum ducere, & cerebrum solum in Apoplexia laborare, cerebellum vero a pressione & insarctu immune esse pronuntiavit, quod ut suaderet aliis, finxit iterum cerebellum firmius esse cerebro, & ita vitæ necessarium, ut hoc ablato vel presso, illico pereat animal; quæ tamen omnia vel gratuita, vel, experientia demonstrata, falsa esse comperimus, & comperit quicumque experiri voluerit. Verum experian-

perinuntur pauci, quia multo facilius est in museo fingere, quam in amphitheatro experimenta caute & accurate instituire; hoc certe mirum semper mihi visum est, quod horum morborum, quorum causa nos latet maxime & curatio felicissimos fingit practicos, ut Epilepsie, Ephialtes, Hysterie, Apoplexie, &c. sicut ab ignaris plurima venditantur remedia arcana certissima, ita a novitijs Medicis libentius tradatur Theoria, & causa facilis, ut putant, explicetur; quos novitios interea primorum mechanice theorematum & Anatomie principiorum ignaros saepe comperimus.

15. Sunt & plurimi qui dum humane machine, etiam valde complexæ, omnes effectus dogmatice ac velut ex cathedra dilucidare & explicare non verentur, simplicissimæ machine, ut vestis, libræ, theoria, aut prima principia ita turpiter ignorant, ut hanc ipsam Mechanicæ & Hydraulicæ scientiam quasi ignorare parum sit, etiam vilipendere non erubescant, atque omnem disciplinam Mathematicam, veram Physicæ & Philosophiæ matrem, inanem, erroribus scætam clamitent, eiusque studium philiatris vertant vitio, ac e foro medico indignandi relegent.

Nulla est temeritas magis punienda, aiebat olim *Sanctorius*, quam nulla habita experientia repugnare experientiæ: idem pronunciandum videtur de iis, qui quam ignorant Matheſim ſopercilioſe deſpiciunt, niſi forte eam vulpem imitentur, quæ ſymmate deſtituta ſocijs ſuis perſuadere volebat, ut hoc inutile pondus abjicerent, aſt abſiſſis falſis exagitata jocis, ut narrant *Bernoullius*. Atque hæc eſt altera errorum in Medicina parens, Matheſeos ſcilicet ignorantia, vel ut rectius loquar, Methodi Geometriæ contemptus, & averſio; licet enim multæ ſint in Mathematica diſciplinæ, quibus Medicus, Phyſicusque carere poteſt, ut Aſtronomia, Gnomonica, Trigonometria, &c. nullus tamen rectam animalis œconomie noticiam aſſequetur, qui fluidorum generales proprietates, velocitates, vires ex Hydranlica non cognoverit; qui vaſorum cavitates, diametros, ſuperficies, ſolidorum firmitatem, fibrarum motus, tonos ex Geometria & Mechanica æſtimare nesciverit; nemo audient viſuſque theoriæ callabit, quem acouſticæ, & optice primæ elementa ſugerint; nullus demum, quod poſſimum eſt, nec experientia accurata capere, aut nova tentare, aut ex illis certo ratiocinio conſequentias deducere: verbo, nec in Phyſicis & Medicis rebus tuto philoſophari potens erit, qui Geometricam ratiocinandi Methodum, quæ demonſtrante *VVeſſio*, optima Logica eſt, ignoraverit; nullus denique eximia quæ in aſſis Academicarum, in ſcriptis Medicorum eruditiffimorum hujus ævi, quidnam intelligit, qui Arithmeticæ, & Geometriæ principiis non fuerit ſufficienter imbutus.

16. Ex his tamen æqui rerum æſtimatores non iſterant ita medicis neceſſariam eſſe Ma-

theſim, ut illa deſtituti eximios non poſſint ſe præſtare practicos, aut ut illa ſolum ſcientia eruditi illico ad medendum ſint apti; nemini enim in mentem tam delira venire poteſt opinio: hoc tantum in animo induxi meum ut credam nullam ſine Phyſica mathematica dari poſſe certam humane machine theoriæ, quæ qui prædictus fuerit, Anatomie & materie Medicæ ſimul peritus, is quondam ad praxim Medicam conſequendam aprior evaſurus ſit: verbo, id unum probandum ſuſcepi, quod omnium certiffima theoria ex Anatomie & Phyſices experimentalis, ſimulque Philoſophiæ mathematicæ, peno depremdenda ſit, quæcum negligent vulgo Medici, mirum non eſt ſi erroribus ſcæta ſit morborum ætiologia; atque cum falſa eſt, ea non magis Medico utilis eſt, quam Architecto Muſicæ nec proinde poteſt Medicum in praxi dirigere, nec accurati ſymptomatum ſtudij, annoſeque obſervationis & experientiæ vices ſupplere, licet contrarium clamet Medicorum multorum ſententia.

17. Medicina, nemine reſragante, conſequentialis eſt adhuc ſcientia, adeoque ſi eam callere nemo poteſt, qui in arte conſectandi rudis extiterit: verum hanc Artem quæ unquam docuit præter Mathematicos, ſcilicet *Hughenium*, *Bernoullium*, *Montmort* & *Graveſande*? quis in matheſi rudis rite circa probabilitates, quæ toties in praxi Medica nos manuducere debent, ratiocinari valebit?

18. Non poſſum vero hoc argumentum dimittere quin alterum vitium theoriæ Medicæ breviter perſtringam; mos ſcilicet in vaſis omnia generaliter & vage tantum pertrahere, omnem in phaenomenis exponendis circumſtantiarum & cauſarum diſtinctionem, & quantitationem deformationem prætermittere; cum tamen ex illa ſolum acribeja determinari poſſit veritas. In Geometria, ſigno unico omiſſo, minima quantitate neglecta, contracta aut falſa proſus exurgit problematis ſolutio, ut quod negativum fuerat, poſitivum evadit, vel e contra: quanto frequentius in Medicis computis error debet irrepere, cum ſine methodo, & phantaſiæ duſu ex principiis ſæpius ſuppoſitis, diſcultates intricatiſſimæ dilauantur? Si quis lympham in patella poſitam & ex ſanguine pleuriti ſeparatam cernens, a calore inflammatorio congelatam fuiſſe probare contendat, ſi fervorem in ſanguine ſummum eſſe prædicat, attritum ſolidorum & fluidorum in febris acutis exaggerat, & non mirum putat idem intra corpus humanum accidere lymphæ, quod in aqua bulliente fieret; ſi vero experimenta accurata ſumamus, hunc errorem conſutare non erit arduum, cum lymphæ non coaguletur niſi a calore 56. graduum, & tamen ſanguis in vivo homine non caleſcat ultra 33. gradum Thermometri Reaumuriani. Fieri poteſt, ajunt plurimi, ut preſſio aeris in duos cylindros plene marmoreos 26. linearum diametro, ope ſtabili fuiſſi unitos, & dein frigori ſummo expoſitos,

eos tanta viadeunt, ut non nisi vigoo. libram separentur, unde concludunt immensam esse pressionem aeris, & huic soli tribueodam esse corporum adhesionem: qui sic ratiocinantur iudicium solum cum experientia confundunt, & errorem vitantur, si accurata observatione, perspicere pressionem aeris non majorem esse pondere columae mercurii ejusdem basis, cujus altitudo sit 28. pollicum: atque hoc pondus supra basim 26. linearum in diametro non superat 28. libras, seu fere decimam partem 600. librarum, unde concluderent rectius: pressionem aeris decies minorem esse, quam ut possit haec marmorum adhesionem producere.

19. Ex possibilitate supposita atque similibus principiis vagis & indeterminatis quovis effectus deducunt Medici theoreici, qui non experimentis ducentur, sed ex hypothesibus suis facta determinant, qui contraria propositis pro lubitu concludere potuissent: *hic fieri debet, ergo fit*, solemne ratiocinium est, sed in Physicis fallacissimum, in quibus hoc solum tantum valet prioris inversum; *hoc fit, ergo fieri debet*, & ad summum consequentia: levero ratiocinio ex factis derivati, & rursus experimentis firmatae, quid certi in Physicis exponere possunt.

20. Doleo enim certe est quod a tam brevi tempore Medicia Marthesios opem, mediante *Alph. Borelle*, mutata fuerit; serior aetas haud dubio *Bellini*, *Jurini*, & *Bernoulli*, *Micheletti*, *Hambergeri* laboribus sceuerit, si plures nascantur viri *Haleji* similes; sed interea oculus sapiens a tam stabili & hypothetica, qualis hodie viget, theoria, in praxim dirigi se patitur; centum fere sunt aevi a quibus inventa est circulatorio sanguinis, sed nondum ejus leges sunt omnes satis cognitae: quanto tardior sit in minimis vas, quam est in aorta, demonstravit non dudum *Jacobs Keill*; verum ejus velocitas absoluta quae tam sit, nondum satis est comperit; quae tam sit pressio sanguinis in vase quiescentis docet vulgaris Hydraulica, verum quantum transfluens sit pressio super taorum nos docuit *Althuystris*, *Daniel Bernoulli* in *Hydrodynamica*; quid valeat illius adhaesio & viscositas nuperime derexit *Althuystris*, *Hambergerus*; at quantum ab hac viscositate, & vasorum minimorum attritu retardetur huius motus adhuc inquirendum restat; nondum itaque numeris omnibus & absoluta circulationis cognitio, qua tamobis destituti clarum & certam theoriam obtinere non possumus.

21. Quid itaque Medico inter praxeos scopulos versanti superest interea peragere? quae nautica supplebitur acus quod in morborum procellis ex luce deficit? quid annosam experientiam, non nisi per mortem acquirereodam, supplebit? audiamus hae de re non quovis Medicos, quorum morbi mira quaedam ingenio vi, aut propria solertia se scopum artificiose contendunt; multi quidem aereis remediis, plurimi hypothesibus suae praxeos felicitatem tribuere, pauci nisi

*Sanctorum Rosolijis Methodica*, Tom. I.

ad summam senectam & sanam pervenerint, id honoris repetitis lapsibus, fatalibus experimentis, loquaque Morborum observationi, acceptum referent. Consulamus caodidissimum Artis Magistrum, simulque felicissimum opiferae *Thom. Sydenhami*, Anglice lumen, Artis Phœbum, quem sine honorifica praestatione, ut cum *Borhaave* loquar, nominare erubescerem, de ejus erga rempublicam Medicam meritis nunquam ita magifice loquar, quia id ejus sit superata dignitas.

22. Scito autem, ait Hippocrates, Anglus, postea Artis incrementum in his consistere ut habeatur primo *Historia Morborum*, seu descriptio quoad fieri potest graphica & naturalis; secundo praxis seu *Methodus curae* eisdem stabili ac consummata.

23. Quod autem spectat ad *Historiam Morborum*; primo expedit ut morbi omnes ad definitas ac certas species revocentur; eadem dem prolixus diligentia ac acutior, qua id factum videtur a Botanicis in suis *Phytologiis*. Quippe reperitur morbi qui sub eodem genere ac nomenclatura iedacti, ac quoad nonnulla symptomata sibi invicem con- similes, tamen & natura inter se discreti, diversum etiam medicandi modum exposcunt. *Cardui* quidem nomen ad plures herbarum species extendi nemo nescit: at vero parum accurate faciet rei *Herbariae Scriptor*, qui generalem huius Plantae descriptionem, qua scilicet a ceteris stirpibus discrepat, proponere contentus, propria interim & peculiaria ejusque speciei signa & characteres, quibus ab invicem discriminantur, contemplari: eodem sane modo nec satis est scriptori communes duntaxat morbi alicujus multifloris apparentias annotasse. Eto sane non omnibus morbis eandem contingere varietatem; tamen complures esse qui, sicut ab Auctoribus sub eodem titulo circa ullam speciei distinctionem tractantur, dissimillima sint indole, in sequentibus pagellis, nescio spero, palam fiet. Imo etiam ubi distributio in species reperitur; id sit plerumque, ut hypothesi alicui quae veris phenomenon subtrahitur, fusi reservetur honores, ac proinde ejusmodi discriminatio, non tam ad morbi quam ad Auctoris ingenium, philosophandique theoriam accommodata est. Sic Galeoici, humorum quaestione praecoccupati, morbos omnes in sanguineos, biliosos, pituitosos, & melancholicos dividere, sumpta non ab evidentibus eorum humorum praedominantibus signis, sed a materia morifica (scilicet *Sanguine*), distinctione. Sic *Paracelsus* morbos dividit in *salios*, *terreos*, *mercuriales*; alii Chemici eos in *acidos* & *alkalinos* distinguere ob praecconceptam mente theoriam; atque inde factum est, ut arbitror, historiam morborum in *Sylvam tam immensam*, sed *fructu perexiguam*, excrevisse.

24. Secundo seponitur tantisper oportet quae-

cumque hypothesis Philosophica, quæ Scrip-  
toris iudicium præoccupaverit; quo facto,  
tum demum morborum phenomena clara ac  
naturalia, quantumvis minuta, per se accuratissime annotentur, exquisitam picturam indistinctam imitando, qui vel nervos & levissimas maculas in imagine exprimunt. Eum vero dici vix potest, quot erroribus ansam præbuerint hypothesis istæ Physiologicæ, dum Scriptores, quorum animos falso colore illius Imbuerint, illiusmodi phenomena morbis assignant, qualia, nisi in ipsorum cerebro, locum nonquam habuerant; debebant autem in conspectum venire, si hypothesis, quam ipsi pro concessa & rata habent, constaret veritas. Adde quod si quando symptoma aliquod, quod cum dicta hypothesis appositè quadret, revera morbo competat cuius typum delineaturi sunt, tum illud supra modum evehit, ac plane reddent ex more elephantem, quasi in hoc scilicet totius rei cardo verteretur: si hypothesis minus congruat, aut proorsus silentio, aut levi saltem pede transmittere consueverunt, nisi forte beneficio subtilitatis alienigenis philosophicæ in ordinem cogi, ac quoquo modo accommodari possit.

25. Tercio expedit ut in describendo aliquo morbo peculiaria & perpecta phenomena seorsim ab accidentibus & adventitiis (qualia sunt quæ non tantum ab agrotantium temperiem & ætatem, sed etiam ob rationem medendi diversam varie se habent) enarrentur. Nam sæpe accidit ut facies morbi variet, pro vario medicandi processu, ac nonnulla symptomata non tam morbo quam Medico debeantur. Casus autem oppido rarus præterire debet scriptor, quemadmodum in descriptione salviæ, erucarum v.g. morbus inter signa discriminantia istius plantæ nequaquam recensetur. Hujus historiæ utilitas, pergit *Sydenhamus*, omnem estimationem excedit & præ ea argutiola & subtiles disquisitiones, quibus Neotericorum libri ad nauseam fere inferiuntur, nullo in numero sunt habendæ.

26. Has tres Nosologiarum conscribendæ regulas, scilicet specierum, generumque accuratam distinctionem mere historicam; philosophicæ theoriæ ab historia sepositionem, & characterum a symptomatibus constantibus derivationem, dictæ ipsi sapientis. Nec enim facta, quæ tantum historia recenset, cum iudicio philosophico debeat confundi, secus falsa est experientia (10.); nec philosophicæ theoriæ debet innitri Historia; nam nimis hæcenus ruinofum est hoc fundamentum (6.-10.); & cum a notioribus ac certioribus sit semper ordiendum in veritatis disquisitione, semper pro hæc theoriæ sterenda est & præmittenda historia, non vero theoria debet esse basis historiæ. Tertia vero regula ex eo pendet principio quod cum symptomata in sensus incurrant, non vero casus, ex si constantia sint, characterem certiorum & evidentiorum ad morbos cognoscendos præbeant.

27. Triplicis generis est humana cognitio, scilicet Historica, Philosophica & mathematica. Historica est cognitio factorum; sic historia docet in pleuritide adesse febrem, dyspnœam, tussim & dolorem pectoris. Philosophica est cognitio causarum & principiorum; sic cognitio pleuritidis est philosophica illi qui novit quæ de causa & ex quibus principiis oriatur illa quatuor symptomata, v.g. ex pulmonum vel pleuræ inflammatione. Mathematica cognitio datur, si quantitates & earum mensuræ cognoscantur; sic si quis ad mensuram revocaverit pulsus frequentiam & vim, caloris gradum, doloris intensitatem, vim tussis & similibus symptomatum, ille cognitionem horum mathematicam obtinet.

28. Cognitio historica debet omnes alias antecedere, & est omnium simplicissima, Philosophica cognitio morborum Dogmaticam distinguit ab Empirico, & curiosa est; ac demum mathematica omnium est certissima & in praxi præstantissima, est hæcenus minus exulta & proinde rarissima.

29. Cuius profectio in Mathematicis versato; vel in Medicina faciendâ paulo magis occupato manifestum est, nos nihil aliud in rebus cognoscere quam earum ad alias relationem, legesque & proprietates virium, quibus eas mutare vel ab aliis mutari solent. Loquar de rebus corporeis, vires autem illarum, viriumque leges actionibus mutuis & utrinque reditis deteguntur: nam actiones & earum effectus sunt data illa quorum opus leges virium invenimus; causa vero physica & tantopere a Philosophis quaesita rerum natura est illud in rebus ignotum a quo vires emanare videntur. Illud autem cum seiri non possit, nisi prius agnoscat viribus, harumque legibus inventis, neque quidquam præterit nisi per vires, sequitur viribus ignotis, notitiam illius esse nullam, notis vero esse inutilem: adeoque Mediceis incambit solum ut vires medicamentorum & morborum, quæ per operationes possunt inveniri, expendant & ad leges revocent, non autem ut causas physicas erendis insudent, quæ non nisi ex prius inventis virium legibus possunt deduci, illis que inventis, Medico non sunt profuturæ.

*Placemus. Praefat. pag. 21.*

30. Quænam sit relatio gravitationis auri ad gravitatem aquæ novimus; quid sit ipsam auri gravitatem in se non novimus: leges & proprietates gravitatis, quibus tam scilicet utuntur artifices in horologiis, machinis astronomicis, aliisque ex observata & mensurata hujus effectuum quantitate adificiuntur; hæc solæ leges nobis sunt utiles cognitæ: verum quænam sit gravitatis causa, hoc ætatenus scire utile foret, quatenus ex hæc philosophica cognitione gravitationis leges, velocitatis, nislusque mensuras accuratas deducereamus; sed licet ignoretur hæc causa, virium leges ex phenomenis inventæ sunt, atque illis inventis, philosophica gravitatis cognitio vix est Mechanicæ profutura. Idem dictum esse



de philosophica morborum & medicaminum cognitione, quam totis viribus sectantur Medici; cum ex historica, & inde derivata mathematica horum noticia, quidquid utile sciri est, quidquid certum, & in praxi necessarium, derivetur.

*Nosologia Historica fundamenta.*

31. Nosologia est morborum scientia, seu habitus demonstrandi quidquid de morbis affirmamus aut negamus, & est pars Pathologiae. Ad demonstrandum debet institui ratiocinium experimentis indubitatibus seu factis historicis, definitionibus, axiomatibus, & propositionibus alibi demonstratis innixum; ergo ad Nosologiam necessariae sunt morborum descriptiones, historicae descriptiones, & principia certa ex anatomicis, chemicis, hydraulicis & mechanicis mutuata.

32. Quoties magnus est subsectorum cognoscendorum numerus, toties ad intelligentiam & memoriam iuvandam ordo necessarius est, seu necessaria est similitudo obvia in modo quores se invicem consequuntur; & ordo in tradendis scientiae dogmatibus vocatur *Methodus*; cum itaque magnus sit morborum numerus, in illorum historia tradenda & cognitione iuvanda methodus est necessaria.

33. Vocabula sunt idearum nostrarum signa; sed ideo loquimur, aut scribimus, ut nostras ideas, & nostra ratiocinia cum aliis communemus; nec ea commutare possumus, nisi valor horum signorum sit determinatus, & aliis cognitus; quod tantum fieri potest per vocabulorum definitionem; adeoque dum ab aliis volumus intelligi, necessum est ut valor vocabulorum, quibus utimur, sit fixus, constans, & aliis cognitus, seu ut vocabulis definitis utamur.

34. Vocabulorum & terminorum Artis definitio vocatur *Nomenclatura*; ea vero si sit inconstans & vaga, diversas ab ideis Auctoris ideas in mente lectorum excitat; unde acquivoctio, quae eatenus vitatur, quatenus cuique rei diversae diversum propinque nomen competit, nec eodem nomine res diversae, nec diverso nomine res eadem significantur; qui contrarias sequentes leges, si ideo loquitur, vel scribit, ut non intelligatur.

35. Duplex est Nosologiae historicae fundamentum, *Methodus* scilicet, & *Nomenclatura*.

1. De *Methodo* Nosologica.

36. Methodus Nosologica alia synoptica est, alia systematica. Synoptica est dispositio morborum in partes binas oppositas & successively bifurcatas vel brachiatas, ut dividantur morbi in externos & in internos, ambo in particulares & universales. Externi & interni particulae in morbos capitis, pectoris, abdominis, & artuum. Illa vero Methodus procedit per libros, capita, articulos, & paragraphos;

verum jamdudum experientia docuit Historiae Naturalis, & potissimum Botanicae cultores eam Methodum non ita claram esse ac facilem, quam est Methodus Systematica.

37. Systematica Methodus morbos similes similibus conjungit & a dissimilibus separat, atque omnes individuos morbos ad suas species, istas ad genera, rursus genera ad ordines, & illos ad paucas classes reducit; & derelicta Synoptica omnes Historiae Naturalis cultores jam pridem systematicam tantum Methodum sequuntur.

38. *Notas* appello rebus intrinseca, unde agnoscuntur & a se invicem discernuntur, *VVolf. Log. 79*. Verum scopus Nosologiae est, ut huius ope morbos agnoscamus & ab invicem discernamus; ergo cum scopus seu finis non nisi per media possit attingi, & illa media sint notae, hoc potissimum incumbit Medico Nosologiae studio, ut notas morborum adificetur. Has notas *Characteres* vocant Botanici.

39. *Definitio* est enumeratio notarum nec plurimum, nec pauciorum quam quae ad rem definitam agnoscendam, & ab aliis discernendam sufficiunt: *VVolf. Log. 153*. & ex ea significatur notio completa & determinata terminocuidam respondens; ut itaque morbi in nobis exurgant notio completa & determinata, ejus definitio seu notarum & characterum enumeratio inquirenda est.

40. Ut nota nos in morbi cognitionem deducat, ea quaesito debet esse evidenter & clarior; atque ut certa morbi cognitio fiat, notis certis & constantibus ea debet inniti, adeoque definitiones morbi ex notis certis & evidentibus sunt desumendae.

41. *Notas* ad definitum agnoscendum & ab aliis distinguendum praebent *Generis* atque differentiae specifica. *VVolf. Log. 183*. ergo genus & differentia specifica definitionem constituunt. Si itaque morbi ad sua genera & ad suas species reducantur, ex hoc ipso genera & species definiuntur atque complete & determinate cognoscuntur.

42. Morborum singularium & individuorum similitudo *Species* vocatur, & similitudo specierum *Genus* constituit, ut similitudo generum faciat *Ordinem*, atque ordinum convententia *Classis* est.

Si notas pluribus plantis individuis communes consideremus, ut jasmis omnibus florem infundibiliformem limbo quinquepartito, calycem tubulosum quinquefidum, stamina duo, pistillum unicum, baccam diphyrenam, inde generis jasmini ideam obtineo: sed si simul pluribus illorum individuis notas observo, quibus illa ab aliis ejusdem generis discernuntur, ut folia opposita pinnata, cum in aliis sunt opposita ternata; inde ideam determinatam speciei seu differentiam specificam eruo.

43. Simili artefacto non solum idea generum, ordinum & classium, sed idea ipsius morbi in genere potest erui, si quod est omnibus morbis

commune perspicimus, simulque in quo ab statu sanitatis differat cognoscamus, atque ea perspecta idea, morbi definitio comparatur: cum autem definitio sit enumeratio notarum, quæ clariore esse debent re definita, facile est concludere eos errare qui morbos definiunt, eorumque genera & species, non ex principiis evidentibus & certis, sed ex ignotis, obscuris, litigiosis & incertis deducunt.

44. Erronæ sunt itaque morbi definitiones, quæ petuntur tum a *Dispositione* partium sensus sæpius fugiente, etque hypothetica & saltem obscura; tum a *sedē* sæpius supposita, vel gratuita in partibus quæ sub sensu non cadunt, tum quia sunt internæ, tum quia exigue nimis quam ut cerui queant; tum demum a *Causa*, quæ per se quatenus causa in sensu cadere non potest, ut *Principiis* sive Prolegomenis sive procatarticiis quæ sunt extrinsecæ corpori, ac proinde notas morborum non constituunt (38.).

45. Dividuntur speciatim morbi diversimode, sed potissimum juxta quatuor diversas methodos, scilicet *Alphabeticam*, *Temperariam*, *Anatomicam* & *Ætiologicam*, quibus omnibus methodum *Symptomaticam* anteposendam consensimus.

46. *Alphabetica* methodus ea est quæ morbos conjungit, qui nomine sunt affines, vel ratione similitudinis nominum, aut litterarum initialium. Talem sequuntur *Mangutia Polyalthia*, *Jamæ Dissimulatio de Medecine*, &c.

Verum cum nomen sit nota extrinseca quam ægrotantes præ se non ferunt, & ex hominum arbitrio pendeat, nec Artis tyronibus morborum singularum sint cognita nomina, ex illis ad morbi cognitionem non devenire possumus: præterea in hoc ordine morbi iudole prorsus diversi conjunguntur, ut apoplexia, & alopecia, paralyis & paronychia: separantur vero qui maxime affines sunt quoad iudolem, ut pleuritis & hepatitis, arthritis & rheumatismus; evidens est hanc methodum ab omnibus Nosologiæ studiosis esse rejiciendam.

47. *Temperaria* methodus illa est quæ morbos ratione durationis dividit in chronicos & acutos, prout longius, breviusve temporis spatium percurrere consueverunt; talem methodum secuti sunt *Aræbani*, *Callis Aureliani*, aliique.

48. Verum ea methodus in eo peccat quod multus sit character evidens, quo prima die chronicus ab acuto discernatur, quod acutus & chronicus differant tantum temporis quantitate, & quantitas similitudinem non turbet, ex eo principio nec genus, nec species erui possunt; similia etenim, salva similitudine, quantitate differre possunt, ac proinde morbus sive longior sive brevior potest esse ejusdem generis & ejusdem classis, meritoque dicitur in Scholis, quod majus & minus non mutat speciem. Adde quod nullus sit limex naturalis inter chronicum, & acutum, & datur tantum limex arbitrariorum, a quolibet pari jure, quo institutus fuit, rejiciendus: cum dantur morbi quos non

majori jure quis ad acutos reduxerit quam alter ad chronicos: quoties autem non dantur limites inter genera & inter species, illa ejusdem ordinis, istæ ejusdem generis censentur, secus genera & species multiplicarentur in infinitum, quod foret absurdum; præterea sunt morbi acuti qui ultra quadraginta dies, & chronici qui citra terminantur; demum ex illa methodo tum demum morbi Classis cognoscitur, cum ipsum nosse minus necessarium est, seu cum delierit.

49. *Anatomica* methodus juxta corporis partes, quæ morborum sedes sunt, procedere consuevit, atque dividit morbos in externos & internos, universales & particulares, in morbos ætatis, sexus, & demum in morbos capitis, pectoris, abdominis, & artuum, quo facto in singulis partibus morbos enumerant & symptomata deinde recensent: verum pro morbis habent quæ omnes prædici inter vitia, seu morborum principia & causas recensent, & symptomata ea appellant quæ morborum nomine ab omnibus prædiciis salutari consueverunt. Vide *Ideam universalem Medicinæ* J. J. Sennerii Amsterdami 1644. juxta quem Apoplexia, Mania, Rabies, Cephalalgia, &c. morbi non sunt, sed varus, verruca, vulnusculum, lentigo, &c. morbi sunt, quæ nomenclatura quatuor prædicatorum more aliena sit, ignorat nemo, nisi qui scholasticis argutiolis est imbutus.

#### Conspectus methodi J. J. Sennerii & Sennerii.

50. Morbi primario dividuntur, vel secundario. Primario in similes, organicos, & solutæ unitatis seu communes.

51. A. 2. *Similes* sunt morbi intemperiei cum materia, vel sine materia & morbi ocularum qualitatum.

Intemperies sine materia sunt calida, humida, frigida, sicca & composita.

Intemperies cum materia sunt sanguinea, biliosa, melancholica & serosa.

Occultæ qualitates sunt ab aere infecto, aqua, contagio, veneno, fascino.

52. B. 2. *Organici* sunt in conformatione numero, magnitudine, & situ.

Conformatio dividitur in figuram, cavitatem, & superficiem vitiosas.

Magnitudo peccat vel defectu vel excessu, ut in tumore humoralis, flatulento, solido, purulento.

Numerus peccat vel in defectu vel in excessu. Situs mutatur in luxatione & hernia.

53. C. *Communes* sunt vulnera, ulcera, & fracturæ.

Secundario dividuntur morbi in externos, & internos.

54. D. *Externi* sunt iterum tumores, affectus cutanei, ulcera, luxationes, fracturæ.

*Tumores* Sanguinei, corpulentia, phlegma, bubo, phygellus, parotis, paronychia, perisio, ecchymoma, carbunculus.

*Tumores biliosi, erysipelas, herpes.*

*Tumores Pityriasi, oedema.*

*Tumores Melancholici, scirrhus, cancer.*

*Tumores Salsiferosi-biliosi, scabies, phlyctenae, sudamina, sirones, vari, epinyctis, alphas, leuce, impetigo, gutta rosea.*

*Tumores foveati, strumae, ganglia, meliceris, steatoma, atheroma.*

*Tumores solidi, verrocae, clavi, calli.*

*Tumores a solidis alio incumbens, aneurysma, varix.*

*Tumores maligni, elephantiasis, carbunculus, variolae, morbilli.*

55. E. *Affectus cutanei* sunt lentiginos, ephelides, naevi, maculae hepaticae, pruritus, maius odor, alopecia, porrigo, plica, gangrana, &c. Interni dividuntur in universales & particulares.

56. F. Universales sunt *Febres non putridae, putridae, malignae, & pestilentes.*

Non putridae seu purae, ephemera, synocha. Putridae continentur, synochus putris, causus.

Putridae periodicae primariae, tertiana continua, quartana continua, quotidianae continua.

Putridae periodicae secundariae ex inflammatione visceris, Lipytia lenta, ex viscere putri & corrupto, ex lacte corrupto.

Intermittentes simplices, tertiana, quartana, quotidiana.

Intermittentes compositae, tertiana duplex, quartana duplex, triplex, semitertiana.

Hectica Febris.

Febres malignae, variolae, morbilli, febris petechialis, morbus Hungaricus, sudor Anglicus.

Febres pestilentes, pestilencia.

Morbi particulares sunt non venenati, vel venenati.

57. G. Non venenati sunt primo *morbi capitis*, qui dividuntur in morbos cerebri, & in symptomata cerebri in functionibus laesi.

1. *Morbi cerebri* sunt ejus intemperies, meaurum agglutina, commotio, inflammatio, hydrocephalus, capitis contusio, vulnus, fractura.

*Symptomata* sensus externi *cephalalgia*; Sensus communis *vigilia, coma*; Imaginationis *verrigos*; Rationis *oblivio, delirium, phrenitis, melancholia, mania, rabies*; Sensus interni *coma vigil, lethargus*; Motus animalis *lassitudo, inquietudo, rigor, tremor, paralysis, spasmus*; Mixta *incubus, catalepsi, epilepsia, vortus, apoplexia*. *Symptomata* in excretis *catharrus*.

2. *Morbi oculorum*, trachoma, emphysema, cancer, hydatidis, hordolum, grando, trichiasis, phalangosis, pthiriasis, maradosis, encanthus, aggliplos, fistula, ophthalmia, unguis, pannus, hypophagma, nebula, albugo, pustula, vicus, mydriasis, hypochima, cataracta, atrophia.

*Symptomata*, dolor, strabismus, myopia, nyctalopia, amaurosis, gutta serena, presbytia, amblyopia.

3. *Morbi aurium*, inflammatio, vicus, *Symptomata*, dolor, surditas, tinnitus, obscuratio.

4. *Morbis aurium*, ulcus, ozæna, polyposus. *Symptomata*, stertutatio, haemorrhagia, anomia, coryza.

5. *Morbi oris*, ranula, aphthae, labiorum fissura, parulis, excrecentia, ulcus, &c. *Symptomata*, oscitatio, pyralismus, odontalgia, scortor, dentium nigrities, thupor.

58. H. *Morbi medii ventris* sunt tumores, ulcera, vulnera, angustia, &c. faucium, gutturis; tracheae, pulmonis, thoracis, cordis, mammarum &c.

*Symptomata*, angina, pleuritis, tabes, phthisis, asthma, tussis, haemoptysis, palpitatio, syncope.

59. I. *Morbi infimi ventris* sunt tumores varii, ut inflammationes, abscessus, prolapsus, herniae, nec non ulcera, fistulae, vulnera, rhagades, obstructions, intemperies, &c. & sopbagi, ventriculi, iocetiorum, ani, genitalium, &c.

*Symptomata*, difficultas deglutendi, dolor, ardor ventriculi, anorexia, nimia appetentia, appetitus depravatus, polydipsia, coctio laesa, singultus, ructus, nausea, vomitus, cholera, iliaca, colica; alvi retentio,lienteria, coctica, diarrhoea, dysenteria, fluxus hepaticus, ani pruritus, tenesmus, haemorrhoides, cachexia, hydrops ascites, tympanites, anasarca, icterus, atrophia, affectio hypochondriaca, scorbutus, diabetes, ischuria, dysuria, mictus cruentus, sacclatitas, priapismus, lachryalis, gonorrhoea, uteri inabecillitas, dolor, mensium fluxus, stillicidium, difficultas, fluor muliebris, morbus virgineus, suffocatio uteri, furor uterinus, melancholia mulierum, sterilitas, &c.

Appendix de Arthritide.

K. De *Morbis venenatis*. De lue venerea, de venenis fossilibus, vegetabilibus, animalibus.

L. De *Morbis puerorum*. De morbis capitis, medii ventris, infimi ventris.

60. Verum haec methodus est confusa, fallax & incommoda. *Confusa* quidem est; cum etenim partes similes, ut arteriae, venae, nervi, fibrae, fluida, cum omnibus musculis, visceribusque sint intime mixtae, adeoque confusae, ut eo quod nervus sit affectus non sequitur hoc vel illud viscus, hanc illamve partem non esse affectam: imo omnes in parte affecta simul afficiuntur, unde nulla distinctio a sede potest repeti: praeterea partes omnes sunt continuae invicem, & non ita determinatae ut limites possint assignari; quis enim limites extus sensibiles novit inter partes internas & externas? nam cutis interna est quam tegit epidermis? cum potest una inflammari quin & vicina continua, arteriis, venisque colligata simul afficiatur? si limites inter intestinum ileum & jejunum quis novit potest in vivo homine, qui in cadavere sunt arbitrati? quis praecisos limites hepatis, lienis in vivis distinguit? Morbos bene multos quos particulatim vocant pari jure adscribere possent universales; tales sunt inflammatorii, febre scilicet signati, soporosi, qui vires omnium simul cretum proferant, sensumque & motum illis detrahant, cachectici, decolores, leprosi, tabidi.

61. *Incommoda est methodus Anatomica*, quia in ipſis tyrannibus ſupponit Anatomiz notitiam, nec non quia ex cognita parte cui morbus inſidet non certius morbi cauſa & indoles cognoscitur, nec proinde medendi methodus habetur, cum idem viſcus afficere poſſint morbi omnino diſſimiles, ut ptoſenſis & apoplexia, febris & ſyncope, anorexia, boulimia, & eandem partem poſſint laſeſcicare phlegmone & oedema, intemperies ſicca & humida : adde quod propter conſenſum nervorum ſymptomata ad unam, & cauſa ad alteram partem reſeruntur, ut in ſympathicis morbis ; ac propter extensionem partium, morbus ſimul ad partes diverſas reſerri poſſit, ut obſtruſio recto non ſolum abdomen dolo, tenditur, ſed etiam per os materiz vomitu reſciuntur : ſed quod præcipuum vitium eſt, nulla eſt inter morbos ſimilitudo ratione partis affectæ ; juxta hanc methodum conjunctis morbis diſſimilibus ſæpius iteranda venit generalis Theoria & Therapeja, ita ut cum omnes, & ſingulæ partes dolere poſſint, theoria doloris in ſingulis claſſibus eſt repetenda, quoties ſcilicet de dolore eſt quaſtio, & cognitio claſſis nullius fere uſus eſt ad ejus generum, utpote diſſimilium, cognitionem.

62. *Fallax demum eſt methodus*, tum *qualis eſt*, cum omnes morbos nequaquam tradat, quales ſunt morbis ſingulis maſculis, oſſibusque, glandulis ac viſceribus ſupervenientes : nullus Auſtor agit juxta hunc ordinem de morbis cerebelli & medullæ ſpinalis, cyſtidis ſelleæ, thymi, capſularum atrabiliarium, medullæ oſſium, &c. tum *qualis debet eſſe*, quia ſedes morbi multiplex eſt vel dubia, vel poſſus ignota, quam tamen hæc methodus noſſimam ſupponit, cum ex hac ad morborum noticiam deducere debeat. Sit vomitus in exemplum : quoniam ſedes hujus eſt ? anos, ex quo fit reſectio ? an oſophagus, trans quem peragitur, & ex quo ſolo quandoque emovenda prodeunt ? an ventriculus, ut putant pluriſimi, qui iterum ejus diverſas membranas, ut villoſam, nerveam, muſcularemve pro lubito incuſant ? an in teſtina, ut io vomitu ſiſico a bubonocœle ? ſed vomitus bilioſus ex hepate procedit, urinoſus ex renibus, & ſic deinceps ſedes ergo hujus morbi multiplex eſt ; & cum ſcriptor cum quo reſerat ſeſcit, Le-ſcoe, ubi eum quaſiturus ſit, ignoret neceſſario. Quoniam eſt ſedes mania, melancholia, obliſionis, ſomnambulismi, tarantuliſmi, vegetiſia, catalepticoſis, ephaltes, pſica, & mille aliorum ? hoc determinat eorum hypotheſis, ſed nunquam ex ſedis affectu methodo eruetur evidentia quæ charaſterem conſtituit. Ex hac morborum ſedis ignorantia ſit ut ephaltes in ventriculo quarto cerebelli juxta *Lavocram*, in thoracis maſculis juxta *Di. Doidier*, in ſtomacho juxta plures, in pulmone juxta alios reponatur, &c. Quærit *Galius Aurelianus* quid locus io hydrophobis patiatuſ ; & reſponder *verus* affici juxta *Democritum*, & *moninges* juxta *Aſclepiadis* ſedatores ; *diaphragma* juxta alios, *ſtomachum*

juxta *Arteriorum & Artemidorum* ; *ventrem* juxta *Gajum Herophilum* ſedatorem ; *cor*, *illa*, *caput* & *diaphragma* ſimul ſi credatur *Magno Epheſio*. Febris morborum frequentiſſima ſedem habet in *cerebro* juxta *Aſtophanum* ; in *corde* juxta *Galenum* ; in *ſaibus arteriarum* juxta plures Neotericos ; in *meſenterio* ſæpius teſte *Baglivo* ; in *pameroſate* teſte *Syſto* ; in *ſtomacho* ut putant plures practici. *Syphliden* locat in *lymphæ & ſemine D. Aſtruci* in ſpiribus aërialibus *Mercurialis*, in *hepate* *Perdalcis*, &c. Quæ ſententiarum diſcrepantia fatiſ evincit morborum ſedem non ita evidentem eſſe ut ea poſſit charaſterem morbis cognoscendis & dignoſcendis idoneum ſuppeditare, adeoque methodum ex ſede petitam huic ſcopo minus utilem eſſe.

63. *Ætiologica methodus* morbos a cauſis & principiis deſinit & dividit, ſeu cauſas, & principia cognita ſupponit, & ex hoc fonte notas ad morbos cognoscendos & diſtinguendos mutuatur.

Sic cum *Galenicis* febris cauſam putabant eſſe calorem in corde accenſum, & in artus diſfuſum ; ac calorem eum in humoribus, in ſpiritibus & in ſolidis accendi exiſtabant, febres ipſi diſivere in *choticas* ſeu ab accenſis humoribus aut ſpiritibus, & in *botlicas* ſeu ab accenſis ſolidis partibus : quæ ab accenſis humoribus, illas ruruſ diſvidebant in ſanguineas, bilioſas, pituitoſas & melancholicas.

*Paraceliſta* qui omnes morbos produci ſomniabant ſulphure, terra, ſale, mercurio, ſeu ſpiritu & aſtorum influxu, eos in ſulphureos, terreos, ſaſios mercuriales, & aëtrales diſvideant amabant, & ab illis principiis deſinebant. *Tachenius* vero fere omnes in acidoſ, alkaliſos, & neutroſ diſcrimibat.

64. Quantum vero erronei ſint ſimiles charaſteres ex cauſa hypothetica & arbitraria ducti, quiſque facile percipit ; alit non ita quiſque ſentit errorem qui ex charaſtere ætiologico ad rationis & experientiz normam accomodato poteſt exoriſi, quod ut intelligatur dico primo *nunquam Medicinam progreſſuram fore, niſi firmis & indubitatis ſciæntiæ ſubſtantiis* : ſi enim mutabilia inconfiantiaque fuerint ejus ſubſtantiæ, eam mutabilem & labilem ſaturam eſſe conſequens eſt. Verum optime quæ hæcenus traditæ ſunt morborum ætiologiae, quales a *Sennerto*, *Sydenhamo*, *Riverio*, *Boerhaavo*, *Hoffmanno*, *Picarnio*, &c. traduntur, multum inter ſe diſcrepant, ſe mutuo impugnant, quolibet decennio mutantur, adeoque firma æti Mediceæ ſubſtantiæ ſubſistere non poſſunt. Secundo licet certa ſoret morborum ætiologia, non tamen ad morbos cognoscendos & diſtinguendos, ſa charaſteres ſuppediari valent : quia cauſa quatenus cauſa nequaquam in ſenſu incurrit (*Hamborg. Phyſic. Prefat. pag. 35.*) & ex principiis ſeu cauſis remotis tantum morbi poſſibilitas, non præſentia intelligitur. Nugaretor Botaniciſ qui cum plantarum charaſteres alijs præbendis haberet, plantas deſinit & diſvideret, ſeu cognoscendas præbere vellet ex earum dotibus licet obſcuris, dubijs, ſenſus ingentibus, vel

ex earum structura intima, hypothetica, ut folliculis, tracheis; quia delirium est ab ignotis ad ignotorum cognitionem procedere, & signa debent esse clariora re designanda: a quo certe errore longe distant Botanici, qui a numero, figura, situ & proportionem conspicuis partium externarum & omnibus obviarum suas classes, suaque genera ac species determinant, atque ad radices non nisi inviti recurrunt, cum alia signa deficiunt. Rideretur Zoologus qui, ut animalium species & genera ceteros doceret, eorum characteres ex ovis, aut animalculis spermaticis, aliisque mysteriis generationis vellet deducere, quia genera & species sunt similitudines obviae; id est sensibus conspicuae, adeoque quae evidenter & claritate deserviant character, is ad definiendum, & dividendum ineptus est.

65. Cum autem morborum principia & causae sint saepius internae, adeoque in corporis addito latentes, ignotae vel extrinsecae homini, ac tantum morbi possibilitatem inferentes, ex causa utcumque certa nullus character evidens, & ex principis (155.) ut ut evidentiis nullus character certus erui potest. Si quis dux aut centurio militum suorum signaturas ex navis additis, notis obscuris, ignotis, signisque vitium & sensum omnem fugientibus, exararet, frustra deliriores recognoscere tentaret, his detegendis praefectus. Ita & si morborum historiographus morbos ex causis & principis designet, definit & dividat; isideo morbos designabit ut a nemine cognosci possint, quod sapientia repugnat.

66. Morborum quidem causam & principia cognoscere utilissimum, imo, si velis, necessarium existimo; verum ea noticia adhuc in votis est, & causas proximas praefertunt ante Harvianum ignorarunt Medici in praxi felicissimi: verum quidquid sit, in tradenda morborum historia seponenda est tantisper omnis hypothesis & theoria Philosophica; & harum causarum indagatio ex ipsa morborum Historia debet deduci, ut in Geometria ex datis seu cognitis ad ignotas quantitates inventionem procedendum est, & non vice versa.

67. *Symptomata* sunt demum methodo ea est quae a phaenomenis morborum constantibus, & evidentiis symptomatis eorum characteres repetit.

Qua enim, ait *Anglus Hippocrates*, aut compendiosiore aut etiam alia via, vel causae morbosae, quibus obviae eundem est, deprehendi, vel indicationes curativae elici possunt, quam certa & distincta peculiarium symptomatum perceptione? Neque enim ulla est circumstantia tam levis aut exigua, quae suos usus ad utramque non habeat. Nam ut demus aliquid varietatis a temperamento individuum & tradendi ratione proficisci, nihilominus adeo aequabilis ac sibi ubique similis est naturae ordo in producendis morbis; ut in diversis corporibus eadem plerumque non reperiantur ejusdem morbi symptomata: non secus ac universales plantarum notae ad omnia ejusque species individua rite sedis-

fundunt. Qui violam v. gr. accurate descriperit, aut ejus characterem semel ab ejus phaenomenis constantibus ad partium fructificationis figura, numero, situ & proportionem definiaverit, omnibus ubique terrarum violis historiam illam seu characterem tantum genericum, tum specificum singulis speciei individuis convenire facile animadvertet.

68. Et quidem existimo, pergit *Auctor*, nos ob eam potissimum causam accuratori morborum historia ad hunc usque diem destitui, quia scilicet plerique eos pro confusis inconditisque Naturae, male se tuentis & de statu suo dejectis, effectis tantum habuere, ac proinde laterem lavare crederetur is qui fastum eorumdem enarrationem moliretur. At profecto haud minus summum Numen legibus certis adduxit in morbis producentibus, seu humoribus morbosicis maturandis, quam in plantis & animalibus. Quin imo uti cuilibet plantae, sive animali proprii quidam ac peculiates affectus competunt, ita se res habet in qualibet succi ejusque exaltatione, ubi semel in speciem eruperit; & sane qui febris quartanae v. g. ordinem, accessum, tempestatem, invasionis horam, phaenomena frigoris, caloris, recessum, verbo omnia symptomata perscrutatus intrinsecus, haud minus ille similitudinibus inducitur ut credat morbum hunc speciem esse, quem sunt illae ob quas credit plantam esse speciem quae parrem semper ad normam e terra nascitur, floret, interit, &c., eo tantum discrimine quod cum plantarum species, demptis paratibus, per se subsistant, istae morborum species ab his dependent humoribus vel causis, a quibus generantur.

69. Sed ut ad rem revertamur, non minus certo etiam a minutissimis symptomatis indicationes curativas Medicus potest deducere, quam ab iisdem sumptis diagnostica; atque adgo non semel mihi in mentem subit, quod si morbi cujuslibet historiam diligenter perspectam habere, per male remedium nunquam non scirem adterre, variis phaenomenis viam, qua mihi incedendum foret, haud dubiam, praemonstrantibus. Quae quidem phaenomena, si inter se sedulo conferantur, manu quasi ducerent ad indicationes illas maxime obvias, quae ex intimo naturae sensu, non vero ex phantasiae erroribus, demonstrantur.

70. Atque his sane gradibus ad medicinae solidum ascendit ille nunquam satis laudatus Medicorum Romulus *Hippocrates*, qui hanc arti Medicae insuper strenuè solidam ac inconcussam substantiam basim, (naturae morbis mendentur) id egit ut morbi cujuslibet phaenomena aperta traderet, nulla hypothesei adscita, & in partes per vim adacta, ut in ejus libris de *Morbis*, de *Affectionibus* videre est: In hoc stetit magna Divini Senis theoria. *Haecenus Sydenhamus*,



71. Humana corpora machinas esse in iisdem fatisce ætatis, sexu & temperamentis invicem similes, vel maxime affines, docet tum exteriorum, tum interiorum partium comparatio; & eatenus quid in medicinz praxi ac vitæ usû certum est, quatenus illa propositio pro certa habetur; sic certum habetur Titio cor, pulmones, ventriculus oodum visu perceptum, eundem situm, locum, eandem figuram & partium proportionem obtinere circiter ac in Mævio: leonam, eadem dosi, in iisdem circumstantiis, eodem effectus generales esse in ambobus produciendum; panem profuturum pro alimento; venena quædam ambobus nocitura, &c. Et hæc certitudo moralis in vita sufficit.

72. Hinc sequitur ab iisdem causis & principiis eodem morbos sub iisdem circumstantiis obvenire esse; & uti certum est ambobus serum sanguinis lixivium per urinas, bilem per hepar secretandam fore, ita materies morbifica eadem has vel illas læsiones functionum, excretionum, vel qualitatum inducitur est. Verum illæ læsiones seu mutationes, quatenus in sensus incurrunt & conspicuæ sunt, vocantur *Symptomata*, & horum datis causis sufficiens, illa velut effectus consequi necessum est; quoniam nil accidit in universo fortuito, & fortuna est nomen fictitium, quod ignorantie causarum ortum debet; datis itaque causis morborum consequi debent necessario symptomata, eaque pro diversis causis & principiis diversa.

73. Certa dator & necessaria inter symptomata, & causas, contextio: verum symptomata sunt mutationes evidentes & conspicuæ, adeoque ex quibus tanquam notis & characteribus ad causarum cognitionem procedendum est; aut procedere possumus; ergo non ex causis, nec ex sede morborum ad eorum symptomata, sed ex symptomatis ad sedem, causasque morborum est procedendum, utoque progredi potest Medicus.

Ex his sequentes Canones deducere liceat.

74. \*Definitio morbi est enumeratio symptomatum quæ ad illius genus vel speciem cognoscendam & ab aliis distinguendam sufficiunt.

75. Peccat itaque morbi definitio quam ingrediuntur ea quæ sunt obscura & hypothetica, ut sedes interna & propria quæ sensibus in vivo homine non potest distingui verum ea sedes est in definitione recensenda, quæ sensu aut ægrî relatu percipitur, sicut causa vel principium morbi reapse alibi lateat. Sic quæcumque pars in ephlate primario laboret, quoniam æger sensum gravaminis ad exteriora pectoris refert, illud symptoma in definitione reponendum est; & utrum in cerebro, pulmonibus, stomacho sit materies morbifica, non in definitione proponendum, sed in ætiologia investigandum est. Sedes itaque symptomatum conspicua solum, non vero sedes causæ abduca in definitionibus est exponenda, secus experimentum cum iudicio confunditur (10.).

76. Peccat iterum definitio, quæ causæ vel principiorum mentionem facit, nec in genere definitio tolerari potest, quia licet certum foret & inconcussum hoc morbi genus ab ea causa produci, cum tamen ea sub sensu ægrî, Medicæ non cadat, ex notam, vel charactere suppeditare non potest. Sic male definitur pleuritis a *Goræ* inflammatio seu tumor rubore, calore, & dolore stipatus in membrana costas succingente; quia calor & dolor tantum, non vero rubor & tumor, sensu percipi possunt, & quia utrum illa membrana afficiatur, in sensu non incurrat.

77. Hinc factum est ut nulla certa & constans morborum slet definitio; sic ex *Aristotele* pleuritis est liquidæ materiez cœlio, seu densatio. Ex *Apollonio* desinitur passio temporalis, atque celer secundum hyperocotas, aliquando in pulmonis partibus, sæpius sine tumore. Ex *Astlepiade* dicitur humoris fluor temporis partem, atque celer interiorum lateris partium cum febre atque tumore. Ex *Sorano* dolor vehementer interiorum lateris partium cum febris acutus & tussicula; quæ variz qualitatis liquor excluditur. Ex *Gardanio* (*Liliipag.* 203.) est Apollonia, calidam velaminum, collatum interiorum elibani pectoris. Ex *Helmontio* dicitur laceratio pleuræ, & eius divisio a collis facta, non per pondus piritur a cerebro defluentis, ut Antiqui credebant, sed per conatus convulsivos archæi: vel est peregrina aciditas concepta ex archæo: *Helmontii pleura furcata*, pag. 126. Ex *Fancheræ Tab.* 64. est febris acuta, continua, inflammatoria, secundoaria, quæ principium agens humores versus pectus dirigit, & statim in pleura factam resolvere intendit.

78. Definitio nimis stricta est & falsa, quæ omni speciei non competit, atque species ad genus datum pertinet, quæ cum illo symptomatis essentialibus magis affinis est quam cum aliis generibus.

Sic strictæ nimis sunt pleuritidis definitiones quæ lateris tantum dolorem admittunt, cum docet pleuritis dorsalis *Hippocratis*, pleuritis mediastinali *Avicennæ*, aliæque species quæ ad aliud genus quam ad pleuritidem dimitti non possunt, quæque tamen dolorem pectoris quidem, at nullum lateris, inferant. Quoniam autem sint generis limites sola docet accurata omnium specierum hæcenus observatarum enumeratio, quam qui ignorat, si genus designat apte non potest, nisi fortuito.

79. Definitio nimis est laxa, quæ aliis generibus quam definitio congruit, adeoque respicienda, cum quæ sunt distinguenda confundat.

Sic definitio pleuritidis ab *Aristotele* & *Gallio* prolata multis morbis a pleuritide diversis congruit; levis phlegmone pleuram afficiens potest nullam febrem acutam inferre, adeoque nec pleuritidem; quotidie in eadem morbis eorum qui

\* Peccatum errorum admittit *Tissotus*, qui præcipit ad quædam solum, uti alibi, quæ quædam tantum sunt, morbos censere, sed solis excursionibus Medicos incitare esse vult. *Quædam*

pleuritidem non sunt passi cernimus loca sub-  
tumida & rubro colore pleuram deturpantia ;  
hæud dubie prius levis inflammata .

80. Dicitio erronea est, quæ principium vel  
causam in sensu non incurrentem determinat ;  
illa enim determinatio non solum est sæpiuser-  
ronea, verum licet certa sit, non est ad defi-  
nitionem apta . Sic errabat *Sennertus* dum in  
definienda pleuritide inflammationem a pleura  
costarum ad pulmones usque extendi per ven-  
nam cavam aut arzygon pronuntiabat ; & *Jos-  
sephus* cum eam ab influxu sanguinis servidi,  
effusi ; *Helmontius* ab acido, fieri putabant : ver-  
um & *Neoterici*, qui hærentiam sanguinis in  
minimis vas, tanquam causam, inter inflam-  
mationis characteres reponunt, similem culpam  
admittunt, cum ab hærentia sanguinis, qua-  
lis, calor, dolor, pulsatio, distensio, tumor-  
que nequaquam produci possunt .

81. Genus morbi est ejus definitio, seu enu-  
meratio notarum, quibus cum omnibus ejusdem  
classis & ordinis convenit, & earum quibus ab  
illis discrepat ; sic pleuritidem vocat *Alexander  
Trautmann* concursum febris acutæ, pulsus duri,  
doloris punctorii thoracis, tussis & spiran-  
di difficultatis ; *lib. vi. cap. 1.* & ratione febris  
atque doloris convenit pleuritis cum hepatis-  
ide, nephritide, peripneumonia, aliisque mor-  
bis inflammatoriis, ab ratione tussis, sedis do-  
loris, & dyspnææ ab isdem discrepat generibus .

82. Quoniam genus est similitudo specierum,  
quidquid dictum est de genere convenit speciei,  
quicquid hujus generis, adque quod semel di-  
ctum est de genere suo loco, frustra repetere-  
tur in specie ; verum cum symptomata genera-  
lia in diversis speciebus similia sunt, similes  
sunt eorum causæ, ac proinde therapia gene-  
ralis eadem est (76.) ; ergo cum genera me-  
thodice disponuntur, & simul theoria ac praxis  
generica tradi potest, & semel tradita repe-  
ti non debet in diversis locis, quod in methodo  
anatomica & ætiologica vitari vix potest, cum  
quot sint partes, quæ v. g. inflammari possunt,  
toties theoria & therapia tradenda sit .

83. Species ejusdem generis tot debent enu-  
merari, quot sunt observatæ similitudines inter  
individuos morbos ejusdem generis, quæ cum  
symptomatis genericis symptomata constanter pro-  
pria ab illis diversa secum adferunt . Licet eni-  
m illæ species, brevitatis gratia aut propter  
usum recepti tyrannidem, a sede, vel a prin-  
cipiis procatasticis aut proegmenis denomi-  
nentur, ea tamen ratione sic vocantur qua sym-  
ptomata diversa hisce nominibus tantum signi-  
ficantur . Sic pleuritidis medii *Avicenna* nihil  
aliud significat quam eam pleuritidis speciem,  
quam his verbis expressit Auctor, qui sympto-  
mata ipsi propria numerat . Si pleuritidis dorsalis  
*Hippocratis* ea est species in qua dolor præci-

puns ad dorsum refertur, & respiratio singul-  
tuosa videtur : licet ex hoc nomine nequaquam  
determinetur sedes causæ morbi, sed tantum se-  
des ad quam referuntur præcipua symptomata,  
quod semel pro semper monitum volumus .

84. Differentia morborum sunt simplices illæ  
relationes per quas aliæ species ab aliis distin-  
guuntur ratione potissimum quantitatis . Sic di-  
ferentia est morborum, si in longos & breves,  
acutos & chronicos, magnos & parvos, leves  
& graves, fortes & debiles, dividantur : clas-  
ses vero, ordines, genera & species distinguun-  
tur ratione qualitatibus, adeoque sine aliis assump-  
tis, aut sine relatione ad alia opposita intel-  
ligi possunt . Quantitas enim dari potest, ut  
majus ; per se autem & sere relatione ad alte-  
rum scilicet minus, intelligi non potest . E  
contra vero qualitas dari potest, ut rubrum,  
rotundum, dulce, calidum, &c. & sine alio  
opposito ipsi comparato intelligi potest .

85. Similia salva similitudine quantitate dif-  
ferre possunt : ergo quæ discrepant ratione quan-  
titaris possunt esse similia, ut major imago mi-  
nori ; adeoque quantitas non mutat classem,  
ordinem, genus nec speciem, & tantum diffe-  
rentiam constituit . Inde sequitur magnum esse  
discrimen inter species morborum & eorum dif-  
ferentias, quæ perperam in scholis confundun-  
tur, monente dudum & repugante *Argente-  
rio* .

86. Gradus sunt quantitates qualitatum (*Volf.  
Ontologia 743.*) , adeoque per se & sine com-  
paratione ad aliud intelligi nequeunt ; & quali-  
tates, salva identitate & similitudine, gradu  
differre possunt ; ergo gradus non mutat genus,  
nec speciem : morbitaque quorum symptoma-  
ta sunt similia, ut calor major vel minor, pu-  
tredo major vel minor, extensio major vel mi-  
nor, &c. nec genere, nec specie, ea solum  
ratione discrepant, quod symptomata sint in-  
tensiora vel remissiora .

87. \* Scio fore plurimos qui hanc speciem  
enumerationem nequaquam probaturi sunt, si-  
quidem in arte potissimum quæstiosa, in qua  
non juxta rationis, sed juxta auctoritatis mo-  
mentum, judicari consuevit, plurimi in hac  
arte, quidquid a suis præceptoribus non accepe-  
runt, aut ipsi non conceperunt, illud superci-  
liosè contemnunt ; id enim in Botanica, licet  
minime lucrosa, factum novimus ; Rixotomi si-  
quidem & Pharmacopolæ plantarum genera &  
species tot novas tam accurate a *Tournefortio*,  
& *Linnaeo* fuisse propositas acriter doluerunt, &  
certe ex eo tantum stomachari illos puto, quod  
cum nomen sibi in re herbaria fecerint, perci-  
piant tamen ab aliis sciri quod ipsi nesciunt :  
quorum, ajunt, tanta cura, tantoque labore  
plantulas inquirere & miscos ac miscos vena-  
ri, cum e tot millibus vix ducentæ sint, qua-  
rum.

\* Est autem ab initio propositum illud, qui omnium morborum nomenclaturam Methodo non invenerit, hanc maxi-  
me in ipsi medendi methodi foribus ipsorum, cum constitit totidem esse medendi rationes, quot sunt morborum  
idem, ( seu species ) ergo sic in enumerandis morbis egisse, ut neque individui proprietatibus attentis insisterent, sed  
tunc, nec in primis sit in generibus subijgit, id in promptu quoque non est, sed ei tantum qui in methodis sic  
sæpius usus, Gules.

rum in Medicina usus sit. Sic etiam idiotæ quætuor quorundam Astronomi innumera describunt, notant, & suis asterisim inferunt sidera, quorum utilitatem non percipiunt: ego vero profanum vulgus censorum facis contempno, ut hinc objectionibus non respondeam; hoc tamen est discrimen inter Astronomos, Zoologos & nos, quod impune illud & istud sidus, ac insectum ignorari possit; aut hanc vel illam ignorari morbi speciem, in Medico culpa est, insoniti plurimorum sæpe hominum sanguine eluenda.

83. Quot miseri mortales medicamentis omnimodis frustra plectuntur ab officiosis Medicorum imitatoribus ob ignoratam morbi speciem? *Cephalæam syphiliticam* qui non novit, eam infausis omnibus per phlebotomias, martialia, emetica, cathartica, fonticulos, & id genus catinificinæ debellare conabitur. *Cephalalgiam hyssericam*, vulgo *clavum*, repetitis sanguinis missionibus, catharticis aggredietur ignarus, & ægrem in ultimum periculum conjiciet, quam speciei gnarus grano laudani liberabit. *Asilem* a suppressa scabie nocivis aut saltem frustraneis Pharmacopolarum armis impugnet Medicaster; aut indutus scabiosis tunicis eruditus sanabit Medicus. *Anorexiæ* ab animi pathemate, ut a mœnore productam, inefficem per amara, emetica, stomachica sublevare tentabit, qui banc ab aliis ejusdem generis speciem non distinxerit.

89. Et sane, ait *Baglivi* (*lib. 3. præc. med. cap. 9.*) inter præcipua Artis nostræ desiderata illud merito reponimus, ut singuli quique morbi in tot species subdivinguantur, quot sunt morbi primarii a quibus foveantur, aut causæ vehementes, constantesque a quibus producuntur; & singularum specierum proponantur signa characteristica, nec non medendi methodus cuilibet opportuna & stabilis; eadem porissimum ratione qua id factum videmus a Botanicis, qui sub generali nomine alicujus plantæ, v. g. *Cardui*, plures carduorum species comprehendunt, suntque adeo seduli in describendis magnitudine, figura, colore, sapore, aliisque plantæ accidentibus, quibus unam cardui speciem ab alia distinguant, ut insigni laudum ornamento digni profecto videantur. Contra Medici morbos nonnullos, qui in tot species distingui deberent, quot sunt morbi principales aut causæ vehementes a quibus foveantur, quia in nonnullis symptomatibus sibi similes videntur, sub uno generali titulo comprehendunt, eademque medendi methodo in singulis utuntur; cum re vera & natura diversi ad invicem sint, & diversam medendi methodum exposcant singuli, & singuli pariter sub propriis reponi titulis debeant, prout de cardui speciebus superius consideravimus.

90. Talem vero morborum historiam tanti fecit ille summus Artis medicæ restaurator, ut duos sum Præceos medicæ libros impendit in stabilendi Medicorum Academiæ, quæ huic operi perficiendo tantum intenta foret; legantur

potissimum *cap. 4. §. lib. 2.* ubi præjudicia Medicorum diversa a nobis sentientium firmis rationibus evellit, & nec inbusitas, nec inconstantes esse morborum species, sat clare demonstrat, rationibus a *Clarissimo Sydenhamo*, & experientia petitis.

His calculum suum inclytus addit *Mortuus*, qui in describendis variis phthisicis pulmonatis speciebus nobis præluxit, quique in *Præfatione* ait, „vehementer exoptandum esse, quin & hoc „sæculo jure merito expectandum, ut præstantissimorum virorum opera & consilia, ceterotum pari ratione morbotum historia in clariori luce ponatur; frequentissime enim „in Medicinæ opprobrium, æque acin ægrotantium summum dampnum, plurimos morbos sub uno generali titulo, plerisque Medicorum scriptis comprehensos, atque nai eidem „que medendi methodo accommodatos passim reperimus, qui cum a diversis causis originem suam ducant, ita admodum diversis symptomatis stipari æque diversas indicationes subministrant, methodumque curandi, quod tandem optatus eventus attingi possit, æque differentem requirunt. Cum vel pene deejrare possim neminem, quantumvis generali hac scientia instructum atque versatum, cum successu felici artem suam exercere posse, do nec vel ingenii sui acumine singulari fretus, vel multo etiam usu instructus, pro diversitate causarum, & symptomatum, distinctiorem morborum ideam sibi ipse formaverit, & pæpèdum habuerit; atque inde fit quod nulla alia ars præter medicinalem adeo longo usu & experientia indigeat, &c.

91. Quanto ille & quam digno risu exciperetur, ait *Illudr. Mûgrave* (*Præfat. de Arthritide*), „qui, dum artem exercere professus sit Gemmarum, adamantes, quotquot sub eodem nomine circumferuntur, non distingueret, & omnes pro veris haberet. Idem foret Medici error, si arthritidis diversas non distingueret species; hac scilicet neglecta distinctione, verendum ne, dum uni eademque tantum morbo obfistere contingit, multis iisque longe inter se diversis & diversa ratione impugandis accipitur prorsus „eventu; prælium in tenebris committamus.

92. Non omnitemdum est celebris in *Leydensi Academiæ Professoris D. de Gorter* suffragium: in morborum species æque constantes existimant sunt species plantarum, & naturam in suis operationibus constantissimam esse contendit. Hoc si concedatur, quod a nemine sanæ mentis negari potest, magna equidem affulget spes, observando naturæ cursum, & redigendo operationes in ordinem, tandem proximam ad illam certitudinem perventuram, qua hodie gloriatur Botanica. Botanici plantas digesserunt in genera & classes, quas itidem in species, hoc non minori in Medicinæ praxi fieri posse certitudine roor; sicut mihi similitudinis id in utriusque ratio „& ia.



„ & in quibusdam experientia: “ *D. de Gorter Orat. Inaugural.* Auctoritates summi ponderis, seu exemplum ab hujusce Academiæ Cancellario olim & Archiatrorum Comite *D. D. Chiraciano*, dum de peste scripsit, & a Celeberr. Reginæ Archiatro *D. Helvetio*, dum de variola disserit, propositum in nostras partes traherem, nisi in Pathologia methodica prius idem animadvertissem, quocirca hisce supersedere visum est. Legatur de his *Illustr. Gaudii Pathologia*.

## 2. Nomenclatura Nosophica.

93. Si quæ ab aliis abstrahimus, ea vocabulis peculiaribus designamus; hoc modo abstractiones sunt magis clare & distinctæ, & abstracta facilius memoriæ mandantur, ac diutius retinentur. Demonstrat *Vpuius Psychologia Empyrica* 284.

94. Genera & species Morborum sunt notiones abstractæ; nec enim dantur in universo tum genera, tum species, sed tantum individua. Illa itaque peculiaribus vocabulis, id est, nominibus sunt designanda, ut clarius, distinctiusque cognoscantur ac intelligantur.

95. Nomina si tollas, nulla est cognitio rerum, ait *Isidorus*; nec enim colloquio ulli locus est sine nominibus, nec eas intuitive satis cognoscere possumus, ut docet quotidiana experientia; unde fit ut quo quid distinctius nosse volumus, eo accuratius ejus nomen memoriæ insigimus. Sic venatores cuique cani, pastores cuique ovi, duces cuique militi nomen proprium adscribunt, sine quo nulla, nisi confusa & obscura, foret eorum cognitio. Talis est brutorum cognitio, illa plantas norunt, heros suos distinguunt, alii nomina nesciunt.

96. Ideo loquimur & scribimus ut ab aliis intelligamur; qui ideo loquitur ut non intelligatur, is pittacorum instar reddit sine mente sonos, vel incassum loquitur. Vocabula & nomina sunt signa idearum nostrarum, & tantum valent, quantum sonant, vel quantum ex definitione constanti certus est & fixus eorum significatus. Si itaque ob inconsistentiam loquendi eodem nomine plures ideæ enuncientur, eo prolato, auditur, quid significet hoc nomen non intelligit, adeoque qui verbis æquivocatur, is ideo loqui videtur ut intelligi non possit. Eodem itaque nomine unica tantum idea significari debet, si cordate loquamur.

97. Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora; unico nomine una idea exprimi potest apprimè, adeoque eidem rei diversa nomina affigere frustraneum est; cuiuslibet itaque generi unicum nomen, illudque quoad fieri potest simplicissimum convenit, & quælibet hujus generis species nomine generico non solum, sed & etiam ephiteto ipsi addito, seu specifico debet designari, Ephemera v.g. nomen est ge-

nericum febris continens, quod sufficit ad omnes ejus species genericæ designandas; verum quoniam datur species sudore intenso stipata, altera a lactis proventu puerperis communis, illæ species nomen suum specificum postulant, unde merito alia *ephemera sudatoria*, altera vero *ephemera lactea* nuncupatur. Immerito vero prius vocaretur *Hydropsyten*, quia hoc nomen novum genus exhiberet, adeoque generica nomina sine necessitate multiplicaretur. Quo pauciora sunt nomina generica, seu geneta, eo facilius retinentur & intelliguntur. Si vero tot genera constituantur, quot species, tunc ea multiplicentur sine necessitate, & cum summo scientiæ detrimento, res enim recidit ad primum cahos, & omnis methodus inutilis est.

98. \* Si propter loquendi inconsistentiam uni nomini plures vulgo significatus respondeant, tunc temporis Auctor debet, Geometrarum more, quid ipse hoc nomine intellexerit, præmissa definitione, monere, & suæ definitioni constanter adherere. Si eodem characterè Arithmeticus in computo reddendo uteretur, nunc ut significaret decem, nunc ut significaret quatuor, is haud dubie stultus esset, vel nequam & veterator, cum vel decipi, vel decipere vellet; verum nomina sunt idearum nostrarum characteres, & discursus sunt idearum computa, quæ Lectori reddi debent, adeoque qui eodem vocabulo diversas ideas indiscriminatim exprimit, is semetipsum non intelligere, vel ab aliis non intelligi conatur, adeoque errat, vel decipit. Veteres *nervi* nomine intellexerunt indiscriminatim & nertrum, & tendinem, & ligamentum; *Physicifementationis* nomine motum omnem intestinum indigirare; nuperrimi vero ab eo vocabulo excluderunt merito *effervescentiam* & *putrefactionem*, distinctisque nominibus ideæ magis distinctæ evaserunt.

99. Poetis & oratoribus suas ideas synonymis & homonymis exprimere solemne est, illis enim non *vera loqui*, sed *aeri* potius quam menti jucunda proferre animus est; sed in scientia gravi & seria æquivocas voces adhibere prorsus inconsultum est, & ex illa prava consuetudine fluunt illæ indecoræ scholasticorum triæ & disputationes, quæ Geometris & Sapientibus nauseam movent, in quibus scilicet de verbis continuo luditur; quoniam cum voces æquivocæ inconsiderate vel consulto adhibeantur, tutum est respondenti, vel prædixi in distinctionibus repetitis persequium, unde argumenta eluduntur, & disputatio philosophica in rixam muliebrem vel puerilem altercationem degenerat.

100. Nullum sere genus est morbi cui constans competat definitio, experientia docet, (77.) adeoque Nosophi primum officium est cuique morborum nomini generico constantem significatum imponere.

NOT. No-

\* Multo lecius esse opinor unicuique rei scorsim unum nomen, ipsiusque proprium, indere, eoque perperuo uti, cum sciam quod communia nomina, quæ alterum non magis quam alterum significant, auditorum confusio, & perturbatio, ut non cognoscat quid sit tandem quod dicitur, priusquam æquivocum distinguatur. *Galen.* in *Uppia*, lib. 11.

101. Nomina generica apte definiri non potuerunt a primis medicinarum patribus, qui plures species deinceps inventas ignorarunt, adeoque suis generibus includere non potuerunt; ergo sic definiantur genera, ut species omnes hactenus observatas amplectantur.

102. Nomina generica simplicia solis generi-

bus morborum competere debent (99.) adeoque, rejicienda sunt ea nomina quæ aliis subiectis communia sunt, seu quæ ex Physiologia, Botanica, Zoologia, aliisque scientiis in Nosologiam translata fuere. *Appetitus, furor, passio, tedium* sunt termini Psychologiæ, ergo ex Nosologiæ sunt expungendi, & sic minus placent.

Appetitus defectus,  
Furor uterinus,  
Passio iliaca,  
Tedium vitæ,

qui *Anorexia*.  
qui *Nymphomania*.  
quæ *ilens*.  
quod *Melancholia species*.

103. *Fames, sudor, miſtus, deſectio, fluxus, coſſio, appetentia, &c.* sunt termini physiologici, adeoque a generibus morborum expungendi.

Fames bovilla,  
Miſtus cruentus,  
Deſectio frequens,  
Fluxus alvi,  
Fluor albus,  
Vigiliæ,  
Motus convulſivus,  
Infultus Epilepticus,  
Chorea ſancti Viti,  
Cibi faſtidium,  
Apprehenſio,

quæ *Bulimia*.  
qui *Hæmaturia*.  
quæ *Diarrhœa*.  
qui *Diarrhœa*.  
qui *Leucorrhœa*.  
*Agrypnia*.  
*Convulſio*.  
*Eclampsia*.  
*Scolotyria*.  
*Cacoſtia*.  
*Catalepsia*.

104. *Morbus, affectus, diatheſis, lues, epidemia, dolor, febris, alvi fluxus, imbecillitas, intemperies, &c.* sunt termini claſſium & ordinum, adeoque generibus minime applicandi, ne, cum genus designatur, lector claſſem intelligat, & ne per plura nomina genus ſignificetur, quod per unicum poſſet exprimi.

Morbus Neapolitanus  
Diatheſis ſcorbutica,  
Epidemia peſtilens,  
Dolor auris.  
uteri,  
pectoris, &c.  
Febris ardens,  
putrida,  
quartana,  
quotidiana continua,  
peſtilens,  
Alvi fluxus cruentus,  
chyloſus,  
ſeroſus,  
Imbecillitas hepatis,  
ventriculi,

qui *Syphilis*.  
quæ *Scorbutus*.  
quæ *Peſtis*.  
qui *Otalgia*.  
qui *Hysteralgia*.  
qui *Pleuradynie*.  
quæ *Tristhaophya*.  
quæ *Synochus*.  
quæ *Quartana*.  
quæ *Amphimerina*.  
quæ *Peſtis*.  
qui *Dysenteria*.  
qui *Cæliaca*.  
qui *Diarrhœa*.  
quæ *Chlorosis*.  
quæ *Anorexia*.

Morbus ſacer,  
Morbus herculeus,  
Morbus comitialis,  
Morbus caducus,  
Lues deifica,  
Malum Sti. Joannis,

*Epilepsia*.

Incubus,  
Succubus,  
Incubo,  
Pnigalium,  
Epibole,  
Cochemar,  
Chauchevieille.

*Ephialtes*.

105. Nomina generica synonyma sunt eligenda, & optima peioribus anteponenda.

*Morbus Gallicus* Baglivi, *Lues Neapolitana* Gallorum, *Lues Bavarica*, *Morbus Lusitanicus*, *Paturia*, *Pudridagra*, *Morbus mevinus*, *Scorbutus Neapolitanus*, *Mentagra*, *Lues venerea*, *Variola magna* Jouberti, &c. sunt synonyma *Syphilitidis* Fracastorii, quam Angli, Indi, Hispani, aliis etiam nominibus \* hic non recensendis insigniunt; ex his nomina composita & claf-

Inflammatio Hepatis,  
Renum,  
Intestinelorum,  
Meningum,  
Ventriculi,

Ulcus pulmonum,  
Ulcus Prostatum,  
Uteri,  
Passio hysterica,  
Colica,  
Hydrops abdominis,

Intercus,  
Chorea Sancti Viti,  
Sputum sanguinis,  
Profluvium alvi,  
Melancholia-morbus,  
Cholera-morbus,  
Pavor nocturnus,  
Ardor urinae,  
Mictus cruentus,  
Morbus virgineus,  
Morbus arquatus,  
Icterus niger,  
Difficultas respirandi,  
Sitis nimia,  
Ardor ventriculi,  
Lævitas intestinelorum,  
Difficultas intestinelorum,  
Coma somnolentum,  
Coma vigil,  
Amor insanus,

107. Nomina barbara, seu nec græca nec latina, barbaris & Garamantis sunt relinquenda, ut

Guttes,  
Heimve,  
Subeth,  
Beriberi,  
Mirachia,  
Aproximeron,  
Dievaren,  
Soda,  
Veirola,

quæ *Epilipsia*.

*Nesalgia*.

quæ *Cataphora*.

*Berberia*.  
*Hypochondriasis*.  
*Anaphrodisia*.  
*Malis*.  
*Pyresis*.  
*Syphilitis*.

108. Nomina deceptiva vel speciebus contraria, ut diminutiva, pluralia & veritati repugnantia, rejicienda sunt.

Fluxus hepaticus, qui non semper est hepaticus  
Fames canina, quæ lupina, humana etiam est,  
Fluor albus, qui etiam viridis, luteusque,  
Pavor nocturnus, qui sæpe diurnus,  
Noctambulismus, qui interdiu fit,  
Incubus, qui est sæcubus,  
Morbus Italicus, qui est Gallicus, Americannus, &c.  
Morbilli, quasi plures parvi morbi, cum sit unus & magnus,

*Hepatitis*.  
*Bulimia*.  
*Leucorrhœa*.  
*Panophobia*.  
*Somnambulismus*.  
*Ephialtes*.  
*Syphilitis*.  
*Rubella*.

*Sauvages Nosologia Methodica*. Tom. I.

B

Va-

\* 1-12 buss. Las bubas, Lepros, The yavro, Psa. Pellagra, Ochiaria, Borsali, Unguaria, French-pox, sambakusan

Variorum, cum sit unicus morbus, a variis diversus,	-	-	Varicella.
Morbus regius, qui subjectis non parit,	-	-	Aurigo.

Licet autem nomen græcum, ut leucorrhœa, hepatirrhœa, vicio simili laborare videatur quo latinum, interea multo pauciores deludat & tolerabilius est.

109. Nomina generica ex aliis artibus & scientiis mutuata, illis restituenda sunt.

Ex Zoologia *testudo, talpa, lupus, cancer, ovum, nux, unguis.*

Ex Botanica *lichen, paronychia.*

Ex Oeconomica *clavus, nodus, lorum, ignis Perficus, pannus, gutta serena.*

110. Nomina causarum & principiorum pro morbis ipsis genericè designandis sunt erronea.

*Ilhus venii* - - - Pleritis, Angina, Rheumatismus.

*Obstructio* - - - Chlorosis, Dyspnoea, Aurigo, Cephalæa.

*Indigestio* - - - Vomitus, Diarrhœa, Cholera, Ephemera.

*Saburra* - - - Cholera, Synochus, Diarrhœa.

*Conatus* - - - Pleuritis, Lumbago, Rheumatismus.

*Vapores* - - - Hysteria, Epilepsia, Vertigo.

*Ilhus solis* - - - Cephalalgia, Phrenitis, Ophthalmia, &c.

*Calculus* - - - Dysuria, Ischuria, Nephralgia.

*Vermes* - - - Eclampsia, Bullimia, Colica, Carus.

*Virus* - - - Syphilis, Scorbutus, Variola.

*Suppressio mensium* - - - Cephalalgia, Asthma, Vertigo, Anorexia.

*Vitia oculorum* (57) - - - Amaurosis, Amblyopia, Ophthalmia, &c.

*Dyspepsia* - - - Anorexia, Cardialgia, Diarrhœa.

*Vomica hepatis* - - - Hepatalgia.

*Flatus* - - - Colica, Meteorismus.

*Defectus mictionis* - - - Stranguria.

*venereis actus* - - - Anaphrodisia.

*appetitus* - - - Anorexia.

Infinita prostant apud Auctores ejusmodi nomina pro morborum generibus venditata: illis pro morbis vermes, calculos, &c. non erubescunt obtrudere; quidni gladios, lapides, dentes ferarum, aera, ignem, stercus, morbis annumerant? cum ab his omnibus intra corpus adactis, vel ipsi intempellive admotis functiones æque lædantur ac a vermibus, calculis, pute effuso, aqua collecta, saburra, &c. Omnia venena, medicamenta, alimenta morbos inducunt, anne propterea morbi sunt?

111. Defectus & privatio nihil est positivum, & nullam ideam morbi in mente imprimit. Miror hæc nomina *Felici Placero* ita arripisse ut classem defectuum instituerit, ut *defensus* partus, sudoris, lactationis, conceptionis, motus vitalis, digestionis, defecationis. Verum utcumque a suppressis quibudam evacuationis sunt aliquando morbi, ipsi tamen defectus, morbi non sunt. Sunt bene multæ mulieres quæ optime valere sine menstruis, multi viri sine usu veneris; sunt qui per seminem non deiciunt feces & optime se habent; ergo suppressio eorum per se morbus non est. Cum quis fonticulis, phlebotomiæ, cathartis, vomitui est assuetus, horum suppressio ipsi morbos inducit, ut notum est; at inde non sequitur quod suppressio vomitus, diarrhœæ, hæmorrhagiæ, &c. sit morbus: inde enim illud absurdum sequeretur quod tot sint morbi quot sunt morborum defectus, seu quodam morbos esse morbi privationem. Has suppressiones, hosque defectus nullas Græcorum Medicorum morbis annumeravit, ut patet ex

defectu nominum genericorum ipsis a Græciis inditorum; & si hæc valeret generum institutio, genera in hæc tamen excreverent: etiam si idea morbi sit negativa, ut in soporosis accidit, illum tamen per symptomata positiva definire consuevit, quia quod adesse observare licet, quod non est divinandum est, & in sensus non incurrit, adeoque symptoma non est.

112. Nomina generica nova morbis novis, qui ad priora genera non pertinent, a methodicis Auctoribus possunt & debent imponi, vel nomina vacua ex antiquis Auctoribus ad illos significandos determinari, vide *VVelf. Log. 144.*

Si qui novas plantas observant, illas nomine proprio novo non insigniunt, nulla cum aliis harum distincta communicari possent notio. Si peregrinator urbium quas observat nomen ignoret, is earum ideam distinctam non retinet. Idem de morbis dictum esse; si nomen non habuerint, nulla eorum est notio: ergo si novi sint, novo nomine debent insigniri prout leges a prudentia sancita. Sic *Calins Aurelianus* nomen indidit plurimis morbis, ut *Catalepsi, Hydrophobia, Phagedæna, Oniragone, Calina, Elephantiasis, Asciti, Tympaniti*. *Plinius* testis est suo ævo nomen colica inditum fuisse. *Zuvingerus* poropatridalgia seu *nostalgia*; *Baglivus* *Hysteria*; *Boerhaave* *Gastritis, Enteritis*; *Fracastorius* *Syphiliti*, imposuerunt. Et quoniam novum genus est, etiam si res definita sit antiqua, cum novæ species ipsi aptantur & ipsum ad novam methodum accommodatur, idcirco non solum Altronomi fiderum nomina plurima nova in medium attulerunt, sed & Ana-

& Anatomici, ut *Vivinslevu*, *Ruyfchius* nomina nova musculis, membranis, Botanici plantis, Zoologi piscibus, insectis, avibus dudum cognitis imposuerunt; Geometrae curvarum classes, & genera plura nominaverunt; verbum qua proportione scientiæ paulo felicius exultare & latius promovere sunt, ea nomina generum & specierum distinctiora & meliora multiplicare necessum fuit, idem in Arte Medica evenit, ut patebit conferenti genera morborum *Calis Aurelianus* & deinceps Neoterici cognitorum.

113. Nomina morborum generica, si epitheto fuerint stipata, specifica evadunt; eatenus enim epithetum nomini generico additur, ut ejus valor quid distinctum a genere designet, adeoque speciem determinet: epithetorum vero leges eadem sunt ac nomium generico- rum, quibus tamen sequentes addantur.

114. Distinctio morborum in *legitimos* & *spuri- os*, *veros* & *falsos*, ut plantarum in veras & falsas, est omnino spuria & fallax; nam qui definitur recte genus, ipse nomen indidit, ex hoc ipso excludit species huic definitioni repugnantem, ergo species illæ nomine eodem generico insigniendæ non sunt. *Pleuritis* v. gr. definitur morbus febre acuta, dolore pectoris punctorio, tussi, & dyspnœa insignitus. Si jam ea dividatur in veram & spuriam seu falsam, idem est ac si divideretur in eam quæ est pleuritis, & eam quæ non est aut quæ falso pleuritis indicatur, hanc enim falsam vocant, quod certe absurdum est. Antiqui verum vel legitimum morbum eum vocabant, qui juxta suam sententiam fiebat a quodam humore determinato, ut cynanche a sanguine: spurium vero qui partim a sanguine, partim a pituita, ut angina catarrhalis. Rustici pari errore dividunt v. g. salviæ in veram, quæ salvia est, & in spuriam, quæ salvia non est, sed phlomis vel stachys.

115. Species morborum a regione, subjecto, tempestate non debent denominari, quia illæ conditiones in ipso ægrotante non sunt conspicuæ, & idem morbus diversis regionibus, sub- jectis, tempestatibus, &c. est communis.

*Colica Piltæna* infestat in Moravia, Hun- garia, rarior est hodie apud Pictones.

*Lues Gallica* seu syphilis infestat Ameri- cas, Italos, Anglos, &c.

*Morbus virginicus*, chlorosis, etiam scorta & uxoratas mulieres, imo quandoque viros infe- stat.

*Quartana autumnalis* eadem est ac verna, æstiva, -hiemalis. Ridemus veteres Botanicos qui plantarum genera & species dividebant in montanas, pratenses, arvenses, maritimas, &c. quia eadem species nunc in pratis, nunc in arvis, nunc in montibus &c. enascitur; mirum est Nosologos, ab eo errore nondum liberatos esse.

116. Nomina specifica eatenus valent, qua- tum characterem præ se ferunt quo species

cognoscitur aut ab aliis distinguatur; verum epitheta quæ indicant causam aut quid obscu- rum, dubium, in sensum non incurrens, chara- cterem seu notam non suppediant, adeoque omnia quæ ex hypothesi, causa latente, sed ignota deducuntur, sunt fallacia vel minus utilis nomina.

*Tertiana legitima* Galeni quæ a bile sincera. *Tertiana notha* Galeni quæ a bile & phlegmate. *Scurbutus ab acido*, *scurbutus ab alkalino*. *Cephalus sympathicus*, *cephalus idiosynthicus*. *Pleuritis essentialis*, *pleuritis secundaria*.

Si vero illis nominibus auctor intelligat, non causam nec sedem, sed symptomata in de- scriptione recensenda, quæ speciem illam dis- tinguant, nomen est tolerabile, maxime si breve & triviale.

117. Epitheta, tropis & figuris ornata, com- parativa, superlativa aut quovis modo gradum & quantitatem designantia, ac demum sequis- pedalia, rejicienda sunt. Nihil pulchrum nisi quod verum: procul itaque oratorum figme- ta; nomina propria sint, non veto allegorica & fucata: vide *Volf. Log.* 149.

*Tarantismi mirandus* Guiller.

*Epilepsia mira abdominalis* Heurnii.

Nomina relativa nihil docent cum in ipso morbo relatio non potest observari, nisi plures simul comparentur, iique præsentem.

*Apoplexia levis*, *apoplexia gravis*.

*Ophthalmia recens*, *ophthalmia inveterata*.

*Amphimerina levior* seu *notha* Boneti.

*Amphimerina syncopalis minuta* Jonstoni.

Nomina sequisipedalia brevioribus sunt post- ponenda. *Potopatrialdigia* Zovingeri locum ce- dat *Nostaligia* Neuteri; *Malum hypochondriaco- hystericum* Junccheri cedat *Hysteria* Baglivi.

118. Nomina specifica quasi in ægrotante re- periundas ac velut inscriptas notas, easque con- stantes, & evidentes referre debent.

Harumque regularum rationes quifusius per- spectas habere voluerit, adear *Excellentissimi D. Linnei Botanico- rum Criticam botanicam*, ad cujus exemplum nomina morbis epitheta tm trivialis addidimus ad species designandas, tum scientifica seu characteristica addenda proponi- mus iis qui hoc opus, aut simile ulterius pro- moveve voluerint.

#### Nosologia Philosophica Fundamenta.

119. Philosophia est scientia possibilium qua- tenus esse possunt, *VWolf. disc.* 29. Cognitio philosophica non in nuda facti notitia subsistit, ut historica, sed ulterius progressa rationem facti palam facit; ut intelligatur ejus possi- bilitas seu cur istius modi quid fieri possit. Nosologia itaque philosophica est habitus de- monstrandi quod asseritur circa principia, cau- sas, & relationes morborum; Græci *asilegiām* vocant.

120. Quorum philosophica nobis est cog- nitio, ea certiori successu ad casus in vita hu-

mana obvios applicantur quam ubi eorundem non nisi historicam habemus, *VVolf. disc. 41.* ea ad plures casus in vita humana obvios applicantur quam ubi eorundem non nisi historicam habemus, si ratio ejus quod speciei competit in notione generis continetur, *VVolf. 42.* atque ab ea propositum numerus immittitur, ut cognitio minus ampla instructus ad plures casus sit paratus, qui ex casu speciali observato notionem universalius enunciare potest (*id. 43.*) ac demum philosophica cognitio historicam juvat, mathematicæ viam sternit, & animum voluptate perfundit, & felix qui potuit rerum cognoscere causas. Haud dubium est itaque quin nosologia philosophica Medicis utilis sit, & historica præstantior, eaque Dogmaticis ab Empiricis distinguit; Empirici enim in mera historica cognitione subsistebant. Verum si philosophica fuerit erronea & falsis principii innixa, tunc historice simpliciter postponenda videtur; satius enim est nullam habere ætiologiam, quam falsam, ex qua scilicet in errores Medicus incideretur.

121. Instituti nostri ratio non exigit ut hic Physiologiæ, Pathologiæ, Hygieinæ, & Therapeutice fundamenta tradamus; notum est in Medico requiri non solum auxiliorum, ut medicaminum, instrumentorum, sed & hominæ machinæ notitiam tum historicam, tum philosophicam; id tantum in nos suscipimus ut fundamenta philosophicæ nosologiæ hoc ævo minus cognita aut neglecta, quæ tamen, me quidem judice, necessaria sunt, paucis eradamus; in quibus certe si nexum & ordinem exquirem multo prolixior essem; cetera ex *VVinslevus, Boerhaave, Pitcairne, Schreiberno*, aliisque cognita suppono. Atque quoad fundamenta ontologica, psychologica & mathematica, ea omnia solus fere suppeditare potest Celestis. *VVolfus*, cujus & terminos, utpote definitos, & propositiones demonstratione munitis in usum vocare, nequaquam vero iacrum definire nec demonstrare meum est.

122. Homo est aggregatum ex anima vivente & mobili atque machina hydraulica simul unitis.

123. Humana machina ita a Summo Numine est fabricata, ut ejus singulæ partes & actiones ad totius conservationem seu tutelam & medelam mirifice conspirent.

Sic oculus ita structus est, ut ejus singulæ partes eo colliment, ut nitida objectorum externorum imaguncula in retina depingatur, unde moveatur anima de objectorum sibi utilium aut noxiarum præsentia; media per quæ ille finis attingitur sunt corneæ convexitas, pelluciditas, radiorum refrangibilitas, eorum a crystallino refractorum convergentia; verum ut cornea sic pellucida servetur, lachrymis affluctibus lubricari debuit, ab externarum injuriarum accessu per palpebras, earumque protectionem muniti debuit, globos appositis mu-

sculis versus objecta dirigi, pupilla ad moderandam lucem nunc contrahi, nunc dilatari, &c.

124. In hoc autem sita est sapientia, ut finem utilem sibi proponat agens, ad quem obtinendum media optima dirigantur: cum autem humanam machinam attente consideranti pateat ejus singulas partes in sui & totius conservationem ultimo conspirare, & singularum actiones dirigi in fines proximos, qui sunt media ad finem obtinendum aptissima, quin humana machina a sapientissimo Creatore sit fabricata nullum est dubium.

125. *Vita animalium* est coexistentia actionum cordis, & in nativis pulmonum, cum actionibus animæ: posita actione ponitur vis, quæ ejus est ratio sufficiens, adeoque *vita vires vitales*, & animales coexistentes audit.

126. *Vita perfecta* est complexus omnium actionum in totius conservationem tendentium; ut autem in eundem finem consentiant, non omnes actiones possibiles eodem tempore, eademque ætate debent simul exerceri, sed semper & vigilia, manducatio & dejectio, accrescentia & generatio diversis temporibus peragi.

127. *Perfectio* est sufficientia ad finem, seu plerumque diversorum consensus in unum finem: Deus vero creavit hominem perfectum, & ita ejus organa construxit, ut singula in totius conservationem mirifice conspirent; quoties itaque organorum omnium actiones in totius conservationem tanquam in unum finem consentiunt, & finis a Deo intentus attingitur, & vita hominis huic fini conformis perfecta dicitur.

128. Sic actiones omnes oculi ad perfectionem tendunt, cum ipsius figura, pelluciditas, mobilitas, proportio ea sunt, ut objecta possint in retina sui imaginem, quantum fieri potest, amplam, nitidamque & claram depingere, palpebræ injurias externas arceant, singula fluida solidaque nutriri & a putredine immunia servari.

129. Si pupilla solito magis dilatetur, campus visionis ejusque lux majores sunt, sed visio interdiu confusa evadit; si solito minus contrahatur, campus visionis minor, lux minor est, sed in magna luce visio est distinctior; datur autem certa pupillæ apertura omnium utilissima, ex qua productum est distinctio, claritate & amplitudine visus omnium maximum, atque ea augetur in tenebris, decrevit in luce meridiana, atque mirifice aptatur ad diversas objectorum distantias; ea dispositio visum quidem limitatum facit, sed intra datos limites perfectum: adeoque perfectio humanæ machinæ consistere potest intra certos limites, uti perfectum est microscopium, etiam si remota objecta non attingat, modo finem ob quem ab auctore suo constructum est, attingat.

130. Homo gaudet viribus limitatis, seu non nisi datum virium gradum obtinet, ejusque actiones

vitæ

vitales & animales sunt finitæ; errant itaque illi qui sanitatem ex aditionum vigore æstimant, cum infecta minimis viribus prædita æque sana & perfecta sint ac boves & elephantes multo majori vigore præditi.

131. Sanitas historice considerata est concursus phenomenorum quæ vitam & structuram perfectam designant. *Galenus*, qui sanitatis nomine intelligebat functionum exercitium lætum, constans & facile, perfectionem reponebat in quatuor conditionibus, scilicet *sanitate integritate, robore & forma* seu pulchritudine.

132. Ad sanitatem concurrunt perfecta partium omnium combinatio, quæ si sit partium sensibilibus, *structura* dicitur; si insensibilibus, vocatur in solidis *textus*, in fluidis *crasis* vel miscela. Structura perfecta est, cum ad eam totius corporis debita integritas, & forma, seu concinna proportio, decens firmitas & connectio, qualis ad functionum perennitatem & totius conservationem requiritur.

133. Verum illa machina sana non est nisi vivat, nisi motore internodum; nulla enim machina agit sine motore, & vita ejus perfecta est complexus adionum temporis, ætatis & sexus convenientium, in totius longevitatem conspirantium.

Quæ concurrunt, illa vel invicem coexistunt, vel sibi mutuo succedunt, adeoque datur ratio illius concursus, seu unum dependet ab altero, vel cum altero connectitur: cognitio vero sanitatis philosophica ea est, quæ rationem sufficientem reddit hujus mutue connexionis: hæc vero ratio caput vel inventum difficilis est, ut probat circa eam Medicorum disensus.

134. Essentia scilicet sanitatis est poros inter & fluida proportio juxta *Aesculapiam*; qualitatem primarum juxta temperies ex *Galeno*; expeditus & æquabilis sanguinis circuitus ex *Pitcarne*; æquabilis liquidorum fermentatio ex *Vrillio*; vel expeditus humorum placide servescientium circuitus cum idoneo fibrarum tono, teste *Bureto*; solidorum & fluidorum æquilibrium, docente *Mequere*; nos vero machinam omnem bene se habere atque decenter aere putamus, cum quoad crasim fluida, solidaque quoad structuram ad finem machinæ, cum ipso motore concurrunt, ita ut quam maximas vires servet motor, & quam minimas impendat.

135. Sic cor bene se habet, cum talis est ejus textus, ut sileti, contrahere se patitur, & ita fabricatum est, ut sanguinem accipiat alternatim, & dimittat ea vi quæ ad circulationem per omnia vasa sufficit, ita ut non torpeat motor & motus, ut in syncope; lipothymia; nec de viribus suis ultra quam par est impendat, ut in syncope & febre: sic enim & adiones, quibus a Deo illa machina

destinatur, facile & constanter perfici possunt, & propter illam virium parcimoniam longævitas seu perennitas virium conservatur.

136. Mutatio, quæ statum corporis & animæ simul perfectiorem reddit, *sana* dicitur, atque si conspicua sit vel sensibus possit percipi, ea *phenomenum sanitatis* vocatur; illa vero phenomena duplicis sunt generis, vel enim ea consistunt in motu sensibili per visum, tactum, auditum, & *Functiones* vocantur, ut loquela; respiratio, contractio muscularis, incoctus, dejectio, mictio, exputio, &c. vel consistunt in sensibili partium dispositione, sed sine motu partium corporis sensibilibus manifesto, & ea *Qualitates* dici consueverunt a Medicis, ut figura, color, situs, magnitudo, &c.

137. Mutatio, quæ hominis statum minus perfectum facit vel ostendit, *morbosa* dicitur, eaque si sit conspicua, *symptoma* vel phenomenum morbosum nuncupatur; symptomatum vero duplex est genus scilicet in *functione*, ut raucedo, claudicatio, palpitatio, pulsatio frequens, sudor immodicus &c. & in *qualitate*, ut flavedo in aurigine, asperitas in scabie, odor in oæna, tumor in ascite, rubedo in faciebus.

138. Fluidi solidive prius in corpore contenti exitus seu emissio extra corpus vocatur in genere *excretio* vel evacuatio, sed ex definitione aliata evacuatio est motus partium corporis conspicuus, ergo functionibus est accensenda; unde alia est functio in motu solidorum conspicua, qualis in ambulatione, loquela, &c. alia in motu fluidorum extra corpus, ut in mictione, exputatione. Unde sequitur divisio symptomatum ab Antiquis in functione, in excretionem, & in qualitate vitiatam.

139. Morbi omnes hominis statum imperfectiorem faciunt quamdin vigent, quod enumeratione patebit; morbi autem omnes reducuntur ad febrem, inflammationem, convulsionem, paralytism, anhelationem, dolorem, vesaniam, evacuationem & cachexiam: ostendendum est in illis vel structuram, vel crasim, vel motoris vires non in longevitatem consentire eo modo quo in statu perfecto.

140. In febre vel fluida solito viscidiora canales suos inferiunt, vel acriora eos stimulant, unde vires vitales ad ea discutienda vel corrigenda evolvuntur, absumuntur majori proportionem quam ut possint pari passu refarciri; variat itaque illa optima virium impensa (134.) quæ parcimoniam longævitati prospicit, dum nulla impendit sanitati pericula.

141. Morbi inflammatorii virium vitalium dispendio, eoque magno sunt, ut febris, adeoque de longævitate hominis detrabunt; sed præterea doloris & debilitatis causa hominem a functionibus consuetis avertunt, & suppura-

B 3

*Sanguis Nefologia Methodica Tom. I.*

\* Facili aces humores alia corporibus animalis propriæ, & animæ re dicuntur, ut facultates cognoscens, appetendi, movendi, capiendi, & pulsandi in corde & arteriis. Quorum alia vitales dicuntur, ut respiratio & pulsus; cetera animales vulgo vocantur, quia ab anima pendere solæ putantur; facultates vero ipsi vegetabilibus communis quæ vegetabilis possunt nuncupari, sunt facultates crescendi, nutriendi, dirigendi, secerneendi, & generandi.



tione, in quam vergunt, integritati machinæ nocent.

143. Convulsivi morbi sunt quoad nervos idem quod febriles quoad vasa sanguifera; maximo virium animalium dispendio sunt; unde summa sequitur debilitas & functionum sanitatis seriatio.

143. In paralyticis nervi, qui ad eum finem sunt fibrefacti ut animam moneant de objectorum noxiorum & utillum præsentia, iam impressionibus eorum transmittendis sunt impares; ergo ad totius conservationem & cautelam non concurrunt.

144. In dolorificis vires absumuntur, ut in inflammatoriis; acque anima dolore detenta cæteris functionibus exequendis impar est, atque integritas nervorum labefactatur.

145. In vesanis anima, cuius finis præcipuus est verum dignoscere & bonum appetere, nec vero cognoscendo, nec bono festinando apta est; nec etiam fini propiori, seu sanitatis tutelæ pars ejus nobilior, scilicet intellectus, invigilat, dum ideis absurdis & appetitibus depravatis transversum rapitur.

146. In evacuatoriis morbis, vel continuis excretionibus functiones principes turbantur, vel immodicis effluxibus vires exhauriuntur; adeoque diverso ac in sanitate modo distribuntur in longævitatē detrimentum.

147. In cachecticis demum forma, color, cæteræque apparentiæ a statu sano tantum discrepant quantum interna solidorum textura, structura, fluidorumque crasis; sed cum a perfecto statu non possunt machinæ discedere, quin in peiorem ruant, evidens est in his morbis structuram & crasim non eandem esse, quæ est ad longævitatē necessaria utpote perfectissima (124.)

148. Hinc concludere licet a morbis omnibus statum hominis imperfectiorem fieri, quamdiu viget morbus, adeoque morbos omnes *malis* physicis esse annumerandos. *Malum* enim id est quod nos statumque nostrum reddit imperfectiores.

149. Quoniam vero malum ratione cuius ab infortunio graviori liberamur, in eo statim bonum est respectivum: si dantur conatus naturæ quorum ope a causis morbificis, aut peiores morbos inducturis liberemur, illi conatus salutares dicuntur, quod in homine locum obtinere quotidiana docet observatio: verum illi conatus sunt mutationes morbosæ (137.) adeoque morbi dantur; itaque morbi salutares, qui scilicet a morbis multo pejoribus nos immunes servant, quique proinde, licet in se sint *malum absolutum*, cum a malo graviori nos liberent, pro *bono respectivo* possunt haberi; sic vomitus spontaneus vel arte excitatus, qui crapulosum ab apoplezia ingruente excitat, morbus est salutaris; diarrhoea, quæ febrem gravem avertit, utilis & bona censetur; febris intermittens, quæ epilepsiam tollit, pari titulo laudatur.

150. Nulla in corpore mutatio fieri vel concipi potest nisi per motum; sed omne symptoma mutatio est, (137.) ideoque sit per motum

vel internum, vel externum; mutatio status; cuius ratio sufficiens continetur in subiecto, cuius status mutatur, vocatur *actio* (Ontol. 713.) sed ratio sufficiens symptomatum fere omnium continetur in ipso homine, ut attendenti patebit, ergo omne fere symptoma debetur actioni partium hominem constituentium. Excipiendæ sunt læsiones evidentes a causis externis, ut vulnera, contusiones, fracturæ, quæ non morbis, sed affectibus seu vitiiis accensentur.

151. Actio omnis est effectus virium immediatus, seu sine vi nulla datur actio, & posita vi ponitur actio, nisi detur resistentia ipsi æqualis; (Ontol. 718.) cum autem mutationes morbosæ plurimæ fiant a partium hominis actione, dantur in homine vires, quæ ipsius statum mutare, atque symptomata inducere possunt; morbi autem, si ex horum numero effectus excludamus, omnes a viribus humanis dependent.

152. Omne ens quod potest vires exercere seu agere, *potentia activa* vocatur *seu facultas* (Ontol. 716.); verum in homine partes tum fluidæ, tum solidæ, tum substantia incorporea seu anima, vires exerunt, agunt in se mutuo, in qua actione mutua vitale consistit commercium; adeoque mutationes morbosæ corporis & animæ potentiis activis seu facultatibus sunt ut plurimum tribuendæ.

153. Hoc ulterius patebit si ad classes morborum recentius attendamus, ut febres, inflammationes, &c. licet enim illis occasione præbeant corporum externorum, ut applicatorum & ingestorum, actiones, ipsi tamen morbi nunquam exoriantur nisi vires ipsius hominis exerantur, & fiant mutationes in corpore a fluidorum, solidorum, aut ipsius principii vitalis & sentientis viribus.

154. In cadavere vigent facultates vegetabilibus, & machinis hydraulicis communes, ut gravitas, attractio, elasticitas, & quæ ex his forte pendunt putrefactivus & fermentativus motus, dissolutio, relaxatio, condensatio, pilorum, unguium vegetatio, fluidorum lapsus, & pressio versus imas partes, colorum, odorum, firmitatis mutatio, adeoque symptomata in qualitatibus mutatis, & pauca in excretionibus, quia paucæ excretiones sunt independentes a sensu & motu musculari; nullæ vero sunt in cadavere mutationes quæ pendunt a perceptione, appetitu, motu musculari, motu pulsus & circulationis ac respirationis: functiones enim illæ animæ præsentiam, & actionem requirunt, adeoque omnes mutationes quæ sponte fiunt in homine a facultatibus tum corporis, tum animæ dependent; priores vegetabilibus communes sunt, posteriores animalibus propriæ.

155. Principium illud est quod continet in se rationem sufficientem cur alterum possit existere, seu esse illud ex quo alterius possibilitas intelligitur. Pathologi, qui verborum æquivocationem parum curant, illud *causam remota* nomine insigniunt, licet causa in principio multum discrepet, hinc inextricabilis in arte medica oritur



oritur confusio; „causa, ait Celeberr. *Astrucius*, „illud est quod morbum producit, & hanc solum, iam *causa* nomine insignendam esse facile censeremus, si usus permetteret; pace tanti viri dixerim, absurdum non esse usum, & hominis esse, ut rationi potius quam usui irrationali obsecundet: ipse vero fateatur multum difficultatis esse in tradenda definitione causæ, quia etiamnum, usum ista volente, solent, sub communi nomine, confundi tum *causa efficiens*, quæ morbum re vera faciunt, tum causæ, seu ut melius dicamus, *conditiones sine quibus*, quæ præsentem quidem morbum non producant, sed abentes, ne produceretur, impedirent.

156. Principia sunt tum conditiones, tum occasiones, tum circumstantiæ, nec non materia, instrumentum, finis, & prophasis.

Sic quoniam posito sanguinis grumo arteriolem vel venulam obturante, ex eo non intelligitur aqua vas illud dilari, atque proinde tumere, grumus ille non est causa tumoris, sed intelligitur tamen non repugnare quominus dilatetur vas; est ergo principium tumoris, illudque *materialis*, quia tumoris partem constituit; quoniam vero vas intumescens est pars organica, cum in tumoris compositionem ingrediatur, illud est *principium organicum*, sedes & instrumentum tumoris.

Si illius grami hærentia, quæ per se tumorem non facit, ad illius productionem sit necessaria, ut multi putant, ex eo dicitur *conditio* seu principium siue quo non fieret tumor: si vero principium ad tumorem non sit necessarium, ut vas angustum, illud tumoris *ocasio* dicitur quatenus huic animam præbet si causa accesserit. Si vero nec necessarium sit, nec utile, sed præsens, ut rabedo sanguinis ejusve acrimonia, illud principium *circumstantia* tantum dicitur. Illud propter quod agens quidpiam exequitur, *finis* dicitur: sic si ideo excitetur tumor, ut materies venenata e sanguine secedat, illa depuratio sanguinis *causa finalis* ab illi dicta, *finis* est tumoris seu scopus a principio agente intentus. Si tumoris occasio sit vasorum laxitas, vel inspissatio sanguinis a cacochylia, quia hæc meræ passivæ se habent in tumoris productione, & præviæ sunt dispositiones in corpore, tunc principia *proegumenta* vel *prædispositiones* vocantur, ut plethora, spissitudo, intemperies, acrimonia, &c. Si vero tumoris occasio sit activa, ut imperius, nifus, pressio sanguinis, etiamsi ad effectum per se insufficiens, vel animi exandescencia, vociferatio, cursus qui impetum, nifumque illum producat, ea *procatarticum principium* vel excitans dicitur, Græcis *prophasis*, quoties est evidens & externum.

157. *Causa* dicitur illud ex quo intelligitur alterius actualis existentia, unde discrepat a principio, ex quo non actualitas, sed tantum possibilitas intelligitur. Illud est possibile quod contradictionem nullam involvit, sed ideo non existit, quod potest existere; posito principio non necessario ponitur ejus *sequeula*, scholastici

*principium*; verum posita causa, necessario ponitur ejus effectus, etiam si nihil aliud ponatur, & effectus hac sola ablata tollitur. Causa etenim, eatenus est causa, quatenus effectum, seu alterum quid ab ipsa diversum producit; ita ut effectum sine causa, ut causam sine effectu sibi dari contradictorium sit. Quod actu existit, id possibile est, sed ex causa intelligitur actualitas; ergo a fortiori possibilitas alterius, atque proinde causa est species principii: exemplo definitiones elucidabuntur.

158. Potentia, qua vasa humanæ machinæ resistunt suæ elongationi, aut nituntur ad se decurtandum, vocatur *contractilitas*; ut potentia, qua resistunt suæ ruptioni, seu nituntur in cohesionem, *tenacitas* nuncupatur.

159. Pressio fluidorumque agit perpendiculariter in vasorum parietes, vocatur *pressio lateralis*.

160. Vis qua columna fluidi in basim antecedentis agit juxta valis axim, vocatur *vis progressiva*, vel pressio secundum axim.

161. Causa tumoris in genere est excessus pressionis lateralis supra vas aut vasorum contractilitatem: Demonstratio. Vasa eatenus possunt intumescere quatenus a fluidis contentis distendantur; sed non possunt distendi nisi a pressione laterali; omnis enim actio fluidorum perpendicularis est superficiei compressæ, atque eatenus resistunt vasa in statu sano fluidorum pressionem, quatenus in suis decurtationem nituntur fibræ tum longitudinales, tum orbiculares, seu pressio fluidi lateralis æquilibrat a vasis contractilitate; cum itaque pressio lateralis e-nergia major est vi contractilitatis, necesse est ut vas fibræ longiores evadant, & cum pressio illis perpendicularis sit, adeoque directio transeat per axim vasis, necesse est ut fibræ illæ ab axi recedant; sed si fibræ, adeoque parietes ab axi vasis recedant, vas intumescit; ergo dato excessu pressionis lateralis supra vasis contractilitatem, vas illud intumescere necessarium est; quod erat probandum.

162. Hinc sequitur vas intumescere data eadem ejus contractilitate, si vis lateralis fluidi solito major evadat.

163. Sequitur iterum data eadem pressione laterali, vas diductum iri, si contractilitas ejus minuat.

164. Sequitur etiam tumoris magnitudinem fore in ratione composita ex directâ pressionem lateralem & inversâ contractilitatis.

165. Nec non liquet, cessante contractilitate vas, ut sit a ruptione ejus, aut, quod inde sequitur, cessante pressione laterali fluidorum, nullum tumorem fieri posse a fluidis: adeoque limites in magnitudine tumoris esse eosdem, ac limites contractilitatis vas, ac limites pressionis a fluidis inducæ.

166. Pressio viva seu collisio illata vasis, quolibet pnsu cordis, eadem est ac quæ in basim columnæ fluidi antecedentis infertur; sed ea est ut quadratum velocitatis respectivæ columnarum, scilicet antecedentis & subsequen-

tis : adeoque intensitas tumoris , si vasis contractilitas sit eadem , est huic quadrato velocitatis respectiva proportionalis.

167. Pressio, quam fluidum exercet in vasis parietes, est semper ut vis emboli cordis illud promoventis & urgentis; verum ea est mensura maximæ velocitatis quam sanguis in dato vaso potest concipere; est enim ea vis, ut illius velocitatis quadratum, ex hydrodynamicis, adeoque data retardatione sanguinis antecedentis, illa viset mensura pressiois lateralis, quæ timorem suo excessu inducit.

168. Hinc sequitur tumorem tunc fore maximum, sub eadem vasis contractilitate, cum sanguis vi totali cordis premet vasis parietes, quod accidit cum vas est omnino obstructum, & in hoc casu tumoris magnitudinem pro visibus cordis augeri & minui, quod in variis accidit; pulsus enim decrefcente vitali pressione recedunt.

169. Hinc sequitur etiam tumorem, data eadem vi cordis, fore majorem in venis quam in arteriis, quia (ex *Hemaphysique* p. 262.) venis obstructis pressio lateralis est in maxima, & contractilitas vasis minor; unde major excessus, cui debetur tumor.

170. Effectus integri suis causis proportionem respondent, *VWolf. Medica.* 24.

171. En alterum criterium, quo causa cognoscitur & a principio distinguitur, ut exemplis jam allatis liquet; cum enim excessus pressiois lateralis supra contractilitatem vasis sit causa tumoris, qua proportionem crevit ille excessus ( 262. 169. ) vel decrevit, ea crevit, vel decrevit tumor.

172. Sic vase transversum secto, quoniam sanguis antecedens & estluens non resistit subsequenti, adeoque pari produrs velocitate fluit, nulla est velocitatum differentia, seu nulla velocitas respectiva, nec proinde pressio tunc lateralis tum juxta axim vasis ( 166. ) ut patet ex *Hemaphysique* pag. 247. num. 100, illico vas tumor evanescit.

173. Ligata vena, major sit tumor quam ligata ejusdem diametri arteria, quia cum in statu sano contractilitas venæ minor sit quam arteriæ, & tamen in utroque casu pressio lateralis eadem sit ( 168. ) excessus pressiois lateralis supra contractilitatem major futurus est.

174. Abæqualibus causis, lisdem positis circumstantiis, idem semper producit effectus, *Hamberger. Physio.* n. 18.

In Scholis defectu definitionum accuratarum vulgo statuitur unus rei plures posse dari causas: quia causæ nomine non causam integram, sed partem causæ in effectu integro composito, vel tantum occasionem aut subiectum causæ, aut demum quoddam principium intelligunt, verbo causam quodam modo cum non causa confundunt, secus unius effectus eadem semper est causa proxima efficiens, *Id. ibid.*

175. Qui pro causa tumoris hærentiam sanguinis in vase reponunt, illi pro causa princi-

pium ( 168. ) tantum assignant, quo semel errore imbuti facile existimabunt eundem effectum induci posse tunc ab illa hærentia, tum a pressione laterali, tum a contractilitatis decremento, tum ab aliis diversis, ut putant, causis; nec mirum omnes ideas confundi, cum nomina confunduntur ( 95. )

176. Ut suam regulam teneantur illi Philosophi regeantur lutum a sole indurari, a quo cera liquefit, adeoque unius causæ effectus diversos esse pronunciant. Verum sol est quidem principium, non vero causa lutum indurans; nam nisi accederet humidus exhalatio & terrarum molecularum major seu latior contactus, lutum non obdurefceret, dato eodem sole; ceræ vero molecularæ non exhalant humidum, sed fluido lucis circumvolatæ, velut atmosphæra tenuissima, se non nisi per exilia, raræque puncta contingunt, unde fluxilis evadit cera: confusus vocabulis, omnia confundi necessum est.

177. Nulla est scientia in qua sæpius errent artifices quam in Arte Medica, in qua tamen error si damnosior, si Theologiam excipias, atque fons errorum præcipuus est quod non causam pro causa habeant; *pest. hoc*, *ergo promp. hoc*, nullum pejus & tamen frequentius ratiocinium.

178. Ut unum alterius causa dicatur, non sufficit ut uno posito sequatur alterum, & eo ablato tollatur; sed requiritur ut etiam ex uno intelligi possit alterius actualis existentia, atque ut illius causæ intensitati proportionem respondeat effectus quantitas: & quoniam omnis effectus est mutatio, quæ sine vi mutante pernici non potest ( 150. ) necessum est ut quod pro causa habetur vim habeat sufficientem ad effectum ipsi adscriptum, secus ex uno non intelligeretur alterum, quod exemplis patet.

179. In navigio si quis videat tensis velis navigium progredi, his laxatis quiescere, nequam tamen velorum tensionem pro causa motus navis poterit referre, cum illa tensio per se navi motum non possit impertire: datis hirundinibus datur arborum multarum vegetatio, his avolatæ cessat; at quoniam ex hirundinibus non datur intelligendum quod succum intra fistulas arboreas trudit, illæ vegetationis non sunt causa. Mirum est omnes fere morborum, quæ circumferuntur, causas, non minus illis esse ridiculas. Sanguinis hærentia in vasis per se motum subsequentes quidem retardat, ergo multum abest quin acceleret, ut in febre accidit: interea illa hærentia pro causa febris vendicatur, ut & pro causa tumoris: item & pressio cerebro illata pro causa convulsionis, quia scilicet principia cum causa confunduntur. Sic Astrologi eventum causam in siderum aspectu seu situ respectivo reponunt, quasi in illo sita quædam nova vis resideret.

180. Nihil, quatenus est causa, sensibus cognosci potest, *Hamberger. phys. prefat.* 36. nec proinde quatenus est alterius effectus: etenim

uuum.

unum ex altero intelligere est non simplicis perceptionis, adeoque sensus operatio, sed intellectus; nam illatione seu ratioio opus est, ut unum ex alio concludamus; verum causa est illud ex quo alterius actualitas intelligitur seu inferitur; ergo nihil quatenus est causa sensibus percipitur. Experientia vero est cognitio horum quæ ex sola attentione ad perceptiones nostras patet (*Voss. Leg. 66a.*) ergo nullam causam, nullumque effectum, quæ tales, ulla vel observatio, vel experientia demonstrat, contra quam pronunciant Scholastici.

181. Prognosis est cognitio causæ, & unius certitudo ab alterius certitudine pendet.

Ideo quidpiam eventurum esse tuto præfagimus, quia illud cognoscimus dari, ex quo intelligitur alterius præsentia, seu quia alterius actualitas cum eo necessario connectitur; sed postea causa necessario ponitur effectus, adeoque quanto certius novimus illam positum iri causam, tanto certius effectum præfagimus; verum dato principio datur tantum possibilitas eventus, adeoque non repugnat, eo posito principio, eventum non subsequitur, adeoque eventum quidem conjectare possumus, certo præfagire non possumus. Quanto intervallo distat certitudo a conjectura, tanto etiam utilitas cognitionis causæ & cognitionis principii. Cum navis progrediatur excessu vis venti & fluxus aquarum supra resistentiam inertiae navis, & viscositatis aquæ, si illum excessum accurate noverim, certo dimeter navis velocitatem, eamque præfagire & determinare licebit, quia data causa impossibile est quin effectus sequatur; ita cognita causa morbi vel datæ symptomatum congeriei, tato præfagitur illa congeries.

182. Diagnōsis morborum ex symptomatum cognitione dependet; verum definitio est enumeratio symptomatum nec plurium nec pauciorum quam quæ ad genus cognoscendum & ab aliis dignoscendum sufficiunt (74.) ergo diagnōsis morborum ex bona definitione dependet.

183. Si symptomata ita cognoscantur connexa cum altero, ut illorum actualitas ex hoc altero intelligatur, ideo cognoscimus ea esse alterius effectus, seu illud alterum eorum esse causam; & proinde accurata symptomatum cognitio, eorumque cum causis connexionis notitia totam implet diagnōsim & prognosim.

184. Signum est ens, quo alterius præsentia, vel adventus, vel præteritio colligitur (*Ontolog. 962.*) sed symptomata ita connectuntur cum causis, ut his positæ causæ ponantur, vel sequantur; ergo symptomata sunt signa causarum præsentium vel antecedentium: morbi vero sunt symptomatum connexionum concursus; ergo cum ex symptomatis eorum concursus & connectio intelligantur, symptomata sunt morborum signa, eaque certa.

185. Principia positis morbus est possibilis; ergo principia sunt signa probabilia morbo-

rum, eaque plus, vel minus dubia, prout pauciores sunt vel plures casus æque possibiles, in quibus datis his principiis detur talis morbus.

186. Si janciantur duæ simul texeræ, quoniam sunt 36. modi diversi æque possibiles, quibus texeræ illæ puncta sua exhibeant, factio iactu probabilitas datum punctum apparituum esse est ad certitudinem ut 1. ad 35. Si datum punctum ut 7. sex modis æque facilibus exhiberi possit, probabilitas est sexta pars certitudinis.

187. *Verisimilitudo* est probabilitas quæ se habet ad certitudinem in majori ratione quam 1. ad 2. Sic quoniam plusquam octodecim sunt casus in quibus jactis duabus tessellis possunt exhiberi numerus 7. vel 6. vel 8. vel 4. sunt enim illi casus 20. possibiles, jactis illis tessellis verosimile est fore ut alteruter ex his numeris punctorum contingat.

188. *Incertitudo* est probabilitas minor dimidia certitudine; sic quoniam ex 36. casibus possibilibus, numerus 7. potest tantum sex modis contingere, non verosimile est, sed incertum utrum numerus septem primo jactu contingat.

189. *Dubium* est probabilitas quæ dimidiam certitudinem aequat; sic si octodecim sint casus ex 36. possibilibus, qui eventui favent, ille eventus dubius est; sic si in morbo eventus quidam ex concursu fortuito totidem principiorum possit accidere, ac eventus contrarius, uter accidat dubium est.

190. *Possibilitas* est primus & minimus gradus probabilitatis & cum ignorantia consuevit; vide *i. Gravesande Leg.*

191. Quo certius cognoscitur morbi causa, eo prognosim ejus certior, seu eo verisimilior do eventus magis ad certitudinem accedit; quo plura morbi principia cognoscuntur, eo probabilitas ad verisimilitudinem magis accedit, seu eo prognosim est verisimilior.

192. *Periculum* est status in quo sunt casus possibiles quibus malus eventus contingat; sic periculum mortis est in morbo, quo cæteris paribus tot sunt qui fato cedunt, quot convalescunt; hoc vocatur *periculum simplex*. Si casus æque possibiles convalescentia sunt plures quam mortis, *periculum minus*; Si vero pauciores, *maius* dicitur; & in hoc casu morbus *lethalis* pronuntiatur; quia ægrum moriturum est verosimile, in altero vero *incertum*.

193. Quo fundamentum probabilitatis minus est, eo minor est probabilitas, & e contra; probabilitas quæ ex principii notitia deducitur eo minor est, quo minus verosimile est hoc principium in dato morbo concursurum esse.

194. Si quantitas effectus viribus causæ proportionata demonstretur, cognitio philosophica & mathematica omnimodam haurit certitudinem (*Voss. disc. præfat. 27.*) Sic si demonstretur aneurysmatis incrementum proportionate respondere, in dato casu, vi trahi-

væ cordis, seu altitudini ad quam sanguis intra tubum verticalem aortæ insertum potest ascendere, modo non variet ejus arteriæ contractilitas; aut eadem data vi cordis trisiva, ejus aneurymatis incrementum respondere ductilitati arteriæ, ea cognitio mathematica omnimodam certitudinem impertit philosophicæ, atque utilitatem.

195. Inde enim sequetur experimenta ætiologiæ responsura esse, sic experimento sequenti ætiologia potest comprobari. Sumatur vesica fœcula, & humana ejusdem capacitatis, deinde appendis iisdem ponderibus inveniatur utra ex illis dato tempore ductilior sit, seu magis extendi se patiatur: quo facto si utrique aperitur tubus verticalis ad orificium, & aqua ad eandem altitudinem affundatur, docet experientia tumorem singularum fore in ratione ductilitatum, seu inversa contractilitatum; & si deinceps diversa sit aquæ in tubis altitudo, tumoris quantitas cæteris paribus erit ut aquæ prementis altitudo; sed advertendum est temporis adhiberi rationem habendam esse, quia quæ vesica diutius distenditur, ea paulo ductilior evadit, atque successu temporis magis intumescit.

196. *Effectus simplex* is est in quo unica mutatio consideratur, ut in tumore generico: *compositus* in quo plures, ut in tumore rubro, dolo-rico, pulsatili, duro, &c.

197. Causa phaenomeni simplicis debet seorsum considerari antequam ad causam phaenomenorum concurrentium simul deveniamus, sine qua cautela plures errores in Medicina admittuntur; ideoque tumor pulsat, quia per intervalla sensibilia pressio lateralis superat contractilitatem vasæ aut partis tumidæ: ideo rubet, quia radios rubros reflectit pars, maximum vero cæterorum partem absorbet, demonstrante *Newtono*; & ideo rubri radii plures reflectuntur, quia sanguis ejusdem coloris majorem hujus superficiem tingit, tum quia lymphatica vasa plura subivit, tum quia sanguiferæ dissensibiliora simul & latiora sunt, nec obstat membranarum pelluciditas: ideo dolet, quia fibræ nervæ parietibus vasorum diductorum intertexæ distrahuntur: ideo tumor durus est, quia vis sanguinis retropellens resistit ne pressione digiti tumor in minus volumen redigatur; adeoque suam figuram mutat, - quod, ut deprimi possit, necessarium est.

198. Jam vero cum tumor his symptomatibus prædictis dicatur tumor inflammatorius, cum simul calore intenso sitatur, atque cum omnia symptomata intelligantur ex excessu pressionis lateralis alteræ, absolute adauctæ, supra vasorum contractilitatem, illum excessum esse tumorem inflammatorii causam consequitur.

199. Cum autem non idem ex uno intelligat unus ac alter, prout ille accuratam vel nullam obtinet Philosophicæ noticiam, quod est dati morbi causa respectu unius, non ea est respectu alterius, nec dati morbi causa absolute datur - nisi quæ talis demonstratur; quo pacto demon-

stratur causa allata tumoris inflammatorii, vide fulius in *Hæmaphysique de l'inflammation*.

200. Corpus omne perseverat in statu suo, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum suum mutare ex lege prima universi (*Newton. Leg. 1.*) cujus legis nulla alia est ratio præter Dei voluntatem, adeoque illa perseverantia inter effectus naturales non est reponenda.

201. Mutatio motus est proportionalis vi motrici impressæ, & sic secundum lineam rectam quæ vis illa imprimitur (*Newton. leg. 1. ibid.*) Vulnus est partium solidarum animalis prius continuarum separatum mechanicè facta; sit autem mechanicè cum vires ipsam vulnus infligentes agunt ratione molis, figuræ, velocitatis & situs quæ in sensus incurere possunt.

202. Partes continuæ ideo cohærent, quia per plurimas superficies se tangunt; & vis illa cohæsionis mensuratur ex pondere, quod ad illas dissociandas requiritur; vis autem cohæsionis a minima remotione evanescit, quia decrevit in distantiarum ratione duplicata. Vis quæ fibræ & membranz nituntur in sui decurtationem, seu contractilitas elastica, est in æquilibrio cum vi cohæsionis usque dum contactus illi minuuntur; facta solutione continui, contractilitas illico labia vulneris separat, & in circulearem flexuram ducit, ita ut infixo intra cutem gladio, hiatus vulneris multo major sit gladii crassitie. Sanguis vehementer distendens venam, vel arteriam nititur ad fibrarum ejus separationem; & aliquando fit ut sic vasa ut aneurysmata crepent seu vulnorentur.

203. Causa vulneris est vis fibras continuas ab invicem dimovens, major eadem tenacitate, seu cohæsione (158.) adeoque cum vis illa dimovens nunc intra, nunc extra corpus sit, ut vidimus, & ea resultat ex vi applicata, ut vi gladii, impetu cruoris, &c. & ex infinita partium, seu contractilitatis; quo major est vis instrumenti simul & contractilitas, sub eadem tenacitate, eo majus vulnus; & sub eadem instrumenti & contractilitatis vi, quo minor est partis cohæsio nativa, eo vulnus majus: hinc sequitur etiam vulnus feri posse sponte sine audito nisu sanguinis & sine ictu externo, modo contractilitas augeatur in majori ratione quam cohæsio, ut cum frigore rhadages huius: & si contractilitas simul cum ictus energia atque minima cohæsione concurrat, vulnus est in eorum singulorum ratione composita: sequitur etiam impossibile esse vulnus, quamdiu cohæsio partium fortior erit viribus tum impressis, tum insitis ad partes separandas; unde leviter distrahæ partes non vulnorentur; atque sequitur vulnus sanatum iri quoties vel sponte vel arte accedunt ita labia vulneris, & agerentia vasculorum omnia interiticiola accurate replentur, ut amissus refarciatur contactus, sique nativa redeat cohæsio atque tenacitas: saluum est itaque posita causa vulneris vulnus non poni, nec ablata tolli, nisi pro causa vulneris.

neris instrumentum, adeoque principium proponatur.

204. Non minor debet esse cautela in Medico ut causam morbi a non causa distinguat, quam in Iudice ne criminis testem pro auctore habeat, cum de vita humana in utroque casu agatur; nec potest hæc distinctio institui, nisi accurata causæ & principii acquiratur notitia, quæ sine distincta & constanti definitione comparari non potest. Veram causæ ideam non habent illi qui exemplo vulneris utuntur, ut prohibent sublata causa effectum non tolli, quia nunc instrumentum cum causa, nunc vulnus cum hiato laborum vulneris perseverante confundunt; hiatus vero perseverat ex lege prima *Nervorum*, & producit ob virium excessum ex lege secunda, nec instrumentum ad vulnus sufficit, cum illud ex se sit iuers & non agat nisi per vires ipsi impressas, nec vulnus inligat, nisi vis separans sit superior partium tenacitate.

205. *Concursus*, Græcis *Syndrome*, symptomatum invicem connexorum *morbus* est; sic definitur morbus a Veteribus, teste *Clerico* (*Histoire de la Médecine*, pag. 346.) *conkursus* vero est symptomatum constanter sibi coexistentium vel succedentium series; ea vero definitio est ceteris anteposenda quæ notas ad definitum cognoscendum & ab aliis distinguendum suppediat; verum quoniam symptomata eorumque concursus in sensus incurrunt, partium vero internatum dispositio sensus latet, melior est definitio a symptomatis quam a partium interna dispositione; præterea ea definitio est antiquissima, nisi Hippocraticam excipiamus, quæ erat *quæcumque molestia in corpore constans & notabilis*; atque usui loquendi Practicorum conformis: omnes enim morbi sigillatim, ut apoplexia, pleuritis, syncope, dysenteria, &c. vulgo per symptomata sua definiuntur, atque adeo morbus in genere per symptomata debet definiri.

206. Nullus est tam simplex morbus, cuius symptomata plura non sint; licet enim in definitione unum aut alterum tantum symptoma recensere sufficiat, non minus verum est ea simul esse plurima, quod cataractæ vel *amauroses* exemplo patebit: cæcus enim non solum visu orbatur, ut ex eius relato cognoscitur, sed etiam vel labe est in oculis conspiciua, ut glaucoma, cataracta, vel pupilla laborat mydriasi & immobilitate, ut in gutta serena, simulque cæci procedendo manus ad antecessum porrigunt, ne in obvia corpora capite impingant, & in media luce Cælum versus oculos dirigunt, ita ut assueti cæci in cæco, gestu, situ, aliisque noxis plurimis cæcos dignoscant. *Cæcia* simplex videtur morbus cuius dolor est symptoma constans, verum & agrypnia, & faciei distortio, & corporis contractio, & decubitus, & dyspnœa, & conspitiatio, & dysuria, & horborygmi, &c. vel alia symptomata doctorem concomitantur.

207. Quoniam nihil est sine ratione sufficienti, datur ratio cur certa symptomata simul concurrant seu coexistent, aut sibi mutuo succedant, adeoque connectantur; illa vero ratio est ipsamet connexio organorum quæ in morbis afficiuntur, materiei morbosæ quæ plures partes simul infestat, facultatum seu earum potentiarum quæ ad materiam illam corrigendam aut eliminandam sibi mutuo auxilium præbent; datur itaque connexio eadem quæ est inter principia & eventus, causam & effectum. Causa morbi itaque est illud ex quo intelligitur actualis symptomatum connexorum concursus; verum symptomata sunt mutationes sensibiles in functionibus vel in qualitatibus, & mutationes omnes debentur facultatibus tum corporis, tum animæ (152.) adeoque viribus tum corporeis, tum animatis, de quibus agendum est, utpote morborum omnium principia, antequam ulterius procedamus.

#### De Viribus animatis.

208. *Vis* dicitur quod in se continet rationem sufficientem adualitatis actionis (*Ontolog.* 722.) adeoque est causa, cuius effectus *actio* dicitur; ubi datur vis, ibi datur facultas, quia nulla actio sine agendi potentia seu facultate; aut ubi datur facultas, non semper datur actio, quia a potentia ad actum non valet consequentia (152.) Facultates hominis aliæ sunt ipsi & animalibus aliis propriæ, aliæ vero vegetabilibus communes (154.) actiones quæ nunquam in plantis observantur, & in hominibus sunt, sunt animalibus propriæ. In nulla planta observatur cognitio, appetitus, nec proinde sensus nec voluntas, ut culque notum est, verum & nullus motus muscularis, cum musculis careant plantæ, seu fasciculis fibrarum quæ decurtatæ partes appendas transierant; motus enim mimosæ muscularis esse nullus demonstrat; nullum proinde cordis motum huius adscribere licet, cum cor sit musculus, & ipsi nullus sit musculus, nullum proinde cor, nulla vasorum pulsatio, nulla, teste *Hales*, circulatio, nulla qualis in quadrupedibus respiratio; verum hæc omnes functiones homini competunt, & eas vegetabilium functionibus opponere licet.

209. Perperam a Neotericis facultates a foro Medico ablegantur, quasi vero materia subtilis earum vices sola suppleret, vel ablegantur ex eo quod tamen essentia nobis sit ignota; verum ea ratione nomen gravitatis, elasticitatis, quarum essentia nos latet, ablegendum esset, vel ex eo quod metus est ne pro rebus mera nomina tradantur; verum vocabula etiam ficta ut *x*, *y*, & quantitates ignotas in suis computis ita feliciter adhibent sapientissimi Mathematici, ut horum ministerio veritates aliis Philosophis inaccessas inveniant; sic Mechanici potentias animatas, quarum essentiam non curant, ut operarios, bruta, in praxi adhibent, & in theo-

theoria recensent, quarum vites & effectus experientia sola cognoscunt.

210. Nos pari jure facultates homini proprias sola experientia cognitae indagabimus, tanquam causas effectuum & principia multarum functionum, easque instar Mechanicorum considerabimus, quin iudicium nostrum de modo, quo anima agat in corpus, Cartesiana, Leibnitiana & Aristotelica opinionibus interponamus. Sufficit ut nobis quotidiana constet experientia ab anima tanquam principio pendere intellectum, appetitum, motum muscularem, motum cordis & respirationem, cum illi motus praesente anima dentur, absente seu non agente evanescent, & diversimode ea mutata vel affecta mutantur; quae certe ratio Mathematicorum Principem *Alphenjū Borellum* impulit ad credendum animam esse principium vitae, (*de met. animal. pag. 1.*) quod fides & SS. Patrum unanimis consensus confirmat, (*Pugeti Catech. Mens. p. I. S. 1. ob. 2.*) nec desunt quotquot scire, si Cartesiano paucos excipias, Philosophi, quotquot a *Galeno* ad nos extiterint Medici, maxime vero *Rivarini*, *Dulaurentini*, *Baglivii*, *Laucisii*, & inter Neotericos Mathematicos *Cheyneus*, *Porterfield*, &c.

211. Tres sunt praecipuae animae facultates, cognoscit enim, appetit & movet, quod omnibus vegetabilibus & fossilibus est denegatum.

212. Facultas cognoscendi duplicis est ordinis; inferior brutis communis, superior seu intellectus homini proprius.

213. Inferior continet sensum, imaginationem, memoriam, reminiscenciam.

214. Superior illuminationem, attentionem, reflectionem, abstractionem, ingenium & rationem, de quibus in morbis vesanis agemus.

215. Facultas appetendi duplex est, superior homini propria, & inferior brutis hominique communis.

216. Superior est inclinatio animae ad objectum pro ratione boni in eo confusa percepti, seu intellecti, & *Voluntaria* dicitur; vel reclinatio animae ab objecto pro ratione mali in eo confusa percepti, id est intellecti, & *Noluntaria* *Vulso* dicitur.

217. Inferior est inclinatio animae ad objectum pro ratione boni in eo confusa, id est per sensationem solum percepti, & ea *Cupido*, vel appetitus sensitivus vocatur. Vel reclinatio animae ab objecto pro ratione mali in eo confusa percepti, & *Aversio* nuncupatur (*Psychol. Empyr. § 11.*)

218. Rursus *Cupido* & *Aversio* sunt vel debiles, vel vehementes; ultimae vocantur *animi pathemata*; quae in cupidine consistunt, iucundae, quae in aversione ingratae sunt.

219. Facultas movendi vel locomotiva duplex est; alia *Libertas* quae cum voluntate aut cum voluntate determinatur ad agendum; alia *Natura* quae cum cupidine aut aversione motus exsequitur.

220. Motus a libertate pendens est vel voluntarius, vel invicis.

221. *Voluntarius* est ille quem malumus exsequi, quam omittere, nec ipsi repugnat naturae, ut ad amicum scribere, amicum alloqui.

222. *Invicis* est motus quem quisque, dum eum mallet omittere (*Vulso. Philol. 1. 601.*) ut invitus est motus quo nefarius feralis pegma consensit, quo natura repugnante brachium amputandum Chirurgo porrigimus.

223. Motus a natura productus vel est spontaneus, vel coactus.

224. *Spontaneus* motus est ille quem cupido determinat voluntate non repugnante, ut cibos iucundos deglutire in esurie.

225. *Coactus* est motus quem appetitus voluntate repugnante, ut conatus ad egerendas foeces in tefimo, scalptus excorians in pruritu; illos motus malleus non apperere.

226. Motus tum liberi tum naturales pendunt a nobis, & sunt *activi*; ceteri vero quos ab impetu corporum recipimus, aut a gravitate, sunt *passivi*. Rursus *activi* dividuntur in *assuetos* & non *assuetos*.

227. *Inassueti* sunt cum difficultate & attentione, ut dum quis choreas agitare discit, vel scribeodi arte informatur.

228. *Assueti* sunt sine reflexione & cum aliquali levamine, sive vigilem, sive eriam dormiamus. Sic mulier incogitante verba debaeratur, ebriosus propositi omnis immemor vinum deglutit, scabiosus dormiendo se scalpit.

229. Motus iterum ratione motivi sunt *indifferentes*, seu arbitrarii, vel *necessarii* necessitate morali.

230. *Indifferentes* sunt illi quos utrum omittamus vel exsequamur non multum interest, ut ambulare a dextris, sinistris, vel quiescere.

231. *Necessarii* vero quos animi pathema determinat, vel consuetudo dicitur, verbi gratia, timidi ex bombardae explosione contremiscunt necessario; iracundi ex injuria accepta fremunt, nec cohibere se possunt; nauseosi ingrata medicamina expuunt; ob assuetudinem garruli loquacitate vix possunt abstinere; pueruli irrequieti vix in loco se continere valent.

232. Motus iterum alii sunt *conspicui* seu *externi*, alii *latentes interni*.

*Conspicui*, ut manuum, crurum, vix sunt nobis inscisi & invitati, quoad viget mentis libertas.

*Interni* & non *conspicui* saepius nobis inscisi, ut respiratio, deglutitio salivae, pupillae contractio ad lucem, oculi distractio ad objecta; imo invitati, ut motus cordis, stomachi, &c. perficiuntur.

233. Ex his sequitur motus simul dudum assuetos, summe necessarios & internos esse vel coactos, vel a voluntate, reflexione, vigilia independentes, & nobis inscisi atque invitiis perfici.

234. *Libertas* est facultas agendi consequenter ad voluntatem & noluntatem, seu quae determinatur ab ideis boni vel mali distinctis, & per intellectum perceptis: agit anima cum ideis retinet, abicit, revocat, comparat, & cum motum

tum organis imprimi, ideoque alia est libertas movendi, alia cogitandi.

235. *Natura* est facultas agendi consequenter ad cupidinem & averfationem non rationales sed fenfitivas, feu quæ determinatur ab ideis boni vel mali confufis, quales per organa fenfuum obtinentur; aliis inftitutus, cæcus impetus, vocatur.

236. *Naturæ* nomen fumimus in fignificatu apud Medicos receptiffimo (98.) atque abijicimus alios fignificatus, quales funt *effentia*, ut cum agunt de natura auri; *femideitatis* Ethnicorum, ut cum ajunt naturam huic mûdo præfere; *qualitatis* & *indolis*, ut cum tractant de natura fanguinis, puris; *universi*, ut cum dicitur in rerum natura; *ortus* & *nativitatis*, ut cum dicunt quiddam a natura inftitum efle *fanitatis*, ut cum pronuntiant quiddam efle naturale, aut juxta naturam: vide *Boyleum de natura ipfa*.

237. *Natura* est facultas agendi consequenter ad cupidinem aut averfationem; verum nulla alia poteft efle ratio cur illa facultas cupidinem aut averfationem consequatur, nifi quia cupido feu animæ inclinatio ad bonum confufe perceptum incassum a Deo nobis inftita foret, nifi fimul præfto effet facultas objeftum bonum aflectura, vel malum ex fe repulfura; atque vana foret illa facultas bonum abripiendi, malum fugandi, nifi effet aliquis hujus cognitio, atque diftinctio, feu cupido & averfatio; cum itaque illa facultas cum cupidine connexio fumme Dei fapientie & providentie quadret apprimè, illius rationem non attigiffe verofimilimum eft.

238. Cum nobis infra fit ineluçabilis ad bonum propenfio, & a malo reclinatio, quatenus tale nobis appareat, motus ad bona feftanda & mala fuganda funt ineluçabiles, feu neceffarii, faltem neceffitate morali, quin libertas tollatur; fic etiam quis libertate fe laqueo fufpendendi polleat, nullus tamen mentis compos id præftat, adeoque motus qui ad noftre vitæ & felicitatis tutelam utiles funt, coacti & neceffarii videntur, licet nulla eos determinet mechanica, fed tantum moralis neceffitas. Unde natura definitur a *Galeno* facultas produçens motus in corpore humano neceffarios; & alibi fic ait: „Per nomen naturæ vim quamdam intel-  
ligere convenit in his ipsis corporibus, quæ ab ea reguntur, inhabitantem, cujus effentia quænam fit quærere, & de nofta anima, aut ejus principatu, minime neceffe eft.... in-  
rudita natura, quæ opus fuperefficit, ut ni-  
tare, cufpire, fingultire, fcalpere, pandicu-  
lari;... artus pro lubitu movemus, fed ne-  
que quis mufculus ille fit, nec quo pacto  
agere poffit moventi animali cognitum eft;  
cum nonnullos mufculos, ut popliteum, qui-  
dam Anatomici periciffimi ante non ignora-  
verint, nihilominus tamen omnes homines  
ipfius genu articulum fimul atque voluerint  
indefcunt“. *Galeni, in VII. Epidem.*

239. „Nonnulli quidem unam efle animæ naturæque fubftantiam arbitrantur, aliqui in fpiritu, aliqui in corporis proprietate eam confiliter flatuantes. At utrum corporea an incorporea vis a noftro conditore cærebro in-  
dita fuerit, & morientibus animalibus rece-  
dat, nullam hac de re firmam rationem ha-  
beo:“ Sic fentit *Gal. lib. 3. 303.* Hinc patet du-  
dum apud Medicos cognitum fuiffe potentiam morricem, quæ fanitatis regimen obtinere vi-  
deatur, quæque hoc nomine naturæ fuit fem-  
per a Medicis infigita, & definiebatur „vis  
corporibus inftita per quam ea reguntur, &  
facultas quæ animalia, five voluntatis nutu,  
five citra hunc, regit. *Gal. l. 2. de fymptom.*  
caufis. Hinc eam Hippocrates fanitatis tutri-  
cem & morborum medicatricem appellat. „Omnes omnino Medici, *Asclepiades* & *Carthe-  
fianis* exceptis, idem fere ad hanc ufque diem  
cenfuerunt; atque huic effato Hippocratico,  
tanquam fundamento, optimam medicinæ præ-  
xim fuperafdi ruendam efle contendunt *Sydenhamus*,  
*Stahlinus*, & paucis mutatis *Boberhaavus*  
ac *Hoffmannus*: vide *Sydenham, in præfat. Bo-  
berhaave in Oratiône, de honore Medici, fervi-  
tute; & Hoffmann, dif. de natura fanitatis tutri-  
trices, & morborum medicatrice*.

240. Etiamfi parum ad medicinam fpectet utrum in anima, utrum in corpore refideant facultates motrices, veritatis tamen gratia, lubet eorum refellere fententiam, qui naturam corpoream tantum admittunt, & animæ facultatibus non annuerant. Hanc autem opinionem dudum propofuerat *Asclepiades* vixenti fcilicet adhuc fæculis; „qui, teffe *Galeno*, in eo  
omnibus refragatur, non modo Medicis, ve-  
rum etiam reliquis hominibus, quod naturam  
in morbis quiddam moliri negat; „ille nec  
naturæ, nec animæ propriam ullam fubftan-  
tiam facultatemve arbitrat, fed has atomorum  
quodam congressu fieri, juxta hunc nullam per-  
ceptio animæ inftita eft, fed & ex fenfu &  
per fenfum, omnia quæ in nobis fieri viden-  
tur, facta funt, immo nullam efle in anima quæ  
ratiocinatur facultatem afficit. Prudentia, con-  
tinentia aliæque virtutes, juxta *Asclepiades*,  
meræ nugæ funt, nec Diis ulla noftri cura  
eft; omnia præterea fieri neceffitate, & non  
folum prodeffe naturam, verum etiam nocere  
contendit, teffe *Calio Aureliano* de phrenifide,  
& *Galeno de naturalib. facultatib. l. 3.*

241. Hanc fædam a veteribus irrefram, teffe  
*Galeno*, Theologia & Psychologia principis om-  
nino adverfam, theoriæ Hippocraticæ oppo-  
fitam, dudum exoletam, quidam in medium pro-  
tulere Neoterici, animæ quidem fuam immate-  
rialitatem concedentes, verum eam omnibus fuis  
facultatibus, una excepta, fpoliantes; quafi vero  
facultas motrix fit minus effentialis animæ, quam  
cognitio, quæ tamen pacate dormientibus deefle  
videtur, teffe *Læbio*; ut fcilicet *Democritus* di-  
vinum Numen Athenis pelleret, illud ridiculum  
fecit, mundi regimen fpoliavit, æterna per otia  
lærum

factum vivere permittit; ita & *Asclepiades* ejus Sectator impius, ut animam proligaret, eam a ceteris corporibus non differre, nulla facultate motrice gaudere; naturam, quæ ab *Hippocrate* intelligens, sapiens & provida, nostræ machinæ relictæ habebatur, ex animæ facultatibus expungendam docuit; omnia ex materie & ex motu explicare voluit; omnia fieri mechanice necessitate & sine motore, adeoque fato omnia gubernari contendit. Hæc est in summa *Asclepiadea* secta, quæ a *Cartesiana* non multum abluat, excepta impietate. Sed ad objectionum solutionem deveniamus.

242. Ex eo quod motus naturales nobis inscitiis peragantur, non sequitur eos ab anima tanquam potentia motrice non fieri.

243. In homine nihil datur præter corpus & animam; si itaque motus muscularis, ut respiratio, a corporeis viribus nequaquam fieri possit, illum ab anima fieri consequens est. A viribus corporis fieri non potest respiratio, si omnis materia resistat motui, & motus semel acceptus continuo in machinis decreseat propter attritus, & per aliquot minuta æquabilis non possit remanere; verum respirationis motus etiam in dormiente æquabilis est, & paulo major evadit, licet machina pectoris resistat motui, & ratione attritus multum de impressa vi deperdat; adeoque non a viribus corporeis, ut elasticitate, gravitate, impulsionem, perseverat motus respirationis, sed ab anima.

244. Animæ inesse facultatem motricem qui libet ad se ipsum attendens percipit, cum ex propria nostra observatione ideam potentæ motricis acquiramus, ex observatione vero corporum ideam inertie primam derivemus; ita enim essentialis est corpori illa inertia seu inactivitas, ut quo magis est corpus sive extensum & densum, eo magis resistat motui, & quo machina magis est composita, eo majoribus motoris viribus indiget ut moveatur.

245. Saltem motus plures fieri consequenter ad voluntatem, eosque ab animæ potentia motrice fieri nemo hodie inficiatur: ergo motus hominis, qui a machina fieri nequeunt, eos ab anima fieri necessum est: in homine aquis immerso & recens mortuo, vel metu phlebotomie defuncto, saltem in instanti quod vitam terminat, idem est mechanismus, eadem aeris, aut fluidi ambientis pressio, eadem in machina elasticitas, imo forte major, ut ex rigiditate artuum liquet, eadem fluida adjunct, sola deficit animæ actio, adeoque motus naturales, ut respiratio, nequaquam debentur principio corporeo, vel machinæ dispositioni, sed animæ, quæ juxta Scripturam Sacram est vivens & motabilis, seu principium vite & motus.

246. Motus qui sunt nobis dormientibus, nobis inscitiis sæpe peraguntur, ut membra transferre, loqui; imo, ut ait *Galenus* *de motu musculi lib. 2.*, neque palpebrarum motus semper advertis, neque cum concionem habes, aut oras, aut disputas, adhibes mentem omnium partium motibus, neque cum Athenas adis, ex Pyraeo, omnibus particularibus curam actionibus; nam cogitandi sæpius imprudenter peregerunt iter, aut etiam præterierunt locum ad quem principio proficiscebantur: utrum igitur ambulatio, neque animæ actio est, neque motu voluntario fit? Aequè enim nos & ambulatio præsens videtur late, & quæ in somnis accidit, motus quidem partium quæ moventur, actio autem tonica earum quæ non moventur.

247. Nec regerant hoc discrimen esse quod motus voluntarios, etiam si adu dum sunt, non attendamus; attamen eos, cum facti sunt, ab anima pendisse recordemur; verum regerit *Galenus*, multos homines etiam voluntario actiones quasdam egisse, quarum paulo post penitus sunt oblitii, ut qui per metum, aut ebrietatem, aut aliquid aliud generis ejuldem egerint, nihil amplius eorum, quæ egerint, recordantur, ea ratione quod non intenti actionibus tota mente fuerint, & ob hanc causam in ira, curis, ebrietate, timore, phrenitide, & omnino in vehementibus pathematibus, nullis eorum quæ egerint in posterum amplius meminerint.

248. Perceptiones obscuræ, quales sunt in somno, quamquam stabiles sunt; nihil igitur mirum, si motu voluntario respirationem in somnis agente, postquam expergefacti fuerimus, non possimus dicere an secundum voluntatem respiraverimus; sed simile profecto accidit, quod illi, qui & pedes & manus in somnis moverit, & aliquid sit locutus; postea illorum oblitus dicat & membrorum motum & vocem fieri absque voluntate; qui mente errant seu delirant, loquuntur & vadunt, & omnes motus voluntarios obeunt; sed ne hi quidem, cum ad ingenium redierint, amplius meminerint quid egerint. *Galen. ibid.*

249. Quod autem totum opus respirationis vis voluntate & sponte ab anima fiat, declaravit servus barbarus; qui cum vehementer ita concitatus mortem sibi consciscere decrevisset, prostratus humi, respirationeque cohibita, longo quidem tempore immobilis erat, postea vero paululum volutus; hoc pacto mortuus est. *Id. ibid.*

250. Eorum operum, quæ motu voluntario sunt, alia libera sunt, alia vero affectibus corporis serviunt. Priora perpetuo absque impedimento a nobis sunt, ut ire ad al-

quem,

\* In homine sordo & muto actiones ab ejus libertate fieri non dubitamus, licet & eas voluntariae & eas cunctis æquarumque. Graus irritare conligi, sufficit ut videremus ejus actiones circumstantiis morosis respondere (circumstantias morales opponi, impressionibus physicis ad has actiones in machina humana mechanice celandas sufficiens), unde concludere possumus cum *Boetio* solum rebus, quæ anima advertit se scire, (se movere) non esse necessarium ad hoc ut quies (vel motus) *l. 2. de mot. animal. propof. 80.* Naturæ enim agit independentes, non voluntate & concitatus agentis ut independentes a voluntate & conscientia affectus adstantis (249.)



quem, alloqui, quidpiam capere & accipere: posteriora vero non perpetuo, sed in tempore quodam & cum mensura, sic egerere & mingere corporis affectuum sunt remedia; atque aliqui tacuerunt quidem annum integrum & eo amplius sponte sua, egestionem vero vel urinam retinere, non modo annis, sed ne mensibus quidem, quin immo nec diebus paucis uero potuit: adeo enim urgent & saepe argunt, ut quidam in locum consuetum abire non valuerint: simile est respirationis opus, etenim periculum est ne quis moriatur, nisi respiraverit, atque extreme molestum est suffocari: ne igitur quipiam ex eo quod respirationem cohibere non possumus, idcirco minime voluntariam esse respirationem exillimet. *Galeni, ibid.*

252. Hinc etiam sequitur motus humanæ machine animæ esse adscribendos tanquam potentie motrici, licet a voluntate non pendeant, seu nobis involti peragantur.

Qui gravi perituri laborant, illi cupidinis seu appetitus sensitivi ductu se ad usque cruentationem & dolorem scalpunt, licet non scalpere voluntas decreverit. Lippi phorophthalmia affecti etiam involuntarie oculos fricant: ira perciti involuntarie diversos motus suæ iræ indices institunt: meticulosi tremunt, lugent, suspirant, cum suum metum celare vellent maxime; quis autem hos motus ab animæ facultate, id est, cupidine, vel aversione fieri negaverit?

Illos motus ab anima fieri iudicamus quos boni vel mali perceptio determinat, quique huic perceptioni & huius motivi intensitati respondent, ita ut hac perceptione cessante cessent, crescente crescant, mutata mutantur: illud enim est alterius effectus, cui proportionem respondet, & ex quo huius effectus productio potest intelligi (157. 170.) verum tremor a periculo imminente seu a perceptione mali etiam moralis proximi determinatur, corpus autem ab illo malo nequaquam afficitur; quis enim sanæ mentis crediderit corpus magis affici mechanice a visu sententiae lethiferæ, quam a visu diplomatis venialis? & prout periculum gravius est vel levius, symptomata metus sunt graviora aut leviora, ceteris paribus, atque periculo cessante cessant, &c. & si venia reotrementi nunciatur, tunc liber a majori metu, minoribus malis attendere apus est, adeoque mutata perceptione mutantur motus & phenomena: præterea cur anima extremo periculo percita hisce motibus hostium & adstantium commiserationem sibi conciliare debeat & possit, quique potest intelligi; cum phenomena pathematum a summo Numine instituta videantur, ut humana societas caritatis sune colligetur; unde fit ut gentes etiam, quæ loquelam articulatam aliarum non capiunt, vocem

pathematum, ut fletus & risus, intelligant: ergo quos nulla corporis mechanica impulsio, illos animæ affectio determinat motus etiam invitos, & illi ex psychologiæ principii intelliguntur, adeoque datur in anima facultas a voluntate distincta, quæ horum motuum causa est.

253. Ex his liquet cur homo motus in se ipso moraliter necessarii suppressere non possit, licet ab anima pendeant.

Etenim homo ineluctabili ferme necessitate ad felicitatem, seu constantem voluptatem propendet, & impossibile est ut sibi malum, quæ malum iudicatur, inferat, seu ut se odio prosequatur, docet experientia & conscientia; verum sunt motus in homine moraliter necessarii, ut motus respirationis, motus cordis, iique continui; alii per intervalla & in certis circumstantiis, ut sæcum, urinae egestio, potissimum in dysuria & tenesmo; niſtatio; & capitis reclinatio cum oculis corpus quoddam nociturum admovetur; clamoribus auxilium advocare, cum nos urget hostis insuperabilis malitia; aut fletu, supplice vultu illius commiserationem commovere, cum nullum aliud superest periculum. Ergo licet motus ab anima pendeant, illi non minus sunt moraliter necessarii.

254. Necessitas motus est ipsius utilitati perceptæ, & assuetudinis vehementer proportionalis; quoniam docet experientia sine uoxa nos posse anhelitum cohibere per pauca secunda, modo sequentibus inspirationibus quod deficit magnitudine aut numero pensetur, illum per hæc secunda cohibemus facillime: verum, per minutum unum aut alterum cohibito anhelitu jam lædimur, & imminet summa pectoris anxietas, adeoque anima metu concutitur, & si non sponte nostra sed aliena vi cohibeatur, ut immersione in aquam, vel laqueo collum vinciente, illam violentiam ne per unicum minutum tolerare possumus; atque cum periculum tunc temporis velocissime crescat, vel uno temporis secundo animæ sit strangulatum, dentibus, unguibus, horrendis conatibus usque ad virum exsolutionem relucitur; atque etiam si hisce laboribus vires citius exhauriat, sibi quæ mortem paululum acceleret, non minus in hoc mortis periculo satius est anceps experiri remedium, quam nullum, huicque legi potentia motrix otemperat. Patet itaque eo magis esse impossibile a motu & conatu utili abstinere, quo conatus ille ad vitam utilior aut magis necessarius iudicatur. Neque enim omnes, ait *Galenus de motu musculi*, ad moriendum sunt proclives, etiam infinitis malis consistuntur, & qui eo progrediuntur abire a vita cum summo dolore nolunt.

255. Millies experti sumus ab ortu quod, suppressa per aliquod tempus respiratione, orta lætio & anxietas solveretur dein respirationis magni-

\* Mirum videtur plurimis naturam aliquando nocere, ut exibat *Aristophanes*, cum scilicet in conspectu vires exsolvent & mortem maris, si consensu efflantes fuerint; verum inde hos conatus ab animæ etiam rationali non esse, sine læte deducunt, cum ipsam voluntatem, quam animæ rationalis facultatem non insinuant, ipsaque animæ pathemata, in ipsis negotiis moribilibus, quorum deus distinctus obtinet, sapienter hallucinantur, & ipsæ voluntati sibi nocent: quod sunt qui per motu minori periculi in malis se ferunt precipites!

guitudine vel numero adanctis: videlicet ait *Galenus de dyspnœa, l. 1.*, omnis velox motus propter urgentem fit utilitatem & facultatem ei subervire valentem, hoc est, integram & robustam, si nullum ex organis relucet, possibile est quandoque utilitate multum urgente, etiam si facultas moderate debili sit, motum fieri velociorem; si vero amplius debilitetur, non amplius possibile est fieri velocem, sed densam magis pro veloci fieri actionem; omnis enim densitatis actionum unam exilire causam, diximus, prioris scilicet actionis defectum, cogitur enim illa urgente non amplius cessare; fusius omnia hæc in libro de Pulsibus sunt demonstrata. Sic *Galenus*; atque cum millies experti sumus utilem esse conatum in paribus circumstantiis, utcumque ab illo conatu vires exsolvantur, vi motui præteriti, seu affuetudinis bos motus pariter iteramus: hinc facillè quique percipit quod quo antiquior est consuetudo motus, eo illam intermittere vel illi reludari difficilior est; sic qui propter aliquod levamen olim expertum affueti sunt niando, vel certos gestus exerendo, illi incogitantes & inviti eos exerunt, & eo pertinacius ant majori necessitate, quo longior est consuetudo, ac quo motus ad vitam est magis necessarius. Hinc licet concludere motum cordis, utpote a conceptionis puncto affuetum, difficilissimum fuisse motu respirationis. Unicus homo notus est, scilicet *Ciliarcha Terrenobend*, apud *Cheyneum the English Malady, pag. 307.* qui cordis motum sustinere sibi posset; verum & homines silvestres ex Pondicheri, teste *Homburgio*, & servus barbarus *Galenii*, respirationem sibi suppressere potuerunt.

235. Si vehemens cupido & consuetudo simul concurrant ad motum etiam vitæ non necessarium, sed indifferentem, motus ab illis motivis determinati supprimi quidem, sed cum difficultate proportionali possunt; atque hi motus sine concursu voluntatis & reflexionis peraguntur, sic vino dediti necessitate morali ducti bibunt; gravidæ malacia, puellæ pica laborantes, licet firmiter animo decreverint sal non vorare, gypsum non attingere, vix, si præ manibus id habeant, ablinere possunt, & alio etiam intentæ & non cogitantes vorant; qui tabaci pica laborant, illi licet acri studio immergi pulverem naribus inspirant, pyxidem, quam consulto abiecerint, in consuetis sacculis incogitantes investigant.

236. Si muscoli, quorum motus est summe necessarius, dudum affuetus, & cupidinis dictamini conformis, sensibus nostris ut visui non pateant, horum motus nobis ne iudem attendentibus, invitis etiam, mechanica necessitate fieri videtur, licet ab anima fiat; pupilla in locis obscuris ea proportionem dilaturatur, qua majori radiorum lucidorum copia opus est ad objecta distinguenda, atque cum objecta remotiora cernimus, eam dilatamus, ubi vero objecta vividior luce collustrata, aut proximiora conspiciamus, eam restringimus; simulque palpebræ

superioris motus oculi motum & directionem constanter sequitur, ita ut oculo deorsum flexo deprimat, sursum verso relevetur; atque rotas oculi globus, ipsiusque crystallinæ lentis, prout objecta distantiora aut proximiora cernimus, aptetur huic distantie, ut distinctius clariusque videamus: jam vero potentia motrix, quæ pro diversitate circumstantiarum numerola instrumenta aptat, movet & dirigit in finem utilem, intelligens est, adeoque in nobis anima est; æquum licet ab anima fiant hi motus, nec cognoscuntur illi muscoli, per quos fiunt, nec nervi quibus fluidum nerveum excipiunt, nec ipsi motus cum actu fiunt; tantum persentitur lassitudo, cum diutius iidem peraguntur, ut cum minutis attente perspicimus, aut microscopio utimur; atque nobis in vitis fiunt, ut cum solem aspiciamus; eaque tantum Anatomici quidam & Opici norunt non ita pridem.

237. Contra vero motus digitorum, eorumque cum nostra voluntate connexionem percipimus, quia oculis nostris subjacent, dum interea muscularum unæ bis motibus inferientium nos latet contradictio, quia illi muscoli oculis non subjunguntur: idem dictum esto de musculus laryngis & pharyngis, quorum plurimos nequidem existere, nedum moveri noverant antiqui Anatomici; quis autem dubitat quin apte & concinne pro diversitate tonorum & articulorum vocis, illi dato ordine, & data vi contrahantur, tum anima volente, tum pathematis affecta; adeoque quin motus & liberrimi & merè naturales ab illis exerceantur, qui nobis tamen per vitæ totius curriculum sunt ignoti, ut ignore hæc omnia omnibus fuerunt chordæ vocales *Illust. Ferrenii*.

238. Non mirum itaque si muscoli cordis; quorum motus, nisi casum palpitationis excipias, auditum, visumque prorsus fugit, a primordio vitæ affuetus est, & ad vitam continuo necessarius, nobis nec attendentibus, immo invitis, suas contractiones in somno atque vigilia alternatim exsequantur, licet ita ab anima pendeant ut respirationis ad instar possint accelerari, & a diversis animi pathematis intendi, remitti, retardari, prout vitalis utilitas & necessitas exegerint. Nec obijciat cordis electi & extracti motum aliqualem aliquandiu persistere, adeoque ab anima non pendere; his enim reponit *Divus Augustinus & Alph. Borellus* caudam laceratæ resedam pariter moveri, quam tamen voluntarie moveri norunt omnes; immo plurima hodie cognita sunt insecta ut polypus seu *Hydra Linnæi*, (*Fænna Suec. 1236.*) cujus singularia frustra vivunt, ut vivunt singularia, velut ovari frustra fecundata.

239. Ad hoc ut quedam animæ facultas agat, non necessarium est ut aliæ simul concurrant, in somnambulis fiunt omnia opera voluntaria, ut loquela, catus, saltus, discursus concinnus, absque eo quod somnambulus videat, audiat, ullo sensu, ulla memoria aetorum gaudeat, vide *Hist. Somnambulismi & Cata-*

la-

*Supra.* \* Qui optimo valent intellectu, non omnes memoria, acumine, visu, tactu, olfactu, non constanti voluntate, &c. possent; optime videmus, licet surdi, iudicamus sine visu, &c. sic & motum libertas exercere independentem a natura, & naturam independentem a voluntate; pugnare cupido cum voluntate quoties aliquid volumus quod averfamur, ut cum brachium Chirurgi amputandum porrigitur voluntario; sed non sponte (217. 224.); consentiunt cupido & voluntas cum id volumus quod cupimus, ut cum volumus manducare, & simul esurimus; inviti nefarii patibulus conficiuntur, liberetamen artus ad ascensum movent, non sponte, id est pepes eos est non ascendere motu suo proprio; atque natura repugnat, veruntamen ascendunt nec graviora ferant infortunata: non voluntario scabiosus se scalpit, nec sponte, sed coactus ab anxietate, quam scalpus sedat; nec voluntario puerpera natus edit ad partum necessarios, quos natura cius. Quæ cum ita sint, ut ab ipsis mulierculis cognoscantur, non possunt satis demirari plures Philosophos ita cæcutire, ut præfæcte negare malint, quam cum omnibus non philosophis consentire. „Est autem „in confesso, ait *Galenus de Dyspnæa*, quod nullus „la rictu adeo ineluctabiliter imbutur quam „affectio ad vitiosa dogmata; neque enim ullis „persuasionibus revocari possunt in ipsis con- „nutriti, ut cum demonstrativis methodis non „eruditi sint, nec de vero, aut falso iudicare „sciant; nec sine odio erudiri se patiuntur. „Tales sunt nostri ævo, qui si rationem momenta pacate audire velint, ex eo quod *Galenus, Riverius, Stahlus* plenas animæ, quam par est, tribuerint, ipsi etiam quod iustum est & debitum detrahere conantur, sique cum horum vitia effugiunt, in contraria currunt: novidem plures esse qui motum cordis & respirationis mechanice fieri contendunt; quasi vero motus voluntarius non sit mechanicus, & motus musculorum a *Borello* mechanicis legibus non didum foret explicatas: sed id contendunt quod scilicet fiat a dispositione machinæ, sine ullo motore interno, & per vim aeris ambientis, aut alimentorum, aut demum ab elasticitate vasorum; verum ea qui audacius jactant, ut plurimum prima mechanice elementa ignorant, aut præiudicio erroneo laborant, cum scilicet vires a machinis adaugeri, & mobile perpetuum sine motore dari contendunt, quos hinc refutare non est animus; sufficit enim in arte medica ut sciamus ita connexos esse motus humanæ machinæ cum animæ ipsius motibus, aut affectibus, ut si ab anima reapse dirigerentur hi motus non alio modo prorsus se haberent: causarum primarum essentiam non querimus, sed motuum machinæ quæ mentis affectus relationes inquirimus (30.). & naturæ nomen juxta significatum a Medicis dudum receptum adhibemus. Cæterum multis difficultatibus nostram premit sententiam non ignoramus, verum in his *Sauvages Nosologia Methodica* Tom. I.

adstilulamur *Galenus* qui sic ait, „qui evidenter, tibus fidem abrogat sensus expertus est. „qui vero de dubiis prompte pronunciat temerarius est; qui autem propter obscuritatem quæ in his inest, quæ etiam clara sunt habet suspensam, scepticus est; porro qui non modo suspecta habet, verum etiam quæ clara sunt propter obscuritatem dubiorum studeat avertere, sapiens non est; 4. de motu musculi. 986.

*De Viribus inanimatis.*

260. Omnes motus humanæ machinæ ab anima, tanquam a principio suo, dependere nemo debita attentione præditus unquam crediderit; quia luce meridiana clarius est dari motus huiusce similes in corporibus inanimatis, ut vegetabilibus, fossilibus & animalium cadaveribus, in quibus etiam dantur facultates seu potentia mortuæ his producendis sufficientes, nec datur anima.

261. Facultates illæ sunt gravitas, cohesio, seu attractio, elasticitas: & quæ ex his pendent electricitas, putrefactio, fermentatio, calor, rarefactio, dissolutio, condensatio, &c. præterea aeris ambientis, corporumque irruentium pressioni obnoxius homo est, atque illæ causas sufficient ad functiones animalibus & vegetabilibus communes, ut nutritionem, secretionem, digestionem & generationem, eo discrimine quod illæ in animalibus adjuvantur a motu musculari qui deest in vegetabilibus (208.).

262. „Ferre demonstratum esse puto (ait „*Illustriss. Medicus & Geometra G. Chryse The English Malady*, pag. 90.) dari in quovis animali sive perfecto sive imperfecto principium, ex se ipso agens, ex semetipso movens: motus mechanismus, id est, intrinsicus imperfectus motus, juxta certas leges & proportionem data ad corporum superficiem, vegetationis phenomenon forte potest satisfacere, aut ad animationem, seu animalium, & de minimi quidem infestis vitam, explicandam sufficere, vix unquam crediderim atque hæc est omnium sapientissimorum & in mechanicis verissimorum Geometrarum universalis sententia.

263. „Quantum motus perpetuus in meis machinis fieri possibilis in præsentis rerum statu & juxta cognitæ universi leges in me determinare hæcenus non suspicio. Existimo tamen quod ratione affricus corporum ac eorum tinuæ jacturæ quam motus omnis in tellure nostra patitur, atque ratione impossibilitatis describende unius rectæ per unicum & eundem impulsus; motus ille perennis non minus est impossibilis quam in præsentis arithmetica statim circuli quadratura, vel turdorum quantitas per fractiones integras seu finitas expressio.

264. „Verum quod omne animal perpetuum mobile sit, ob innatum se ipsum movens principium, & internam ipsius potentiam, id ex „tra

\* *Galenus* in pedibus iter aliquæ milliarum concessit, satano tamen sepulchrum.

tra omnem dubitationis aleam esse existimo; atque mechanice, id est, ex sola materia & motu extus impresso, coniectis etiam omnibus numerorum & geometriæ viribus, cuiuslibet animalis viventis functiones explicare, id est, quantum concipio, verba sensus vana esse effutire & ignorantiam suam prodere.

265. Omne corpus resistit motui (*Volf. Cosmolog. 129.*), sed omnis machina est corpus, ergo & motui resistit. Si corpus unum in alterum quiescens incurrit, impetus in conflictu ex percussione amissus est ad impetum, quem ante eum habebat, in ratione massæ corporis quiescentis ad massam utriusque simul (*Cosmolog. 429.*), motus ergo machinæ impressus ab alio corpore partim amittitur; sic si columna sanguinis alteram quiescentem impetat ipsi æqualem, dimidia motus quantitas ex hoc conflictu amittitur. In congressu corporum imperfecte elasticorum vis viva quæ amittituro major est, quo elasticitas magis a perfecta recedit, demonstrat *Gravesande*; imo corpora perfecte elastica de sua motus quantitate amittere demonstrat (*Volf. Cosmolog. 466.*) Cum itaque organa corporis humani fluida sint mollia, & elasticitate sensibilibus destituta, atque firma, ut cerebrum, pulmo, hepar, adest, imperfectissime sine elastica, certum est maximam virium ipsi impressarum partem continuo deperdi.

266. Vegetabilia vasis æque elasticis, ac hominibus prædita, & iisdem aeris ambientis actionibus ac nos exposita, tantum vegetant, secerant, nutriuntur, & generant, atque horum omnium motuum ratio in actione solis, & aeris atmospherici potest haberi; quia vegetationis, secretionis, &c. intensitas est proportionalis viribus expansivis & dissolventibus atque electricis, quas solis calor ipsum succum impertit; unde crescentes calore crescunt, & decrescunt, ut hieme, decrescunt illæ functiones: verum motus muscularis cordis, pectoris, artuum nequaquam respondent actionibus solis, aeris & aliarum virium corporacearum, sed respondent motibus ab anima perceptis, ejus cupidinali, avertationi, voluntati & noluntati, adeoque functiones animales dependent a principio animalibus proprio; vegetabiles vero ab alio animantibus, & vegetantibus communi.

267. Imperium animæ in cor directe ex observatis sequentibus demonstratur. Homo, qui vehementer animo perturbatur, & ex improviso perterritus fuerat, per aliquot horas frigidissimo sudore distulxit, & pulsum modo exilem, modo nullum habebat, deinceps vero sedato animi motu cor & sanguis suos naturales motus gradatim recuperabant, & tales per horam stabant animo prorsus pacato, rursus illi motus evanescabant, & per semihoram veluti moribundus ille videbatur homo.

Alteri valida & voluntaria crurum & brachiorum extensio pulsationes cordis viginti intra minutum solitis addebat, simulque ita erat exiguus pulsus, ut vix distingui posset: in ho-

mine quiescente pulsationes 34. circiter quovis minuto, vel bismille per horam numerabantur; sed cum totis viribus ecurrisset, earum numerus a 34. ad 150. intra minutum, adeoque ad 9000. intra horam assurgebat, fere quintuplo frequentiores erant.

Cum homo moveri incipit, pulsus statim solito minor evadit, dein sensim crescit & per motum incalescit: cachinnus pulsum accelerat 25. pulsationibus in minuto; & cum ille homo voluntario respirabat ter vel quater velocius solito, numerus pulsationum additus in minuto erat 13. vel 14. circiter: Tussis deglutitio, lectio alta voce, pulsum accelerant; ergo motus cordis vel mediate vel immediate ab animæ affectibus & facultatibus mutatur: *hæc Br. Robinson Animal Oeconomy præp. 21. Martinus Lister dum de Coelebris agit, observat illarum corculum identidem & per intervalla inæqualia a motu cessare; dein vero cum animal motum quemdam artuum, ut antennarum, vult exerere, cor illius velut ex ipsius arbitrio strenue moveri; innumeris observatis constat, teste Chryso Engl. Med. pag. 68. motum cordis ab anima, prout diversis pathematis est affecta, vel intendi, vel sufflaminari: vide Nicholij erat, de anima medicæ.*

268. In omni humanæ machinæ mutatione morbifica ita affecti animam autumavit *Divus Syntex*, & pathemate percetti, ut morbum per moleliam, seu animæ ingrattam sensationem designaverit; & quotidiana docet experientia nullum esse morbum, si delirios excipiamus, in quibus anima non moleste afficiatur; non debilitate contristata, ut in febrilibus, evacuatoriis, & paralyticis; tum dolore, ut in inflammatoriis & dolorificis; tum metu perculsa, ut in soporosis & convulsivis; tum mœrore consumpta, ut in cachecticis & chronicis; sed in ipsis deliriosis morbis, ut mania melancholia, hydrophobia, dysis pathematis animam agitari norunt Clinici, adeoque inconcussum manet in omnimorbis aliquod animi pathema comitem individuum adungi.

269. Non solum itaque directe probatur animam, utpote corporis amicam, pravo statum molestè affici, adeoque cum potentia morigie sit prædita, & malum averteretur, huic morbificæ causæ pro viribus reluctari; verum etiam probari potest potentias corporeas, & machinæ dispositionem ad morbosos conatus edendos non sufficere, atque mechanicam morborum, ut aiant, explicationem legibus motus reluctari, quod exemplis sequentibus patebit.

270. Sit tussis in exemplo: eam in subita & sonora expiratione consistere norunt omnes, atque ejus occasionem esse pus, sanguinem in pulmonibus effusum, vel pulverem, aquæ, lactisve guttulum inter ridendum in pedus illapsam, vel tubercula, phlegmonem, aliudque vitium in trachea, vel pulmone enatum: contendunt autem *Asclepiades*, qui mechanicam scissam amplexantur, illud ex eo fieri, quod a-

quæ

quæ ver. gr. guttula premendo nervos tracheæ prout influxum fluidi nervi, mechanica necessitate adactum versus musculos expiratorios, unde horum contradio & tussis.

271. Illa theoria peccat in leges mechanicas; vis etenim guttulæ rimam glottidis partim obturantis nihil aliud est quam illius pondus & adeoque infinite parva respectu vis vivæ totius pectoris ad tussim excitandam necessariæ; moles enim pectoris, imo corporis in tussi sit velociter concutitur, etque pluribus millionibus major pondere guttulæ; jam vero si moles guttulæ per velocitatem suam initialem multiplicetur atque conferatur moli totius machinæ concussæ per suam velocitatem multiplicatæ, immensa certe est disparitas; ergo impossibile est a mole guttulæ hanc succussionem corporis fieri; certissimum siquidem est in mechanica pondus per machinam motum, & in suam velocitatem, ductum, nunquam esse majus mole movente in suam velocitatem ducta, ut quisque mechanices principii imbutus apprimè novit, & ex vestris theoria liquet.

272. In vesicæ aqueæ, ope tubuli exilis aqua pleni, & vesicam ipsi continuam replentem, pondera immensa quidem attolluntur, verum tanto tardius elevatur pondus, quam ipsa aqua intra tubulum fluit, quo transversa vesicæ sectio amplior est tubuli sectione, atque vis viva aquæ in tubulo non minor est vi viva ponderis, dum elevatur, atque hoc ipso exemplo ad casum allatum sponte applicato, sequitur theoriam quam impugnamus esse hydraulicæ contrariam, & prorsus absurdam.

273. Si quis ad vim in aquæ guttula expansivam, & vi pulveris pyris similem confugiat, ut ejus energiam intendat, is non solum ineptum figmentum somniat, verum eo etiam concessio, non minus stant principia mechanica alata; atque fingendum rursus erit toties mirum in modum explodi hunc pulverem pyrium, quoties tussis iteratur, quod per intervalla reuertitur; & hoc sine ratione sufficiente fieret, quod est absurdum.

274. Superest ut illi mechanici confugiant ad mechanices leges non solum hæcenus ignotas, verum cognitæ hæcenus prorsus oppositas; nec desunt qui tales leges quondam inveniri posse præsumunt, ut suis dubiis fidem faciant; verum utqueque leges illæ deestituerint, certum est theoriam eorum circa tussim, alioque motus sympathicos esse principii cognitæ contrariam, adeoque anti-mechanicam; & præterea non arduum foret probare leges mechanicas universales non minus esse necessarias quam Arithmeticæ, & Geometriæ principia: III. Bernoulli, A. A. Petropol. T. I.

275. Si fluidum, condensatione & rarefactione, atque attractione omni seposita, per tubum conicum progrediatur, & eadem trans quamlibet sectionem hujus quantitas eodem tempore prætereat, velocitatem in basi esse tanto minorem velocitatem in apice, quanto ipsius sectio

ab illius sectione superatur; hoc est principium æque certum ac duo bis sumpta esse idem ac quatuor? Idem de aliis generaliter acceptis mechanices principii didum puta, verum quæ necessaria sunt, secus esse non possunt, adeoque ea principia ab aliis quondam everti posse proflus impossibile est.

276. Ut theoria absurditatem ulterius perspicuamus, advertendum est fingi gratis pseudo-mechanices nervos alios voluntati, alios vero mechanismo subditos, & amborum fila intime singulis & minimis partibus intertexta; cum enim videant tussim pro lubitu ab anima excitari, atque etiam tussim nobis inivris procreari, inde colligunt tussim mechanicam, ut ajunt, seu automaticam per organa voluntati subdita fieri nequaquam posse, quod principium dudum confutaverat Galenus (244. 256.); atque fidentia circa necessitatem, & verisimilitudinem multiplicare coguntur; nervos autem nullos esse tantum motui, & nequaquam sensui ministrantes demonstrat sensus ex tenuissima acicula ubi-vis impacta oriundus.

277. Si diversos multiplicesque examinemus respirationis motus, eos tere in infinitum variabiles esse videbimus; nam & tonotum diversorum, quos agris distinguit, numerantur 963. (Savonar Hist. de l'Acad. des Sc.). qui singuli iterum quoad vim variare possunt, & præterea sunt suspiria, gemitus, singultus, stertus, stertuamenta, stertores, oscitationes, risus, cachinni, clamores, cantus simplex & modulatus, & infinita loquelæ seu vocis articulata discrimina, quæ singula sunt diversæ expirationis species, & determinatum organorum motum expostulant; ex illis tussis est unica & determinata expiratio, ita ab aliis distincta, ut nemo tussientem cum ridente, singultiente, cantante, &c. confundat.

278. Nullum est in amplissima vesiculatum pulmonarium superficie & tracheæ ductu punctum, quod a pulvisculo, cruore, pure, &c. effuso, tumore quovis pressam tussis occasionem non præbeat, adeoque nullus est nervus, nulla fibra in his partibus, quæ & tussis & singulis aliis inobis numero motibus non ministret; cum autem illa pia in tracheam aquæ guttula nulla sit ratio cur ea potius premat organa tantum excitatura, quam organa risum, singultum, oscitationem, cantum, stertum, &c. producere apta, si ea omnia mechanicè peragantur, machinæ enim semper & necessario quidquid agere possunt exiequantur; nulla est pariter ex mechanice ratio, cur aquæ guttula inter ridendum inspirata tussim solummodo constanter excitet; imo demonstrari potest ex probabilicatum calculo eam nunquam hisce positis excitandam fore; absurda sunt itaque principia in hoc absurdum deducenda.

279. Si ex pluribus æque possibilibus unum constanter contingat, data certa conditione in machina, cui principium movens & intelligens præesse compertum est, illius casus fieri dele-

Aut a principio illo intelligente necessarium est. Cum enim nihil fiat sine ratione sufficienti, atque in illa machina animata nullus ex his casibus potius determinetur a mechanismo quam alter, cum tamen unus constanter determinetur, is a principio intelligente determinari debet, atque id ita fieri in humana machina probant sequentia.

280. Aquæ scilicet guttula chordis vocalibus adhaerens rimam glottidis sua viscositate partem obturat: sic dimidia pars obstruitur, tunc illis viribus expiratoriis non nisi dimidia consueti aeris pars potest expirari ex legibus mechanici; data enim eadem vi embolum pellente quantitates effluentes sunt ut orificia; verum in illis circumstantiis eadem aeris inspirati quantitas duplo diutius in pulmone remanens & incallescens, duplo minus insufficiens evadit tum refrigerando sanguini, tum auferendæ secum calidæ pulmonum exhalationi; atque immixto sanguinis pulmonaris refrigerio, & ejus halitui suppletto constanter supervenit molestia, & anxietas, quæ sola & iterata, vel ampliori aeris frigidiusculi inspiratione potest sublevari, si sensus vigeat, ut docet cuiusvis experientia, adeoque vires respiratoriæ intenduntur ad iterandam & augendam inspirationem.

281. Quantum intendi debeant vires respiratoriæ, ut duplo major aeris copia dato tempore respiretur, docet hydraulica; vires enim emboli debent crescere quadruplo ut eadem per orificium duplo minus inspiraretur vel expiraretur aeris quantitas (*Hæmorrhagie pag. 372. n. 80.*), atque ut sexdecies major vis impendatur, ut sub illis circumstantiis duplo major aeris copia respiretur (*ibid. n. 92.*) adeoque sexdecuplo major vis impendenda venit, quod potentiam motricem exsolveret, nec efficaciter illi dyspnœæ obviam iret.

282. Verum si semel aut his vires expiratoriæ multum intenduntur ad accelerandam aeris effluxum, tunc adaucto aeris prætereuntis in guttulam aquæ obstruentem impetu, potest vi aeris illa guttula foras extendi, & sic unico vel altero conatu materia morbifica & molestia tolli; natura itaque repetitis tentaminibus olim erudita hunc conatum seu tussim salubrem, licet in certis casibus insufficientem, excitabit cum brevi adeoque mediocri virium dispendio.

283. Hinc sequitur eo vividiore fore conatus, data eadem potentia motrice, quo major fuerit & respirandi necessitas urgens, & hominibus sensibilibus aut meticulositas; si enim illud obstraculum majorem aeris inspirandi quantitatem interceptat, conatus erant promptiores & magis coacti; si minor interceptatur aeris copia, homo poterit pro inibitu tussim differre aut longius intermittere, atque interea urgentibus negotiis defungi, ut docet experientia. Si cæteris paribus homo olim inde molestiam expertus, suffocationem, licet minime impendentem, metuat & nimis sensibilis sit, ut sunt convalescentes, hysteriæ, delicatuli, pusillanimes, illico & vividam & pro potentia magnam tussim excitabit, atque ex levi guttulæ resistens summo metus pathemate, summo angore, in facie & gestu expresso, percellitur.

284. Hinc etiam sequitur quod si guttula aquæ ita sit posita, ut minorem aeris quantitatem interceptat, aut æger ob minorem sanguinis fervorem non tanto sanguinis refrigerio indigeat, simulque magnanimitas sit & tranquillitas, vel somnulentus, vel debita papaveracei hypnotici dosi sedatus, tunc eadem data vi guttulæ nervos prementis, vel rara, vel nulla tussis exoritur. Sic phthisicis & catarrhis noctes paccatas syrupus de papavere conciliare solet, non materiam morbosam vim minuendo, sed principii senescentis molestiam tollendo. Sic a gravi nuncio, vel negotio superveniente tussis, singultus quotidie cessant, eodem mechanismo superlites, ex eo solum quod inajor molestia minor obscuratur, & quod principium intelligens urgentiori necessitati debeat occurrere.

285. Confusa perceptio mali pariens molestiam, consensus Latinis vel compassio, Græcis *sympathia* dicitur; ideo autem anima molestatur sive compatitur affectibus corporis, quia huic machinæ ira sociata est, ut ab ejus bono statu lægeretur, a pravo vero ingrata afficiatur; & sic ejus voluptas, adeoque hujus vitæ felicitas ex corporis integritate, robore, formam dependeat.

286. Cum autem in anima sint facultates motrices, ea non in casum eas sentit molestias a causis morbosis, sed ipsas movendis aliquatenus par est, maxime certe & commodissime si sint externæ, sic spinam digito infixam dentibus; unguitibus, instrumentis avellimus; incommode vero, si sint internæ, quia non ira præsto sunt musculi & organa cætera motus, nec via exitus facile patet. Si si fuerit venenum in ventriculo, vix quidquam manus præstant, nisi premendo epigastrium, sola vis muscularis ventriculi foras non vel cito materiam morbosam potest amandare; verumtamen alia insperant auxilia; tunc enim uber salivæ & liquidi gastrici proventus, ubet potus, quem sitis impetrat, materiam demulcet, vel huic vehiculum inspicat, unde vomitum juvatur, simulque potentia respiratoria; musculi abdominales adjuvant; imo musculi, qui truncum inclinant, ad hoc ut facilius ex stomacho venenum cum suo vehiculo possit eliminari, nobis volentibus, vel invititis concurrunt.

287. *Urges* itaque *sympathia*, quæ apud plures sunt verba insaniam, sunt propositiones rationi conformes juxta quas potentie motrices, ut libertas & natura, suas operationes in æconomia animali constanter exsequuntur. *Leges* illas quotidiana promulgat observatio.

288. *Lex prima.* Natura & libertas in hominibus longevitatem pro machinæ statu & suis viribus conspiciat.

289. *Lex secunda:* Libertas externæ & intellectus perceptas noxas tum phycas, tum morales amovet.

amoveat, ingens natura prospiciat; naturae sunt morborum medicatrices: Hippocr. Epid. 7.

290. *Lex tertia.* Urgentiori periculo occurrendum est, adeoque prout nobilissimum organum afficitur, & noxa graviore est, conatus quidam intenduntur, neglectis ceteris, aut major virium quantitas absumatur, aeterea potius expectando tamen quam nullum.

291. *Lex quarta.* Ista organa ad operationem concurrunt, quae finiobtinendo magis apta sunt, & in gravi ac urgenti periculo labor sit continuus, in minor urgente detur intermissio laboris, vel remissio ad vires recuperandas necessaria.

292. Harum legum exempla aliquot attulimus (235. 236. etc.) & fundamēta, plura in sequentibus prolatori; modo bina ab *Illust. Boerhaave* mutua liceat. „Vix aliquid nam tum in vivente, aut extrinsecus in illud susceptum, furtim licet, ipsa statim fabricae conditio, salvi nescia, motus excitat, ad expellendum; quod mora noceret; ad mitigandum; ad aspera; resolvenda; assilla; ad dissoluta nimis cogenda. O, quae molimina vomitus, aliaque expulsiōis impetū alvi videret; cutis vias! quae excitationes, attractionesque, humorum ad sedem mali, ut dicitur, aliuat, detegat, leniat, proturbet, noxiam! Quae febrium impetus expellant, enervent, intendant, maturent, assument materiem periculam mali; vel ut secerentur sincero quod corrigi nescias, denique, ut, novis turbata, deorsum ferendis natura assuescat. Febrim laudamus Medici instrumentum felicissimum, quo natura perficit mille morborum acutorum, & diuturnorum, aliter incurabilium, sanationem perfectissimam, &c. Guttula acetii oculi membranam externam attingat; certe tenellam laderet; sed, fidelis custodia, limia servans, dolor vi convellit orbiculae rem palpebrarum masculum. Ille bulbus oculi ad glandulam lachrymiferam apprimat; exprimat laticem, cuius leni copia acetii acre temperat, & infusum tuto ejicit; haec & plura

*Boerhaave Orat. de honore Medici, servitute.*  
293. Qui mechanicam ignorant, illi facile in animam inducunt suum ut credant a machinis vel exigua potentia maximos effectus praestare posse, atque cum vires mortuas ac vivas non distinguant, ex eo quod summa pondera ope machinae per exiguam vim sustineantur, effectus viribus impetibus seu causis multo majores existimant. Non desunt qui puteat machinam excogitari posse, cuius ope minimolabore maxima, v.g. aquae quantitas ad quamcumque altitudinem (adeoque quantacumque velocitate elevari possit, & animum excruciant summi in anquandis rotis, vestibus, ponderibus appendendis, sed operam perdunt, neque audiendi sunt huiusmodi promissores cum magni quid sibi videntur invenisse, eadem existente potentia absoluta, dico omnes machinas, quae nullas patiuntur friciones, &

quae nullos motus ad propositum finem iuvant, les generant, eundem effectum praestare, neque unam alteri praefereendam esse, demonstrat Celeberr. *D. Bernoulli Hydrodyn. pag. 166. Hist. de l'Acad. des Sc. 1073. pag. 100.* Atque in machina hydraulica perfectissima, cum maximum quem potest effectum exerit, vis absoluta fluidi motoris est ad vim fluidi seu ponderis in motum acti ab illa; seu ad effectum ut 27, ad 4, circiter, ut 7, ad 1. *Ibid. pag. 195.* Sed maximus effectus ab impulsu fluidi est ad potentiam absolutam, qua machina movetur, ut 4, ad 27, atque si perfectissima, supponantur humana machinamenta, in his tamen movendis ex septem virium gradibus sex fere absumuntur antequam effectus oriatur ad propositum finem utilis. Quae cum veta sint, quanto in errore versantur illi qui ex machinarum dispositione, & multiplicatione saepe ficticia, motus cordis, pulmonis ex vi materiei semel impressa & exigua deducere conantur. Quam absurdi quae ex resistentia opposita tanquam ex causa motus incrementum deducunt! quam deploranda ars medica quae tam falsis innititur principiis! vide *Illust. Euler, Atom. de l'Acad. de Berlin 1763. pag. 199.*

294. Piget me certe ac ferre pueri ditiussimum opiniones consutare sigillatim, examinatis viribus inanimatis, ut gravitatio, elasticitate, quas humanae machinae functionibus omnibus explicandas aptas supponunt pseudomechanici: praecipuos circa id argumenti errores indicasse suffecerit.

Gravitas vis est materiei quantitati proportionalis, quae continuo deorsum nostri corporis partes fluidas solidaeque orget; hinc fit ut illi co gravitate humi precombant, qui syncope corripuntur, quia cessante illico omnium muscularum contractione, nil obstat gravitati; verum quandiu viget illis contractio, ut dum stamus, vel ambulamus, ea gravitas vi musculari multum superatur. Sic quandiu cor viribus integris sanguinem in circulum promovet, vis gravitatis fluidorum fere pro nulla habenda est, & inde etiam fit ut licet sanguis continuo deorsum premat, interea quandiu vigent vires cordis non magis insurgit sensibilibus cerebrum, cum homine jacente, gravitas sanguinem a cerebro non revellit, quam cum caput erectum. At si vis contractiva cordis multum se imminuat, quoniam vis gravitatis fluidorum semper eadem in se, iam cum vi musculari cordis rationem multo majorem obtinet, tunc temporis fluida deorsum a gravitate deorsum partes inferiores descendunt, maxime, si sanguine dissoluto, lymphae eo facilius separetur; inde redum repentina in aciculis & chloroticis intumescencia, quam soli majorum veparum praestioni ab obstructionibus vel lymphae in abdomine effusa perperam adscribunt omnia autem phaenomena a sola gravitate pendencia tam accidentia in cadaveribus quam in vivis animalibus, ut Anatomici norunt, cadavera enim in amphitheatris per

noctem suspensa mirum in modum partibus imis intumescunt.

295. Elasticitas est vis, qua corpora compressa, si vis comprimens ablata sit, sese in pristinum statum restituant, absque eo quod illa figurae restitutio nec vi musculari, nec gravitati tribui possit. Vis elastica est aequalis vi resistenti, quandiu elater uterius comprimivis inflecti potest; adeoque perstante vi premente in eodem gradu, vis elastica cum ipsa premente in aequilibrio permanet.

Hoc ignorare videntur qui motus alternos vasorum a sola vi elastica deducere conantur, & qui etiam, ad hujus signenti defensionem, elaterem perfectum in vasis fingunt, ut horum motum perennem explicent: verum praeterquam quod absurdum est esse eundem eumque perfectum, seu maximum elasticitatis gradum in diversis ejusdem hominis vasis & solidis, ut in corde & cerebro, renibus & placenta, tendinibus & adipe, aorta & lymphaticis, immo & in diversis hominibus, ut in saetu & adulto, cum tamen vel levissimus pulsus cerebri & placenta contactus contrarium doceat: Quis non videret ea vasa fortius ab ira, debilius a metu moveri, licet elasticitas eadem sit; atque proinde, sine ratione, vasorum motus ab elasticitate deduci. Mirum quod in vasis sanguine ingurgitatis aut viscido liquido distensis & infarctis motum contractivum fortiozem, qualis est in phlegmone, ab elasticitate deducant, cum corpora eo lentius & tardius se restituant quo majori vi distensa recipiuntur. Vitrum & ebur certe multo majori elasticitate pollent quam arteriae & venae; & tamen una decima quinta parte abest a perfectione eorum elasticitas, immo demonstrante Ill. Rizzuto in *At. Acad. Bonon.* perfecta elasticitas non nisi massis indefinite parvis, ut moleculis lucis competit: quam tamen molissimis & maximis visceribus nostri adscribit Theorici.

296. Quae impulsione spectant, fusius prosequemur, dum agitur de morborum convulsivorum theoria, ubi motus sympathicos, non ex motu semel forissecus impresso, & ex caeca mechanismi necessitate, sed ex providae naturae potentia motrice deducemus: unicum hic argumentum adducemus ex pathematum effectibus desumptum, adversus eos qui omnia mechanice explicare conantur.

Docet cujusvis experientia plures homines ex alterius quem oderint aut deperxerint visu facili irasci, ita ut ex omnia salutatione, ex conspecta epistola procaci, ex omisso responso, febre, calore, moribus violentis & ipsamodici fere conspiciantur.

*Ora tument ira, nigrescunt sanguine vena.  
Lumina, gorgoneo savius angue, micant.*

Qui ex phaenomena ex motu machine forissecus impresso eruere contendunt, in prima mechanice elementa turpiter impingunt, & vi-

seria refutatione digni sunt; nam cum omisso salutationis & responsi sint merae privationes seu nihilum, ea machinae utcumque solent dispositae motum impertire posse, absurdum qui dixerit: verum eos motus independentes a voluntate fieri norunt omnes, unde primis impetus non imputantur; ergo evidens est eos principio interno tum fœtici, tum moventi tribuendos esse; verum in ira motus cordis ingeminatur, febris fugax accenditur, respiratio velox & frequens excurrit, adeoque illud principium motus & sensus magnam habet in cor & pulmones imperium.

297. His argumentis pressi Pseudo-mechanici in Scepticorum partes transeunt, & his respondent nobis ignotum esse, prorsus modum, quo in corpus agit anima; verum non magis scimus quo pacto agat illa in motibus voluntariis; anne inde sequatur eam non agere? nec magis novimus quomodo gravitas, elasticitas, cohaesionis causa agant, num ideò corpora non gravitant, elateria non premunt, nec adherent corpora? Concludamus itaque cum Mechanicorum Principe *Abb. Borelli*: „quod principium „ & causa effectiva motus animalium sit anima, quod nemo profecto ignorat, cum anima „ mantia per animam vivat, & durante vita „ motus in eis perseveret; extincto vero anima „ mali, id est, non amplius anima operante „ machina animalis omnino iners & immobilitas „ relinquitur; quod multiplices & plurimae „ animalis actiones sunt electiones, seu naturalis appetitus quodam animalis, hoc quoque „ ut evidentiissimum ab omnibus admittitur: „ manifestum est quoque cognitionem & appetitum per se tantum animalis partes non „ vere & impellere, sed opus habere instrumentis necessariis & facultatibus; ut locomotiva, &c. *Borelli de mot. anim. p. 1.*

298. Huic opinioni non solum adhaeserunt quotquot in hocce Lyceo floruerunt ante hocultimum saeculum Antitheses celeberrimi, ut *Gordanius, Joubertus, Riverius, Dulaurerius*, &c. verum & in hoc Sanctorum Patrum dogmatibus, ut *D. August.* ipsiusque Ecclesiae doctrinae adimplamur; omnes enim Orthodoxi unanimiter pronunciant animam rationalem esse vitae humanae principium; *Cassob. Montspel. p. 1. S. 1. cap. 2.* nec parvi facienda, ut quidam putant, ea mutua principiorum concordia; nihil enim in Philosophia verum esse potest, quod in Theologia, Jure, aliave scientia falsum fuerit; cum veritas una sit, repugnante licet *Lushero & Averro.*

299. Haecenus de facultatibus & earum viribus, quae sunt omnium actionum & mutationum hominis principia: cum autem in confesso sit eadem principia quae in sano faciunt actiones sanas, ipsa in aegro morbosae facere, de viribus, quae harum principia sunt, agere oportuit, ut morborum causas intelligeremus: his itaque fundamentis innixi deinceps symptomata evulcerare conabimur.



## De Morborum principiis.

300. Phænomenum id omne est quod in sensus incurrit, vel inde quam proxime deducitur; Boerhaave *instit.* §76. Morbosum phænomenum, seu *symptoma*, est quæcumque functio vel qualitas, quæ alio modo se habet quam in sanitate, seu quicquid evidenter mutatum & a sanitate alienum observatur. Qualitates hæc quidem mutantur a viribus inanimatis, seu ab iisdem quæ vegetabilibus communes sunt; siquæ nulla est qualitas vitiosa quæ in cadaveribus vel existeret vel etiam excitari non possit; cadaveris enim partes incumescere possunt, & colores alienos adipisci, & odores novos emitte, & exsiccare, & indurescere, & omnes mutationes cachecticis morbis essentialiter subie.

301. Verum functiones morbosæ, & febris, dolor, convulsio, paralysis, multiplex evacuatio, quæ scilicet a musculari viscerum motu dependet, nequaquam sine virium animalibus propriarum concursu possunt fieri, unde patet vires tum animalibus tum vegetabilibus inhærentes esse principia morborum omnium sæpius combinata; illæ quidem a principio intelligente diriguntur, istæ vero necessitate mechanica tantum agunt. Si quæ aeri v.g. frigiditas fuerit expositus, & inde febre corripiatur, evidens est principii, ut ajunt, mere mechanici describendam esse cutis condensationem, vasorum constrictionem; hinc pallor, frigus, siccitas, & asperitas cutis, digitorum rigiditas, resistentia ad motum; nec non sanguinis coagulatio, visciditas, resistentia major; quod idem eveniturum est, si a venæis quibuscumque intus assumptis morbus oriretur.

302. Verum sensus frigoris, horrores, spasmodici artuum subultus, dein vero virium cordis augmentum, & inde subsequens pulsuum vigor, frequentia, febris, calor viribus animalibus adhiberi debent, ita ut vix magnus foret error, si diceremus morbos omnes fore a virium utriusque generis concursu produci, ita tamen ut materiem morbosam suppediant vires inanimatæ, eam vero agrediantur & impugnent vires animatæ; unde quicquid percipit quæ Veteres intellexerint, cum dixere *morbus esse naturæ* *in humanis materiem morbosam*; sic sumpto veneno caustico alia symptomata materiem morbosam tribuenda sunt, ut dolor ventriculi, calor dextræ huc relictus; alia vero sunt naturæ copiam huic veneno mitigando, vel efficiendo apta, ut ubi saliva proventus, cardialgia, quæ ventriculi constrictionem denotant, nausea, & vomitiones; quibus cum mucosissimo venenum fortis amandatur. Ratione itaque causæ alia sunt *symptomata materiem morbosam*, alia vero *symptomata naturæ* adscribenda, ex horum concursu morbus est conflat.

303. Omnium itaque symptomatum principium est vis quæcumque sanum hominis statum mutant, ut ille minus perfectus evadat: seu

vis sanas functiones & qualitates immutans in alias; nulla enim mutatio fieri potest sine vi motrice, vel resistente, quia omnis mutatio actio est, cuius causa vis est.

304. In omni morbo caute distinguenda sunt ea quæ patent, seu in sensum tum ægri tum Medici incurrun, ab illis quæ eos latent, & quæ vel conjecturali vel certo ratiocinio dignoscuntur possunt; priora sunt *symptomata*, posteriora sunt *symptomatum principia interna*, ex quibus scilicet symptomatum possibilitas intelligitur. Sic in peripneumonia omnis mutatio conspicua in functionibus, ut tussis, febris, dolor, exspitio cruenta, sudor, iactatio, &c. & in qualitatibus, ut calor, rubedo, humiditas cutis, &c. symptoma est: omnis vero actio interna, ut arteriarum pulsus, pulmonum constrictio, dilatatio, erorior in pulmones impetus, fluidi nervi influxus, atque omnis mutata tum sudorum tum solidorum dispositio, ut fluidorum visciditas, acrimonia, solidorum tensio, laceratio, &c. est symptomatum peripneumoniae principium internum.

Ex his principiiis atque causis alia sunt quæ nocent omnino corpori, ut acido veneni, cacochylæ, viscidæ, aeris, vulnus, pressio externas verbo obices & stimuli, & ea *noxia* appello, ut distinguantur a liberatis & naturæ copatibus, qui, licet symptomata multa critica v.g. producant, tamen, si non eventa, saltem scopo, sunt utilia morborum principia. Sic venenum depleturum est vomitus principium, occasio, sed noxia, ventriculi contractio ad id expellendum, est principium vomitus ejusdem, sed utile & salutare.

305. Principia morborum externa sunt vires corporum quorumvis quæ sua pressione, vel actione valent corporis qualitates & functiones, mutare, ita ut a sanitate recedant; huc pertinent aer, ignis, aqua, animalia, fossilia vegetantia quatenus exterius applicantur, aut intra primas vias subsistant: primæ enim viæ, notantur *Piscaria*, quasi extra corpus habentur, seu corpora extranea recensentur, si aliunde in eas devenierint, ut venæ, alimenta; nec inter corporis partes recensentur.

306. Morbi alii sunt magni, alii vero parvi: morborum vero magnitudo æstimatur ex symptomatum gravitate, intensitate, numero, extensione & duratione.

307. Symptomatum gravitas æstimatur, cæteris paribus, ex usu seu necessitate organorum, quorum hæc symptomata sunt functiones motuæ. Sic palpitatio, syncope, quæ cordis motum læsum designant, sunt symptomata graviora claudicatione, quæ motum cruris læsum indicat, & in quantum motus cordis ad vitam est magis necessarius motui cruris: quo plures functiones ex unius organi bono statu dependent, eo illius organi læsus gravior censetur.

308. Intensitas symptomatis ex huius gradibus æstimatur; sic qui duplo, triplo frequentius respirat altero, si dyspnoeam duplo, tri-

plove intensiorem patitur: qui molem corporis sui duplo tardius rariufve movere valet, is debilitate duplo intensiori affligitur.

309. Numerus symptomatum quo major est, ceteris paribus, eo major censetur morbus, si ve eadem organa afficiantur, si ve diversa: sic in morbo acuto, si delirium, convulsio, dyspnoea, nausea, febris simul adsint, morbus major est quam si alterutrum adfuerit.

310. Extensio symptomatum ejusdem speciei æstimatione ex numero partium ab illis detentorum, atque earum spatio: sic scabies totam cutem afficiens, immobilitas omnium artuum, morbum majorem constituunt, quam si pars tantum his afficeretur.

311. Delinum duratio seu pertinacia symptomatis, ejus magnitudinis, ceteris paribus, mensura est: sic quo diarrhoea longius perleverat, eo major morbus est.

312. Omnis morbus est imperfectio, adeoque malum; verum omnis mali perceptio ingestiva mœror est in principio intelligente & cognoscente, ergo morbum omnem comitatur mœror seu molestia, unde morbus ægritudo\*, ægritudo nuncupatur; in morbis tamen delirio, soporosisque mœror ægri non semper innotescit.

313. Homo malum necessario averfatur, quatenus tale ipsi videtur, adeoque in omni ægro datur ægritudinis averfatio, aut quod eodem recidit, sanitatis cupido, quandiu sanæ mentis est, & sanitatem inter bona numerat.

314. Verum perceptio licet confusissima ægritudinis aut mali est motivum quo ad illud malum abigendum & pro viribus impugandum determinantur facultates motrices, omnes enim cum partium fabrica ad totius conservationem mire conspiciant (123.), adeoque cum status partium nutari possit in meliorem a libertate, si de externis agatur, a natura; si de internis, quæstio sit, data mutatione morbifica, libertas & natura debent adversas principia morborum interna insurgere, ut materiem morbi ficam corrigan vel eliminent.

315. Conspiciunt itaque libertas & natura in sanitatem, cum morbis ipsis constictamur; verum si conspirent inter se, non tamen simul ad eundem finem collimant materies morbi ficæ & alia morborum principia, adeoque imperfectus est actionum omnium, partiumque consensus in quo ægritudo consistit, atque a sanitate discrebat (126.); non repugnat itaque divinæ bonitati & Providentiæ dari in nobis principium actionum quod morbos producat, cum idem principium morborum occasiones & materies morbi ficas impugnat non desinat, sanitatis tutelæ & ægritudinis medellæ invigilet. Quomodo malum physicum salva Summi Numinis bonitate & sapientia existat, *Wolffius* fusc ostendit in *Theologia naturalis*.

316. Quoniam vires hominis limitatæ sunt (130.), possibile est ut illæ ad vires materiem morbi ficæ sint in quacumque ratione; si vero in ratione æqualitatis fuerint, mors est in proximo: si vero minores fuerint vires materiem morbi ficæ viribus naturæ, eo minus est periculum, quo priores posterioribus minores sunt facultates.

317. Jo sanitatē vires naturales sunt in data ratione ad vires vitales, & utraq; in data ratione ad vires animales, *Piscara. Elem. Medic.* 112. datur etiam certa proportio inter facultates illas quæ sunt hatum virium principia. Sic notum est infantibus vires cordis minores esse quam vires omnium simul musculorum, circiter ut moles cordis est ad moles aliorum musculorum; & qua ratione crescunt vires cordis in adultis, tandem vires artuum in illis augeantur, atque uti vires cordis, ita & vires artuum in senibus pari passu decreverunt: idem dictum est de viribus aliorum organorum.

318. Quoniam potentia motrix, quæ velut est virium omnium penus & promptuarium, in diversas partes distribuitur, ut in cor, pectus, artus, & tamen per aliquot annos in statu sang, data dici hora, eadem permanet docente experientia, necessum est ut quantum virium singulis diebus absorbitur, tantum eodem tempore relaxetur; imo paulo magis reparatur, cum adolescentibus infantibus validiores evadunt; deinceps vero ætate ingravescente paulo minus restauratur, cum senibus minores sunt vires quam adulti.

319. Docet ulterius experientia alias esse vires actuales *ordinarias*, quæ quotidie in sanitate absorbuntur, & reparantur; alias vero vires; & quales *extraordinarias*, quæ urgente necessitate exeruntur in exercitiis & pathematis fortioribus; atque quo vires actuales majores simul exeruntur, eo potentiales minores superfluit.

320. Quo major virium quantitas in quædam organa mittitur ultra dosim in sanitate consuetam, eo minores sunt vires potentiales, seu eo minor est facultas superflua, atque exsolutionis proximior.

321. Vita est coexistentia actionum cordis & pectoris cum actionibus animæ (125.); scilicet ablata vi tollitur actio, etque imminuta minuitur, adeoque quo propius est exsolutioni facultas, quæ est veluti virium promptuarium, eo actionum omnium adeoque & vitalium imminutio vel cessatio, seu mors proximior imminet.

322. Facultatis motricis exsolutioni malum est physicum omnium maximum, adeoque quod natura maxime cavere debet; at postis causis morbi ficis integritati, circulationi, fluidi nervi secretioni obstantibus mors etiam imminet, quæ averti vel procrastinari non potest nisi dampno virium vitalium, quæ has causas mor-

\* *Ægritudo* est status vite imperfectus seu imperfecta actionum & qualitatum omnium conspiratio in conservandam duplici vero percipit ægritudo, materialis seu virium fluidorum, & solidorum sive conspiciuntur sive incompensantur, sive exigunt. sive possibile est ægritudo formalis quæ morbo est, seu symptomatum notabilium & conspiciuntur.

bificas corrigere, vel eliminare contendant; ergo siue quiescat, siue laboret natura, cum notabilia viscera sunt impedita, atque ad ea liberanda multum virium impendere opus est, hinc & inde periculum est.

323. Datus in aliqua regimen corporis seu facultas tum liberatit, tum naturæ, ex pluribus motibus per structuram corporis possibilibus, eos determinandi, qui utiliores videntur. Sic nobis etiam invitit & sæpe incitit illa facultas velo palatio utitur, tum ad naves policas observandas, tum ad alimenta in gulam, aerem in os, vel naves dirigendum, æque ea ex illis diversis motibus æque possibilibus utiliores pro circumstantiis eligit, eadem vero facultas in morbis æconomiam animalem regit, atque urgentiori periculo occurrit.

324. Inde fit ut in summis doloribus, qui fluidi nervi pægm exhauriant, si perseverarent, quandoque illico motus cordis multum imminuitur, ac veluti sustaminatur, simulque omnes facultates feriantur, fit syncopo, ex qua excitati ægrótes sæpe de doloribus & morbis immunes convalescunt; qui si labor & dolor perseverarent, cum summis conatibus illis obissent. Licet autem syncopæ malum videatur summe terribile, & doloribus atrocissimis pægm, interea multiplex docet observatio eam motum & conatum feriationem, vel suspensionem fuisse plurimis morbis utilem, & forte ideo gravissimis malis phlebotomia ad animi deliquium usque productam a Medicinæ patribus olim fuisse malitiosæ & veluti solemniter celebratam, quod paradoxum agendo de morbis syncopitici agitabimus.

325. In viscerum infarctibus quandoque tanta offertur cordis resistentia, & tantum motus sanguinis tardatur, ut mors in præcinctu sit, nisi quidquid est virium in his resistentiis superandis collatur, veluti si officium cordis alterum obiretur; certe tunc temporis una salus est quidquid est virium in corde, fortius contrahendo & obice superando constanter, & vehementer impendere; licet enim ea lucta non semper feliciter fortiaur effectum, adeoque evenia sit quandoque noxia, in scopo semper salubris est. Sic si quis hostis ense districto fugientem prosequatur, & transiluisse occurrat fugienti fovea, is eam potius transilire debet recta ratione utens, adeoque lapsus præcipitis periculo inserto se exponere, quam cerum aliam de periculo subire. Ratio est facultas percipiendi nexum veritatem universalem (V. Velf. Psychol. 43.), quod autem incertum certe periculum sit anteponendum, hoc est veritatis cognitio, adeoque & rationi consequentem.

326. Facultas, virtus, & robur æstimatur ex intensitate pressionum quæ possunt exerceri, ex velocitate puncti machinæ cui pressio illa applicatur, & ex duratione seu temporis longitudine quo labor ille perseverat; dicitur etiam potentia absoluta, Bernoulli Hydrodyn. pag. 164. vires potentiales eam facultatem appellant plurimi.

327. Exercitium est imposita virium, quæ possunt intra diem quiete, somno & pægm quotidianè preparari; si vero plus virium impendatur in his actionibus, quam quæ intra hoc tempus refarciiri valent, labor dicitur; sic febris, asthma, peripneumonia laboribus sunt annumeranda; unde vulgo ægri, febre, asthma, laborant dicuntur; labor qui finis alicuius gratia peragitur, dicitur cinatus vel finitimus; illi vero cinatur, qui inducunt maximam defatigationem, & virium impensam non cito reparabilem, seu quæ potentiam exhaustura, est, violenti nuncupatur.

328. Penitus exhaustis viribus potentia morticis, mors est; sed quo labor violentior est, eo citius exhauriantur vires illæ; ergo eo citius cessat omnis actio, & merito ajunt violentum non esse durabile.

329. Difficultas operis est, ut resistentia obicis directæ, & ut potentia motrix inversæ, seu eo quid est difficilius motu, quo ab eadem vi impensa tardius movetur; & data eadem obicis mole, & resistentia absoluta, eo difficilius est, quo facultas, seu potentia motrix minor est; sic quo majus pondus ab illam operarii trahendum est, eo tardius trahitur; & idem pondus ab operario uno, quam a duobus similibus & similiter applicatis, duplo difficilius movetur.

330. Difficultas operis est, ut huius tarditas simul & ut quantitas virium ad illud exsequendum impensarum; sic si bolus in œsophago positus & vi deglutendus duplo tardius delabatur; isdem viribus impensis, ex eo difficultas deglutitionis duplo major est; sed si vires simul triplo majores, impendantur, novies est major illa difficultas.

331. Si obicem movendorum velocitates a pressione exorta sint ut vires impense, seu his imminutis viribus velocitas deferreatur & adauctis adaugeatur, eadem remanet difficultas; errant itaque illi, qui difficultatem ex solatarditate motus, vel ex sola virium impensarum quantitate metiuntur.

332. Si obicis velocitas sit minor, & simul vis impensa major, difficultas tanto major est, quo vis impensa major, & simul obicis minor est velocitas, difficultas autem molestia est principii lentientis orta ex resistentia movendi & ex propria motoris debilitate respectiva; neque enim in machinis ulla proprie loquendo datur difficultas.

333. Facilitas operis est major, quo velocius movetur corpus, & quo diutius illud moveri potest citra defatigationem; etenim quo diutius illud constanter sine defatigatione, seu sine facultatis detrimento moveri potest, eo major est facultas, seu motrix potentia; & simul quo velocius illud corpus movetur, eo minor est illius resistentia, adeoque eo minor est difficultas, seu eo facilitas major est.

334. Alacritas est illa animæ modificatio, qua facilitatem in omnibus operibus, seu functionibus exsequendis intuitivè cognoscit, marer & contra adest.

adest cum difficultatem perlentit; atque ut in sanitate adest functionum facilitas, constantia & alacritas, ita in ægitudine difficultas, lassitudo, & mœror adsunt, mania & aliis morbis deliris exceptis.

335. In statu sano facultas est major, & labor, seu virum impensa minor quam in ægitudine.

In sanitate functiones omnes exercentur facile, constanter & alacriter; adeoque sine defatigatione, & multo majores vires urgente necessitate possent exerceri, quod notum est omnibus; & in ægitudine tantum quædam functiones exercentur; cæteræ vero non possunt exerceri, ut in febrilibus, soporosisque morbis; quædam vero exercentur cum vi solita vel minori, aliæ vero nequaquam possunt, ut in paralyti; ergo facultas in toto minor est, in febrilibus & inflammatoriis plures functiones quidem cum summa vi exercentur, ut motus cordis & respiratio; verum non constanter & per plures mentes sic possunt exerceri, immo cum summo mœrore summaque lassitudine, atque simul motus muscularis artuum difficilis est, adeoque virum impensa in eis major est, & facultas minor.

336. Morbus eo periculosior est, quo vires causæ noxiæ sunt majores & facultas naturæ minor, ejusque simul conatus major; etenim malum extremum impendit, si ad æquilibrium accedant vires causæ noxiæ & facultas, aut si posterior a prioribus superetur; verum quo facultas naturæ minor est, simulque plus virium suarum impendit, eo facilius est eam vi causæ noxiæ equari, vel ab illa superari, & tunc eo magis est possibile, ut mors accedat, adeoque (192.) ille status tanto periculosior est.

337. Morbus eo brevior futurus est, quo vis materiæ morbificæ vel causæ noxiæ minor est, simulque facultas & ejus conatus majores, & tunc salus est proxima; vel eo brevior est, quo vis materiæ morbificæ major est simulque facultas & ejus coactus minores, & tunc mors est in proximo.

338. Morborum *acutior* æstimatur ex eorum brevitate & periculo conjunctis, adeoque acutior æstimatur ex gravitate & intensitate (308.); nam quo gravior & intensior est morbus (307. 308.) eo materiæ morbificæ majores vires obtinet, simulque vires majores exerit facultas; cum autem facultas sit limitata (316.) adeoque eo citius exfolvatur, quo plus virium impendit, eo citius accedit ad æquilibrium cum viribus causæ noxiæ, unde brevitas & periculum morbi.

339. Quo plus virium impenditur adversus causam noxiam, simulque minores sunt harum virium effectus sensibiles, eo periculum est ut-  
pote citius. Ligatis in cane ambabus arteriis illarum, plus virium & majores conatus exerit animal, quam si alterutra ligaretur; interea tamen cito in priori casu facient motus cordis & arteriarum; respiratio & pulsus, utut frequentiores, interea brevi debiliores evadent,

quam in altero casu, quia licet in utroque casu intendatur vires & conatus ad hunc obicem tollendum, interea plus intenditur in casu majoris periculi & resistentiæ, adeoque citius exhauritur facultas, citiusque proinde decrevit vis vitalis, ejusque effectus sensibiles seu vis pulsus & respiratiois imminuuntur.

340. Idem alio modo potest ostendi: dispensia virium, quæ ex affricu huc, crescent in ratione duplicata velocitatis fluidorum, quæ ab illis viribus moventur; ita ut vis quadrupla alterius non possit impetire dato fluido velocitatem duplam ejus quam vis simplex impertit, sed paulo minorem; ergo vires majores absumuntur in majori ratione quam minores; verum vires absumptæ in affricu non possunt effectus sensibiles in pulsu & respiratiōe edere; ergo effectuum sensibilibus quantitas decrevit in minori ratione, quam virium impensa. Sic in agone ducentibus licet conatus interni sint vehementissimi, ut patet ex interni caloris intensitate, tamen pulsus est debilis, seu exilis & mollis, quia maxima pars virium absumitur intra cor & majora vasa, nec nisi pars eorum exigua superflua ad arterias minores pergit; ideo quibus explorari potest.

341. Si functiones difficulter & moleste exercentur, datur ægritudo; ideo eorum difficulter & moleste exercentur, vel quia aucta est organorum vel fluidorum his inservientium resistentia (319.), vel imminuta facultas in functionibus exercendis destinata; verum aucta resistentia, functiones sunt rariore vel tardius (330.) solito, adeoque potius imminuuntur vel abolitæ, nisi solito major fiat virium impensa, qua posita ponitur lassitudo, defatigatio & infirmitas (Græcis *arrestia*, quæ ægitudinis est synonymum); imminuta vero facultate, idem est ac si resistentia fuisset aucta; nam si vis hominis duplo minor evadat, is pondus solitum duplo difficilior geret, adde quod quoties crescit functionum difficultas, anima ægre se habet, seu molestia afficitur, adeoque si functiones difficulter exercentur, datur ægritudo.

342. Uno organo affecto, vires illius organi tantum, atque eorum quæ in ipsum possunt agere, seu huic auxiliari, aut sine quibus organum læsum moveri non potest obstructuram partium; debent intendi, cæteræ vero minui.

Vi res enim sunt mensura vitæ (321.); debent itaque illæ summa cum parcimonia conservari, quæ sine facultatis decremento non possunt absumi; verum ut satis indicatio-  
ni desumptæ a vicio, seu causa noxiæ corrigenda, vel eliminanda in dato viscere, debent necessario vires impendi; nam sine viribus multa mutatio, nec proinde correctio aut expul-  
sio; si vero vires in aliis visceribus ad læsum non pertinentibus adhibeantur, more solito vel copiosius solito, facultas exhaustior; utrique autem scopo fatiscit, si vires illæ impenduntur & inutiles supprimantur; v. g. sic repugnum in pulmonari arteria, quod sit reple-  
tum.

languinis impediatur, illud repagulum nequaquam removeri potest, aut corrigi, atteri, nisi vis cordis & arteriarum adaucta, repetita, vel pulmonum valida & alterna constrictione; prior actio palpitantis, posterior suffocationis symptomata producat, tunc autem urgente mortis periculo, vires artuum minuuntur, & exerceant frustra ac periculose suas vires in deambulando impenderet, cum in vita protrahenda & obice lethifero amovendo sint necessaria, adeoque tunc temporis, æger viribus artuum destituitur.

343. Verum propter structuram cordis & pectoris, non potest iterari illorum valida constrictione, quin alternatæ sint eorum dilatationes; nec cordis dexter ventriculus sanguinem vehementius in arteriam pulmonarem trudere, quin sinister eum in aortam majori vi tradat; adeoque necessarium est, ut alterna fiat inspiratio, & expiratio velox, & ut sanguis in arteriis ab aorta proficiens uberius induat, adeoque ut pulsus vehemens, frequens evadat, ut calor, tensio rubedo, &c. aliæque symptomata superveniant, quia actiones potentia matricis in machinam ab illius machinæ structura partim determinantur.

344. Ipsius parcimonie exempla in omnibus morbis observantur; in febre, v. g. vires cordis & arteriarum multum incrementum; at illic vires stomachi, vires artuum, vires imaginationis, attentionis ad eorum moralia minuuntur, venus silet, in soporosis morbis insarctum est cerebrum aut cerebellum, conatus cerebri & meningum intenduntur, verum ea molimina dependunt a viribus cordis; ergo vires cordis facilius intenduntur, ut in apoplexia; cæteri vero artus, cætera sensuum organa fluido nervo defraudantur.

345. In morbis chronicis exigua sunt initio vitia & partibus minus oculibus nocent, aut earum functiones levius impediuntur; sint v. g. lymphatica quædam obstructa in mesenterio, quousiam arteria mesenterica superior decimam sextam circiter sanguinis aortam subeuntis partem trajicit; atque illius decimæ sextæ partis vix una centesima eodem tempore fuit per omnes simul sumptas arterias lymphaticas ex ea promanantes, obstructis omnibus simul illis arteriosis lymphaticis, resistenti cordi oblata non est major quam 3600. pars resilientiæ, quæ ab aorta obstructa nasceretur, adeoque obstructa tantum horum lymphaticorum parte decima, ut obstructis tribus quatuorve mesenterii glandulis periculum inde ortum est tantum 36000. pars periculi, quod ex aorta obstructa nasceretur; non mirum itaque si exinde non nisi exigui & vis conspicui conatus exsurgunt; verum si dimidia glottidis pars obtueretur, quousiam inde dimidia aeris respirandi pars impeditur cum respiratio ad vitam sit necessaria, summum exinde imminet periculum, adeoque summi & vividissimi conatus exsurgunt, seu datur

*morbus acutus.*

346. In chronicis morbis non in veteratis ægri sunt, & functionibus etiam moribus voluntariis, ut artifices suis operibus, literati studiis, licet debilitati, incumbunt, quia paucæ vires in causa morbosica amolendi impenduntur, frustra uberius absumendæ, & si tunc temporis aliæ urgentes necessitates, ut victus parandi, fames sustinendæ, urgentiori occurrere debent; in acutis & contra multam virium impenditur in victu amolendi, unde ægris ad standum & externis negotiis incumbendum, deambulandum, ludendum, &c. non suppetunt.

347. In statu sano vires singulis diebus impensæ sunt copius facultatis, seu virium potentialium, ut ajunt; pars exigua: in morbis autem acutis vires singulis diebus impensæ sunt eo major pars facultatis, quo morbus est gravior, & quo ab initio suo remotior seu crisi propior.

348. Initio morbi periculum minus est quam in vigore, quia initio facultas fere integra est, & deinceps continuo imminuitur, usquequo correctæ vel eliminatæ causæ noxiæ, natura quiescit, somno & cibis copiosioribus vires suas refarciat.

349. Superata causâ noxiâ, vitrix natura quiescit, & consecutam virium ac fluidi nervi distributionem sensum restituit; sic in febricitantibus accedente convalescentia, pulsus, qui pleorus, tensus, velox, frequens, adeoque validissimus fuerat, jam rarus, mollis, parvus evadit, & vires artuum & contra crescunt, ita ut sensum lectulo suo insidere, in alterutrum latus dormire, dein surgere, ambulare, opificiis, studiisque incumbere, acutius audire, cerere, solida alimenta coquere, &c. valeat.

350. Restituta virium proportionem sana, appetitu vigente, exercitio restituto, sensum facultas hæcenus imminuta vires suas integras recuperat, & sic convalescentia in sanitatem abit; & superato morbo principali, remanet symptoma individuum, scilicet infirmitas, quæ somno, quiete, exercitioque alternis, & debito passu tollitur.

Doctrina virium adeo ad diætam præscribendam, ad medicaminum præsertim vehementiorum usum, nec non ad morborum theoriam, necessaria taoti in medicina momenti est, ut mirum sit nullas hac de re traditas fuisse ex professo regulas, quas tamen mechanica hodie ita a Medicis commendata suppeditat; præcipuas attulimus, quas verore ne Philatri ut obcuriores negligant, & Geometrae ut nimis claræ & cuique obvias contemnunt.

#### Clavis Classium.

351. Morbi sunt symptomatum notabilium invicem connexorum concursus.

Symptomata magis obvia & simul constantiora agmen ducunt, & morborum characterem essentialiorem constituunt, eaque vocantur pathognomopice, seu characteristica.

Signa characteristica sunt triplicis ordinis, in functionibus, excretionibus & qualitatibus.

Si pulsus frequens sit, aut respectivo ad artus validus; seu si debiles sint artus citra somnum & sensus imminutionem, pulsus tamen validus sit, *febris* est.

Si febris sit, eaque ut plurimum vehemens cum dolore, calore intenso, & sanguis in patella crusta albescente obductus, datur *inflammatio*, vel *phlegmasia*.

Si muscoli voluntati subditi invito homine fortius contrahantur, quam ab ejus robore & circumstantiis expectandum esset; ac voluntati non subditi solito fortius contrahantur, *spasmus* est.

Si præcipuum symptomata sit respiratio frequens, difficilis, *anhelatio* dicitur.

Si facultas movendi partes voluntati subdita, & simul facultas sentiendi in organis, tum simul, tum seorsum deficiat, *debilitas* est.

Cum præcipuum symptoma est molesta sensatio, qualis a punctura, distractione, *dolor* adest, vel *algema*.

Quando præcipuum symptoma consistit in judicio, imaginatione, voluntate, aut cupidine depravatis, *vesania* est, sic dicta quod illæ facultates sanæ non sint.

Si continentia, potissimum fluida, foras vel frequentius, vel copiosius, vel aliena a statu sano ejiciantur, *evacuatio* est, vel *fluxus*.

Si præcipuum symptoma sit qualitas mutata (136.) quoad volumen, superficiem, colorem, *cachexia* est.

Vitiorum seu morborum pathologicorum, qui nihil aliud sunt quam morborum proprie didorum elementa, in nostra pathologia historiam dedimus; talia sunt ulcus, vulnus, fractura, luxatio, tumor, excrecentia, maculae, &c. de quibus fuse tractant Medico-chirurgi, principia interna morborum, ut vermes, calculos, fluida effusa &c. e morborum censu ablegamus.

#### *Methodus Morbi detegendi.*

Quoniam ea signa sunt omnium optima, quæ secum gerit ægrotans, seu quæ morbo sunt intrinseca, ex hoc fonte signa morborum potissimum sunt deducenda; ea autem sunt vel mor-

<i>Febris</i>	{	Continuæ.
		Remittentes.
		Intermittentes.
<i>Phlegmasia</i>	{	Exanthematosa.
		Membranosa.
		Parenchymatosa.
<i>Spasmi</i>	{	Tonici partiales.
		Tonici generales.
		Clonici partiales.
<i>Anhelatio</i>	{	Clonici generales.
		Spasmodica.
		Oppressiva.
<i>Debilitas</i>	{	Dysæsthesiæ.
		Aneptithymiæ.
		Dyscinæsiæ.
<i>Dolor</i>	{	Lipoptychiæ.
		Comata.
		Vagi.
<i>Vesania</i>	{	Capitis.
		Thoracis.
		Abdominis.
<i>Fluxus</i>	{	Artuum.
		Hallucinationes.
		Deliria.
<i>Cachexia</i>	{	Morositates.
		Sanguifluxus.
		Alvifluxus.
<i>Cachexia</i>	{	Serifluxus.
		Aenifluxus.
		Macies.
<i>Cachexia</i>	{	Tumores.
		Hydromeres.
		Tubera.
<i>Cachexia</i>	{	Impetigines.
		Decolorationes.

borum principia, ut causa, occasio sedes, materia; &c. quatenus intus latent; vel phænomena, seu symptomata, sensibus ægri aut Medici obvia, atque evidens est, non ex principiis, sed ex symptomatibus morborum characteres esse deducendos.

Quæ autem sunt ægritudini extrinseca, ut ratio, tempestas, aer, cibis & potus, applicata, &c. ea quidem signa morbi suppeditare possunt, sed non primaria & pathognomonica, quæ tamen nequaquam in individuo negligenda.

Ut signa intrinseca obtinet Medicus, is perspicuos habere debet characteres omnium classium distinctissimos, id est, non solum notas symptomatis alicuius nosse sufficere, ut febris; verum etiam harum notarum notas dignoscere opus.

opus est, quid v. g. sit calor, ejusque gradus, ac diversi graduum effectus, ac gradus caloris medius cuique ætati ac temperamento familiaris; quid pulsus, quænam ætati ac temperamento cuique est nativa & consuetudo ejus frequentia; ea vero omnia ex physiologia tum historica tum philosophica derivantur.

Quoniam de morbis agitur proprie dictis, seu quales in praxi æstimentur, ab illis apprimè distinguenda sunt vitia simplicia vel parvi momenti, ut nævi, verrucæ, vulnuscula, maculæ, quæ summo nominum abusu pro morbis in pathologia venditantur, quæ principis tantum morborum, vel eorum elementi, si interna fuerint, annumeramus: si vero externa, pro symptomatibus simplicibus & vix notabilibus habentur, nisi cum aliis notabilibus combinata syndromem morbosam constituunt.

Cum semel perspectæ fuerint octo combinationes symptomatum quæ classes designant, immo ordinum viginti septem in quos illæ classes subdividuntur, attente considerandum est in ægro quænam sint illius symptomata præcipua, de quibus æger ipse conqueritur; ea etenim modo fuerint constantia, & ultra morbi initium perseverent, characterem morbi constituunt.

Symptomata vero alia morbis acutis communia sunt, alia vero chronicis, adeoque classes plures non unam designant, unde illis non ad hærendum est, sed ulterius progrediendum: sic lassitudo spontanea, cacostia, moror, debilitas, laboris soliti averfatio, rigor & horror, capitis gravitas, morbos febriles, inflammatorios, dolorificos, acutos, evacuatorios indiscriminatim prænunciant; hinc fit ut in prælium morbi genus non ita facile distinguatur, tunc autem a symptomatibus præcipuis desumuntur indicationes & præscribuntur auxilia hisce classibus communia, generalia dicta, ut diæta tenuis, quies, venæ sectio, julapia, usquequo symptomata pathognomonica morbum quæsitum prodiderint.

Nullus fere morbus est, qui simulari non possit, seu cujus symptomata voluntas non exiit, si vehementer saltem cupiverit, & impostor in hisce veteratoris artibus rudis non fuerit; non solum etenim observante *Paresi* mendicis lepram, hydrocelem, elephantiasin, auriginem, mutitatem, procidentiam ani, uteri, carcinoma; tibiæ ulcera, simulant; verum nova morborum genera multi vafri solertissime mentiuntur, ut colicam ab angue intra abdomen latitante, vampirismum, sagarum dæmonomaniam, observante *Cardello Hist. plant. Gassendi*, aliique: epilepsiam fanatici, convulsiones omnimodas alii fingunt: vidi infantulam, quæ, ut matri suæ magnum mororem incuteret, per dies quindecim gravem morbum miris symptomatibus stipatum mentita est. Nobilis matrona, ut quid de se sentiret amicæ, & æmulæ animum comperiret, hemiplegiam per mensem dexterræ

me finxit. Sunt qui Medicos mentita asphyxia deludunt. Ancilla ex urbe cum sua hera excedere recusans, alio in podicem intruso febrem sibi conciliabat. Morbos vesanos, dolorificos, & quotquot ex ægrorum relatu detegere confuevimus, pro lubitu imitantur astuti. Hamatemem sim largius hausto cruore bubulo a simulabat puella, ut ex cœnobio dimitteretur; tussim, singultum, nauseam, stertutationem ipsi pueruli norunt imitari; unde nisi vasfritiem caliditate sua detegat & retundat Medicus, simulatos & fictitios morbos pro veris habebit.

Qui vero symptomatum concursus apprimè novit Medicus, illa vasaframenta facile comperiet, ex eo quod impostores symptomata ex partium nexu nequaquam dependentia, seu nequaquam invicem connexa referant; si Medicus ipsis fidem præbendo simulans, eos solenter interrogaverit; si graves operationes chirurgicas, & mechanica evacuantia præscripserit, is versipellem ægotantem facile deludet.

Inventa in morbis non simulatis symptomatum graviorum combinatione, classis, ad quam morbus attinet, sponte patet, eodemque pacto ordo detegitur; atque comparatis hujus generibus, non difficile est ad morbi oblati genus devenire. Mulier humi inventa est sensus omnis, motusque voluntarii experta, cum pulso pleno, molli, respiratione stertorosa, & profunda soporis specie; quisque in classium & ordinum characteribus versatus, morbi classem sextam hujusque ordinem, qui comatosos seu soporosos morbos continet, statim adibit, atque sic ex viginti septem morborum ordinibus unicus ipsi venit examinandus, seu mediante hac methodo vigesimam tantum inquisitionis & laboris partem habet exantlandam; dein vero quoniam hic morbus inter decem hujus generis ordines reperiendus est, singula genera debent examini subijci, atque ex soporis altitudine, stertore, & omnium artuum flexibilitate, ægrum apoplexiæ laborare facile comperiet; verum cum apoplexiæ plures sint species, reliquum est ut Medicus inquirit nam ex lapsu, ictu, vel cranii fractura, commotione, num vero ex cacochylia febrilem capitis infarctum excitante, num ex plethora commota, &c. hæc apoplexiæ species orta fuerit, quod ex sedula capitis derafi & manibus contrectati, lingue, faciei, circumstantiarum inspectione, & sagaci assistantium interrogatione, ac demum ingeniosa causarum & principiorum conjectura comperiet, detecto genere ex 270. laboris partibus, unica superest, si fuerint quique ordini genera decem; ac si cuique generi decem fuerint species, ex 2700. speciebus morborum unica quæsitæ sicutotio facileque determinatur.

Qui vero alia methodo, ut anatomica vel ætiologica, usus fuerit, is nunquam, nisi longaprius experientia fuerit edoctus, aut a præceptoribus per traditionem eruditus, sine alterius ope

par-

partem affectam detecturus est, cum in apoplexia generica cerebri vel cerebelli hanc vel illam partem affici nihil certo demonstret; in syncope siquidem æger sensus omnis & motus est expers, nec cerebrum affectum supponitur; dein vero, utrum cerebrum sit primario vel secundario affectum decidendum est, antequam morbi quæsitum nomen innoscescat; verum illa distinctio ex ratiocinio sæpius conjecturali & fallaci derivanda venit; demum nullus est his methodis addictus, qui species distinctas aut sufficienti numero proponat, unde nova confusio.

Non me lateat interea in hacce nostra methodo, quam Sydenhamianam, aut etiam Platavianam, utpote a *Felice Platavo*, quondam Basilienſi Professore & Archiatro, fere delineatam, rectius appellarem, maximas superesse in detegenda morbi specie difficultates; verum illæ

non methodo sunt tam adscribendæ, quam Medicorum incuriæ, ratione cujus non accuratæ & distinctæ singularum specierum hætenus traditæ sunt descriptiones ex symptomatis petitiæ; novæ siquidem quotidie in praxi occurrunt, quibus tamen simillimas ab aliis observatas esse non dubito, ac in quibus cespitant & hærent, qui earum historiam, definiendi modum, symptomatum connexionem ignorantes in therapeja necessario caligant; atque, quod maxime dolendum est, vix ulli sunt Medici qui eas species, non nisi cum summo ægrorum periculo ab aliis ignoratas, scriptis mandare, & cum aliis communicare curent: si vero illud vigeret inter solertes morborum observatores, quod inter Botanicos, amicum & assiduum commercium, nullus dubito quin Nosologia brevi tempore ad eum perfectionis gradum assurgeret, quo hodierna gloriatur Botanica.





## LECTORI PHILIATRO.

Magnum opus aggredior, cuique exsequendo vires meræ nequaquam suffecerunt sunt. Hujus perficiendi causa *Baglivius* Academiam medicam instituendam esse censebat, hujusque statuta & leges proposuerat. Hujus operis utilitatem, immo necessitatem, antea magnus *Sydenhamus* prædicaverat, sed frustra. Nullos inventos est qui illud negotium in se suscipere voluerit.

Idem est institutum quod triginta abhinc annis juvenili audacia, animo conceperam, de quo sic scribebat summus *Boerhaave*. „Instituto, tum egregium de ordinandis in classes morbis laudo, opus quippe ut laboriosum, ita & utile: acre iudicium, copiam studii Medici summam, sapientiam denique pari cum diligentia conjunctam hercle requirens; ordo, enim vero per placet...“ apposite vero Deum deprecabatur, ut animos vitæque sufficeret, qui tantis par essem.

Ætate provector operis utilitatem eo clarius sentio; verum & difficultas non minor est; mille & octingentæ morborum species, præter quadriagentas affectuum varietates, sunt describendæ, & suis quæque characteribus designandæ cuique apponenda sunt selectiora nomina, genus adscribendum, theoria brevis præstigenda, curatio æquæniens addenda: omo solus huic oneri sustinendo par est.

Unum aut alterum genus traçant *Mortonus* vires, & vitam absumpti; *Trillernus* & *Verna* in altero toti fuerunt. *Lind* Scorbutum, *Astrucius* Syphilidem; alii alia genera elaboraverunt; verum nemo classem qua par est methodo adornavit. Omnes itaque oon perficiendas, sed tantummodo delineandas, in me fumo, ut cuique pateat quot, & quanta sunt quæ in medicina adhuc dum desiderantur, eo hoo ut quique, artis suæ promovendæ cupidus, quæ deficiunt supplere queat.

Quisque Cliticos, quas observat ægritudines individuas, eas io usum suum describat, & ad genus speciemque reducat, omnino necessum est, primis saltem præceps annis, si suo munere recte defungi cupiat. Ut autem id exsequatur necessum est, ut in Auctoribus ejusdem morbi historiam, & characteres investiget, adeoque descriptioni suæ historiam ab his consignatam conserat; quod ita discile est, ut, decem morborum speciebus observatis, vix unam in Auctoribus recte descriptam invenire detur. Ille ergo Auctorem defectus novo labore vindicandus est, & ex multis ejusdem speciei historis individuus speciei character est eruendus.

Ex multis ejusdem morbi individuus relationibus speciei character erui non potest. oisi ab illis historis seponantur quæcumque ad theoriam attineant, & quæcumque mera sunt accidentia ex ægri vel Medici errore oriunda; quod quam arduum sit nemo non videt; immo ur

historiographus hanc speciem ab aliis ejusdem generis distinguat, alias cognoscere opus est, operæ itaque pretium erant ejusdem generis omnes species saltem delineatas exhibere, ut singularum comparatione characteres cuique proprii possent assignari.

Medici qui ignotum morbum curaodum habent, quive ejus eventum, progredicodi modum, mutationesque ipsi ordinarias ignorant, confiteri debeat cum Angelo Hippocrate, *Sydenhamus* se in tenebris inter scopulos versari, ægrumque tamdiu de vita sua periclitari, cum nulla theoria, nullaque sagacitas sufficiat ad illius morbi eventum, & progressum divinandum; is sæpe timebit subitam mutationem, eique totis viribus obstitet, a qua tamen salus ægrotantis dependet; is naturæ conatus salutiferos turbabit, novos & noxios excitabit, & quandam cunctandam sit, aut agendum prorsus ignorabit.

Cum de proprio aut pareosis aut nati corio agitur, nullum est pretium, quo historiis morbi curandi non redimere vellet Medicus, quæ, veluti pixyde nautica, in procelloso præceps mari dirigi possent: quin eoim in morbo paroxysmos, crises, aliasque mutationes historia edoctus prævidet; ille plus prodest etiam nihil agendo, quam qui ignorat multa sine scopo, sine ordine suscipiendo.

Uoica fere in quovis morbo via est qua natura a dato morbo liberare se consuevit, ut in peste per bubonum eruptionem; in violari per pustularam suppurationem; in tritæophya ardenti per diarrhœam biliosam: solus itaque Medicus qui historia hujus speciei instructus novit hanc detetmioatam viam, potest eo versus conatus suos dirigere, viam salubrem naturæ parare; qui vero hac viam igoorat, oon nisi fortuito ipsam prosequetur, & cum ebeoc multis hæc sola tuta sit, periculosam aliam quamcumque verosimiliter insillet, aut motato in his dubiis consilio, naturæ motus contioo perturbabit.

Nihil itaque nostra magis refert quam, ut cujusvis morbi obviis historiis calcemus, cum hujus ignorantia nullis theoriis, nullo studio suppleri possit, & hac ignota æger in certo vitæ discrimine versetur; si enim decem sint modi æque possibiles, quibus datus morbus terminari possit, & unicus tantum ex illis in salutem ducat, hoc ignorato non minus timendum est pro ægri salute, quam si ea ludo alex decidenda venierit, & ex decem casibus æque possibilibus, novem exitum, uoicus salutem allaturus esset.

Ea itaque consideratio debet omnes Medicos ad historiam morborum promovendam incitare, maxime si respiciant ad utilitatem quam ex progressu Medicorum laboribus, & periculis, hujus historiæ solius ope excepturi sint, numerosas quidem habemus pro singulis morbis non solum

solum formulas medicaminum, sed etiam, quod præstat, medendi methodos; verum idem Medicis accidit quod Botanicis; millenæ tribuuntur cuique herbæ à *Plinio*, *Dioscorido*, aliisque Veteribus virtutes, verum ea omnia sunt nobis inutilia, quamdiu de qua herba prædicentur hæc miracula nescimus. Quid autem sit *Plinii* althæa, *Dioscoridis* rhabarbarum, *Homeri* nepenthe, aliæque innumeræ plantæ certe determinare non potuerit eruditus, qui a trecentis retro annis summa contentione, & accurata critica hanc inquisitionem ad bene multa volumina deduxerit, ut *Mathioli*, *Dalechampi*; ita ut, rejecto tam vano labore, nuperi coacti fuerint plantarum descriptiones, characteresque ab integro elaborare, notas & nomina figere, ut, quidquid in futurum de earum virtutibus constiterit, ad ferros nepotes certo transmitti possit.

Idem haud dubie Medicis labor exantlandus incumbit; immensa siquidem quæ prostant de medicaminum virtutibus volumina, in quibus ad hunc, illumve morbum sanandum certa nobis promittuntur auxilia, nobis inutilia prorsus sunt, quia quid intelligant per hunc, vel illum quem nominaverit morbum, hodie nemo potest intelligere; quippe mera sunt morbi ut medicaminis nomina, descriptiones vero nullæ, aut ad summum generice; unde confusa, & consequentis exurgit tantum cognitio.

Frustra nominantur morbi, nisi descriptione fixa determinentur, descriptionis defectu ignoramus hæcne quid sint morbi plurimæ ab *Hippocrate* nuncupati, ut typhus, pachy, avante, phronitis, phœnicie, leuce, hippouris, pherea, quid *Plinii* gemurfa, aliique innumeri; nec descriptio individui morbi sufficit, quippe quæ speciem non definit: ergo nobis incumbit, ut non solum individuos morbos accurate describamus, sed ut ex numerosis individuorum historiis, speciei cuiusque characterem eruamus.

Si nomine proprio non designetur morbus, ejus cognitio obscura est, vel confusa; sic ignoramus sere quid sint morbi ab *Hippocrate* descripti, quibus nullum nomen impoluit, ut morbus *Scitbarum*, quem irata *Venus* Vrania immittit: quid magni splenis; quid morbus niger, morbus rufusque, quos certius cognoscemus, si ad melancholiam, scorbutum, melanciam aliave genera nominibus definitis insignita, eos retulisset.

Ophthalmiz nomine quemcumque oculorum morbum dolore, rubore notatum intellexere Veteres, atque in hoc genere morbi centena diversarum certe virtutum remedia laudaverunt, ut emollientia, detergiva, corrosiva, reperiuntur, exsiccantia, attrahentia, quorum quædam, & quo tempore usus esse debeat prorsus ignoramus; inanis est itaque Veterum labor in recensendis & inquirendis tot remediis, quippe in qua specie, & in quo hujus studio adhibenda sint ignoramus; nec enim sibi quis persuadere poterit in ophthalmia chemosiamque rosarum sufficere, quæ ad ophthalmiam tara-

xim sufficit, nec in ophthalmia syphilitica curanda quidquam profecisset Sloanei collyrium, cuius interventu immensas opes se lucratum esse fatetur Auctor; quid vero boni in ophthalmia interna præstissent millena collyria, quæ retinæ inflammationem non attigissent, aut exacerbassent.

Cum itaque diversæ tantum diversis specibus remedia competant, & pro diversis ejusdem generis speciebus quandoque contraria prorsus sint necessaria, evidens est curationes promiscuas, quæ uni generi adscribuntur, non vero cuique speciei propriæ sunt, esse si non periculosas, saltem inutiles, & multo plus profecisse solum *saint-Yves*, qui cuique ophthalmiæ speciei propria assignavit remedia, quam tota Græcorum, Arabum, & Neotericorum turba, quæ consulem, multiplicemque medellam, non distinctis speciebus, summo labore scriptis consignavit.

Species vero cuiusque generis determinare hoc opus, hic labor est. Multi sunt Auctores qui logices ignari tot genera statuunt, quot species; ut qui idem genus in ophthalmiam, taraxim, chemosim, seu totidem genera dividunt; necnon qui diversorum generum species sub eodem generico nomine reponunt; sic Typhi nomine Medici Cnidii delciperse febrem continuam vulgo malignam dictam, necnon tritæophyam ardentem, rheumatism, diarrhææ, & demum anasaræ speciem, quos idem tanquam ineptæ divisionis Auctores vituperat *Hippocrates*.

Falsa sunt, aut saltem inutilia quæ circa genus morbi traduntur vulgo prognostica & diagnostica signa, quoties ea tantum de una aut altera specie vera sunt; sic si quis de variola in genere proferat quod morbus sit gravis, periculosus, & summa artis magistri caute tractandus, falsa profert, cum variola benigna sine ullo Medici auxilio, ægroque per vicos ambulante sanetur; atque cum eum errorem ferme in omnibus morborum historiis admiserint Auctores exceptis paucis nuperis, non mirum si ars medica nullos per viginti sæcula progressus fecerit, cum Botanica, intra dimidium sæculum a Methodicis exulta; ad scientiæ decus & certitudinem evecta fuit, ac sanctissima simul & facilissima evasit.

Scholastica itaque præjudicia exuant Medici, & consuetudinem ac usum rationis loco non sequantur, abusum longiori usu non confirmetur; theoria etenim, qua duci se patiuntur, cum hæc genus falsa fuerit, & adhuc dum in multis obscura, aut dubia, minime præstare potest eam evidentiam & certitudinem quæ requiritur, ubi de vita & salute hominum mercandum est, & quam ipsa non habet. Theoria quidem utilis est, ut hypothesis in physica, non ad probandam thesam, ut perperam putant quidam Philosophi, sed ad verum indagandum, uti solemus est Geometris, qui ex falsa suppositione ad problematum solutionem perveniunt.

Illusterrimos omniumque hujus ævi sagacissimos experimentatores *D. Haies* fatetur se post millena capta in corpore animalium, experimenta, toties hallucinatum esse, quoties facta providere, & veluti divinare voluit, ita ut theoria & analogia eum, sæpius deciperint, in rebus tamen, ad quas visus & tactus eum dirigebant. Quapropter, quibus hallucinatur Medicus, non consultis experientia, & sola theoria duce, quid fiat in corporis humani penetralibus determinare audent, ipsi phycices, hydrodynamices & logices non raro ignari, atque hypothesis, aut principibus evidentem falsis innixi. Oh! Chymici, Humoristæ, Mechanici toties delusi, numquamne fatebimini cognitionem historicam præcedere debere, & infidam ducem esse theoriæ?

Duplex est, cujusvis morbi character, scilicet *factitius*, & *methodo* cuique proprius; alter vero *descriptivus*, & cuique methodo communis; ex eo quod genus v. g. ileus in doloris eorum topicorum ordine reponatur, ex eo intelligitur illud dolore partis singularis, & fixo stipari; adeoque illud in characterem repere superfluum est, sufficere addere alia duo symptomata, scilicet *stercidam vomitionem*, & *alvi constipationem*, ut ab aliis ejusdem ordinis, scilicet a colica, gastrodynia, &c. distinguatur; & hic est character factitius methodo, arbitrarius dependens: si vero character descriptivus desideretur, ejus historia tradenda est, cujus ope in quacunque classe reponatur, dignosci possit, ut inter evacuatorios, inter abdominales, acutos, humorales, prout cuique similes classes insituere placeat.

Si miles in sua cohorte determinationis vestibus insignita recognosci debeat, solusque sit in ea verbis, grat. crispus aut resimus, ejus character factitius ex crispatura, vel similitate cum insignibus cohortis eruitur; alii si in exercitu confuso, depositis insignibus cuique cohorti propriis, detegendus foret, præter hunc characterem, requireret signaturam, seu characterem descriptivum, quo ab aliis eodem nati virio, aut capillorum eadem crispatura affectis distingui posset; ita in quovis genere, & quaque specie præter characterem factitium classis & ordinis, requiritur descriptio, seu signatura quæ possit ab aliis interosci, & uterque character inter se multis morbis adhuc desideratur.

*Historia* differt a *signatura* in eo, quod 1. historia tradit phenomena morbi eodem ordine, quo in ægrotis adveniunt, per horas in peracutis, per dies in acutis, per menses in chronicis; atque historiam morbi traditurus debet 2. observare ne terminis metaphoricis lectori fucum faciat; 3. ne plus referat quam quod in sensus incurrit, seu quod idem est, ne quod iudicat de causa, principio; interna sede morbi, unquam cum factis confundat, aut commisceat; similis in hoc rusticis qui Medico interroganti quid mali sentiant, suam de ejus

mali causa opinionem in phenomenorum locum obtrudunt, & *ematum*, *stomachi aperturam*, similiaque inania verba inculant, cum deberent tantummodo respondere se aliqua parte dolere, vomere, aut aliud quid expectari.

In signatura vero non eo quod apparatus ordine phenomenorum recensenda sunt, sed eo quod ab aliis congeneribus morbis distingui queant, sic cum in historia ægri ætas, sexus, temperamentum, vidus, vitæ seu artis ratio, medicaminum successus, juvantia & cadentia debent accurate & scrupulose recenseri; in signatura nil eorum referri debet, nisi quod ad eum ab aliis determinandum sufficit; cum autem omnia phenomena possint reduci ad *actiones animæ*, ut sensum, intellectum, cupiditates, voluntates & motus; ad *functiones naturales*, ut respirationem, pulsum; ad *excretiones*, ut alvi defectionem, urinae emissionem; & ad *qualitates*, ut colorem, saporem, figuram, &c. eodem etiam ordine phenomena characteristica recenseri possunt.

In historia morborum desideratur pinax, seu catalogus nominum synonymorum, quibus præcipue Auctores eandem morbi speciem designare cum citatione operis ubi illius descriptio fuit tradita: horum enim Auctorum ope potest quisque Medicus quam observat speciem cum descriptis speciebus conferre, ut similitudinem, aut differentiam, prognosim, atque curam ex illis mutetur, atque ex pluribus simul collectis historiis characterem specificum determinet, optimamque medendi methodum seligat.

Nec inutile foret diversam ejusdem morbi theoriam pro diversitate seclorum considerare, adeoque theoriam Galenicam, Chymicam, Pneumaticam, Mechanicam, Stahlianam invicem componere, quæ sæpe nomine tenus discrepant, verum diversam pro diversis regionibus & seclis medendi methodum examinare, multo utilius esset, quam methodorum specimina passim adiciam.

De nomenclatura generum fere exi in prima parte; quod vero nomina specialia attinet, ea duplices sunt ordinis; alia scilicet *characteristica* sunt, quæ veram speciei definitionem comprehendunt, seu speciei cognoscendæ; & ab aliis distinguendæ sufficiunt, qualia pro viribus in prima classe adhibui, ea minime sunt arbitraria, sed in usu & commercio præ longitudo vix usurpanda; aliæ ad signaturæ morbos necessaria, ut signaturæ ad militem recognoscendum.

Alia vero sunt *trivialis*, quæ brevitate sunt solum commendanda, adeoque in usu loquendi commodissima, ut *apoplexia pinifolia*, *vartha biliosa*, &c. quæ ut plurimum nihil distincti & clari per se denotant, & vel nomen characteristicum, vel descriptionem annexam requirunt; sic apud milites cuique nomen militare tribuitur, ipsi proprium & breve, sed cuius ope, si signatura suppetere, vix decepti possent.

datus miles, quod tamen in ordinario usu necessario usurpandum est. In his vero impondendis regulæ Logicæ severioris vix servari possunt, quia non meliora, sed utiliora simul ac breviora epitheta necessario seligenda sunt.

Verum in stabilendis nominibus characteris eadem regulæ exigant, et nomina: 1. a phænomenis tantum imponentur; 2. ut sine tropis & figuris Rhetorices per verba propria, simpliciter exprimantur; 3. ut numquam ab iis quæ sunt addita, ut sedes interna, causa, principium morbi, repetantur; multo minus a regionibus, ætate, sexu, tempestate deducantur; 4. ut a qualitatibus absolutis, non vero relativis, deriventur: cum enim ea nomina ad morbum detegendum, ejusque speciem determinandam conferre debeant, ea nequaquam debeat cognitum supponere quod inquiritur, nec quidquam referre, nisi quod in ipso ægro phænomenis expressum potest reperiri, nec in ægro videre est utrum apoplexia sit levior altera, vel gravior; utrum colica sit in mesenterio, vel in ileo; utrum sit cholera Indica, vel Europea; utrum morbus sit virgineus, vel morbus puerperæ; cum Europæus eodem, quo gravida, ac reciproce, morbo possit affici: Verbo, nihil in characterē, nec proinde in nomine characteristico potest admitti, nisi quod simplex attentio ad phænomena sensibus obvia potest edocere; & id omne quod imaginando, aut ratiocinando adesse intelligimus, id totum ad theoriam seorsum debet amandari.

Finem faciam motuatis verbis Ill. Gaultii in *Paraboliæ* nuperrime edita sic loquentis: „Ex quibus apparet, non esse, cur despere Medicis fore aliquando, ut ingens morborum humanorum numerus, exemplo ac historiarum naturalium scriptoribus petito, in ordinem systematicum redigatur, qui ab omni hypothesei sectarumque commento liber, sola nixus fidelis observatione, classes, genera, species exhibeat, suis singulari characteribus, certis, manifestis, plenis, interdistincta. Specimina jam duco. Recentioribus edita potius in spem erigunt, teotaminibus multiplicatis haud defuturos successus, remque tanti momenti, ac bonis ideo omnibus exoptatissimam, sic tandem feliter perfectum iri, ut non in nominibus duntaxat morborum invenieodis sese utilem præstet, sed præcipue

facilem ad eruendas curationes viam expediat.“ Hæc Ill. Professor Leydenfis. Huic calculum suum addidit Ill. *Tomas Simon in Adib. Edimburgensibus, Tom. IV. artis. XX.* qui singulorum morborum species, geographice effectodem modo describenda contendit, quo plantas descripsit Botanici.

Nuperrime Ill. Baro van Swieten passim in *Commentariis*, et de *Idero*, de *Mania*, &c., concludit his verbis: „ex hæcous dictis patet, sollicite distinguendas esse varias morborum species, ut singulis idonea medela adhiberi possit, cum illa, quæ huic speciei, sanandæ conducunt in alia ejusdem morbi, specie nocerent.“ Hujus præceptis adhærens *Clar. Preßinger* Medicus *Vienneus* classes morborum capitis juxta nostram ferè methodum elaboravit. Quod autem banc partem feliciter a me fuisse exornatam pater Ill. *Eques Linnæus* Archiater Suecicus, ut refert in suis *Anatomicis Academicis Vol. VI.* quod, inquam, Nosologiam magisficis extollat verbis in suis *Epistolis*, hoc certe tribuo benevolæ ejus animo: cum autem ille vir lo multis, sed maxime in methodis diducandis, præcelsissimus sit, non parum mihi gratulor quod hæc mea methodus ipsi potissimum arripserit.

Huic speciei multas species & aliquot genera, necnon appendicis instar methodum ætiologicam & anatomicam in methodum redactas, addere visum est, ut ope ætiologicæ cuique pater quæ generalis medendi methodus singulis morborum speciebus ejusdem classis conveniat; & anatomica cognoscant tyrones nostram nomenclaturam & diagnosim morborum methodis antiquis congruere posse. Poruissent etiam, more *Calii Aureliani*, non morbos, sed ægros in classes redigere, ut in epilepticos, paralyticos, apoplecticos, hydrophobos, certianarios, quartanarios, &c. nisi obstitisset numerum ægros designantium penuria: hinc cuique clarum fuisset, non de modis quales sunt morbi, sed de substantiis seu objectis morborum, in Nosologia, ut de Plantis in Botanica, quæstionem esse.

Ut uno oculo istu innotescat duratio & periculum cujusque morbi, (de symptomatibus simplicibus hic non agitur,) ad calcem nominis apposuius characteres, qui ea breviter indicant.

A. indicat morbum *acutum*, seu velocem & periculosum:.

B. morbum *brevem*, cito descurum, & sine vitæ periculo:

C. morbum *chronicum*, seu longum & periculosum:

L. morbum *longum*, seu tardigradum sine periculo:

P. morbum per *periodos* recurrentem, aut remittentem, & intermittentem:

D. morbum *dubium*, seu ejus duratio & periculum variant, aut non satis constât: a, b, c, &c. varietates ejusdem speciei significat litteræ Arabes.

Morbi, quotquot observantur, sunt *indivisi*, rigorose loquendo a se invicem dissimiles, ut dissimilia sunt quadantenus omnia e-

jusdem arboris folia; verum tamen practice loquendo quidam invicem similes sunt, ut duæ apoplexiæ serosæ, duæ diarrhææ biliosæ, &c.

& illa individuum similitudo vocatur species sic duæ diarrhæ biliosæ sunt ejusdem species. Species itaque morbi sub se continent tantum morbos individuos. Horum morborum differentia quoad symptomata accidentalia, fortuita, fugacia aut quoad gradum, id est intensitatem majorem minoremve symptomatum, vocatur *varietas*.

*Genus* est similitudo seu convenientia specierum; sic diarrhæa geous est, quippe continet sub se diversas species, ut *foresam*, *biliosam*, *stercorosam*. Demum *classis* est similitudo vel conveioctia georum; sic *febris*, quæ classis est, continet *synochum*, *aphemeram*, *quarta-*

*nam*, &c. & pars classis *genus* dicitur, qui velut exigua classis est.

Errant itaque Philosophi, ut logica & historia naturali peregrini, qui indiscriminatim *classem* vocant quod *genus* est, & *speciem* quod *classis* vel *genus* est. Fateor pro diversa methodo classes & genera mutari; non minus tamen, data methodo quisque definitionibus suis debet adderere, quippe, sine definitionibus huius vocabulorum, nulla potest in doctrinis demonstratio valere, & sine demonstratione nulla datur scientia, quippe scientia est habitus asserta demonstrandi.



# SYNOPSIS CLASSIUM ET ORDINUM.

## CLASSIS I. FEBRES.

Symptomata cutanea levidentia, vel mechanicis Chirurgie auxiliis curanda.

- ORDO I. *MACULÆ*, coloris nativi mutationes.
- ORDO II. *EFFLORESCENTIÆ*, tumores humores, exigui, gregales.
- ORDO III. *ERYMATATA*, tumores humores, solitarii.
- ORDO IV. *EXCRESCENTIÆ*, tumores a solidis adanctis.
- ORDO V. *CYSTIDES*, tumores capsulati fluido repleti.
- ORDO VI. *ECTOPIÆ*, solidarum partium a sua sede dimotiones.
- ORDO VII. *PLAGÆ*, seu continui solutiones.

## CLASSIS II. FEBRES.

Pulsus frequens, fortissime viribus artuum imminutis.

- ORDO I. *CONTINUÆ*, quarum pyrexia semel crescit semelque decrescit in decursu ægritudinis.
- ORDO II. *REMITTENTES*, quarum pyrexia pluries crescit & decrescit in decursu ægritudinis.
- ORDO III. *INTERMITTENTES*, quarum pyrexia pluries accedit & omnino recedit in decursu ægritudinis.

## CLASSIS III. PHLEGMASIE.

Concurrit pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

- ORDO I. *EXANTHEMATICE*, eruptiones cutaneæ cum (a) pyrexia sæpius maligna, quandoque lenta.
- ORDO II. *MEMBRANACEÆ*, viscera membranosa dolent, tumēt cum pyrexia acuta.
- ORDO III. *PARENCHYMATOSÆ*, adest dolor obtusus, calor & tumor in visceribus sordidis, non sacculiformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatus.

## CLASSIS IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis loco motivis, non vitalibus, inservientium.

- ORDO I. *TONICI PARTIALES*, rigiditas & immobilitas artus vel organi determinati.
- ORDO II. *TONICI GENERALES*, rigiditas totius fere corporis.
- ORDO III. *CLONICI PARTIALES*, agitatio coacta, non libera, organi vel artus, ejusve motus vitiosus.
- ORDO IV. *CLONICI GENERALES*, agitatio coacta totius fere corporis, sensibus, sæpe obsecratis.

## CLASSIS V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, musculorum pectoris, unde respiratio difficilis, sine febre acuta.

- ORDO I. *SPASMODICÆ*, insultus fugaces, agitationum pectoris cum expiratione vel inspiratione sonora.
- ORDO II. *OPPRESSIVÆ*, constantes in ipsis paroxysmi pectoris agitationes, æque frequentes ac laboriosæ.

CLAS

(a) *Pyrexia* est calor adanctus cum pulsu solito fortiori aut freq. mensurali.

## CLASSIS VI. DEBILITATES.

Vires solitas in agendo exerendi impotentia. Facultates virium dispensatrices sunt tres ;  
facultas cognoscendi, appetendi & movendi.

ORDO I. *DYSAISTHESIE*, debilitates sensuum, ut visus, tactus, auditus sine sopore.

ORDO II. *ANEPITHYMIE*, debilitas vel abolitio cupiditatum, ut famis, sitis, libidinis, sine sopore.

ORDO III. *DISCYNESIE*, debilitas motuum in organis locomotivis, non in vitalibus.

ORDO IV. *LIPPSYCHIE*, seu morbi syncoptici, debilitates motuum vitalium, adeoque totius corporis.

ORDO V. *COMATA*, seu morbi soporosi, debilitas, omnisque sensus necnon phantasie obscuratio, motuumque liberorum imminutio vel suppressio.

## CLASSIS VII. DOLORES.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles sunt,

ORDO I. *DOLORES VAGI*, qui nomen a sede fixa non habent.

ORDO II. *DOLORES CAPITIS*, ut oculi, oris, cranii, dentium.

ORDO III. *DOLORES THORACIS*, ut lateris, oesophagi, dorsi.

ORDO IV. *DOLORES ABDOMINIS*, ut stomachi, intestini, hepatis, &c.

ORDO V. *DOLORES ARTUUM*, ut ischias, lumbago, &c.

## CLASSIS VIII. VESANIE.

Character est imaginationis, judicii, voluntatis, &c. depravatio.

ORDO I. *HALLUCINATIONES*, errores imaginationis, salvo intellectu, ab organorum externorum vitio.

ORDO II. *DELIRIA*, errores judicii ab imaginationis vitio, quod intellectus corrigere nequit.

ORDO III. *MOROSITATES*, voluntatis & cupiditatis depravatio in appetendo aut averfando.

ORDO IV. *ANOMALIE*, morbi prioribus affines.

## CLASSIS IX. FLUXUS.

Character est ejectio fluidorum aut contentorum, quæ quantitate, qualitate defectu sine notabilis est.

ORDO I. *SANGUIFLUXUS*, ejctiones cruentæ, vel sanguineæ undecumque procedant.

ORDO II. *ALVIFLUXUS*, dejectiones ex ano, vel rejectiones ex oesophago, eorum quæ in primis viis latebant.

ORDO III. *SERIEFLUXUS*, ejctiones urinæ, lymphæ, muci, lacris, puris ex aliis locis quam e primis viis.

ORDO IV. *AERIFLUXUS*, flatuum, vaporum, &c. ejctiones.

## CLASSIS X. CACHESIE.

Coloris, figuræ, molis in corporis habitu depravatio.

ORDO I. *MACIES*, corporis partium mollium extenuatio.

ORDO II. *TUMORES*, corporis generalis intumescencia, seu adactum volumen.

ORDO III. *HYDROPS*, partium quarundam intumescencia a contentis adactis, sæpius fluidis collectis.

ORDO IV. *TUBERA*, partium quarundam intumescencia firmæ.

ORDO V. *IMPETIGENES*, cutanei tumores pustulosi, crustacei, gregales.

ORDO VI. *DECOLORATIONES*, coloris nativi depravationes.

ORDO VII. *ANOMALIE*, continent morbos prioribus affines.

## CLASSIS PRIMÆ SYNOPSIS.

## V I T I A.

CHARACT. Syndromes symptomatum cutaneorum leviores.

## ORDO I. MACULÆ, mutationes coloris nativi.

- I. **L** EUCOMA, *saye*, macula opacans corneam.  
 II. **V**ITILIGO, macula cutem deprimens.  
 III. **E**PHELIS, *resser*, macula cutis corymbosa fusca.  
 IV. **G**UTTA ROSEA, *comperefe*, macula faciei corymbosa rubra.  
 V. **N**ÆVUS, *sein*, macula congenita protuberans.  
 VI. **E**CCHYMOMA, *ecchymose*, macula a sanguine sub cure effuso.

## ORDO II. EFFLORESCENTIÆ, tumores humerales exigui gregales.

- a. **P**USTULA, *puftule*, phyma parvulum apice ruptum.  
 b. **P**ARULA, *bouten*, phyma parvulum desquamari solitum.  
 c. **P**HYLYCTAENA, *philyctene*, vesicula fluido plena.  
 d. **V**ARUS, *bourgeon*, tuberculum durum, constans.  
 VII. **H**ERPES, *dartre*, papularum prorientium corymbus.  
 VIII. **E**PINYCTIS, *philyctenarum atrarum congeries* doleas.  
 IX. **P**SYDRACIA, *porcelaine*, phymata erythematosa.  
 X. **H**IDROA, *échéchoulure*, exanthemata miliaria phlyctænoidea.

## ORDO III. PHYMATA, tumores humerales solitarii.

- XI. **E**RYTHEMA, *érythème*, phyma rubrum, calens, diffusum.  
 XII. **O**EDEMA, *œdème*, phyma album, indolens, molle.  
 XIII. **E**MPHYSEMA, *emphyème*, phyma pallidum, elasticum.  
 XIV. **S**CIRRHUS, *scirrhe*, phyma durum, indolens, cuti concolor.  
 XV. **P**HLEGMONE, *phlegmon*, phyma rubrum, calidum, sphaeroideum, pulsans.  
 XVI. **B**UBO, *buben*, phyma scirrhus-phlegmonodeum in glandula.  
 XVII. **P**AROTIS, *parotide*, bubo juxta aurem.  
 XVIII. **F**URUNCULUS, *furoncle*, phyma subdorum, inflammatum, prominens.  
 XIX. **A**NTHRAX, *charbon*, phyma apice gangrenosum, ambitu inflammatum.  
 XX. **C**ANCER, *cancer*, phyma scirrhus, lacinians.  
 XXI. **P**ARONYCHIA, *panaris*, phlegmone extremi digiti.  
 XXII. **P**HIMOSIS, *phimosis*, phlegmone præputii.

## ORDO IV. EXCRESCENTIÆ, tumores a solidis adanstit.

- XXIII. **S**ARCOMA, *sarcome*, excrecencia carnea.  
 XXIV. **C**ONDYLOMA, *condyème*, excrecencia cutanea, tendineave.  
 XXV. **V**ERRUCA, *verru*, excrecencia cutanea globosa.  
 XXVI. **P**TERYGIUM, *onglet*, excrecencia plana in oculi cantho.  
 XXVII. **H**ORDEOLUM, *orgeolet*, excrecencia varo similis ad tarsos palpebræ.  
 XXVIII. **B**RONCHOCELE, *goutte*, excrecencia gutturis.  
 XXIX. **E**XOSTOSIS, *exostose*, excrecencia ossis inhar dura.  
 XXX. **G**IBBOSITAS, *bosse*, protuberantia ossium thoracis.  
 XXXI. **L**ORDOSIS, protuberantia ab ossibus artuum inflexis.

## ORDO V. CYSTITES, tumores capsulati fluido repleti.

- XXXII. **A**NEURYSMA, *aneurysme*, cystis arteriosa.  
 XXXIII. **V**ARIX, *varice*, cystis venosa.  
 XXXIV. **H**YDATIS, *hydatis*, cystis lymphæ ductum.  
 XXXV. **M**ARISCA, *hémorrhoids*, tumor sanguine turgens, in margine podicis, isque pertinax.  
 XXXVI. **S**TAPHYLOMA, *staphylome*, cystis corneæ, vel corneam perforans.  
 XXXVII. **L**UPIA, *lemp*, cystis in articulis spisso fluido plena.

XXXVIII.



- XXXVIII. HYDARTHURUS, *tumor blaneus*, cystis articuli aquosa.  
 XXXIX. APOSTEMA, *apostème*, cystis purulenta.  
 XL. EXOMPHALUS, *exomphale*, cystis umbilicalis sæpius aquosa.  
 XLI. OSCHEOCELE, *fausse hernie*, cystis in scroto.

ORDO VI. ECTOPIÆ, *parvum solidum a sua sede dimotum sensibus evis*.

- XLII. EXOPHTHALMIA, *chôte de l'oeil*, ectopia oculi.  
 XLIII. BLEPHAROPTOSIS, *trailement*, ectopia palpebræ.  
 XLIV. HYPOSTAPHYLE, *chôte de la lèvre*, ectopia uvulæ.  
 XLV. PARACLOSSE, *chôte de la langue*, ectopia linguæ.  
 XLVI. PROPTOMA, *ectopia appendicis externæ*, ut labii, scroti, auriculæ.  
 XLVII. EXANIA, *chôte de l'anus*, prolapsus ani.  
 XLVIII. EXNCYSTES, *chôte de vessie*, prolapsus vesicæ urinariæ.  
 XLIX. HYSTEROPTOSIS, *chôte de matrice*, prolapsus uteri.  
 L. ENTEROCELE, *enterocèle*, hernia intestini.  
 LI. EPILOCELE, *epilocèle*, hernia epiploï.  
 LII. GASTROCELE, *gastricèle*, hernia stomachi.  
 LIII. HEPATOCELE, *hépatocèle*, hernia hepatis.  
 LIV. SPLENOCELE, *splénocèle*, hernia lienis.  
 LV. HYSTEROCELE, *hystérocele*, hernia uteri.  
 LVI. CYSTOCELE, *cystocèle*, hernia vesicæ.  
 LVII. ENCEPHALOCÉLE, *encéphalocèle*, hernia cerebri.  
 LVIII. HYSTEROLOXIA, *obliquité de la matrice*, uteri obliquitas.  
 LIX. PARORCHIDIUM, *ectopia testiculi*.  
 LX. EXARTREMA, *luxation*, osium mobilium luxatio.  
 LXI. DIASTASIS, *diastase*, osium mobilium recessus.  
 LXII. LOXARTHURUS, *osium mobilium obliquitas respectiva citra spatium & exarthema*.

ORDO VII. PLAGÆ, *continui solutiones, vitia dialytica III. Linnæi*.

- LXIII. VULNUS, *hessura*, continui solutio, hians, cruenta.  
 LXIV. PUNCTURA, *piquure*, continui solutio intus tantum extensa.  
 LXV. EXCORIATIO, *excorchure*, cuticulæ vel cutis a carnibus subiectis separatio.  
 LXVI. CONTUSIO, *mourtrissure*, partis carnosæ in minimis punctis attritio.  
 LXVII. FLACTURA, *fracture*, divisio osium in fragmenta separabilia.  
 LXVIII. FISSURA, *fêlure*, osium divisio rimam referens.  
 LXIX. RUPTURA, *rupture*, ligamentorum, tendinumve ab ossibus divulsio.  
 LXX. AMPUTATURA, *coupure*, partis excisio totalive articuli detruncatio.  
 LXXI. ULCUS, *ulcère*, partium mollium erosio purulenta, cute profundior, patulo fundo, pure vitioso.  
 LXXII. EXULCERATIO, differt ab ulcere ut excoriatio a vulnere.  
 LXXIII. SINUS, *sinus*, emissarium abscessus del apostematis orificium.  
 LXXIV. FISTULA, *sigule*, ulcus sinuosum, intus callosum, fundo sæpe carioso.  
 LXXV. RHAGAS, *gorgure*, solutio continui sicca in marginibus partium.  
 LXXVI. ESCARA, *escare*, crusta mortua vi causticorum sæpius facta.  
 LXXVII. CARIES, *caries*, ossis erosio cava vel aspera, peristio exfoliato denudata.  
 LXXVIII. ARTHROCAE LINNÆI, *ulcus medullæ cum ossis carie*.

His nominibus vitia tantum conspicua intelligenda volumus: si enim ea intus lateant, ut nlcus pulmonis, cerebri, hepatis, caries costarum, exulteratio intestinorum, &c. ea inter morbos quorum principia sunt inquirenda veniunt: sic ulcus pulmonis ad phthisin, ejus vulnus latens ad hæmoptylum, ar-

thorace ossis latens ad osciopum &c. pertinent. Medici in morborum diagnosi sunt primo sensuales artifices, seu sensu & phænomenis duci se patiuntur, licet deinceps vi intellectus abditas earum causas inquirere debeant, nisi velint in Empyricorum turba delin-

## CLASSIS PRIMÆ THEORIA.

## VITIA SEU

## AFFECTUS SUPERFICIARII.

Sunt vitia conspicua in partibus externis corporis, seu pravæ partium conspicuarum dispositiones, ex quibus magis læduntur qualitates, ut figura, color, quam ipsarum functiones; unde minus nocent sanitati & robori quam pulchritudini & integritati, ut cum antiquis has quatuor valetudinis conditiones distinguam.

Distinguuntur a morbis sequentium classium, quia sunt syndromes symptomatum vix intensitate aut extensione notabilium; si quis tamen maluerit hos inter morbos ordinare, & maculas ad cachecticos decolores, efflorescentias ad inflammatorios exanthematicos, vel cachecticos leprosos, aliosque ad alias classes referre, non repugnabo.

Ex his autem intellectus facilius sunt cæterorum morborum theoria, quippe affectus isti sunt veluti illorum elementa, & cum a simplicibus ad composita progrediendum sit, a vitiis istis corporeis exordium duxi.

Ista vitia sunt 1. vulnera, 2. ulcera, 3. maculæ, 4. exanthemata, 5. phymata, 6. excrecentiæ, 7. cystides, 8. prociidentia, seu ectopizæ.

De duobus prioribus actum est in pathologia, & quoties in morbos a vulnere, ulcere, contusione ortos indicemus, toties eas species *Traumaticas* nuncupabimus: sic apoplexia traumatica dicitur species ea quæ a cranii fractura, commotione, vulnere, contusione, &c. capitis ortum ducit, ut eas distinguamus ab speciebus *sponsaneis*, id est, quæ a principio interno sine causa evidenti, vel principio mechanico procedunt.

Cæteri affectus superficialii vulgo dicti *morbi chirurgici* non ita evidenter sunt originis, adeoque theoriæ magis lucidatæ expolulant, maxime quia multo pluribus morbis interius occasione præbent; adeoque theoriæ non solum phymatis, excrecentiis, sed & morbis inflammatoriis cachecticisq. applicandam hic in antecessum tradere necessarium iudico.

1. Tumor, Græcis *oncos*, est quidquid præter naturam crescit in humano corpore, *Galenus* definiente; juxta Neotericos est præternaturalis elevatio partis: is vulgo dividitur in calidum & frigidum: adscribitur humoris ejusdem hærentiæ tamquam causæ, cui hærentiæ causam præbent res non naturales dictæ, &c. Verum has definitiones ingrediuntur vocabula a nemine hæcenus recte definita, & admodum obscura, a quibus abstinemus; ut autem de tumoribus dilucide agamus, præmittenda sunt more *Alphonfi Borelli* quædam seminata lucem huic theoriæ temperatura.

2. Volumen corporis humani sani crescit in dies ab ortu usque ad vigesimum quintum circiter ætatis annum cum notabili altitudinis augmento; ætate vero provectiori, ut circa quinquagesimum, aut sexagesimum, augeri consuevit in latum & profundum sub eadem altitudine; nec non singulis diebus, horis matutinis, aliquot lineis crescit altitudo, quæ tantamdem vespertinis decrescit.

3. Volumen quarundam partium corporis humani crescit præ aliis determinata ætate, hora, &c. ætate fertili abdomen gravidis, mammae puerperis, hora pectus epigastrium saturis, hypogastrium vesicæ & alvum exoneraturis, increfcunt.

4. Sanitas, ex physiologia, facultas est omnes omnino functiones, quæ ætate, sexui, temperamento, temporis conveniunt, jucunde, constanter, & facile exercendi; exercentur autem ille functiones per partes corporis tamquam instrumenta, quorum moles, situs & figura ita concinne a Sapientissimo Numine sunt ordinata, ut ad fines plures simul & optimos obtinendos mirifice concurrant.

5. Si itaque aberrant moles, situs, vel figura partium a regula, quod nostra culpa aut pœna evenit, non mirum est si imperfecta exinde evadat machina, seu si iidem functionibus dato tempore & ordine exercendis impar evadat; ut in machina aut statua omnium perfectissima, nil immutari potest, quin perfectio vitietur; ita ut humana machina (quæ si perfecta fuerit & animata *sana* dicitur) nulla sitis, molis, figuræ mutatio fieri potest, quin imperfecta evadat ejus status, seu fiat *agrinde*.

6. Moles partium & ipsius corporis variat admodum intra sanitatis limites; patet molem recens nati cum adulti mole conferendo; nec enim solius corporis mire discrepat magnitudo in diversis ætatibus, verum etiam non eadem ratione excrefcunt diversæ ejus partes: datur tamen, si non absoluta, saltem relativa partium sibi invicem comparatarum magnitudo constans, aut *sanitatis conveniens proportio*, a qua si partes aberraverint, morbosam molem habere dicuntur. His positis,

7. *Protuberantia* est partis magnitudo adacta ultra quam exigit sanitas conveniens proportio.

8. *Protuberantia* dicitur *absoluta*, si alterius partis moles augeatur, dum cæterarum magnitudo eadem perstat. *Relativa* vero vocatur, si datæ partis volumen idem perseveret, dum in aliis omnibus imminuitur. Sic macilentis ossium juncturæ, scapulæ, claviculæ protuberant.

9. SCHOLIUM I. Omnis protuberantia non est molis augmentum: moles enim est ut quantitatis materiæ in parte; verum protuberat pars etiam si tantum eadem materies majus spatium occupet, ut in meteorismo, tympanite: ergo omnis protuberantia non est molis augmentum.

10. SCHOL.

10. SCHOLIUM II. Si liquida, solidave ex uno loco in alterum transferantur, crescit quidem moles partis recipientis; alii quoniam illud incrementum fit cum alterius dispendio, totius corporis moles non crescit, fecus totum corporis pondus augetur; ergo omnis protuberantia non supponit molem corporis auctam.

11. SCHOLIUM III. De visceris singularis tumore, nequaquam certo ex sensu tactus judicare possumus; nam ut certum foret iudicium, deberet prius esse perfectum & nativum huius visceris volumen, & huius incrementum; sed ambo nos latent ut plurimum; ergo anceps est de tumore viscerum iudicium ex tactu petendum. Pro exemplo sumatur lien: cum intumefactum censemus tum elevatione regionis abdominalis quæ ipsi respondet, tum ex ejus percepta inter contectandum resistentia. Verum non certo constat quantum sit in vivo homine lienis volumen, imo super tantum innotuit illud post partum non idem esse quam ante partum; nec ex resistentia regionis illius abdominalis ad lienis tumorem valet consequentia, cum indurari possit viscus & simul pristinum volumen servare; immo mole minui: ut induratur lens crystallina, & simul decrescit, arefcunt partes tabidæ & minuuntur.

12. Protuberat pars omnis vel aucto volumine; vel aucta mole, vel figura mutata, vel mutato partis situ.

13. Volumen dicitur auctum, si spatium a parte occupatum majus evadat, non aucto partis pondere: huius protuberantiae exempla præbent emphysema a rarefacto aere, pneumatocoele, tympanitis & meteorismus.

14. Mole dicitur aucta, si pondus partis increseat; quod duplici modo fieri potest, vel aucto simul volumine, vel crescente partis densitate, & eodem volumine persistente; sed iste ultimus casus est tantum possibilis, prior vero vulgarissimus. Talis est protuberantia a fluidis vel solidis in parte aggestis, ut in scirrhis, cedemate, phlegmone, hernia, farcomate.

15. Figura mutata protuberantias non raro producit, ut in gibbis, quorum sternum, costæ, vertebrae extorsum flectuntur; rachiticis, quorum ossa vel intorta, vel spina ventosa affecta & intus cariosa in extremis incurvantur.

16. Situs denique partium mutatur quandoque tumores effingit, ut in ossium luxatione, fractura, viscerum, musculorum prolapsu, distortionem.

17. Tumores vocantur illæ partium protuberantiae, quæ a fluidis intra vasa inconspicua dilatata congestis producuntur, tales sunt phlegmone, erysipelas, scirrhus, cedema, emphysema, &c.

18. Cystides vel tumores saccati illæ sunt protuberantiae quæ sunt a fluidis intra vasa sensibilibus diducta, vel intra conceptacula quævis sensibilia, diductione, ruptione, vel erosionem facta, cumulatæ, ut aneurysma, varix, abscessus, hydrocele, phlyctæna.

19. Extrinsecus sunt illæ partium protube-

rantiae quæ a fluidis in partes solidas, carneas, ossificas conversis producuntur, ut verruca, farcoma, exsoliosis.

20. *Loræ* sive demum sunt ceteræ protuberantiae, quæ a partium solidarum e sua sede dimotione dependent, sive mutata tantum figura, sive mutato situ.

Cum autem de tumoribus tantum agere ferat animus, præmittendæ sunt propositiones, quibus intellectus, horum theoria in conspectum se prodit.

1. Omnes corporis partes organicae molis, voluminis, situs, & figurae sunt mutationi resistentæ.

2. Partem in anatomia vocamus organum illud, quod ita toti coheret, ut tamen ratione figurae & usus a contiguis diversum videatur; sic digitus est pars manus, unguis pars digiti. Particula vero dicitur portio organi a ceteris situ tantum aut loco distincta, ut particula unguis, tendinis.

3. Quidem omnis materia gaudet vi inertiae, & tandiu perseverat in suo statu, quamdiu a viribus applicatis non cogitur statum suum mutare ex lege universi, quam *Newtonus* tradidit; ergo & materia corporis humani seu pars quælibet.

4. Ut moles vel volumen partis mutetur, debent partes solidæ, fluidæque ex loco in locum transferri: verum & illæ partes priori loco adherent per fibras continuas, quæ sine violentia non possunt elongari, rumpi, inflecti; vel loca vicina, in quæ transferuntur, plena sunt aliis partibus, quæ resistent suæ expulsiõni, dimotioni, ut docet anatome; ergo moles & volumen partis mutari non potest, quin vires his resistentiis majores adhibeantur, quia proinde proportionalis superetur resistentia.

5. Fluida omnia corporis humani viscosa sunt, & eo magis resistent motui, quo majores in tubis vehentibus affrictus patiuntur; sed affrictus in minimis potissimum vasis sunt maximi; ut patet ex bulla aeris, aut aquæ intra tubum capillarem adacta, quæ vi status vix potest epici: cum autem ad tumores proprie dictos fluida e loco in locum per minima vasa transferri debeant, simulque intra vasa plena non possunt urgeri quin superent viscerum eorum rixum, & contrahitatem nativam, evidens est non exiguum hinc & inde superandum esse resistentiam: verum si partes solidæ organicae essent sint inflectendæ, vel rumpeandæ ad hoc ut novam figuram, vel novum adipscentur situm, resistentia superanda adhuc major est; ergo patet partes organicas corporis nostri resistere omni figuræ, situs & molis mutationi.

21. SCHOLIUM. Duæ sunt partibus nostris vires resistentes, scilicet vis quæ fibræ nostræ suæ elongationi resistent, & in sui contractionem nituntur, quæ vis *elasticitas* vel contractilitas dicitur; altera est vis quæ dilatationi suæ rationi resistunt, & *tenacitas* vocatur. Vires illas diversæ generis esse docet observatio, quæ constat carnes animalium, fascicellorum potissimum annosarum, esse parum elasticas, seu facile elongari, & tamen esse tenacissimas, ita ut carnes; ovillæ

ovillæ a vervecinis ea ratione distinguui possint: ita & coria licet flaccida & mollia vix elastica multum tenacitatis habent; e contra vero ligna viridia, quæ facile frangi possunt; non ita facile possunt elongari; vitrum admodum elasticum est, tamen fragile, ergo diversa est elasticitas a tenacitate.

24. Utraque vis si cetera sint paria, est in partibus ejusdem diametri ut quadrata diameterum, vel ut numerus fibrarum, adeoque resistentia utraque crescit in partibus prout sunt crassiores.

25. SCHOLIUM I. Tenacitas absoluta partium corporis humani diversa est pro temperamento, ætate, sexu; major in adultis & annosis, ut ex usu culinariorum est, minor in junioribus faginat, delicatè nutritis, non multum exercitatis. Cutis, ligamenta, tendines, membranae majori tenacitate gaudent quam ceteræ partes molles: mollissimæ & tenerissimæ partes sunt cerebrum, cerebellum, medulla spinalis, lien: mollis, sed tenax est pulmo, vesica: firma & tenax arteria, intestinum, uterus, renes; durum, sed fragile pancreas, hepar.

26. SCHOLIUM II. Loramentum cutis humanæ, viginti quatuor post mortem horis resedit, longitudinali, unius lineæ quadratæ sectionem habens, sustinet citra ruptionem plures quam ducentas libras, ut expertus sum.

Tenacitas ventriculi humani non excedit libras 30. ex meis & Halesianis experimentis, aut tenacitas arteriarum eam maximam.

In pede vituli, cujus circumferentia erat 4. pollicum, si ponamus crassitiem periolei unius semi-lineæ æqualem, sectio transversa totius periolei erat 12. linearum; illa autem juxta experimentum 22. *D. Hales dans l'Hémaphysique*, sustinuit ante ruptionem 431. libras, & symphysis fosa perioleo nudata sustinuit tantum 129. libras, licet symphysis haberet sectionem æqualem 182. lineis: ergo tenacitas symphysis est 3. 6. vicibus minor tenacitate cutis.

27. Resistentia fibrarum viribus distrahentibus sunt in ratione simpla densitatis earum.

28. Partes eo densiores sunt, quo intra datum spatium plures fibræ ejusdem generis obtinent; sic caro musculi minus est densa ejus tendine, quanto pauciores in eadem transversa sectione fibræ longitudinales obtinet quam ipse tendo. Docet autem experientia quod multo minori vi rumpitur fasciculus carnis muscularis, quam fasciculus tendineus ejusdem diametri, prout plures in tendine secandæ sunt fibræ quam in pari fasciculo carneo.

29. Eandem vero esse ventris totius musculi tenacitatem quam sui tendinis docet experientia, quæ constat non facilius dirumpi musculos in ventre quam in tendine, quippe cum idem sit hinc & inde fibrarum tenacium numerus.

30. Flexilitas & ductilitas fibrarum æstimatur ex quantitate elongationis quam patiuntur di recte, & ex intensitate potentie ipsas distrahentis inverse; adeoque carnes, tendines eo mi-

norem habent contractilitatem, quo ab iisdem viribus magis intra datum tempus se elongari patiuntur.

31. Contractilitas partium nostrarum est in ratione inversa earum longitudinis.

32. Etenim docet experientia ab iisdem ponderibus appensus capillos, chordas fidium, loramenta cutis eo magis elongari, quo majorem obtinent nativam longitudinem, adeoque ad majorem sagittam earum arcus inflecti a ponderibus, vel viribus inflectentibus; verum quo magis se ab iisdem viribus diuici patiuntur chordæ, eo minus contractiles sunt: ergo contractilitas partium est in ratione inversa nativæ longitudinis.

33. Sic si capillum humanum pedis longitudine, pondere unius uncie elongemus ad lineas duas, eodem pondere duplo brevior capillus una tantum linea elongabitur.

34. Contractilitas partium corporis humani est ut earum tensio.

35. Illa propositio verissima est, licet in scholis continuo contradicendum patiat: si enim loramentum cutis humanæ diversis & successive majoribus ponderibus distrahatur, docet observatio quod cum nativa majorem adeptæ est tensionem, tunc quo magis elongatur & tenditur, eo major vis requiratur ut ulterius elongetur, seu quod eodem recidit, eo magis nitatur ad sui contractionem: sed nifus in contractionem est contractilitas seu elasticitas; ergo contractilitas partium corporis humani est ut earum tensio.

36. Vulgo obijciunt scholastici fibræ sic distensas suam tonum amittere, & tamen eas adhuc tensas supponunt, quod est contradicendum: statim enim atque fibræ suum tonum amittit, eandem laxatur, vel rumpitur; utrobique vero jam nulla est vel saltem non eadem tensio, adeoque non minus verum est quod contractilitas fibrarum tandiu crescat, quandiu crescit earum tensio.

37. Experimentum. In recenti cadavere mensuravi loramentum cutis tres pollices longum longitudinale, axi brachii parallelum; illos tres pollices totidem lineis nigris distincti, dein loramentum dissecui & a cute separavi; hoc loramentum separatim decurtatum est sponte, & habuit tantum duos pollices, sed cum proprio pendere traheretur, pendulum scilicet, longitudo fuit 3. linearum. Hinc sequitur vim contractilem in cadavere eam esse, ut una tertia longitudinis nativæ parte cutis loramentum decurtare possit.

38. Experimentum. In alio cadavere, similibus cum cautelis, sumpsi tria loramenta æqualis latitudinis & ejusdem in corpore directionis quæ erant ante excisionem inter se 99. lin. 46. lin. & post excisionem inventa sunt 7. 29. 33. 6. 35. 6.

Hinc sequitur, ut patebit attendenti, decurtationes loramentorum ejusdem latitudinis essentialiter longitudinalibus proportionales.

39. Hinc sequitur etiam contractilitates cutium

In diversis cadaveribus esse diversas. Nam in primo cadavere contractio ad longitudinem erat, ut 2 ad 3: in hoc vero casu, ut 3 ad 10: sed ut 1 ad 3: sed fatendum est in tam delicatis mensuris errorem semi-lineæ facile obrepere posse.

40. Experimentum. Loramentum 36 lineas lon-

41. Pondera appensa. Productiones in lineis decimalib.

1.	4.
2.	7.
3.	9.
4.	10.
5.	11.
6.	13.
7.	15.
8.	17.
9.	19.
10.	19.

42. Hoc loramentum appenso pondere 134. drachmarum extensum est supra tres pollices una tantum duodecima. suæ nativæ longitudinis parte.

43. Primis ponderibus elongationes erant multo majores, quam cum majorem tensionem adeptum erat loramentum; cum primo pondere, quod erat 633. 3 granorum, extensum fuerit quatuor decimalibus partibus unius lineæ, a decuplo vero pondere non 40 decimalibus, sed tantum circiter 19 vel 20 harumque partium excreverit, adeoque duplo minus elongatum fuerit, & a pondere vigecuplo non 80, sed tantum 28 partibus, adeoque triplo fere minus excreverit.

44. Elongationes loramentorum cutis humanæ crescunt quidem a viribus ea distrahentibus, sed in minori ratione, quam ponderum, seu virium distrahentium, ita ut extensio duplo major exigat vim decies majorem, & elongatio septies major exigat vim vigesies majorem.

45. Experimentum. Capillos humanos & crines equinos appensis ponderibus affixi tabule verticali, & elapso aliquo tempore vidi eos una 25, sui parte sensim elongatos fuisse, & sic quiescere, quamdiu thermometer & barometrum quiescebat; sed accedente humiditate & calore elongabantur, accedente siccitate aeris & frigore decurtabantur iterum.

46. Ex hoc experimento aliquoties repetito sequitur fibras semel data vi distensas, sponte successu temporis laxari; fibræ enim, quæ appenso eodem pondere longiores deinde evadunt, tantumdem laxiores fiunt.

47. Sequitur etiam ab aere calido & humido laxari fibras simplices animalium, non in tortas, & a frigido ac siccato decurtari.

48. Unde patet ratio, cur successu temporis phlegmonum dolor sponte minuat, etiam non mutata tempestate, laxatis scilicet fibris.

49. Sequitur etiam cur dolores partium tenarum a frigore & siccitate intenduntur, foemina vero calidis & humidis leniantur.

gum, sed ab excisione ad duos pollices decurtatum, appensis ponderibus in pristinam 36 lineæ longitudinem deduxi; dein vero pondera æqualibus temporum intervallis, illi appendi, & productiones creverunt juxta tabulam sequentem: loramentum erat semi-pollicem latum ex cute humana desumptum.

Pondera appensa. Productiones in lineis decimalib.

11.	20.
12.	21.
13.	23.
14.	24.
15.	25.
16.	26.
17.	27.
18.	27.
19.	27.
20.	28.

50. Circa actionem medicaminum in fibris laxandis vel distrahendis summam attentionem merentur egregia Illustr. Brian Robison experimenta in tractatu de animalium Oeconomia, quæ cum non repetierim, hic recensere supersedeo.

51. Experimentum. Sumpsi arteriam carotidem canis recens jugulati, & ante excisionem mensuravi in ipsius longitudine 27.7 lineas; ea resecta habuit 12 lineas: dein illius extrema machinæ applicata longitudinaliter traxi, usquequo in medio transversum rumpereur arteria. Sed paulo antequam rumpeatur illa habuit longitudinem duplam seu 55. linearum. Idem bis repeti in arteriis & in venis.

52. COROLLARIUM. Antequam arteria, sensim distrahendo intra aliquot temporis minuta, rumpi queat, illi vis tanta applicanda est quanta ad ejus longitudinem duplicandam requiritur, quæ certe vis est maxima, sed non facile determinanda. Conferantur experimenta (26.).

53. Sequitur etiam arteriæ diductionem citra rupturam eam fieri posse intra breve tempus quæ sectionem nativæ quadruplam acquirit, quandoquidem fibræ circulares, ut expertus sum, distrahendo possunt duplo longiores reddere antequam rumpantur.

54. Cutis & arteria carotis simill experimento exposita sunt. Habebant autem ante extensionem in cadavere scilicet tres pollices a tramento distinctos. Extensæ habuerunt 6. pollices & statim ruptæ sunt; singula fragmenta ita decurtata sunt illico, ut simul sumpta tres tantum pollices haberent, quod ante experimentum non credidisset.

55. Non inde sequitur fibrarum & vasorum, elasticitatem permanere post distractiones omnium maximas, nisi temporis ad distrahendum impensio ratio habeatur; certum quippe est quod si tamdiu perseveret tractio ut succus nutritius appellens possit vascula fibrarum a distractione relicta replere, tunc fibra laxatur, & in contr-

tractionem minus nititur, ut patet ex antiquorum aneurysmatum incisione.

56. *Experimentum.* Aequalia vulnera eodem instrumento infixa cadaveri recenti, & animali viventi, verum alia transversim, alia vero longitudinaliter, seu secundum artuum directionem, & observavi illico labia vulneris a se invicem recedere, statim velocius, deinceps usque ad aequilibrium; hiatus autem vulneris longitudinalis fuit ad hiatum transversalis ut 5. ad 12.

57. *COROLLARIUM.* Hiant vulnera pro ratione tensionis fibrarum resectarum, adeoque tensionem fibrarum cutis longitudinalium est ad tensionem transversarum ut 12. ad 5. plus quam duplo major. In arteriis semel observavi tensiones esse aequales in fibris transversis ac in longitudinalibus.

58. *Experimentum.* In cane denudavi hinc & inde musciculum cruris quo tibia extenditur, &

arteria resecta

vena

nervus

61. In cadavere hominis aëticuli pedibus oedematosis & a novena diebus mortui, idem experimentum in crure & in brachio institui, in ambobus mensuravi 6 pollices.

Habuit vero altera resecta

vena

nervus

62. Sequitur ex primo experimento in vivis arteriarum tensionem esse ad tensionem nervi ut

Tensionem arteriarum, ad tensionem venarum ut

Venarum tensionem ad tensionem nervi ut

63. Sequitur ex altero experimento quod arteriarum tensio ad tensionem nervi sit in cadavere ut

Venarum tensio ad tensionem nervi ut

Arteriarum tensio ad tensionem venarum ut

64. *COROLLARIUM.* In hoc cadavere nervus non minorem habuit potestatem elascitatem ac in cane vivo.

65. *COROLLARIUM.* Arteriarum & venarum in cadaveribus antiquis multo magis relaxantur propter tunicam earum muscularem: musculi vix in antiquis cadaveribus habent duodecimam elascitatis nativae partem.

66. *SCHOLIUM I.* Si vulnus infligator plantarum pedum rusticorum, quae scilicet valde est dura & callosa, nullus observatur hiatus; vix ullus, si vulnus infligatorum cruribus dudum oedematosis, in quo etiam casu cutis intorsum flectitur & subfidit, sero scilicet, quod eam sustinebat, ex adiposis cellulis elapso.

67. *SCHOLIUM II.* Vulnus carnis insitum relinquit hiatum cuneiformem in cute latiore, intus continuo strictiorem, & labia vulneris in curvam inflectuntur.

68. Si carotis vel locamentum cutis ejusdem ubique latitudinis harpaginibus hinc & inde firmiter compressum elongetur, margines cito parallelismum suum amittunt, & in medio longitudinalis multo minus distant quam in extremis, seu margines in arcum intorsum curvantur. Aortae truncum, sic distractum, duplo angustius evasit in medio quam in suis extremis paulo saetquam rumpetur; hujus phaenomeni ra-

tionem vivo animalis surcipibus secui; dectatus est una tertia sui parte; longitudinem vero, adaequis intra tendines ad aequalem distantiam aciculis, determinaveram; tentavi idem in altero musculo post mortem animalis, seu hora integra post cessationem motus cordis, & eadem fuit omnino retractio.

59. Errant itaque illi qui defectum elascitatis incusant statim atque animal expiravit, quod non consulta experientia, & ut opinio nem suam jure tueantur, temere pronunciant.

60. *Experimentum Alexandri Steward.* quod multis ante eum annis institueram in Amphitheatro D. Davisard: in cane vivo dissectui arteriam, venam, nervumque comitem in collo, & alias in crure, atque eorum fasciculum filo hinc & inde constrinxi; distantia inter ligaturas fuit 27. lineas; horum fasciculum transversim secui, habuit vero

12. lin.

13. 3.

24. 5.

61. In cadavere hominis aëticuli pedibus oedematosis & a novena diebus mortui, idem experimentum in crure & in brachio institui, in ambobus mensuravi 6 pollices.

Habuit vero altera resecta

vena

nervus

62. Sequitur ex primo experimento in vivis arteriarum tensionem esse ad tensionem nervi ut

Tensionem arteriarum, ad tensionem venarum ut

Venarum tensionem ad tensionem nervi ut

63. Sequitur ex altero experimento quod arteriarum tensio ad tensionem nervi sit in cadavere ut

Venarum tensio ad tensionem nervi ut

Arteriarum tensio ad tensionem venarum ut

64. *COROLLARIUM.* In hoc cadavere nervus non minorem habuit potestatem elascitatem ac in cane vivo.

65. *COROLLARIUM.* Arteriarum & venarum in cadaveribus antiquis multo magis relaxantur propter tunicam earum muscularem: musculi vix in antiquis cadaveribus habent duodecimam elascitatis nativae partem.

66. *SCHOLIUM I.* Si vulnus infligator plantarum pedum rusticorum, quae scilicet valde est dura & callosa, nullus observatur hiatus; vix ullus, si vulnus infligatorum cruribus dudum oedematosis, in quo etiam casu cutis intorsum flectitur & subfidit, sero scilicet, quod eam sustinebat, ex adiposis cellulis elapso.

67. *SCHOLIUM II.* Vulnus carnis insitum relinquit hiatum cuneiformem in cute latiore, intus continuo strictiorem, & labia vulneris in curvam inflectuntur.

68. Si carotis vel locamentum cutis ejusdem ubique latitudinis harpaginibus hinc & inde firmiter compressum elongetur, margines cito parallelismum suum amittunt, & in medio longitudinalis multo minus distant quam in extremis, seu margines in arcum intorsum curvantur. Aortae truncum, sic distractum, duplo angustius evasit in medio quam in suis extremis paulo saetquam rumpetur; hujus phaenomeni rationem vivo animalis surcipibus secui; dectatus est una tertia sui parte; longitudinem vero, adaequis intra tendines ad aequalem distantiam aciculis, determinaveram; tentavi idem in altero musculo post mortem animalis, seu hora integra post cessationem motus cordis, & eadem fuit omnino retractio.

59. Errant itaque illi qui defectum elascitatis incusant statim atque animal expiravit, quod non consulta experientia, & ut opinio nem suam jure tueantur, temere pronunciant.

60. *Experimentum Alexandri Steward.* quod multis ante eum annis institueram in Amphitheatro D. Davisard: in cane vivo dissectui arteriam, venam, nervumque comitem in collo, & alias in crure, atque eorum fasciculum filo hinc & inde constrinxi; distantia inter ligaturas fuit 27. lineas; horum fasciculum transversim secui, habuit vero

12. lin.

13. 3.

24. 5.

emineret, & flum libere vesicæ circumdudum, quod erat 145 lin. longum, ita utambo ejus extrema se tangenter, non amplius potuit vesicam undique amplecti, ejusque extrema 5. li-

neis a se recesserunt, deis tantumdem aquæ addidi ut duplo magis seu tres pollices emineret, & fila extrema recesserunt ab invicem 12 1/2 lineis; & sic successive juxta hanc tabulam.

Altitudines aquæ in tubo	Circumfer. vesicæ augmentum.	Altitudines aquæ in tubo	Circumfer. vesicæ augmentum.
1. p. 1/2	5 lin.	18. p.	29. 5.
3. 1	14. 5.	19. 1/2	30. 1/2
6. 1/2	16.	21.	31. 1/2
7. 1/2	19.	22. 1/2	33.
9. 1/2	21.	24.	34.
10. 1/2	23.	25. 1/2	35.
12.	24.	27.	36.
13. 1/2	26.	28. 1/2	37.
15. 1/2	26. 5.	30.	38.
16. 1/2	27. 1/2	31. 1/2	39.
	28. 1/2	34.	40.

& vesica tunc crepuit.

72. COROLLARIUM. Vesicæ minor circumferentia, seu transversa habuit, cum plena erat & pondum distensa, 134 lineas; crevit autem circumferentia in primo expe-

rimento 5 lineis, in secundo 12. 5, tertio 16, & sic porro. Quoniam vero volumina sunt ut circumferentiarum cubi, illa incrementa fuerunt.

Volumina.	Vires.	Differentiæ.
1. 495.	1.	
3. 652.	2.	2. 134. 16.
4. 915.	3.	3. 363. 12.
5. 359.	5.	4. 484. 12.
3. 979.	10.	5. 043. 11.
6. 539.	15.	5. 366.
7. 077.	20.	

73. Ex hac tabula sequitur Incrementum quidem volumina crescentibus viribus distendentibus, ita tamen ut peiora incrementa multo majora sint quam subsequencia, ita ut cum vis, ut unguis, produxit incrementum ut 21, vis dupla producat incrementum non ut 42, sed ut 38: vis tripla, producat incrementum non ut 63, sed ut 44: vis quadrupla non ut 84, sed ut 50: & vis quinquapla non ut 105, sed ut 55, seu dimidio minorem.

76. Verisimillimum est incrementa longitudinum in fibris eandem sequi rationem ac sequantur ordinate curvas logarithmicæ, cujus abscissæ repræsentantur a viribus distendentibus, verum multo majori diligentia & numero forent insitigenda experimenta ut theoriæ quadret experientia.

77. Tumores vix unquam sunt in vasis muscularis arteriosis a causa interna, quia demonstrante Halsted vis tenacitatis eorum vigetis major est quam vis maxima sanguinis per illas fluentis, *Halsted exper. 22.*

78. Verum non ita se res habet in capillaribus vasis, quoniam tenuitas & laxitas parietum decrevit in vasis juxta eandem rationem, qua summa peripheriarum ragonum ejusdem trunci major est peripheria trunci: cum autem propter numerum capillaribus ex eodem trunco oriendorum portio totam, summa circumferentiarum multoties excedat peripheriam trunci, sequitur

ab eadem vi pressiva sanguinis vasa capillaria multo magis dilatatum iri, quam arteriæ masculæ. (vide *Pulsus & circulas. Theoriam Menpeli 1752. editam, art. 44. 47.*)

79. Quare vero tam debilia vasa in statu sano æquilibrent pressuram sui sanguinis, & non intumescent, ratio est quod quanto debiora sunt suis truncis, tanto minor est pressio lateralis, quam a præterfluente suo sanguine experiuntur (*Pulsus theoria §. 60. 72.*). Verum si minima vasa obstructa fuerint, tunc quoniam sanguis arteriosus in istas agit tota illa vi, qua in truncos obstructos ageret; & illæ tamen multoties laxiores & flexiliores sunt truncis, necessum est ea portento dilatari, ut docet observatio & *theoria pulsus §. 109. & sequentibus.*

80. Si frustulum carnis, undique æqualiter flexibile & vasis capillaribus confiatum, intumescat a sanguine vasa capillaria dilatante, illud inter crescendum figuram suam non mutabit, verum si involvatur intra capsulam flexibilem, & illa capsula resistat suæ ampliacioni, tunc temporis capsula figuram quantum fieri potest sphaeroidem adipiscetur, quia qua parte ejus parietes sunt complanati, et minus resistunt suæ expansioni, adeoque magis recedent a centro quam partes prominentes; nec superveniet equilibrium, nisi cum omnes partes æqualiter a centro fuerint remotæ, seu corpus subglobosum evaserit.

Idem.

Idem accidit partibus corporis humani, ut musculis, glandulis, membrana sua cellulari involutis, quarum proinde intumescencia figuram globosam affectat, ut docet observatio.

81. Si vero tantum dilatentur vasa membranæ cuti supposita, tunc quia fluidum inferiens in viciniam undequaque potest diffundi, quippe cum cellulæ lateraliter inter se communicent, in omnem plagam tumor ille diffusus erit, & figuram artus affecti sequetur, non vero supereminet ad instar globi, ut docet œdema, emphysema: idem evenire debet vasis reticularibus cutaneis, aut alterius conjunctivis membranæ, quæ cum per retiformem nequum invicem in omnem plagam supra hanc membranam communicent, inde tumor solidus, sed superficialis & diffusus observari debet, ut accidit in erysipelate.

82. Sedes ergo infarctus phlegmonodei diversæ est a sede infarctus erysipelatosi & œdematosi. Prior est in spatio solido, quod undique ex paucis arteriis ramissimis sanguinem accipit, & in paucas venas dein refundit, unde in sphaeram vel sphaeroidem solidum debet pars intumescere: posteriores sunt in eodem plano reticulari vasorum aut cellularum quæ vix in altum exoriscere possunt.

83. Docent Geometræ quod si tela expansa prematur ab eadem vi in omnibus punctis suis, ea tela, vel minima vi, inflatur in curvam, & deinceps crescente vi, magis ac magis incurvetur, atque si tela in saccum fuerit conformata, seu undique clausa, & distendatur a fluido, illa tela in corpus sphaericum ellipticumve debet immutari (*Bernoulli de motu musculari, Hermannj Phoronom. &c.*): res autem eodem recidit si tantum aqua intra hunc saccum fuerit contenta, si ve saccus fuerit spongiis repletus, quæ spongiæ ab aqua distendantur, nam pari passu crescet ab intumescencia spongiarum pressio lateralis æqualiter in omnem loci differentiam, ex qua æqualitate pressionis exurgit tumoris sphaericitatis, si æqualis fuerit in omnem plagam resistentia.

84. Hinc patet cur obstructo frustulo cuiusdam visceris, ut pulmonis, hepatis, utrumque polyhedricum, illud frustulum in tumorem sphaeroidem motetur, quia scilicet constans est ex vasculis capillaribus sanguinem ab uno trunco recipientibus, in unum refundentibus, & singuli lobis capsula cellulari vestiuntur, ut docet anatomia; ita ut sanguis facile in ramos vicinos intra ejus capsula cancellos possit se defendere, sed non ita facile extra capsulam, unde idem accidit ac sacculo polyhedrico spongiis madentibus pleno, qui figuram sphaericam adipiscitur, nisi foret undique involutus aliis sacculis pari passu & robore excrecentibus.

85. Inde concludere, ni fallor, possimus tumores sphaeroides eos esse, quorum substantia est veluti sacculo involuta, vel capsulata, ut sunt omnes glandulæ & viscera ex glandulis conflata; e contra vero tumores diffusi, erysipela-

tosi, œdematosi, sunt intra vasa vel cellulas telæ inflati expansi adeoque non coercitas.

86. Venæ ad eandem a corde distantiam positæ non solum sunt arteriis comitibus fere duplo capaciores, verum, ut docet observatio, fibras habent circulares multo duilliores, quam arteriæ; ita ut cum ratione tenuitatis parietum, venæ ejusdem naturæ diametri ac arteriæ, possint ab eadem vi fluidi immisi crescere una tertia parte magis quam arteriæ (*Theoria pulsus §. 17. ad 20. p.*). Hinc sequitur tumores in vascibus venosis magis excrecere posse quam in arteriosis, & tunc tumores maxime dilatari, cum infarctus ex arteriis trahitur in venas, quod videtur fieri in odontalgia catarrhali, cum enim materies coctæ & fluxilis evasit, tunc subito intumescunt genæ, simulque dolor remittitur, quia venæ multo laxioris & minus sensibiles textus sunt quam arteriæ.

87. Partes intumescitiles sunt resistentiæ vi contractilitatis suæ (patet ex propos. 1. n. 23.). verum quo major est crassities parietum vasorum & canalium ceteris paribus, eo major est contractilitas (§. 14.) ergo quo crassiores sunt membranæ distendendæ ceteris paribus, eo minor satura est intumescencia. Sic certum est intra fistulas osseas fieri quandoque maximas congestiones, quæ tamen parietum ossium resistentiam vincere non possunt, unde nullus tumor: e contra in vasis lymphaticis vel levissima pressio lateralis vas in magnam molem extendit.

88. Quod densiores sunt & compactiones membranæ vasæ vel viscera coercentes, eo major est ipsarum contractilitas imperanda ad hoc ut intumescant; sic arteriæ ejusdem crassities ac venæ, cum duplo aut duplo majorem habeant firmiorem quam illæ, tanto minus ab eadem pressione interna diducuntur.

89. Resistentiæ itaque, quas partes opponunt suæ intumescencia, sunt in ratione compositæ crassities, & densitatis membranarum, earum vasa & molem constituentium, involvætiæ; cum itaque lien omnium viscerum minime coercetur, & textus sit aliunde mollissimus, lien in molem immensam, quaptum fert abdomen cavitas, potest excrecere. Pulmones quidem intra datos limites a cavo pectoris coercentur, verum eorum lobis seorsum sunt in excrecendo liberi, textuque ductilissimo præditi, nam exigua vi distracti pulmones in omnem plagam possunt evadere duplo fe ipsi longiores; ergo infarctus in lobis pulmonis facile possunt admodum intumescere.

90. Ceteris paribus intumescencia partis intra suæ tenacitatis limites est eo major, quo major vis distendens ipsi applicatur; sed tamen intumescencia crescit in minori ratione quam vires distendentes (§. 5.).

91. Si initio intumescat viscus in duplum sui voluminis per vim uis, illud non potest intumescere triplo magis, nisi per vim quolunque majorem, seu ut 20, patet ex tabula (§. 24.).

ergo



ergo semel intumescens viscus non potest sine atrocissimis doloribus ulterius intumescere, quippe cum necessario applicanda sit vis multo major, quam quæ huic intumescentiæ respondet; atque cum hæc vis reactionem parem expectari; adeoque distensionem maximam, ex qua dolor proportionalis exsurgit, semel enatus tumor non potest crescere intra vasa ejusdem generis quin atrocissimus dolor exsurgat.

92. Induratio & renixus partis crescit in ratione qua crescit partis intumescentiæ, habita partium distensionum ratione. Etenim intumescentiæ minus crescit quam vires distendentes. Verum distensio crescit, ut vis distendens directe, & ut elongatio inverse; ergo cum vis distendens increpset & elongatio fibrarum non pari passu crescit, tanto major evadit partis renixus & durities.

93. SCHOLIUM. Si fibra pari passu elongetur quo majoribus viribus distrahatur, ejus tensio minus crescit, quam si non elongetur, ut quisque facile concipit.

94. Quo magis accedit fibra ad terminum extremum suæ tensionis, eo magis accedit ad terminum suæ ténacitatis, qui in eodem extremo puncto concurrunt, ergo quo major evadit durities & renixus tumoris cito crescentis, seu ejusdem tensio, eo magis imminet periculum ruptionis, unde effusio sanguinis; hinc inflammatio systrophica, vel etiam sphacelus.

95. Ad sphacelum in hoc casu vitandum, vitanda est vasorum disruptio, quod ipsa præstare possunt emollientia, quorum usu quidem tumor excreset, sed sine tanto ruptionis periculo, quam cum fibræ rigiditatem & tensionem suam servant, nec remittitur vis distendens.

Ad sphacelum in hoc casu vitandum, altera methodus est, ut vis distendens minuatur, quod præstent phlebotomiæ repetitæ, & victus tenuis.

96. Ergo si phlegmonedei aut erisipelatosi tumores gangrænam minitentur, duplo utilius est simul emolire fibras potu & foris diluentibus, atque vires cruoris distendentis detrudere victu tenui, & evacuatoriis, quam alterutrum tantum auxilium adhibere.

97. Repellentia dicuntur ea medicamina, quæ fibras condensando, & fluida coagulando impediunt ne tumores inflammatorii excrecant; verum cum augmentum tumoris inflammatorii, dum perstant vires sanguinis distensivæ, non ita periculosum sit quam ejus ruptio, atque cum ea medicamina difficiliorem reddant ejus extensionem repellentia in hoc casu noxia sunt.

98. Ex corollario 46 sequitur, tensionem fibrarum corporis sponse remitti solo lapsu temporis, adeoque phlegmonis tensio & dolor, si non crescat in dies, tolerabilior evadit & minuitur. Operæ itaque prelium est expectare, si fieri possit, & impedire tensionis augmentum; tempore scilicet res ægri in melius mutantur, a fortiori vero si apta adhibeantur interim auxilia.

99. Ex corollario 47 aer calidus & humidus

fibras relaxat, sed in phlegmone sæpissime relaxatio utilis est; ergo aerem calidum & humidum haurire, seu quod eodem recidit, foribus emollientibus, tepidique tumorem mitigare proficuum est.

100. Docet experientia partes corporis humani citra noxam, aut earum destructionem, portensse intumescere posse, modo tardigrada fiat expansio, teste graviditate, ascite, natæ, &c. Ast qua proportionem tumescit pars infarsa, eadem ratione dilatantur & intercedunt tunicarum (71.) & modo pari passu non crescat tensio, crescent ut totum; expansis autem vasis, fluida prius ipsis impada & inhærentia per vias liberiores fluere possunt, adeoque & infarsus referari, & hæc prima ad resolutionem via. Dilatatis excretoriis cutaneorum oculis, & valorum intercapediniibus, materię resolutæ possunt ex illis effluere, perspirare; unde curatur infarsus, & hic est alter resolutionis modus.

101. Non tamen semper metuendum est, ne partes admodum distensæ, resolutæ infarsu, pristinum volumen non recuperent: docet enim experientia maximam inesse partibus ductilitatem & elasticitatem, cum quædam viscera, ut uterus, volumen multies majus adipisci possint, illibata fere sua elasticitate, Immo identidem portensse ampliari, & iterum contrahi.

102. Sunt tamen partes in humano corpore ita parum elasticæ, quales sunt mammae, cutis inguinum, genitalium, faciei, palpebrarum; quæ facilediducuntur, elongantur, nec facile pristinum tonum recuperant, & illas a primis distinguere possunt anatomici; quippe si acu adigant, ut sit inter consuemam cadaverum exenteratorum cutem, non raro notavimus partes superius recensitas multo facilius dividi, quam cutis dorsi, brachiorum & aliarumve partium.

103. Tumores partium corporis humani prius sani sunt a viribus partium ut plurimum fluidarum partes continentes extrorsum premehibitis.

104. Tumores sunt ex fluidis intra vasa vel receptacula contentis; illa vero vasa & receptacula, quandiu elasticitate gaudent, niuntur in sui contractionem, cum autem intumescunt illa tendunt in omnem loci differentiam ab interioribus ad exteriora, cum itaque sola fluida in ipsis contenta premant extrorsum & in omnem loci differentiam; sola fluida sunt instrumenta, quorum actioni ea intumescencia possit tribui.

105. Verum fluida non ratione sui ponderis solius hos tumores inducere possunt, cum non ea sit altitudo columnæ fluidi superincumbentis, quæ possit vim illis sufficientem imperiri, nisi elasticitas partium continentium sit ablata: ergo vis illorum fluidorum ab alio fonte repetenda est.

106. Sunt quidem in primis vijs potissimum fluidi.

fluida rarefcebilia & summe elastica, aer scilicet, flatus, quæ calore, putredine, fermentatione ita possunt expandi, ut membranas ambientes summa vi distendant, ut patet in tympanite, ructu, emphysemate, pneumatosi, &c. ergo tumores flatulenti vi aeris expansivi tribuendi sunt. Verum sunt & alii qui sanguinis solis viribus, aut lymphæ solus adioni sunt tribuendi, ut phlegmone, œdema: cum autem illa fluida nullum sensibile elaterium habeant, nisi caleant, & calefacta via una ducentissima sui parte excrefant, tumores paululum notabiles ipsorum fluidorum rarefactionis ascribi non possunt: superest igitur ut vi trusivæ a corde mutuatæ tribuantur, potissimum viribus sanguinis & lymphæ, quibus vasa, membranæque coercentes in notabiles tumores diducere queant.

97. Vis circulatoria succum nutritium in diversas partes deducit; verum excrecentiæ sunt a succo nutritio copiosius adherente, & in solidas partes convengo; & licet succus nutritus vi adhesionis in carnes & ossa dureseat, non tamen alia vi quam vi trusivæ cordis ad partes appellit & eas diducit; ergo viribus trusivis cordis etiam tribuenda est hæc tumorum species, non tanquam causæ, sed tanquam principio. Si cum Hippocrate per partes contentas intelligamus fluida, per continentes vero solida scilicet membranas, evidens est vires trusivas fluidorum requiri ad hoc ut in homine prius sano partes continentes in tumorem eleventur.

98. Excessus virium in partibus contentis supra contrahilitatem & resistentiam continentium est causa tumorum.

99. Causa dicitur illud ex quo alterius aequalitas intelligitur; principium illud ex quo tantum intelligitur alterius possibilitas (*Parthol. method. n. 15.*) atque causa est illud, quo posito solo producit effectus, quo solo sublato tollitur effectus (*Mariotte Essai de Logique*) & ex hoc causa cognoscitur, quod effectus integer illi sit continuo proportionalis (*Wolff. Mechan. §. 24.*)

100. His positis certum est partes corporis humani continentes cum contentis continuo luctari; quippe imminuta partium contentarum resistentia, statim continentes in tumorem attolluntur; sic detracta aeris pondere per appositam eucurbitulam pars supposita illico intumescit, sed ea externa arterie cujusvis tunica, adeoque imminuto illius robore, ceteræ tunice in aneurysma elevantur, &c.: et contra vero adausum partium continentium robore, elaterio, pressione, ut sit per frigida, per spasum, pressionem, per adstringentia, partes continentes confringuntur: et contra vero cum pæglat æquilibrium inter partes continentes & contentas, neutra mutatur quoad volumen. Verum potentia opposita, quæ ideo quiescunt, quia ut se æquæ momentis virium æqualibus, luctant & semper æquilibrium dicuntur: ergo partes continentes & contentæ continuo luctantur.

101. Jam vero cum partes continentes cum

continentibus in æquilibrium posita sint, quando nec crescunt, nec decrescunt illæ partes, earumque momenta æqualia sunt, impossibile est eas intumescere; verum si vis, quæ partes contentas extrorsum urget continentes, illarum vires contrahivas superet, non potest fieri qui in continentes eleventur & extrorsum distendantur, cum ergo causa efficiens illud sit ex quo intelligitur alterius aequalitas, & cum, hæc posita, necessario ponatur alterum, ablata tollatur, evidens est excessum virium, quibus partes contentæ continentes extrorsum premunt, esse tumorum causam quæritam.

102. Intelligitur etiam tanto majorem fore tumorem, quanto major erit vis partes continentes distrahens supra ipsarum contrahilitatem, quantacumque sit illarum vis absoluta, aut quantacumque sit contentarum energia: ergo tumor seu effectus illi excessui virium erit continuo proportionalis.

103. Evidens est etiam quod si eousque, eaque velocitate partes continentes extendantur, ut demum ad ultimum suæ tenacitatis terminum deveniant, seu modice rumpantur, tunc temporis cessat actio contentorum in continentes partes, seu jam fluida in hac parte non amplius continentur, non agunt adversus membranas quæ ruptæ desciunt, adeoque nullam vim in ipsas exercent; sed ubi nulla est actio mutua, nullaque vis, nullus est virium excessus, nec proinde tumor; unde sequitur quod rupto vase, aneurysmate, aut alio tumore, ita ut fluida non amplius retineantur a solidis, tumorem evanescere necessum est.

104. In excrecentiis, scirrhis, alisque tumoribus hujusmodi, rupta quidem cute, nequaquam evanescit tumor, quia partes, ex quibus tumor componitur, non sunt fluidæ, de quibus hætenus agimus, sed propter earum cum suis vasis minimis adhaerentiam, & viscositatem pro partibus solidis sunt habendæ; partes autem illæ non sufficienti vi protruduntur extrorsum, ut vel minimum extuberare possint, cum semel in tumorem scirrhusum, vel in partem solidam excrevere; adeoque cum vires, quibus extrorsum urgentur, sint tam exiguæ, ut propriam inertiam, proprium pondus non possint superare, partes illæ scirrhosæ, induratae persistant in suo statu; quandoquidem ea lex est universis, ut quodcumque corpus perseveret in suo statu, nisi quatenus viribus applicatis cogitur statum suum mutare; præterea si consideremus in scirrbo tot tumores exiguos, quot sunt vascula illum constitutentia, quoniam semel indurata parte scirrhosa, inspissata fluida propria viscositate renitentur elasticitati vasorum, & nullam sensibilem vim trusivam habent, quæ vasa sua ulterius distendant, nullus amplius fit tumor, sed ea persistant in statu suo. Quorsum autem corpora persistant in statu suo, si nulla vires de novo accedant, quæ statum mutant, nulla alia inquirenda est ratio quam lex univer-

fi, seu constans & immutabilis summi Numinis voluntas.

115. Effectus est quodcumque phenomenon quatenus a causa sua producitur; adeoque est mutatio: ergo ubi nulla mutatio, nullus effectus, & ubi nullus effectus, nulla causa. Ergo quæ non mutantur pro effectibus non sunt habenda, seu nulla causa præter legem universali signanda est quorum corpora perirent in suo statu, si vires nullæ de novo ipsi applicentur; vide *Newton, Principia Mathematica* l. 1.

116. Nulla mutatio nec fieri in corporibus, nec concipi quidem potest, nisi per motum. Verum motus causa dicitur *vis motrix*, (*VWolf. 137. Cosmol.*) & ex illa concipitur possibilitas tumoris, adeoque *vis motrix* est cuiusvis tumoris principium sine quo fieri non potest, nec concipi ejus productio.

Non possum itaque satis mirari doctrinam Neotericoꝝ, qui cum se mechanicos profiteantur, & mechanicæ omnia in Arte Medica explicare contendunt, interea pro tumorum causa non sanguinis motum, vel nitum, sed ejus tantum hærentiam, stagnationemve reponunt, quod certe apud mechanicos peritos absurdum est.

117. Hærentia est defectus motus progressivi adeoque quies columnarum sanguinis, quæ per vasa debent fluere; verum ex lege universali, si nulla vis accedat, corpora quiescentia nunquam statum suum, multo minus partem vicinam, mutantur; & jam si mutantur, ideo mutant quia moventur, cum nulla concipi possit in corporibus mutatio nisi per motum. Ergo hærentia est causa earum partes continentes in tumorem elevatur.

118. Ex eo quod fluidum in vase hæreat, nil impedit quominus ab aliis causis partes vicinæ & loco moveantur, adeoque tumoris ipsarum possibilitas intelligitur: verum cum causa & principium non minus differant quam aqua differt a potentia; & cum a potentia ad actum non valeat consequentia, a principio tumoris ad ejus productionem nulla pariter datur, seu principium non sufficit ad tumorem producendum.

119. Vix ullus est uberior in Medicina fons errorum quam illa causæ & principii confusio, quam certe cautius vitare debuissent Medici, cum totius Artis Medicæ studium theoreticum in causis morborum dignoscendis versetur; quippe ex causis & principiis tantum indicationes curatorias eruentes esse contendit *Galenus*, & in hoc Dogmaticos ab Empiricis distinguit. Si vero indiscriminatim principium pro causa accusetur, nihil est quod pro morbi cuiusvis causa non possit haberi, cum nihil est ex quo non intelligatur morbi cuiusvis possibilitas. *Demonstratur* pro causa phrenitidis bilem ad cerebrum delatam accusabat: *Polypus* generis Hippocratis statum seu aerem pro quorumvis morborum causa habebat, (*libro de flatibus*) quod falsissimum esse nemo hodie ignorat, verum si illud causa sit ex quo alterius possibilitas intelligitur, seu quod quomodocumque ad alterius existi-

stentiam concurrat, certum erit bilem esse causam phrenitidis, & statum omnium morborum; sed quod de bile dico, alter de subura, alter de sanguine, de urina, de fluido nervo pari jure pronuntiaturus est; nudenihil erit constans & certum in Arte Medica magis quam in Astrologia & Alchemia.

120. Hærentia quidem fluidorum est principium tumorum, quatenus non potest hæreere sanguis, vigente vi circulatoria, quin eadem vi, qua hæret, ipse resistat sanguini retrofluenti, qui proinde ex axi valis in parietes diffunditur, ut docet Hydraulica; fluidorum enim actio lateralis in vasa crescit pro ratione qua ipsi resistitur, & qua pone fortius urgentur. Verum hærentia illa est occasio tantum hujus sanguinis ad latera diffusionis, & vis movens sanguinem adversus hunc obicem est sola incusanda tanquam causa efficiens; quod ita verum est ut pluries observaverim, ligatis arteriis carotidibus in cane vivente, & altera vice ligata aorta in abdomine, altera etiam ligata arteria intestinali in simili animali, licet animala per diem supervixerint, & alia per hebdomadas, nullum tamen inter cor & ligaturam observavi tumorem saltem oculis conspicuum, cum quia pressio lateralis in arterias, si cordis vires non crescant, pro nihilo est habenda respectu resistentiæ arteriarum, vel quod illa animalia præ dolore & metu, (cum nequidem ejularent, sed alterum continuo tremere) vires suas vitales minores solito haberent. In minoribus vasis, si obstructa fuerint propter rationes mechanicas (78.) allatas, non ita se res habet; pressio enim lateralis utcumque eadem ac in majoribus, cum minores multo in tenuibus & laxis parietibus resistentias reperiat, eorum contractilitatem superat, unde tumor ex theoria jam expolita.

121. Verum licet obstructio prævia sit frequentissimum tumorum principium, facile est demonstratur plures tumores sine ulla obstructioe quotidie fieri, quod, quia Neoterici paradoxum videtur, est paulo fusius ostendendum, & quoniam experimenta facilius intelliguntur quam rationes ex hydraulici petitis, ab experimentis ordiatur.

In cadavere tubum aliquot pedes altum verticaliter erectum & aqua continuo plenum aptavi ureteri juxta renes; aqua illico in vesicam influxit, & licet sphincter illius atonus foret, ut ajunt, & veluti paralyticus, licet musculi in cadaveribus non exiguum cui elaterii partem servent, illa aqua sensim in tumorem elevavit vesicam, nec guttula per urethram effluxit usquequo vesica multum intumuisse; tum autem cum aqua ex urethra fluere, non proinde cessabat vesicæ tumor, immo cum tubum aqua plenum paululum altiores in hoc experimento adhiberem, pari passu & aqua per urethram copiosius, velociusque effluxit, & simul vesica magis induruit atque intumuit. Ex quo

E. patet

patet non ab hærentia fluidi factum fuisse illius tumoris augmentum, cum velocitas aque vesicæ transfluentis, aucta altitudine tubi, increverit, nedum fieret hærentia.

122. Pluries experimentum idem in pulmone testavi, tubum scilicet eundem aptavi arteriæ pulmonari, & aqua calida, quam continebat, sensim in venas & in bronchia transfluentes, illius vasa ita elutriavi sanguine, ut nivis instar albesceret pulmo; nam sane dixerit illius vasa magis quam in statu sano insarta; interea cum aquam ex altitudine tubi tres pedes alti fluere sineret, pulmo prius ita collapsus, ut vix quartam cavi pectoris repleret partem, jam in tantum tumorem attollebatur, ut totum cavum exleret & multum superemineret, interea dum pleno rivo aqua ex venis pulmonaribus & etiam ex ore effluebat; immo adhibito tubo sex pedes alto, aqua multo velocius efflueret quam sanguis, persistente vita, in hoc circulabatur.

123. Unde evidentissime liquet, quod intumescencia partium potest consistere cum omnimoda vasorum libertate, & cum solito majori fluidorum velocitate, quod qui negaverit in media luce cœcutire velit. Non ita evidenter sunt experimenta in vivo homine instituta; interea tamen omnes Medici norunt quod a validissimis exercitiis, ut cursu, non solum pulmones intumescant & turgent, quod ex dyspnœa illico oborta, quandoque ex hæmoptysi superveniente licet augurari; verum etiam sibi prius frigore contrictæ tardiores evadant, ita ut vespere calcei angustiores videantur, annuli digitum manus premant arctius, collarium sit laxandum, &c.

124. Verum ipsa docet Hydraulica & Anatomia non posse propelli majorem vi sanguinem intra arterias ramosas, quin affricus sanguinis cum vasis crescat pro ratione vis sanguinemurgentis, seu pro quadrato velocitatis impresse; fluida enim antecedentia eo magis reagent in subsequente sanguinem, quo majori viurgentur: norunt vel phycices tyrones quod aqua manu leviter pressa vix resistat manui, sed si vehementer a manu percussatur, tunc non secus ac corpus durum resistat, & hinc patet ratio cur lapides, immo globi ex tormentis oblique explosi, si superficiem aquæ attingerint, ab illa reflectantur tanquam a corpore solido, quod non accidit, si leniter in illam projiciantur.

125. His positis patet sanguinem in vasis prius existentem non posse imperi & nrgeri vehementius a subsequente, quin ille resistat, adeoque quin subsequens ad latera vasorum diffuset, nec obstat quod sanguis antecedens circuleat, corpora enim in motu constituta resistunt suæ accelerationi, ut probat lusei *Gravofande*; nec minus resiliunt lapides plani supra amnis superficiem juxta ejus fluentem oblique projecti, quam si transversum projicerentur, modo velocius projiciantur quam illa aqua diffuset,

126. Nil itaque jam obstat quomodo intelligamus quod ad hoc ut sanguis fortius agatur in vasorum parietes, sufficit ut velocius in ipso propellatur.

127. Ad has incitas redacti Neoterici hoc anicum adeunt perfigium, quod scilicet ille sanguinis impetus vasorum majorum tantum pulsationem, non vero tumorem constantem producat sit, & quod ad intumescencia totius corporis hoc sufficiat, non ad intumescencia partis.

128. Verum vanum est responsum, quippe cum crescente vi cordis trusiva, non solum crescat sanguinis impetus diaholes arteriarum tempore, sed etiam tempore earum systoles, cum arteriæ fortius diductæ, intermissa per diahole cordis sanguinis in ipsas pressione, fortius reagent in sanguinem, eumque fortiusurgent; velocitas utroque tempore, licet inæqualis, semper est major velocitate consueta, adeoque cum data velocitate sanguinis majoris, partes saltem aliquantulum debeant intumescere, certum est utroque tum systoles tum diaholes tempore eas in tumorem diductas iri, quod erat primum.

129. Quoad alteram perfigii partem, jam satis notum est ex *Illustriss. Halleri* observatis dari habenas nervas, quæ pro animæ imperio (voluntario vel naturali, nihil ad rem) laxantur, vel stringuntur, unde pari passu vasa arteriosa, quæ ab ipsis ambiuntur, magis vel minus patula sunt; jam verò supponamus arteriæ v.g. mesentericæ orificium, cujus diameter est trium linearum, laxatis habenis, quatuor lineas in diametro acquirere, eorum est quod sanguis multo velocius intra illius ramos influatur sit quam antea; ut huius asserti ratio pateat, notandum est sanguinem dum ex trunco in ramo procedit in spatia semper ampliora procedere, adeoque sanguis magis est compressus & coercitus in truncis quam in ramis, quod patet ex saltu sanguinis ex truncis portus; is enim decies longius exiit, quam ex ramulis eodem vulnifculo perforatis, ut ulterius docent experimenta hydraulica *D. Carri*, *Mariotte*, &c. quod quantitas fluidorum, quæ ab eadem vi eruduntur per orificia diversa sit major in majoribus ratione, quam quæ ab orificiorum amplitudine repetitur; quippe cum attritus oriundus a circumferentia, cui columna fluidi adhæret, est major in minoribus vasis quam in majoribus respectu ad quantitatem fluidi in ipsis contentam, paululum cresceat orificio, quantitas transfluentis crescit in majori ratione quam orificiorum, seu minus deperdit ex parte attritus quam cum per angustiora vasa fluebat, sic observante *D. Carri* (*Mém. de l'Acad. des Sc.* 1706.) ex orificio, cujus diameter est 2. &  $\frac{1}{2}$ , duplo major effluit liquidæ copia quam ex eo, cujus diameter est 2. licet illa orificia non sint ut 72. & 36. sed ut 64. & 36.

130. Exinde patet igitur laxatis illius, vel illius arteriæ habenis, & contrictis vicinis trun-

cis, crescere impetum sanguinis in arteriam determinatam absque eo quod vis cordis intendatur, adeoque certam partem calere, rubere, intumescere, dum ceteræ pallent, & frigent: hoc autem in animi pathematis & morbis observatur, in verëcundia scilicet laxatis haberi arteriam maxillarem ambientibus, & contractis, ope nervi recurrentis, axillaribus, cruor toto fere, quem a corde concepit, impetu fertur in faciem, & ruborem, calorem subitaneum genis impertit, sanguine ad has cutaneas arteriolas celerius appellente, simile tantum accidit in pathemate quod miserationem comitatur, in quo licet pallent facies, interea incalescunt subito aures & tinnunt, in insultu apoplexiæ non raro totum caput, faciesque præsertim intumescit, turgit ad lividum usque, cum calore, oculorum prominentia, &c. dum partes inferiores frigent & contrahuntur.

131. Immo febres parciales observantur, ut febres unius brachii quam recolet *Bonetus* (in *Sopalebre de febrib.*) ab eo mechanismo solum possunt explicari; quod autem in phlegmone, v. g. in paronitide, datur major calor, tumor, immo pulsatio fortior in brachio morbofo quam in altero, oemio potest negare; cum autem illa symptomata ab hærentia sanguinis nequaquam procedere possint tanquam a causa, ut fusius ostendit (*Dissertation sur l'inflammation à la suite de l'Hémaphysque*); supersit ex impetu sanguinis in partem determinatam adducto illa phænomena repetantur.

132. Principia tumorum sunt vel pressio contentorum in contenta solito major, vel tacto contentium solito minor.

133. Posita enim pressione contentorum in contenta solito majori, fieri potest ut ea superent resistentiam contentium, si scilicet vires contentium pari passu non fuerint adauctæ, & reciproce: ergo ex his intelligitur possibilitas tumorum; adeoque hæc sunt tumoris principia ex definitione (109.)

134. COROLLARIUM. Quoniam in statu morbofo, ut in cachexia, ascite, chlorosi, reactio solidorum est maxime debilis, & vis gravitatis fluidorum eadem persistat, potest fieri ut lymphæ fluidior solito, & cruore facilius separata, ponderans in partes decliviores, earum contractilitatem superet, adeoque eas in tumorem attollet, qui tumor frigidus, mollis, pallidus, indolens & prementis digiti vestigium servans, species est œdematis.

135. COROLLARIUM. Si vero lymphæ, adeps, mucus in vasis suis colligatur propter adhesionem mutuam partium accedentium cum indigenis, nec vasa resistere possint vi qua hæc moleculæ ad se invicem accedunt, aut vi qua per columnam subsequenter urgentur, intereaque propter angustiam ramulorum ex hisce vasis prodeuntium non ulterius trahi possit fluidum illud viscosum, id ibi loci conestlet, congeretur, atque si in succum nutritivum & partes solidas mutetur, dabitur excesscentia, secus erit

scirrhus seu tumor durus, indolens, pallidus, vel cuti concolor, non elasticus: si autem vasa lymphatica uberius quam par est diducta sint per antecedentem phlogosim, vel per contusionem, aut ruptis sanguiferis cellulæ adiposæ craorem exceperint, quoniam nullum est fere in illis elastrium, sanguis in ipsis coalescit, quiescet, & in primo casu rubedinem, in altero lividinem præ se feret pars infarcta, talis est sagillatio, vetus ophthalmia caloris experta, macula livida seu vibices.

136. Si tumor est circumscriptus, calens, rubens, dolens, pulsatilis, ad suppurationem vergens, is *Phlegmons* dicitur: si vero diffusus seu portio majoris ipsarum rubens, acies dolens, pressione albescens, uniformis, is *Angioplasta* est: alii si rubens, diffusus, pruriginosus, scirrhaceus, punctatus, ad desquamationem vergens, *Herpes* vocatur. Plura in calore *Barbologia* infra tumorum genera & species videtur: isti ultimi tumores calidi vulgo dicuntur ob calorem comitem consuetiorem; priores, cum emphysemate, carcinomate, frigidi censentur.

137. Tumorum calidorum causa est impetus cruoris in vasa sæpius obstructa, major quam est ipsorum nativa contractilitas. Frigidorum vero causa est contractilitas minor quam nativus fluidorum appellentium impetus.

138. Calor est particularum ignearum actioni proportionalis; illa vero actio in humana machina mutæ fluidorum & solidorum actioni respondet, & cum reactio actioni proportionalis sit, calorem etiam reactionis illorum iustitanti proportionalis est, si par sit fluidi ignei copia. Jam vero quoniam ut calor nativo major sit, necessum est ut reactio fluidorum & solidorum sit nativa intensior, nec potest esse intensior nisi fluidorum impetus augeatur, nec solidorum elasticitas deficiat, patet tumorum calidorum causam esse impetum cruoris in vasa majorem quam est nativa ipsorum contractilitas.

139. Data obstructione in vasis minimis, modo sanguinis nativus impetus non minuat, velocitas respectiva inter columnas subsequentes, & columnam obstructam major est (*Theoria pulsus* 114. 123.), atque si impetus ille major evadat, inde oritur est non solum tumor, sed etiam afflictijs major, cui gradus caloris respondebit.

140. Si vero vasorum & membranarum ambientium elasticitas minuatur, nec crescat fluidorum hac accedentium vis trusiva, immo licet minuatur, sed in majori ratione quam crescit contentium elasticitas, minor erit reactio mutua, ac proinde minor calor solito, quod *frigus* appellatur; unde patet tumorum frigidorum principium.

141. Cruoris moleculæ exsiccatæ & in ignem projectæ flammam concipiunt, doceente experientia; non item vero partes lymphæ: præterea velocitas cruoris ordinaria etiam in minimis vasis est major quam velocitas lymphæ in suis lymphaticis; quippe a corde remotioribus, & quo

rum summa alveorum est amplior alveo articularum sanguinearum ex quibus procedunt; verum actio particularum ignearum respondet velocitati duplicatae fluidi illas secum devehensis, si par sit actio in solida, & eorum reactio; adeoque eror est aptior ad calorem concipiendum quam ipsa sympha; unde sit ut tumores rubri sæpius calidi sint, lymphatici vero seu pallidi potius frigidi.

142. Morbus est symptomatum connexorum, id est, ab eodem principio pendentium & notabilium syndrome; docet Pathologia; morbi quorum symptomata sunt fervor, seu calor interensus, dolor, febris acuta, nec non, si externi fuerint, rubor & tensio, habent symptomata ab eodem inflammationis principio dependentia, adeoque connexa, unde vocantur *morbi inflammatorii*, quorum theoria jam ex dictis elucescit, Idem dicendum esto de morbis cachecti-

cis, qui tumores œdematosos, scirrhusos, leprosos, asciticos & frigidos sæpius indolentes inter symptomata sua numerant, qui ex horum tumorum theoria facilius intelliguntur.

143. Cystides seu tumores saccati, alie pendunt a causis mechanicis, ut aneurysmata, varices, tympanites, ascites, pneumatocèle, &c. alie a causis physicis, ut abscessus, spina ventosa, &c. productio enim abscessus, seu supurationis, cariei ex principiis tantum physicis, ut dissolutione, putrefactione, erosionem, intelligitur. At causa aneurysmatum, varicum ex fluidorum nisu, impetu, qui vasorum & receptaculorum continentium contrahilitatem superet, facile deducitur, adeoque ex principiis mechanicis eruitur. Horum vero affectuum praxim tum generalem tum specialem ex Chirurgicis Auditoribus, ut Haistero, Plazaro, &c. crucendam relinquo.



# CLASSIS PRIMAE VITIA.

## CLASSIS PRIMAE.

**AFFECTUS SUPERFICIIARII**, seu **VITIA** Morbi Chirurgici vulgo dicuntur, tum quia levioris momenti Chirurgis curandi committuntur, tum quia manus operatione plurimum potissimum indigent, ut sanentur. Interea, qui a sanguinis vitio foveantur, artis medicae simul auxilium exigunt. Cum autem ad horum curam quae attinent in morborum gravitatem historia recensentur, affectuum theoriae & praxi parum insistere animus est; & qui plura voluerit, adeat Auctores qui, ut *Heisterus*, *Pottius*, de hisce fute & ex professo scripserunt.

## ORDO PRIMUS.

### MACULAE.

**MACULA** est coloris mutatio in parte, seu color a sano & consueto alienus. Colorum diversitas pendet a laminarum epidermidis, & cutis elasticitate & densitate, docent Physici: verum nondum satis est evoluta illa theoria, ut ad prima colorum principia attenti, inde collaria ad praxim utilia deducere possimus, & ideo vulgo macularum theoriam a colore studiorum epidermidem, vel cutem tingentium deducimus, ut flavedinem a bile, rubedinem a cruore, pallorem a lymphae praedominante; sic diversos colorum gradus a mutata diti humoris crassitie, aut consistientia deducimus, ut lividitatem in ecchymomate a cruribus coagulatis, flavedinem ipsi ecchymomati succedentem ab eisdem cruoribus dilutis; quippe docet experientia paucas sanguinis stillas multa aqua dilutas linteum album flavedine inficere: sic crystallini in cataracta, corneae in caligine albarem a lymphae coagulata eruiunt, ex eo quod hoc fluidum ena- gulatum albefcat. Quam crassa vero & manca sit haec philosophia non ignorant qui in physicis sunt versati; verum ultra phlebem sapere in theoria inutile est, cum ex hac theoria non- dum certior praxis erui potest.

Genera maculorum sunt sex; scilicet, *Leucoma*, *Vitiligo*, *Ephelis*, *Gutta serena*, *Nevus*, & *Ecchymoma*; ceteras declinationes morbis gravibus accensentur, ut petechia, chlorosis aurigo, phlegmasiae, febresque variae.

### I. LEUCOMA, Tays.

Est macula corneae.

Albuginea membrana oculi flavescit inaurigine, nigrescit in melassifer & oculio, ecchymomate; cornea vero in leucomate albefcit, subflavescit, aut pelluciditatem amittit, quod sine colore quodam accedente fieri non potest.

*Sanvages Nosologia Methodica*. Tom. I.

Cum pelluciditas supponat summam homogeneitatem, necessum est ut in statu sano eadem fere sit lymphae corneae nutritientis, ejuque lamellaram specifica gravitas; itaque opacitas quae leucoma comitatur tribuenda est heterogeneitati; & cum fluida solidis facilis mutentur, in leucomate fluida corneae alluentia gravitatem specificam nativam amiserunt. Notum est lympham calore coagulari simul & albescere; opacatur autem in hoc casu quia multas particulas aeris in locum feri exhalantis recipit; aer enim cum sit millies specifice levior nostris fibris & fluidis non potest illis conspiciis admisceri, quin heterogeneitas, adeoque opacitas, superveniat, quae pro gradu crassitie lamellarum nunc omnes radios consusos reflectit und ealbedo; nunc paucos transmittit, unde color griseus, ut in nebula.

1. *Leucoma Nephelium*, *Nebula* Latinis, *Achlys* & *Aegis* Graecorum, Gallice *embras*, *nuage*. L.

Est macula subpellucida corneae, quae facit ut objecta tanquam trans sumum aut nubem videantur, adeoque obscuriora sint. Inspektionem obliqua dignoscitur ab opacitate humoris aquei in caligine mydriasis, cataractam lacteam ruptam, & cataractam crystallinam nascentem comitante. Dividitur in *Achlys* & in *Aegida* pro gradu obscuritatis, sed plus vel minus non mutat speciem. Differt ab albugine ex eo quod albugo omnino opaca sit, alba, cretacei coloris & quandoque paululum emineat.

Saepeis oritur post nphthalmiam variolosam, aut humidam, necnon a calore nimis, ut ambullione; opacatur cornea etiam a spiritibus acidis, ut vitrioli, nitri affusis; necnon ab alkalinis, ut oleo tartari; a collyriis acrioribus non tamen a spiritu vini, qui nudam lympham opacat.

Nephelium de arte excitatur, & utile est in mydriasi, ubi nphthalmia interna est, cum lucis jubar est recutendum ne retinam laedat.

Nephelium multo facilius sanatur albugine, isdem sed lenioribus ad motis remediis; saepe in infantibus sponte perteretis mutationem evanescit. Prodest succus anagallidis, vel caeruleae, vel purpureae, bis in die per sepiimanam instillatus; succus calcitrae ac cyani juvant: sacchari candidi pulvis saepe satis est; vinum emeticum, quod oculis minime laedit, etiam utiliter instillatur; vapor anisi atque foeniculi profunt.

2. *Leucoma albugo*, Gallice *Tache blanche*. Si resplendeat dicitur Latinis *margarita*, Graecis *paralampsis*, Gallice *perle*. L.

Distinguitur in albuginem D.S. Yves, quae est in margine rubra, dolens, adeoque inflammata; & in albuginem altorum Auctorum, quae est subminens, coloris cretacei, inflammations- nis-espens.







Distinguitur maculis amplis flavo-nigrescentibus, quæ non nudas, ut lentiginis, sed totas partes afficiunt, ut inguina, dorsum, & sunt palmæ magnitudine; non raro periodice revertuntur, & post quartanam, tertianam, necnon cum nostalgia accedunt, cuticulaque levem desquamationem affertur.

*Cura* obinetur, 1. cathartici; 2. diætæ ex cibis electis minime acris, aut salitis; 3. iusculis levis incidentibus & diureticis cum plantis hepaticis, ut capillaribus, agrimoniam, cascara, eichorio, &c. 4. fritione iterata partibus; 5. balneis; 6. sinapismo parti applicato, & cum irritaverit, ablato; vel cataplasmate ex sapone liquesfacto, &c. Vide *Sennertum de maculis hepaticis*, lib. 3. part. 3. sect. 1. cap. 8.

### III. EPHELIS, *Reussner*.

Cognoscitur ex maculis umbrinis, glabris, corymbosis, faciem, vel manus, vel tibias, rarius partes rectas, afficientibus. Ephelides sunt maculae acquisite, nævi vero sunt congeniti, nude discrepant.

1. *Ephelis a Sole*, *Nigredo a Sole*, *Sennert.* de cutis vitis lib. 5. part. 3. Gallice *Hâle*. L.

Affecti solati. *Ephelis* Græce *απὸ τοῦ ἡλίου*, a Sole dicitur. Differt illa macula nigricans ex eo quod non sit guttata, sed continua, verno tempore, tenerique puellis familiaris, si insolentur.

Præcaveatur umbraculis, chirothechis, &c. Cuticula a sole adulta successu temporis delabitur; puellæ Monspellienses oxycrato utuntur ad hanc nigredinem delendam; aliæ pasta ex amygdalis amaris; aliæ aqua rosarum cum paulillo camphoræ, aut gummi cerasæsum in aceto, vel solis cerâ recentibus sufflunt.

2. *Ephelis gravidarum*. *Sennert.* ibid. c. 2. L. Sunt maculae umbrinæ, solitariae, palmum latæ, frontem præcipue afficientes; tum apud gravidas, tum apud opilatas virginis. Illæ maculae redeuntibus cæramenis evanescent.

Curantur abluendo ex decocto baccarum lauricum melle, vel emulsionem ex seminibus cannabis vel succo ex radice buglossi, &c.

3. *Ephelis lentigo*, *tachos de Reussner*, *lentilles*. L. Est macula corymbosa, seu ex minoribus lenticularibus quoad colorem, & magnitudinem congmentata, quæque, ut *Ephelis a Sole*, partes Soli expostas descendat, sed puellas etiam non insolatas afficit; æstivo in primis tempore crescens, hieme decrescens, atque cutes teneriores, & albidiores inficiens; potissimum apud eas quæ pilo ruffo gaudent, quas vocamus *les blondes*, & *les cheveux ardents*.

Laudantur ad has eluendas aqua ex floribus sambuci, & sâharum destillata, pasta ex amygdalis amaris, seminalibus brassicæ. Lentiginosæ, observante *Rallens*, sunt cacoehymi; ulcera apud eos sunt cacoethæa.

4. *Ephelis ab igne*, *tachos de brûlure*. L. Illæ vel ab ambulatione procedunt maculae, & subflavæ, umbrinæ, quandoque cicatricosæ sunt,

nec ulla arte emendabiles, nisi ad fucos confugiamus; vel a summo calore epidermidem infuscant, quales feminarum tibias, & femora deturpant, si sæpius hieme foculos pedibus supposuerint.

5. *Ephelis lutea*, *color sideris infantum Junckeri*; B.

Est macula flava ariginosa unam aut alteram partem afficiens, recens natis superviens: Vide *Auriginem*.

6. *Ephelis febricitans*.

Est macula ampla livescens, palmi magnitudine, quæ crura, lumbos, aliæque partes infuset, quæque etiam nostalgia non raro comitatur, sed ab scorbutum attingit, ut *ephelis vitæ*, vulgo *vibices*, ad ecchymomata spectat.

### IV. GUTTA ROSEA, *Goutte-Rose*, *Couperose*, *Rougeurs*.

Cognoscitur ex maculis faciei rubris, guttatis, parum prominentibus, aut asperis, & diu permanentibus. Diuturnitate differt ab erypelate.

1. *Gutta rosea simplex*; *tachos hepaticæ*, *Verduc Pathol.* tom. 1. pag. 192. *Goutte-rose* *Turner*. Gallici. L.

Sunt maculae subsæpæ, eminentes, rubræ, corymbosæ, quæ faciem sæpius, quandoque brachia, collum, pectus aggrediuntur, sine desquamatione, sine pruritu notabili: nasum sæpe tuberibus deturpant in vinosis. Difficillime curatur per medicamentum sanguinis acrimoniam, & fervorem competentia, qualia sunt iuscula refrigerantia antiscorbutica; serum lactis, lacticia, acidulæ, balnea præmissis diureticis, ut iusculis ex testudine, ex cancriis fluviatilibus, millepedibus. Dein ad topica deveniendum, qualia sunt testacea in succo limonum dissoluta, cosmetica vulgarissima, lac virginale, pomata, &c.

2. *Gutta rosea herpetica*, *Sennert.* cap. 6. S. r. lib. 5. *Couperose dartreuse*. L.

Distinguitur per pruritum, pustulas squamosas, quæ faciem, nasum derurpant.

Curatur ut herpes. De hac specie vide *Gabelbruerum*.

3. *Gutta rosea syphilitica*, *Convenne de Vénus*; G. Sunt pustulae rubræ, rosæ, duræ, callosæ, circulares, non fastigiatæ, summæ parte microsæ, sicca, sine pure, aliquando humidæ, manentes, squamosæ, furfuraceæ, flavæ in labiis, naso, sæpius circa frontem, & tempora, poneque aures, ubi seriatiim dispositæ veluti corallum referunt, vulgo *le chapelet*. *Afrus de morbis veneris* lib. 4. c. 1. n. 4.

Signa sunt syphilidis confirmatæ, & curantur ut syphilis.

4. *Gutta rosea febrilis*, *De Meyerey*, t. 2. n. 241. B. In febribus malignis observatur gutta rosea, in qua nasus purpureus, brunneus, nigricans, tumidus, pustulosus evadit, quæ symptomata mortem imminenter prænantiant: ex viginti quinque ægris has affectis vix unum alterumve evasisse observavit *Auctor*: accedit gangæna aromaticis curanda, non vero scarificanda.

V. NÆVUS, *Ensis*.

Est macula congenita, quæ vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partus eminentia.

1. *Nævus scillium*, *nævus lenticularis* Sennerti; vulgo *foin*; L.

Est macula nigricans subrotunda, parva, una vel multiplex, quandoque emineas, & verrucosa; alias plana, quæ nedum noceat, sæpe in facie ita placet, ut similes maculas, cum deficient, effingant puellæ.

2. *Nævus maternus*, Sennert. L. P.

Est decoloratio congenita, certis temporibus evanescens vel decrefcentis, aliis revertens, quæ quidpiam matre gravis cupitum, ipsique de negatum, ut vulgo ferunt, repræsentat, ut æcum, morum; carnem apri, atque quo tempore fœtus, mori, fraga maturefcunt, vividiori calore, nitet, & apud puellas suppressis catameniis inrumescit. Laudant Germani ad hoc vitium sanandum improvisum contactum manus cadaveris humani.

VI. ECCHYMOMA. *Ecchymose*.

Est macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, successu temporis flavescens, noncongenita, nec aspera, sed plana aut parum prominens, & subfolitaria.

1. *Ecchymoma ab igne*, *Ecchymosis* Auctorum, *Sugillatio* Latinis, *Livor* Sennerti; *pelidno* Græcis; *meurissure*, *contusio* Gallis. D.

Differt ab aliis speciebus per cognitum imperum quo corpus contudens partem sugillatam impigit, unde differt a vibice.

Cognoscitur etiam ex dolore, & commixta quandoque inflammatione, conjuncto vulnere, &c. Pendet a cruore in textum cellulofum effuso, cuius color trans epidermidem aut cutim pellucet.

*Curatur* larga aut repetita phlebotomia, & potu calido resolvente, fomentis similibus, ut ex parietaria confusa cum aqua vitæ mixta, vino calido: si levis sit contusio, sufficit sæpe aqua frigida ex qua charta madens parri apponitur, vel unguentum album Rhazis; si metus sit gangræne, aqua vitæ camphorata, aqua Regiæ Hungariæ, sapo Venetus in urina, vino, vel aqua vitæ solutus, applicantur immo scarificationes instituuntur; vide *Haister. Chirurg. de contusionibus*, t. 16. & de venæ sectione, cui supervenit ecchymosis.

2. *Ecchymoma melasma* Galeni; *nigror* Latinis. L. Est species diuturna, constans, senibus familiaris, quæ potissimum tibias infestat, sine principio evidenti, unde a prima specie differt. Mulieribus a catameniis suppressis supervenit.

3. *Ecchymoma vibex*, *vibices* vulgo. A.

Vibices sunt livores sponte in morbis acutis, ut typho, peste, variola supervenientes, & longitudinales, quales verberibus cæse fuissent partes, vel flagellatæ; curantur ut morbi acuti.

4. *Ecchymoma scorbuticum*. C.

In scorbuto præter maculas exiguas, flavas, dantur & vibices & lentiginis nigricantes, vel lividæ in tibiis, nec non magnæ maculæ palmæres, umbrinæ vel livescentes in cruribus, lumbis, dorso.

5. *Ecchymoma a compressione*. D.

Clunes, coccyx, dorsum, quibus diutius incumbunt ægri, in morbis tum acutis tum chronicis, a diuturna compressione nigrescunt, excoarantur, & non solum epidermis ac cutis gangrænaeant, sed quandoque malum hoc profundius serpit.

*Curatur* 1. mutato situ & sublevata parte a pressione per convenientia pulvinaria; 2. vino in quo rosæ rubræ ebullierint, ipsique rosæ applicatis; 3. remediis gangrænam avertentibus.

6. *Ecchymoma hypopyon* Paul. Æginetæ, L. seu *hypophthalmia* Hippocratis, affectus ab hypopyo diversissimus est.

7. *Ecchymoma palpebrarum*. *Ecchymoma hypophthyma*. Æginetæ, Sugillatio L. ad caliginem referenda est, quæ humalops Hippocratis.

8. *Ecchymoma hypopyon* Paul. Æginetæ, Sennerti lib. 5. a prima specie non discrepat.

Cæteræ maculæ pertinent ad caliginem in dysæsthesiis, petechiam in exanthematicis, & ad decolorationes in cachecticis.

## ORDO SECUNDUS.

EFFLORESCENTIÆ, *Eluvies*.

Differt a maculis quod præter coloris mutationem concurrat cutis elevatio per pustulas, phlyctænas, varos, papulas, similesve asperitates cutaneas.

*Pustula* sunt tumores exigui, ut diametri circiter linearis, colorati, qui apice suppurantur, & in pus vel in crustas abeunt, (Gall. *pustulæ*, *bubæ*.)

*Papula* differt a pustulis ex eo quod non suppurantur, sed quid humidi apice rejiciunt, deinde abeunt in squamas furfuraceas, (Gall. *boutons*.) Græc. *Elythria*.

*Phlyctæna* sunt tumores exigui diametri linearis, qui pellucidi sunt, & aquam vel serum continent, & ruptis exsiccantur, excoarantur, (Gall. *Phlyctènes*.)

*Vari* sunt tumores duri, colorati, pertinaces qui sine suppuratione, ac desquamatione, diutissime permanent, veluti tubercula scirrhouea, Grecis *anthoi* dicuntur, (Gall. *bourgeons*.)

Hi affectus sunt gregales & cum exanthematicis inflammationis, ut variola, miliari, rubæola, &c. nec non cum impetiginibus cachecticis, ut scabie, lepra, strabæmia, tinea, &c. conveniunt; verum sunt levioris momenti quam ut morbis accenseantur.

VII. HERPES, *Herpes*, ou *Dartre*.

Est papularum congeries, seu efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis; in squamas furfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

1. *Herpes simplex* Sennerti; *Dartre farineuse*, *dartre sèche*, L. P.

Colm-

Componitur ex papillis rubris, parum prominentibus, pruriginosis, non excoctis, nec crustaceis.

Distinguitur ab aliis, maxime ex eo quod facile sanetur vicio in parte tantum hærente, & sanguinis massam non contaminante. Principium est materies acris perspirabilis retenta, & mora acrior facta in cryptis seu glandulis sebaceis cutis & faciei.

*Curatur* empyrice topicis sæpius alkalinis, ut oleo tartari per deliquium, oleo ex chartis, linteis, vel lignis combustis effillante, ruffo, acris, amaricante, quod saliva jejuni hominis dilutum parti innungitur.

2. *Herpes serpigo* Turneri 2. *Species* de morbis cutaneis cap. 5. *Ermicia ambulatoria* Celsi; *dartre encroûlée*. L.

Papulæ peiores, corrosivæ, congestæ aream circularem constituunt, acute pungentem, valde periginosam. Illæ papulæ relictae priori parte in viciniam se diffundunt seu serpunt & pertinaces sunt: non raro exsudent humorem tenuem, & acrem, sed non suppurant nec resolvuntur: major est sensibilitas, & acrimonia quam in simplici.

Hæc species exigit remedia sanguinem edulcorantia, lixiviantia, ut *miliaris*; nec non topica lenientia, ut ceratum Galeni, vel unguentum rosaceum cui decima pars sulphuris aut benzoini, aut duodecima pars mercurii præcipitati albi adjungitur.

3. *Herpes miliaris* Sennerti lib. 5. cap. 17. Amati Lusitani Cent. II. cur. 37. Frid. Hoffmanni Tom. II. pag. 426. Turneri 3. *species*; *dartre miliaire*. L.

Juxta Sennertum constat ex hydatidibus seu vesiculis granum milii æquantibus; verum rectius ex Turneri sunt papulæ exiguæ, corymbosæ, in diversis partibus, ut collo, lumbis, pectore, femoribus, circum inflammatae, febricula stipatae, quarum apici rupto inhæret molecula crustacea subrotunda, hævescens, grano milii similis, unde nomen; apex pustulæ albescit, cum suppuratur; sed pus est viscidum, crustaceum; interea applicatis angustis perspirabilis materies, & unguen cutaneum linteis adhærent, unde non parum incommodum, quippe motu corporis solvitur hæc hærentia, quod dolorem creat, & epidermidis excoctionem. Major est sensibilitas, & acrimonia ac seror quam in serpigne.

Potissima serpiginis & miliaris herpetis cura versatur in edulcorando, & leniendo sanguine, in quem finem præmissa phlebotomia, & catharsis, infusa ex pullo, ranis, cum paucis canceris fluviatilibus vel millepedibus, radice enulæ, lapathi, solis cichotidis, beccabunge, nasturtii aquarici, fumaris, acetosæ, &c. repetenda sunt, serum lactis harum plantarum succis alteraturum diu usurpandum; lacticia deinde balnea alternanda; verum nihil est utilius quam acidulis Vallenibus aut similibus per triduum identidem, tempestate convenienti ante balneum

usum, purgare, quod omnibus topicis præstat. Interea æger cibis insipidis, refrigerantibus natus, fructibus mollibus maturis, aqua sola absque vino; valeatque caffè, cocolatæ, liquoribus spiritibus; & quod topica, forte satius est uti tantum illis quæ adhesionem cum tunica præpediunt, ut cerato Galeni recentissimo bis in die renovando; fervorem tamen optime sedat liquor Saturni, velleus salcerato commixtus; cavendo tamen ne repercutiatur nbiq; simul ichor acer, qui eo periculosis supprimatur, quo malum est magis inveteratum; unde caute usurpada sunt topica acidula, & repercutientia ab Auctoribus laudata, quæ acetum, lithargyrium, alumen & similia recipiunt.

4. *Herpes effluviens* Galeni, *Herpes Galeni* Method. Med. cap. 17. *Herpes exedens* vel *dartre* Turneri spec. 4. *Dartre vengante*; C.

Differt ab erysipellate exulcerato, quod solam cutem exulcerat herpes, erysipelas vero carnes profundius exeat, cum exulceratur; huic speciei maxime competunt remedia interna, dum de miliaris, præscripta, per plures menses usurpata, intereasdem ulcus illud aqua hordei, & melle, vel aqua acidula tepida bis in die affusa mundatur, dein vero cerato Galeni, vel unguento quodam cerussæ, lithargyrum recipiente regitur; immo quandoque ad fortiora deveniendum, ut præcipitatum alium, æthiopem mineralem, æruginem, nec non ad eichærotica, quæ laudabilem suppurationem denique promoveant, consueta methodo curandum.

5. *Herpes syphiliticus*; *Herpes venereus* Astruc. lib. 4. *Dartre vérolique*; C.

Cognoscitur tantum ex signis syphilidis illum foventis, sive herpes sit simplex insidens auribus, capitis parti capillatæ, sive sit exedens. Ille confirmatam syphilidem adorat, resistitque omnibus remediis vulgaribus; soli mercurio, aut alteri specifico syphilidis cedit; adeoque, præmissis remediis generalibus, quæ ad litum mercurialem præmitti solent, at phlebotomia, catharsis, balneis triginta, vel quadraginta, digita lactea, &c. ad litum mercurialem deveniendum est; simulque unguentis admiscenda præparata mercurialia leniora, ut æthiops, aquila alba, præcipitatum album. Sunt quini hoc morbo commendat pilulas Bellostii, quæ minime spernendæ videntur.

6. *Herpes periculis* Græcor. *zona* & *zoster* quotundam; Gall. *la Farretière*; L.

Est herpes farinaceus siccus & simplex, qui poplite; ubi zona vinciri solet, infestat.

7. *Herpes collaris*; *la collier*. L.

Collum Ecclesiasticorum nostro tempore sæpius herpete afficitur, propter acrem tincturam, qua linteum ipsorum collare inficitur, calcem admittens; distinguitur vero ab aliis speciebus collum etiam afficientibus ex figura circulari collaris quam imitatur, hæc species probata principiis externis inuri posse herpetes; sanatur autem remoto principio.

8. *Herpes pustulosus*; *Dartre boutonnière*. L. Sont

Sunt pustulæ pili circiter magnitudine, discretæ, raro confluentes, atro-rubæ, intense dolorificæ, cum pruritu, glabræ, per collum, mammas, &c. sparæ, quarum apex cito nigricat, sensum amittit, exsiccatur, & necrosi corripitur. Sanatur hic affectus cerato Galeni, vel butyro illita crusta decidit.

9. *Herpes zoster*; Zona ignea Fr. Hoffmanni T. II. pag. 426. Zona Russellii de usu aquæ marinæ pag. 124. *Cinture dartreux*. *Theingles* Anglis. An diversus a *perifolide*?

Herpes mali moris pectus speciatim & præcordia occupans, cum cardialgia, calore morbofo, cutis inflammatione, dolorifica exulceratione, pustulisque parvis & lucidis, instar cinguli ad manus latitudinem in pectore dispersis. Vide *Saurinum de abscessibus* L. 4. c. 9. *Tulpius* I. 3. *Langium* qui ex ulcere cruris intempelli-ve sanato hunc ortum vidit.

### VIII. EPINYCTIS.

Cognoscitur ex phlyctænis atro-rubris, aggregatis, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientibus, & noctu potissimum acriter pungentibus.

1. *Epinyctis vulgaris*, R. P.

Phlyctænæ mihi visæ sunt, licet primo aspectu litæ & crassæ pustulæ videantur, parum eminentes, calore urenti per noctem stipatæ, quæ apice crepant, acrem ichorem fundunt, mane sedantur, vespere iterum intensius rubent, febriculum, anxietates, pervigilium creant, & aliqualem ægritudinem, quæ plures dies divexat.

Curatur phlebotomia, diæta refrigerante, cathartico antiphlogistico, iussulis emollientibus; parti vero applicatur cataplasma emolliens ex floribus malvæ, seminibus lini & similibus; demum sedato dolore epidermis frustulatim dilabitur. An ad psydriacæ genus pertinet, viderint alii; nec enim illa genera adhucdum sunt satis determinata.

2. *Epinyctis-pruriginosa*, malum cutaneum singulare D. Billebaut Vandermonde 1756. pag. 349. L.

Brachia & crura obsident maculæ rubro-rutilæ quæ extra lectum statim apparent cum impetigine pruritu; ægro vero vespere lectum repente evanescunt, & sic porro per annos integros. In muliere post graviditatem maculæ tumuerunt, & pollicis, aut semi-pollicis diametrum adeptæ sunt cum pruritu intolerabili: tempore quidem graviditatis evanuerunt, sed dein omni tempore vixerunt, noctu omnino retrocedentes, & mane surgentes in lecto iterum afficientes; *Epi* ante & *nyctis* nox, quia sub noctem tantum seviunt.

De *Termintho* quem non vidi, aut non cognovi, nil habeo quod dicam; suspicio ejusdem esse generis cum epinyctide, aut esse suæculum diffusum.

### IX. PSYDRACIA, Eruption.

*Psydriacum* communiter dictum est, juxta Ga-

lenum, effervescentia. quæ in diversis corporis partibus accidit, in summo rubicunda; alibi vero psydriacæ esse vesiculosas. vel phlyctæno-des innuit: verum sæpius accidit ut initio effervescentia sit rubra, intus firma, quæ deinde cuticulæ separationem acute inducit, unde intus cava, vacua, vel sero flavo turgida videtur. Huic speciei sequentes accensentur.

1. *Psydriacia porcellanæ* Rosa saltans Avicennæ, vulgo Montspeli la porcelaine; B. an *Esfera* Sennerti?

Sunt efflorescentiæ solitariæ, pollicaris aut majoris diametri, in pectore, brachiis, aliisve partibus testis subito exorientes, dein recedentes, iterumque redeunt, coloris rosei, diffusæ, & numero plures.

Hic affectus raro febriculam comitem habet, vere non raro omnis ætatis & sexus, sed præcipue florentes & biliosos, aggreditur; & diætæ tenui, refrigeranti victu, aut ad summum ope phlebotomiæ intra paucos dies evanescit per resolutionem; nec enim suppuratione, excoaratione, aliave evacuatione terminatur.

*Psydriacia* a *vespis*, siquæ ex de gustas, confinis, &c. B.

Morsus culicum, apum, vesparum sequuntur efflorescentiæ rubro-roseæ, erysipelatæ, dolore pungitivo vivido stipatæ; & si oculis attentis singula efflorescentia circumspiciatur, in apice videtur punctum, cui infestus aculeus sæpius infixus remanet.

Contra puncturas ab apibus infestas nullum melius est auxilium, monent *Ræumurius*, quam partem punctam aqua frigida. identidem renovata fovere. Rustici partem tribus herbis diversi generis quibusvis obvisis fricare solent; aculeum acicula extrahere non raro tentant, qui oculati sunt; sed dolor pendet a veneno acido, corrosivo quod secum intulit aculeus. Huc spectant vespa, crabro, culex pipiens; culex pulicarius, &c.

3. *Psydriacia urticata* B.

Urtica urens habet aculeos tenuissimos succo venenato pervios, qui efflorescentias acriter pungentes & erysipelatosas excitant.

Phascioli pruriginosi Americanorum excitant pruritum intolerabilem per aliquot horas, villis suis acutissimis oculum furgentibus.

Cacti diversæ speciei tenuissimis etiam spiculis pungunt, sed veneni expertes sunt.

4. *Psydriacia ab acario*, *Sitones*, vulgo, Gall. *Cirons* B.

Nomen Sironis tribuitur & papulæ, & insecto quod hanc excitat; insectum illud intra manuum, pedumve cutem se insinuat, in pustulas actollit pruriginosas rubras, quæ dein exulcerantur; sed præter hanc speciem sunt alia insecta, quæ nos lacessunt, & efflorescentias diversas creant, ut formica ruffa, formica rubra, pediculus pubis, pediculus humanus, cimex lectularius, pulx communis, alique quorum punctura ita imitantur quandoque efflorescentias spontaneas, ut Medici incerti hæreant, maxime

me si dormientes ægri fuerint ab hisce infectis lacerati, adeoque originem psyciatricæ ignorent. Alios morbos ab infectis excitatos videre est in Malide inter imperiginolos cachecticos.

Sirones acæ effodiuntur, & locus affectus vino vel aceto, in quo pauxillum nitri, vel salis marini fuerit dissolutum, abluitur; vel etiam lixivio vulgari cinerum detergitur; dein unguentum amarissimum ex decocto absinthii, tanacetii, myrrha, aloë confectum, aut denique, si affectus pertinax fuerit, decima hydrargyri parte onustum, parti illinatur.

5. *Psudratia acne* Aetii, acna *vari* Sennerti, lib. 5. c. 13. *Fanthos* Græcis: Gall. *Bourgeons* L. *Psudraciis* connata sunt tubercula faciei, *vari* dicta, ait Sennertus. Sunt scilicet tumores exigui, rubri, duri, pertinaces, qui vix unquam suppurantur, nec dolent, nec prurunt, & tantum faciem decurant, maxime distincti a tuberculis frontis, de quibus egimus in gutta rosea syphilistica, necnon ab elephantiasi, quæ cum rucedine, faciei inflatione, & tuberculis initio rubris incipit.

Tribuuntur alimentis crassius, & apud quosdam pueros usque ad adolescentiam perleverant, dein evanescent.

6. An ad guttam roseam attineant potius, ut vari vino deditorum iudicent alii, Remedia ex Sennerto eruite, cap. 23. lib. 3. part. 1.

6. *Psudratia diurna* Billebut *Journal de Medec.* Novemb. 1756. L.

Mulier a pueritia ad ætatem 24. annorum obnoxia erat maculis rubris, nitidis, pruriginosis, quæ successu temporis pollicis extensionem adipisciebantur, cum superficiali tumore, calore acri, quæque per totum corpus manebant, & noctu evanescebant.

#### X. HIDROA, Echanbonlure.

Sunt exanthemata milii granis non maiora, subito in cute exorta, confecta, & ut plurimum fugacia, non coherentia. phlyctænoidea.

1. *Hidroa sudamina*; *sudamina* Sennerti; *Esfemata* & *idrea* Gewicz: *asof* & *alhafaf* Avicennæ: Gall. *Echanbonlure*, vel *Echanbonillure*; Occitanis *cambrant*; *doublet* de sang. B.

Exanthemata illa dorsum, pedus, brachia, crura sæpius afficiunt, numerosissime confecta, rubra, pungentia, acriter dolentia; juvenes & calidos potissimum adoriuntur æstivo tempore.

Hic affectus vitæ refrigerante curatur, & sponte recedit; attemen exanthemata possunt elui aqua rosarum aut plantaginis cum camphoræ grano uno aut altero, vel balneis domesticis etiam cedunt, quorum tamen usum horum eruptio plerumque iuvatur. Exsiccantur demum hæc pustula, & delabuntur.

2. *Hidroa alba*. B.

Ætate pariter similia prioribus per cutem exoriuntur sudamina, sed cuncti concoloria, pelucida, vesiculosa, granis milii non maiora, pungentia, sero turgida atque fugacia, miliaribus affinia.

Cutis etiam a frigore subito exasperatur, & vulgo cutis asnerina, Gall. *peau de poule*, dicitur, exiguis vesiculis grano milii minoribus, sub epidermide exortis.

3. *Hidroa symptomatica*. B.

Sunt pustulae rubrae, pruriginosæ, quæ in aliis morbis cum sudore potius erumpunt, ut in Rachialgia vegetali, atque tunc acidum molet sudor.

### ORDO TERTIUS.

#### P H Y M A T A.

Vulgo tumores, sunt protuberantia notabiles, sæpius solitariae, a fluidis intra vasa minima congestis productæ.

Differunt a maculis & exanthematibus, in quibus nulla omnino aut exigua partis elevatio, & potius asperitas ex numerosis edematibus, & cystidibus, in quibus magna receptacula fluidum collectum continent, unde fluctuatio; ab *excrecentiis*, quas firmitas carniem vel ossium similis comitatur; a *procedentiis*, quæ parti solidæ & sua sede dimotæ debentur. Galenici omnes protuberantias ad phymata inepte revocabant, ut satisdici divisioni quadripartitis humorum, quibus singula tumorum genera tribuebant, unde emphysema excluderetur, cum aera ad pituitam, bilem, melancholiam, sanguinemve reducere difficile foret.

Phymata terminantur resolutione, desquamatione, decorticatione, suppuratione, induratione, gangræna, vel remotione.

Optima terminatio, nisi materies morbifica sit venenata, est *resolutio*; si sit venenata, est *suppuratio*, aut *eschara*, quam comburendo excitamus, quæ est veluti necrosis. *Desquamatio* ad exanthemata multa attinet, ut rubeolam, herpetem; *crusta*, quæ est suppuratio siccata, ad pustulosos affectus, ut variolam, tinea, & decorticatione ad erysipelas, erythema, &c.

#### XI. ERYTHEMA, Eryspela.

In erysipelate est febris acuta, ægritudo gravis, seu morbus; erythema est sine febris graviumque symptomatum fatellitio. Erythema est tumor superficialis, solitarius, diffusus, rubro-rosæ, pressione evanescens, glabritie uniformi præditus, nisi phlyctænis exasperetur, & calore acri urenti, vel pruriginolo stipatus, qui non ad suppurationem, sed ad cuticulæ separationem sponte vergit.

1. *Erythema spontaneum*; *eryspelo communis* B.

Tumor erysipelatosus a causa interna; differt ab herpete, quod sit fugax, herpes vero pertinax; quod sit uniformis, herpes vero papulis, vel guttis rubris distinctus. Non raro crisis instat a levi frigore, subsequente calore; erumpit nummi magnitudine circiter, vel juxta vulnera adnascitur; pendet a materia acri, cruore fluxili, &c., ut ajunt, bilioso, in vas recticularibus cutis collecto, minime vero in glandulis. Hinc fit ut pressione recedat, eaque cessante velocissime revertatur rubedo, quod nul-

lum

jam sanguinis hærentiam arguit; omnes membræ corporis ultima vasa sanguifera habent reticulata, & hoc reticulum est sedes erysipelatis, vel cutanei, vel introversi. Materiam erythematis introvertitæ pejor est, quo acrior est; si serum acre sub cuticula effundatur, fit phlyctæna, quæ exsiccata abit in crustam, hinc erythema crustaceum.

Erythema est vox Hippocratica qua rubores erysipelatosos designavit *Aulus in Coacis*, & *Epidemiis*. Erythema circa nares, ait *Hippocrates*, profusumque alvum significat; *Duretus*, erythema vertit per suffusionem erysipelatosam.

Sola natura hæc erythematis speciem sæpe sanat; quippe materies acris calore resoluta perspirat, & quod crassius remanet, cutis desquamazione demum foras emittitur; Medici itaque officium est hæc excretionem sustinere, juvare, quæ feliciter succedit præmissis generalibus auxiliis, scilicet phlebotomiis & catharticis; raro cruor educus in patella concrevit, quod in phlegmone frequentissimum; sæpius thrombus sero flavescenti innatus; facies ab erythemate præ aliis locis afficitur: abstinendum est sedulo a repellentibus frigidis; acris & calida dolorem, fervorēque intendunt; liquida utcumque initio tepida cito refrigerant, & nocere possunt, ita ut sæpe tutius sit abstinere a topicis; interea decoctum aquosum florum sambuci, linum vino aquato madidum, applicari possunt. Potus diluens & diaphoreticus, non acer juvat perspirationem; intra paucos dies epidemias frustulatim separatur, & sic sanatur erythema. Vide plura in *erysipelate* inter inflammatorios exanthematicos.

2. *Erythema ambusio*, Heister. *Chirurg. lib. 4. cap. 15. brûlure*.

Fluida omnia bullientia, solida omnia candentia, vel fervidiora, ignis, sol meridianus ipse, maxime vitris causticis adunatus, comburunt, & pro diverso gradu caloris, ejusque duratione ac partis sensibilitate diversa sequuntur phenomena, ut ambusio, escchara, ulcus, gangræna, &c.

Differt ab erythemate spontaneo, quod a principio evidenti, seu fervore corporis admoti pendet. Partes, igneæ ubertim admittit: intra eitis textum sanguinem inflammant, serum rarefaciunt; hinc phlyctænae, seu ampullæ, cutis rubor intensus, dolor acerrimus, tumor diffusus.

Quoniam particule igneæ adhærent corporibus frigidioribus & densioribus fortissimè calidis & raris, sublevarit pars ambusta a ventilatione, seu admotione aëris frigidulæ; aqua etiam frigida sæpius renovata partem immergendam esse docet *Godfrey Missell*. & sedato dolore utendum linimento ex cerussa, oleo, spermate ceti. Nos, ubi nulla est excoctio, utimur vino tepido mero, vel aquato, vel succo cæpæ contusæ, vel atramento, vel oleosis, ut oleo cum aqua conquassato ad unguenti spissitudinem. Phlyctænae minime sunt aperiendæ; inde enim dolor atrocior; his apertis emollientia tantum usurpanda, ut albumen ovi cum oleo lini,

olivæ, vel amygdalarum, pulpa pomi codi, pulcritia ex hordeo, oryza.

Si ulcus addit aur escchara, vide *ulcus* & *gangranam*.

In gravibus & valde extentis combustionibus digesta tenuis, refrigerans, potus spiritu salis aculatus, narcotica, phlebotomia, diversæque cautelæ requiruntur, summumque vitæ periculum imminet; si oculi amburantur, caligo multiplex; si collum, obliquitas accedere solet; ambusio ab oleo bulliente, a calcevia, a metallis fufis periculosior est quam a stramine spiritu vini, &c.

Demum periculum ambustionis est in ratione, 1. intensitatis caloris; 2. extensionis & dignitatis partis ambustæ; 3. temporis per quod ignis applicatus fuit: intensitas vero caloris est eo major, quo corpus urens est densius, gradumque caloris majorem passum est; duratio actionis ignis major est, si corpus fervens parti magis ad hæreat, ut oleum fervidum, &c.

3. *Erythema velaticum*, *macula velatica* *Scnerri*, *affus volatus*; vulgo *feu volage*; *Lean der ilug* *Gabelchovesi*?

Pueri lactentes non raro erythemata habent in facie pertinacia, constantia, intense rubra, uniformia, circularia, monete minoris magnitudine, circa genas, labia: in maculæ centro non raro vidi foramen fuscum, siccum.

Si hæc maculæ evadant crustosæ, an sunt quid diversum a crusta lactea? *Sennerius* se nunquam vidisse fatetur, atque maculas ori, oculis, auribus vicinas pro lethalibus habendas profert, quod a vero aberrare docet *Verducius*; hujus desideratur accurata historia; si calore, dolore careat, ad guttam roseam artinet. Quas vidi, crustosæ non erant, unde a crusta lactea differabant.

4. *Erythema pernio*, vulgo *engelure*, *mule aux talens*; *L.*

Est rubor cum tumore glabro, pruriginoso, pertinaci, extrema potissimum hieme afficiens, ut pedes & manus; calens, quandoque excoctus, qui nec suppuratione, nec desquamazione soler terminari. De nasi pernio vide *Biblit. Medic. Mangeti*, *T. 3. pag. 492*.

Fovetur ab acrimonia sanguinis, & excitatur a calefactione subitanea pedum manuumque dum algent; gradatè etenim calefactæ partes minus pernioibus sunt expositæ: perspiratio acris retenta roborem, calorem, pruritus excitat, pruritus vero illo calore lectuli inrenditur.

Perniones integri optime curantur frequenti irrigatione partis cum spiritu salis, qui acrimoniam alkaliam materię morificæ innocuam reddit, ac pernioes excocti debent emplastro de mucilage defendi, imo cerato Galeni cum aqua Saturni deliniri in integris; loco spiritus salis solutio aluminis convenit, item fomenta aromatica vino rubro mixta, necnon adstringentia tonica, decoctum baccharum juniperi, decoctum cassaneum &c. Rapa costæ perniois applicata, pellis leporina, nix applicata, muria etiam a diversis Medicis laudantur. Vide *D. Tissot. Avis au Peuple, Ch. XXX. n. 462*.

Rubor femorum & perinei apud infantes ab urina, facies quibus involvuntur inficiente; hoc ludentibus est familiare, unde anxii, & insomnes evadunt, sæpe etiam excoriantur maxime in plitibus fere angulis.

Curatur adpersio bis in die cerussæ pulvere; alii salicis cariosæ teredine aspergunt, summa præterea requiritur eunicarum mundities, & frequens detergio linivialis, dein ablutio aqua, secus lintea lædunt.

6. *Erythema paratrima*, paratrima Græcis. B. Rubedo clunium in sequinatis, pedum in pedibus, manuum in operariis, dori in decumbentibus ægris, procedens a contusione vel assidua partium compressione, unde excoriantur, dolent, adhærent vestimentis, linteis; hinc cruciatus a sitis mutatione in coecyge; etiam rubedo illa livescit, & gangrænam post se trahit. Illa species fugax est, & ablato principio procatartico aufertur, nisi a principio interno pendat, & tunc non gangræna est, sed necrosis, quæ, si imperite tractetur, lethalis est species quam si negligatur. Vide *Necrosin* Class. X.

Attriti pedes viatorum sublevantur foliis viridibus alni; si excoriatio accedat, sebo salo.

Attritus coecygis sublevatur pulvinaribus excavatis, quibus lumbi, & femora sustineantur, nec non decocto petalorum rosæ rubræ in vino rubro, aqua vitæ camphorata, &c.

7. *Erythema gangrænosum* D. Quésnay de la Gangrène; A.

Est coloris minus intense rubri, qui cito in lividum abit, cum eirculo in ambitu partis gangrænose rubro, qui procedens gangrænam repentem anteit; nullas est tumor, nulla ad supurationem tendentia; pars est quidem firma, sed cum mollitie pastacea, quæ digiti vestigium servat, si pressa fuerit; illud Erythema supervenit vulneribus a catapulta, a contusione, nec non sine vulnere prægresso; nulla est tensio, nec ullus calor notabilis. Cura eadem est ac gangrænæ cuius est symptoma. D. Quésnay de la Gangrène pag. 40. 325. 333. Accedit etiam punctura venenatis.

8. *Erythema velans*, *Flamma velans* Tulpii l. 3. Obs. 97. *Vena du visage*. B.

Est accidens fugax, hythericæ & menostasæ non raro comes; subitæ scilicet calor & rubor ut in verecundia, identidem a pectore ad faciem assurgit, cito transiens, quandoque levem sudorem & vertiginem excitans.

9. *Erythema a punctura*. B.

Est illud quod puncturæ venenatis inferunt; scilicet puncturæ agum, vesparum, crabonum, culicum, tabanorum, libellularum, scorpion, &c. maxime si palpebræ vel residuæ faciei partes pungeantur. Succus venenatus ab auleo fistuloso in vulnus insinuat, inde tumor ruber, glaber, diffusus, maculosus; cum numerosæ sint puncturæ, dolores acuti, pyrexia, per-vigilium, syncope, convulsio, quæ tamen symptomata neminem & medio tollunt, sed intra quatuor dies evanescent.

Cum illi. *Reamur* diversa medicamina exper-tus esset, nullum aptius esse concludit quam partem punctam aqua frigida continuo renovata co-luere. Suadet illi. *Tissi Avisan Peaplan*. 234. 1. aculeum insecti avellere: 2. succo cerefolii, vel petroselinii, vel geranii Robertianij, vel floribus sambuci partem fovere, vel borum florum deco-cto pannis laneis excepto tepido tegere, cui panxillum theriacæ addi potest; vel cataplasma ex mica panis, cum lacte, melle & pauxillo theriacæ adhiberi potest: addit & 3. pediluvia, & 4. potum ex infuso florum sambuci cum nitro. Rustici tres herbarum quarumvis species con-tundunt & cataplasmati isleri adhibent.

Quid sit Erythema quod ignem Sancti Anto-nii vocat Auditor, ab eo est. sciscitandum.

## XII. OEDEMA, *œdème, infiltration, enflure*.

Est tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expertus. Pendet a sero intra tex-tum cellularem collecto, ob impediment ejus in vasis lymphaticis circulationem.

1. *œdema flaccidum*, *œdema commune*, *œd-matie, infiltration*. L.

Ea est species in qua sœva a digito premente impressa remoto digito aliquandiu perseverat; pendet itaque non a sola collectione lymphæ in textu cellulari, sed ab intima partium etiam fibrosarum relaxatione per serum aquosum, quo imbibitur suere, unde elasticitas amissa, seu flacciditas, & sensibilitas imminuitur.

Si ille tumor œdematosus pedes, tibias, se-mora, aut multas partes occupet, tunc mor-bus constituitur, qui œdematia vulgo; aut si totum corpus occupet, phlegmatia vocatur. Hoc symptoma ascitum, hydrothoracem, cachexiam, chlorosim, empyema, phthisim inveteratam, graviditatem, aliosque morbos chronicos non raro comitatur. Vide *Anasarcam* in cachecticis.

2. *œdema crystallinum*, *Gallice la cristalline*; C.

Est penis & genitalium tumor œdematosus a viru syphilitico excitatus; curatur ut syphi-lis. Vide *Hydrosculum* infra in *Osteogelo*; præpu-tium potissimum in hoc affectu tumet, & est pellucidum ut crystallus, ait *Cockburn Libr. de Gonorrhæa*. An caries Ant. Musæ, & Tareli Italorum? Vide curam apud *Cockburn* cap. 6.

3. *œdema periostei*, *Petic* maladiæ desol, des-figues de l'exostose, pag. 438. T. 2. C.

Cum tumor partium, cuti concolor, indolens, vel vix dolens, est circumscriptus, solitarius, sub-jacentque immediate ossa, ut in parte antica ti-biæ, œdema periostei adesse indicatur, ex eo quod fit cutis superflua, & vacillans & mobilis; si leviter prematur digito, nullum vestigium re-manet; verum si fortius prematur, impressio statim apparet, & parum perseverat exterius, interius vero periostei depressio tactu persentitur.

4. *œdema serpentina*, *serpentina* Gallo-Provinciæ.

Est œdema pedum in recens natis; etymi rationem, ignoro. Curatur linteis calidis, & confectioe de hyacinto intus data. Huius principia desiderantur.

5. *Oedema hyssericum* Sydenhami Epist. de hyss. *genfement hyssericum* Raulin Traité des affections vaporeuses. L.

1. Alterutrum tibi, suram scilicet afficit; 2. ad tarsum, & pedes non diffundit, nec ab illis incipit, ut vulgare; 3. velligum digiti prementis non servat; 4. hoc hyssericis tantum accidit.

6. *Oedema varicosum; bouffissure; A.*

Est tumor oedematofus faciei, & palpebrarum; qui io variola confluyente superveoit, cum pyralismus definit, ac eo recedente supervenit tumor manuum veluti criticus: in variolosis malignis hic tumor est non raro petechiis variegatus. De oedemate rubecolam saepius excipiente, Vide *phlegmatismum*.

7. *Oedema lacteum; infiltration lacteuse, lait épanché, C.* Vide Mémoires de l'Acad. R. de Chirurgie Tom. 2.

Puerperis, rarius gravidis, accidit; textum cellulofum inflat; dolore stipatur; mammae, inguina saepius afficit; phlebotomis; diureticis, fomentis resolutentibus, impognatur. Vide *Mastodyniam lacteam, Ischia lacteum &c.*

8. *Oedema urinafum.* Raulin Observations de Médecine p. 199. Illud ex ischuria supervenerat. 9. *Oedema purulentum.* Haller Physiol. Lib. I. pag. 14. & 154. C.

### XIII. EMPHYSEMA; *emphyseme, bouffissure.*

Tumor fluctulentus est, diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.

Fit aliud a vulnere thoracis quo aer in textum cellulofum insinatur; aut est artificiale cum mediante folle vulnus cutis subente aer in textum cellulofum insufflatur, ut quidam laniones in milite quem olim vidi experti fuot; sed haec ad pneumatofim pertinent, ut emphysema animalium in vacuo. Quibus in morbis fit Emphysema recenset Ill. Hallerus Physiol. Lib. 8. Sect. 5. Art. 6. scilicet in gangraena, boum morbo seu dysenteria bovilla, variola, rachitide, hysteria, scorbuto, a loculis suppressis, &c. saepius a vulnere thoracis. Vide *Pneumatofim Class. X.*

1. *Emphysema spontaneum. L.*

Differt a tympanite & meteorismo, quia sedem habet emphysema in cute, seu aer nidulatur in textu celluloso; extrahitur autem aer ex sanguine vel motu putrefactionis, unde carnes omnes quoque putrescunt, observante Pringle, aquae supernantant, vel a fermentatione, quae in statu morbofo possibilis est. Videantur experimenta D. Hales & Cotes de aëris productione.

Emphysema curatur vel aeris destructione, vel ejus emissione, destruitur aer seu elasticitatem suam amittit successu temporis a solo calore calido animalis, ut constat experimentis Mayow & Hales; ergo sine remedio solo calore partem evanesceret, nisi causa aerem elasticum extrinsecus perleveret. Huic destructioni favebunt succuli ex herbis, seminibusque aromaticis, camminativis, ut fœniculi, anisi, anethi, cumini, fantonici, chamæmeli, lauri, decoctis inde pra-

paratis in vico, cum floribus sambuci. Vide *Verduell pathologiam de Emphysemate*, pag. 140. art. 5. Vide etiam anemuriosim in cachectis, & *Mastodyniam in doloisels, Oscheosiem flutulentam infra, &c.*

### XIV. SCIRRUS, *scirrhus* Cæli Aureliani, *Squirre.*

Vulgo definitur tumor durus, veniens, indoleos; dicitur de lioc aut hepate; verum definitionis nimis generalis est, nec cum scirrhus confundi debet strumæ, bubones, multo minus exerescentie callosæ, duræ, ossæ, verrucosæ, escharæ, sclerismata; genus hoc itaque intra sequentes species retriogemus, doctoribus rectius determinandum.

1. *Scirrhus hepatis; Squirre au foye. C.*

Dicitur adesse quoties infra tegumenta hypochondrii dextrii persistitur testiditia solito major, constans, cum imminuto sensu, seu sine dolore alio quam qui ex pondere adactis procedit.

Cum exigua est resistentia, diuturna tamen & sine dolore, *obstruio* hepatis dicitur, seu *scirrhus* incipiens imperfectus. Sinullus fit tumor; & sit totum durities, quæ quandoque cum volumine visceris imminuto aut condensato reperitur, teste *Scipulhorro Bonast*, vocatur *scirryma*; sed scirrhum visceris ab ejus sclerismate vix distinguere potest Medicus, nisi exenterato cadavere, cum nativum visceris volumine in dato homioe vix cognoscatur, nec distinguamus tactu urrum pars visceris, utrum totum viscus duritie afficiatur.

Quæ narrat Veteres de humore melancholico & pituitoso crassis, inspissatis, meræ fabulæ sunt, in physices ignorantiam refundendæ. Quoties dissecui hepar phthisicorum, aut eorum lienem, quæ tactu resistentia scirrhusa videbantur, toties inveni majorem carnium densitatem, quam invento in lardo sale indurato, in carne exsiccata fumo, viscera tamen illa non erant tumida; ergo ad duritiem non necessaria est vilius peregrini humoris congestio vel cumulatio sufficit vel 1. ut fluida in vasis contenta sint viscidiora, vel ut vasa sint arctiora, tumefactiora in dato spatio, vel ut fluida tardius diffusilius possint ex viscere elabi; alterum enim ex his posito indurabitur viscus.

Scirrhum hepatis saepe comitantur hepatagia auri, quartana, ascites, quæ videantur suo loco; hic scirrhum simplicem consideramus, non ut principium morbozum, sed ut vitium seu symptoma, qualitates mutatur; cujus curatio eadem ac scirrh sequens.

2. *Scirrhus lienis; Squirre à la rate; C.*

Est resistentia saepius cum tumore in regione hypochondrii sinistri exorta; quandoque longe, lateque diffusa, sine dolore præter seolum gravitatis, diffimile permanens; si firmis regionis lienis sit minor, *obstruio lienis* nuncupatur hoc vitium; quod vulgo est principium diversorum morborum, ut splenalgia, quartana, metastasis, ascitis, cachexia, de quibus suo loco agemus.

Dis



Difficillimum est judicare a quo principio pendat scirrhus lienis & hepatis; vulgo tribuitur uterque sanguini crasso & viscido, tartareo, sed hoc ex theoria graruit; nec enim ex eo quod hepar sit firmius liene, lien pulmone & cerebro, non inde sequitur in hepate sano haerere humores crassos, & viscidos; sepe etiam viscosa dura sentiuntur a pressione manuum absque eo quod humorum ulla crassities possit inculari. De his in *Hipatalgia*, & *Splanalgi*, ac *Phisemia* agemus.

Scirrhum lienis sine tumore, seu ejus scelyma observavit *Litter* (*Hist. de l'Acad. R. des sc.* 1700.), lien feniit petrefactus unciam unam & semissem tantum ponderabat. Frequentior est *megalo splenia*, quae splenis magnitudo adaucta sine duritie audit. Vili sunt splenes ultra xx. immo xxx. libras ponderantes, qui in statu sano vis semilibram attingunt. *Morgagni Epistolam XXVII. 18.*

3. *Scirrhus Lupa*, *Glandula Avicennae*, *Lupia Castellii*, *loup*, *glands*, *tumour scrophuleuse*, *Squireuse*. L.

Tumordurus, indolens, permansus, subfolitarius, cuti concolor; subcutaneus in diversis partibus. Differt a *scrophula*, quia est solitarius tumor, & muleum successivo egrescens, ut circa articulos genuum, maxillae, circa caput, aliasque partes. Differt ab *excrecantili*, ut sarcomate, quia ab humore congesto, non a nutritione partis adaucta, pendere censetur. Differt a *lupia*, quia non est cystis seu saccus humore infarctus, nisi in illam degeneret; quandoque in cancerem mutatur; cum est exiguus unus aut alter, vulgo *glandula* vocatur, & in suppuratum minime vergit.

#### IX. PHLEGMONE, *Phlegmon*.

Est tumor sphaeroides, rubore, calore, tensione, dolore pulsantili insignis, sponte in supurationem vergens. Dicitur a *phlego*, uto. Differt a pustulis inflammatis, ut a variola, &c. ex eo quod sit tumor subfolitarius, & multo major; a bubone, parotide, paronychia, ophthalmia, quia sedem in certis locis determinatam non habet.

Causa est impetus craoris adauctus intra vasa partis tumens, quae involacris ut plurimum coercetur, ut glandula vel membrana cellulosa; si etenim intra ramificationes vasorum feret ille infarctus, tumor non sphaeroides, nec certis limitibus circumscriptus foret, sed erysipelatis inflar diffusus.

1. *Phlegmons mammae*, vulgo *poil*. Vide *Mastodynia*.

2. *Phlegmons oculi*. Vide *Ophthalmiam internam*.

3. *Phlegmons testis*, vulgo *gonorrhoea tumeur dans les bourses*. A.

Dici solet a principio cui potissimum debetur. Praeter remedia generalia, ut phlebotomia, videri tonem, fomenta emollientia, & dein resolutiva, desiderant ea quae virus syphiliticum specifice debellant.

4. *Phlegmons maseulorum*, tumor phlegmonodes. A.

Vulgo non habet figuram determinatam, nec magnitudinem. Ortum habet a principis ut plurimum procatarrhico, ut fractura, contusione, vulnere; exigit remedia quae resolutionem instituere possunt, ut sunt phlebotomiae repetitae pro tumoris extensione, symptomaticae vehementiae, aegri robore, aetatis vigore; necnon videri tonem, refrigerantem & humectantem; cataplasmata emollientia ex foliis malvae, violarum, acetosae, bulbis lili, mica panis cum lacte cocta, additis croco, axungiae recentis, medulla animalium, oleo, pulpa althaeae. His enim dolor, calor, tensio sedantur, fluxilitas sanguinis conciliatur, vasa crispata laxantur, membrana involuentes spasmode contractae, remollitae cedunt, circulatio restituitur; si his irriti in suppuratum vergat, aut in gangraenam, videantur remedia apostematice, gangraenae, &c.

5. *Phlegmons axillaris*, vulgo *bubo axillaris*. Vide *Bubonem*.

6. *Phlegmons testiculi* River. Obs. 39. Cens. 2. & Obs. Comm. L.

#### XVI. BURO, *Bubon*.

Est tumor partim scirrhosus, partim inflammatorius glandulae unius aut alterius inguinalis, cum dolore obtuso vix lancinante, calore, rubore, renitentia minoribus quam in phlegmone; lente accedens & recedens, incessum aliquatenus impediens.

Debetur sanguinis impetui intra vasa lymphatica glandularum missio vivida, cui occasione praebet infarctus horumque vasorum, distinguitur a bubonocoe cognita sede glandularum inguinalium diversa a foramine musculorum abdominis & areu Poupartii, necnon ex eo quod bubonocoe subito fiat, bubo vero lente exerceat; bubonocoe ileum superius excitet, non vero bubo. Varietates sunt bubones scirrhodes, phlegmonodes, oedematodes, exulcerati.

1. *Bubo simplex*, *Bubon*. D.

Sic vocatur Graece *ingen*, quia regio inguinalis afficitur. Dicitur simplex qui nec febrem, nec pestem, nec syphilidem comitatur. Curatur remediis iidem quibus phlegmone, sed potissimum resolutivis.

2. *Bubo syphiliticus*, Astruc. l. 3. c. 5. *cambuca* Paracelsi, *Poulain*. C.

Ab impuro coenaculo immediate, seu post paucos dies, vel a gonorrhoea suppressa ortus, dicitur *primarius*; qui vero infecto iam dudum sanguine sine his principis supervenit, *secundarius* vocatur, uterque magis est vel phlegmonodes, vel oedematodes, vel scirrhodes; alter ovum columbinum, alter pugni magnitudinem adaequat; phlegmonodes facilius resolvitur, citius suppurat, oedematodes resolvitur, non suppurat; scirrhodes resolutivis resistit, & non suppuratur. Differt ab alijs speciebus a prio-

principio cui debetur. Curatur ut syphilis, cujus est symptoma & signum certissimum.

Bubo syphiliticus induratus, durante hydragryosi tegatur emplastro de ranis cum mercurio; si inflammetur, cataplasmate de mica panis cum lacte tegatur, facto pure cultro aperiatur; si suppuratio bona sit ulcus curetur unguento basilicone: si pus paucum, saniosum, addatur digestivum, scissalium sit ulcus, caustico inuratur.

3. *Bubo strumofus; Buben scrophularum. C.*

Distinguitur ab aliis per signa scrophularum in collo, mesenterio, deficientibus signis bubonis syphilitici, pestilentis, &c. Vide *Scrophularia in cachecticis*. An scorbuticus bubo fuerit observatur, valde dubium mihi videtur, nec nuper Auctores qui de scorbuto expresse scripserunt, ut *Lindius*, illud symptoma memorant.

4. *Bubo pestilens, Buben pestilentis; A.*

Est tumor criticus in pelle ad inguen alterutrum oriundus cum bonis aegri rebas. Ille vero bubo quantocius aperiendus est, licet immaturus, & ad suppuracionem cito ducendus, ut ea via virus pestis foras amandetur; Vide *Pestem in class. 3.*

5. *Bubo cretissimus, vulgo les creissantes ou creissants; B.*

Est tumor dolens, retinens, cuti concolor, glandularum inguinalium, qui, poveribus dum sensibilibus crescit in altum, cum aliquali corporis macie, oriri solet: ille tumor sponte resolvitur, nullamque petenulum importat.

6. *Bubo scorbuticus. Vide Pestem scorbuticam.*

7. *Bubo axillaris, criticus in rubeola. Hatte Journal de Medec. May 1755.*

## XVII. PAROTIS; Parotis, Oreillon.

Differt a bubone eo quod glandulas pone aures sitas afficiat; est enim tumor scirrhoplegmonodeus glandulae parotidis dictae in suppuratorem lentissime vergeos; eisdem varietates subit ac bubo, non vero totidem species.

1. *Parotis benigna, Parotis simplex; B.*

Est ea quae sine febre, sine gravi symptomatica enascitur.

2. *Parotis febrilis, Journal de Med. May 1755. D.*

Ea est quae in febris acutis, in pelle, vel critice, vel symptomatice supervenit, saepius cum furditate: in pleuritide maligna, *Rivier. Grav. Obs. 72.* critica in militari, *Journal de Med. May 1755.* in typho carcerem, *Pringle tom. 2. cap. 6.* Vide curam in *Triphosphora elode.*

## XVIII. FURUNCULUS, Furuncle, Clon.

Est tumor inflammatorius, cutaneos, prominens, durus, & atro-ruber, cujus centrum, cum suppuratus est, occupant fibræ crassae, quae in pus oon colliquefcunt. Dantur furunculi ovi columbini figura & magnitudinis, alii majores, & hemisphaerici.

Floccus fibrosus in axi furunculi harens, dum suppuratur, vulgo dicitur *Bourbillon*.

Species, seu varietates sunt.

1. *Furunculus dachion Gal. clon ordinaria. B.* Curatur ut phlegmone; sed durior est, magis sphaeroideus.

2. *Furunculus terminans Gorræi definit.*

Est species phymatis, ait *Oribasius*, supra quod pustola nigra eminet, quae rupta inferne similis desquamato apparet, eo autem dissecto, pus invenitur. Obcurissima est descriptio.

3. *Furunculus, phlegmone Græcis, pauci & pauci Latine.*

Est furunculus erysipelaceus, diffusus, cutaneas glandulas obidens, difficile suppurans, calore durente & mordaci sputatus. Hujus accuratio historia desideratur.

## XIX. ANTHRAX, Charbon.

Est tumor carnis immerfus ut plurimum, in cujus apice est vesicula grisea, subus sphaerolosa, io ambitu dolor & rubor quandoque leves; excoriatus vel suppuratus, scripit in viciniam, & colorem intusce rubrum exhibet.

Optime describitur a *Plinio* & a *Cæso*; quippe quadoque collum, fauces obudet sine ulla dolore & dolore, sed cum lividitate pustulae aut cuticulæ, quæ ablata, cito substrata nigricat, sphaerolosa est; interea æger languet; somnolentus est, pulsus habet debilem, rarum, & intra breve tempus e medio tollitur, cum vero minus malignus est carbo, circa pusillum nigrum est tumor phlegmonodeus, cum febricula; aperto tumore, ulcus ægro-rubrum, sicum, calens, ardens, in viciniam serpens, labiis extrovertis apparet.

Accidit potissimum pauperibus sordidis; qui carnes animalium, ut vervecum, anthracis desuntorum edunt, aut qui eorum lanas trahant, adipem fundunt ad candelas parandas; hinc laniones, coriarii, candelarum opifices huic malo sunt saepius expositi.

Raro Medici accerfuntur ad hoc malum curandum; saepius rustici arcano sua huic malo specifica dicta adhibent, & caustico furunculum inurentes anthracem se sanasse jactant.

1. *Anthrax simplex; A.*

Est ille qui non pandemus est, sed sporadicus, extus prominens cum pulsu febrili, & levibus symptomaticis.

In hujus curatione statim apex sphaerolosa caustico, ut lapide infernali vel lapide caustico, inurendus est, ut destruat virus gangrenosum, quod vel carnes vicinas rodere, vel introverfum funestissima symptomatica, ut syncope, delirium, &c., excitare valet; raro phlebotomia indicatur, aut a vigore pulsus indicata. In hac specie non nocet; interea eicharæ lapsus promovendus, & suppuratio excitanda ad virus eliminatioem, & sanguinis depurationem, quod præstant suppurantia vulgaris; intereadum intus usurpantur medicamina quæ vires circulationis excitant, si languant, aut sustinent, si vigeant, funique perspirationem intendunt.

2. *Anthrax malignus, charbon pestilential.* A. Vide *Pestem in exanthematicis.*

3. *Anthrax Persicus.* *Pruna & ignis Persicus* Avicennæ; *le mal des ardens*, Vide Mezeray Histor. de France; *le feu S. Antoine*, Vide l'Histoire de Philippe I. ann. 1090. A.

Est pellis species. *Carbo*, ligno combusto, *carbunculus* lapidi pretioso designando inservit; unde pejora sunt nomina quam anthrax.

4. *Anthrax tarantulus, malvat* Occitanis. A. Miranda carbunculi species P. Borelli, *Consur.* 2. *obf.* 12. in urbe *Roquecourbe* prope *Castres* in Occitania, frequens est morbus *malvat* vocatus qui species carbunculi est, quo affecti, nisi dies novem infomne traducant, jugulantur; utque somnum arcere valeant, accedunt ad ægrum amici & parentes, ibique genio indulgentes canunt, & ægrum ad saltandum invitant: tarantula demorfi pariter somnolenti sunt, teste *Serap*; inde mox apud ipsos invaluit, ut saltarent somni fugandi gratia. Vide *Tarantulum Tingitanum*.

XX. CANCER, *Carcinæ* Græcis, *Gallis* *Cancer*, *tumour chancreuse, cancer occulte.*

Plebs quæ hunc morbum exasperari putat, uti anthracem, si nomen ejus proprium proferatur, hunc morbum vel non nominat, vel malum vulgo *le méchant* nuncupat.

Duo status considerandi sunt in hoc morbo, ut in omni phymate; status scilicet *Tumoris* integri nondum aperti, & status *Ulceris*, excoriationis, aperturæ, qui occlus, seriusve supervenit; ulcuse enim non est genus distinctum, sed modificatio phymatis.

Definitur tumor durus, tuberosus, lancinans, pertinacissimus. Differt a scirrho per dolorem lancinantem, superficiem inæqualem; a phlegmone per diuturnitatem, colorem nativum cutis, nisi varicosis tumoribus nigris circumdatur tumor.

Exulceratum carcinoma, sive ulcus cancerosum ex fœtore, laborum inversione, carnis ductu, ichore acri exudante, pertinacia, dolore lancinanti, facie propria ab aliis distinguitur.

Specierum distinctio desideratur, interea tamen alia sunt carcinomata, quæa verruca ortum ducunt, ut in mamma: alia a punctis, vel varicibus nigricantibus duris, ut formicis, huc *myrmecia* Græcorum; alia superveniunt a lupis irritatis, seu scirrhis, v. g. colli, glandulæ lacrymalis; alia ordiuntur a pustula, quæ cito exulceratur & late serpir, quorum exempla citat, sed non fac accurate describit inter morbos oculorum, *cap. 6. Saint Yves*. Species possunt sic nominari.

1. *Cancer verrucosus, verruca cancerosa* S. Yves, Chap. 5. Part. I. C.

2. *Cancer myrmecia*, 3. species S. Yves Chap. 6, Part. I. C.

3. *Cancer lupus, Lupia cancerosa* vulgo. C.

4. *Cancer phagadæna, species* A. S. Yves C. *Sanvages Nosologia Methodica* Tom. I.

*Pustula cancerosa*; utrum diversa sit horum prognosis & curatio, dubium videtur, si verum sit, quod *Saint Yves* asserit, se primam speciem sanasse usu aquæ cujusdam quam ad alias species inutilem putat.

Cancrosi, si curentur, citius intereunt, ait *Hippocrates*; cura itaque hujus morbi debet esse ommissa, id est, omitti debent quæ ejus principium eradicare posse putamus, cum tantæ virulentia sit, ut omnibus medicamentis alterantibus & evacuantibus exacerbetur, si excipiamus diluentia & edulcorantia potissimum interna. Cancer non debet attingi, sed ab omni pressione, unctioe, cataplasmate immunis servari, appposito molli gossypio; exulceratus mollior detergi, vel potius elui debet cerato Galeni, butyro insulso, carnis vitulinæ taleolis appositis, angustis anodynis demulceri.

Intus vero in utroque casu juscula refrigerantia, serum lactis, lac, cremores usurpant, balneis repetitis sanguinis acrimonia temperari debet: sunt carcinomata libera, patribus sodis non connexa, vasis majoribus non contigua, quæ premillis edulcorantibus, & massam sanguinis depurantibus, feliciter excinduntur.

Vidi prægrande mammar carcinoma quod ab exigua & profunda verruca, seu porro minime syphilitico, ortum duxerat, quodque per hydrargyrosim decuplo minus evaserat.

Laudatur usus internus foliorum atropæ beladonæ ad carcinoma sanandum; vide *Journal de Médecine de Vandermonde*.

Vidi carcinoma phagedænam faciei, quod oleo corrosivo plumbaginis sanatum fuit: vide *les Mém. de l'Acad. R. de, Sc.* De usu interno cicutæ majoris Tournesortii ad carcinoma curandum, vide Experimenta *Starchii*.

5. *Cancer syphiliticus*; Paracelsi; *Cancer uterique*, C.

Puella 3. annos nata, a pluribus mensibus extracto hyosciami albi usa, patiebatur tumorem in utraque successive mamma ovi gallinæ magnitudine, durum, tuberosum, immersum, cum doloribus lancinantibus ab axilla ad mammas per intervalla accedentibus. Cum autem simul acciperem ulcuscula oris & vaginæ adesse, quæ syphilidis decennis erant vestigia, nec liceret uti hydrargyrosi, ad trageas Keiserianas more consueto confugi, lisque per mensem & semissem usurpatis tumor & dolor mammarum, atque omnia syphilidis symptomata, evanuerunt, nec usque reversa sunt.

XXI. PARONYCHIA; *Panaris*.

Est tumor phlegmonodeus extremi digiti cufjusvis cum dolore perterebrante, colore rubro, calore urenti, tensione maxima.

1. *Paronychia cutanea*, 1. spec. Heister. Chir. cap. 170. *panaris cutané*. B.

Digiti extrema pars initio parum dolet, tumet, mox rubedo accedit, crescit dolor & febedo, quæ symptomata ultra digitum non fe-

F exten-

extendunt, & tolerabilia sunt; deus pulsatione crescente fit suppuratio, apex digiti albescit, remollefcit, & fine periculo abscessus ruptus detersione ac consolidatione terminatur.

*Curatio* absolvitur emollientibus, quæ maturant phlegmonem, & extractione peregrini, ut spione, aciculae, si huic anam præberit; cataplasma de mica panis cum lacte & croco, caro cochleæ pomatice applicata, pulpa ex foliis malvæ, violæ, radice althææ, bulbo liliom, si dolor & fervor minores sint, emplastrum diachylum cum gummis, emplastrum de mocilagine, &c. conveniunt; & suppuratione facta, abscessus aperiendo, & solito more tractandus; sæpius autem accidit ut unguis delabatur, si pus infra ipsum genitum sit, quod loogum facellit negotium.

2. *Paronychia peristylis* Heister. ibid. Garengeot Operat. de Chirur. du parais. A.

Differt a prima specie doloris, fervorisque intensitate multo majori quam ex tomore expectandum videtur, com febre, vigiliis, convulsionibus, immo quandoque delirio. Differt a tertia, quod dolores ad anteriorem brachii condylom, seu ad cobitum non extendantur.

Hæc species fovetur a pauxillo ichoris acris & rodeotis infra periosteum, unde os sæpius cariosum evadit; & si negligatur, manus eodem morbo contaminatur, adeoque quatuordecim incidendum est apex digiti vel lateraliter, ut vult Garengeot, vel io medio quo noo pertingit tendo flexoris, ut putat Heister, ut illa guttula puris, vel ichoris foras emittatur; postmodum non raro excrefcit caro fungosa, quæ excinditur, vel eroditur, & vulnus denique solito more curatur.

3. *Paronychia tendinis*, 3. *spec.* Heister. ib. A.

Ea est quæ vagioam tendinis flexoris digiti aggreditur, intra quam est pus, vel ichor acer & rodeos; tumor io apice digiti modicus est, vel nullus; dolor tamen est intolerabilis; manus, carpus, univerfumque brachium ad usque condylum internum humeri dolentiotense; unde febris, vigilie, spasmus, intumescitque brachium, manus, immo paululum digitus in ipsi phalangum articulis.

Species illa est aliis periculiosior; febris, vigilie, abscessus, immo gangræa hominem quandoque e medio tollunt.

Medicamenta inutilia sunt; brevi ad incisionem digiti & vaginæ tendinis properandum est immo vagina ulterius scindenda, si pus ulterius serpsit, ut io ligamentum annulare carpi, io ligamentum transversum quo os cubiti cum osse radii conneditur, quæ curatio fusc tradita est apud Garengeot & Heisterum, io hisce consulendos.

4. *Paronychia artura* Linnæi Gen. morbor. L. Artura est unguis acie lateraliter cutem fecans, unde inflammatur digitus cum exulceratione laterali & dolore non exiguo.

5. *Paronychia digitum* C. Digitum Ill. Linnæi Gen. Morb. 227.

Cognoscitur dolore intensissimo, periodico, ejusdem articuli digiti unius, qui ibi maciatur, siue ullo inflammationis signo; dolor ille per menses & annos perseverat, paroxysmis duo vel tria minuta durantibus, sed pluries in die recurreritibus. Amputato digito sanatur æger, & os, non erolum, sed friabile videtur, quasi farina coagulata. Hæc Sueci observant.

6. *Paronychia præfura* L. Præfura Ill. Linnæi Gen. Morborum 260.

Est phlegmone ad unguis radicem tantum enascentem cum digitus frigore congelatus calori exponitur; dolor non magnus est, sæpe exulceratio accedit, onguis delabatur, alter vero, sed crassus, asper, corticosus evascescit: ratione sedis differt a paronychia cutanea.

7. *Paronychia artificialis*, Ephemer. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obf. 187. pag. 364.

Fit per circumcirculationem digiti cum peltula ex ovi recentis testa; febrem tertianam curare creditur.

## XXII. PHIMOSIS, *Phimosis*.

Est præputii, & sæpe simul glandis inflammationis tumor, ut placet Neotericis, cum præputii adducendi, aut redocendi difficultate.

Veteres Græci nomen illud genericè tribuebant meatum præclusivum; unde phimosis palpebrarum, labiorum, uteri, narium; verum mos invaluit ut hoc nomine intelligatur inflammatio præputii, quæ balano intra præputium arde retioetur, si vera phimosis; aut quæ balani balani veluti strangulatur, ut io phimosis spuria, seu paraphimosis Neotericorum.

1. *Phimosis vera*, *phimosis* Heister. Chirurg. cap. 130. A.

Est gravis inflammatio præputii, quæ ejus ductio pone glandem impeditur; oritur a secretionem fluidi acris, flavescentis, mucosi, quo illinitur præputium, & in glandulis odoriferis balani potissimum paratur, ex quo ruber interior facies præputii, rubet balneo cum dolore, & dysuria, propter irritationem qua urina transiens præputium afficit. Hic affectus cum gonorrhæa præputii convenit apud eos qui prælongo præputio gaudent; vide *Gonorrhæam*. Novi viros quos identidem recurrunt hæc excretio liberat ab ophthalmia; unde sequitur ejusdem esse iudolis mucum in corona glandis secretum, ac eum quem glandulæ Meibomianæ palpebrarum fundunt. Hunc affectum etiam pueris familiarem esse observat *Sennertus*.

Curatur julevis refrigerantibus, sero lactia, balneis & aquis acidulis; præmissa phlebotomia, & catharsis: ruborem etiam & dolorem tollit aqua rosarum balneo iospersa, aqua Saturni, &c.

2. *Phimosis hydrocalica* C.

Non rarum est apud hydropes laborantes anasarca, ascite, vel sola hydrocele portentofo tumere pænem, sed magis adhuc præputium, ita ut omnino recoodatur glans, ejusque via vix inveniri possit; simulque vidi non semel fieri decubitus humorum in hoc præputio, ut inflammatio

matio gangrænodea immineret. In hoc vero casu forcibus limbum præputii hic & illæ dissectum vidi a Chirurgo egregio D. *Serræ*, unde infarctu liberatus penis & aqua vitæ camphorata fectus, gangrænam vitavit.

3. *Phimosis syphilitica*; *phimosis utralique*. C. Pender ab ulcusculis syphiliticis coronam balani obidentibus, & inde subsequente præputii phlogosi, maxime si limbus præputii similibus ulcusculis, *chaacres* dictis, obducatur; unde depuratio horum ulcusculorum impeditur, erosio augetur, similiaque gravia mala imminant.

Si malum tolerabile sit, præmissis phlebotomia, catharsi, & balneis sufficientibus, hydrargyrosis est usurpanda more solito; interea fomentis ex lacte, floribus malvæ, meliloti, & similibus, curandum, ut reducto præputio hæc ulcuscula elui, detergere possint: si vero altius serpent ulcuscula, ita ut metus sit ne balanus erodatur, tunc totum præputium ulcusculis intus obstitum circumscindendum est; quippe una altera incisione vix in paulo reponi queant omnia ulcuscula; aut datur hydrargyrosi, ea omnia feliciter succedunt, cum virus simul auferatur.

In phimosis & paraphimosis cum ulcusculis venereis, penis quandoque gangrænæfit; tunc post phlebotomiam & partis scarificationem kinkina largæ dosi sumendum; sic sanitas restituitur; & cedit suppuratio, quæ digestio promovetur, & separata eschara gangrænosa, vel hydrargyrosis, vel spiritus antiveneris continuatur.

4. *Phimosis circumligata*, Altruc de morbis vener. lib. 3. c. 8. de phimosis; *Circumligatura* Latinorum; *Paraphimosis* Græcorum; *Periphimosis* Pauli Æginetæ Lib. VI. cap. 55. A.

Rarius est syphilitica, ut plurimum vero pura; ortum ducit ab inflammatione & tumore balani, dum est erectus penis, maxime si per violentiam retroversum fuerit præputium, ut in defloratione virginum accidit, aut similibus causis tribuendum quique judicat; si enim retroactum præputium inflammetur; & glandem strangulet, si balanus intumescat magis quam præputium, inde sequitur hæc species, quæ phlebotomia, balneo penis in lacte, dein in decocto resolvendi, ut florum meliloti, sambuci, &c. evanescit. Vidi ter vel quater in nosocomio generali similes paraphimoses a vera ligatura peni injecta ope filii amico circumligati, unde supprimitur urina, penis inflammatur; interea tamen in duobus puerulis, quibus hoc acciderat, vidimus filium successive penem trajecisse, vestigio successive coalito.

5. *Phimosis vagina*, Altruc de Morbis veneris, lib. 2. c. 8. num. 1. L.

Pender a syphilitica inflammatione labiorum, nympharum, ob ulcusculam rodentia syphilitica; simileque virium in cataractorum pollice, in nutricum papillis memorat *Ill. Astruc*; quæ omnia eandem medelam expostulant, ac phimosis syphilitica, scilicet ulcusculorum detersionem, & virus venerei extinctionem.

6. *Phimosis infantium*, Manger. Biblioth. Med. præf. pag. 9. ex Hildano. L.

Accidit ob urinæ acrimoniam, ex prava vitæ ratione nutriticis; lactentes enim ab hoc ætu immunes non sunt. Curatur vitæ ratione tenui & refrigerante, dein catharsi leniente; subsequeatur cataplasma ex mica panis cum balauftis pulveratis, croco, & butyro recenti, ac lacte vaccino.

## ORDO QUARTUS.

### EXCRESCENTIAE, Excroissances.

Sunt tumores in hoc a phymatibus diversi, quod .i. fiant per conversionem succi nutritii copiosioris in partem solidam; adeoque 1. lente crescant, & adolefcent senium, sine sensu; 3. quod non sponte abeant in suppuratum, sed veluti immutabiles, cuti concolores, indolentes in suo statu perseverent: sola lordosis huic ordini minus convenit; causa est succi nutritii, vel cum vasis parvis affectæ adhaerentis & assini, appulsus uberior, usque assimilatio & in partem conversio: in phymatibus vero fluida appellata suum fluorem conservant, & facile in pus, ichorem mutantur. Excrecentiæ variant pro diversâ consistentiæ & sede, hinc genera consequentia deducuntur.

### XXIII. SARCOMA; *Sarcome*.

Est excrecentia carnis consistentiam circiter obtinens.

1. *Sarcoma vulgare* Sennerti; *Excroissance charnue*. L.

Ubivis indiscriminatim oritur, estque vel connatum, vel acquisitum; difficulter distinguitur a scirrhus lupæ dicto, nisi quod omnino doloris sit expertus, suoque seu & sua mole tantummodo noceat; scirrhus lupæ glandulas obidet, non sarcoma.

2. *Sarcoma narium*, *polypus narium*; *polype du nez*. L.

Est excrecentia internæ narium membranæ, quæ prorsus nocet olfactui, respiratori & loquellæ; vide *Aesniam*, *Dispnæam*, quarum illud sarcoma est principium.

3. *Sarcoma oculorum* Saint Yves Chap. 14. & 18. L.

Est excrecentia sæpius adiposa palpebris accreta ad cantum temporalem, quæ enim ad nasalem pertinet, est alterius coloris quam pars ipsa, & an pyregium, vel entandem speciat. Nocet hoc sarcoma, vel intuitui, vel visui; vide *Caliginem*.

4. *Sarcoma epulis* Heister. cap. 85. L.

Est excrecentia in oris cavo enata, potissimum gingivis accrescens, unde differt a parulide, quæ apostema est gingivarum; vide *Dysphagiam*, *Phlissimum*.

5. *Sarcoma cotyledinis*, *polypus uteri*, *cervicosis* Aetii; L.

Est excrecentia carnosâ molis majoris, quæ ex utero, vel ex vagina propendit, & hysterocœlem

F 2 quan-

quandoque mentitur. Nocet generationi, paritui, &c. vide *Dysociam*, *Sterilitatem*, &c. *Corsosus* dicitur, quia pistillum vel caudam refert.

6. *Sarcoma natta, natta dorsii*. L.

Sarcoma dorsii penile maximum est excrescentia petiolata multum excrescens, dorso accretata, quæ pondere aggravat, situ & mole debuit nocet.

7. *Sarcoma biciphalium*, P. Botelli Cent. II. Obs. 57. L.

Est excrescentia capiti accretata, alterum caput mole sua referens: an a scirrhus lupia sit diversa tantum quoad volumen?

8. *Sarcoma fungosum, hyperfarcosus* Græcis.

Est excrescentia mollis & fungosa ulceribus ac vulneribus adnascens.

9. *Sarcoma seroti*, Græcis *farcocole* Heister. Chirurg. cap. 121. & 125. Græcis *farcocole*. L.

Est excrescentia testiculi quæ abeius inflammatione scirrhusque diversa est, in scirrhus enim major est durities quam est nativa durities testiculi, non in farcocolæ; in phlegmone testiculus acute dolet, brevi intumescit; farcocolæ vero sensum & sine sensu excrescit.

Hoc etiam nomine scirrhus ipsius testiculi vulgo intelligitur; ille quidem per topica resolubilis est, farcocolæ vero minimo.

10. *Sarcoma varicoso, Cirrcole* Heister. Cap. 128. *Ramex varicosus* ejusdem. L.

Ad varices valvorum spermaticorum potius quam ad farcomata pertinet, licet a quibusdam confundatur.

11. *Sarcoma encanthis*, S. Yves Ch. 18. pag. 136. Gallie *mûre*. L.

Duplex est ratione sedis; alterum est excrescentia ipsius caruncule lacrymalis, alterum vero majus nascitur inter palpebram & globum; utriusque superficies est granulosa ad instar fructus moti, unde nomen; color nunc plumbeus, nunc ruber.

Curatio absolvitur duplici modo, 1. quidem actione per lapidem infarnalem soli excrescentiæ applicatum; 2. ligatura vel melius excisione ope lanceolæ facta, quo facto residuum absumitur ope pulveris ex octo aluminis partibus, & una sacchari parte.

#### XXIV. CONDYLOMA; *Condyloma*.

Est excrescentia sicut carnis durior, ossibus mollior.

1. *Condyloma tylos, durillon, callosité, tylos* Græcis. L.

Est excrescentia epidermidis in manibus, pedibusve, minime adhærens tendinibus aut periosteis, accedit pedibus, si pedibus nudis incedere assuescamus, manibus vero accrescit ab instrumentorum crassiorum assidua tractatione; tactum tollit.

2. *Condyloma clavus, Cor des pîs*. L.

Est excrescentia callosa, dura, tendinibus aut periosteis pedum, manuumve adhærens: hinc a pressione dolens, familiaris illis qui arduioribus calcibus utuntur. Clavi differunt a verrucis, por-

riisque, quod in centro suo gerant callum durissimum, quo eradicato non dolet pars ulque: quo novus nucleus efformatus fuerit; emollitur nucleus ope soliorum sedi, telephii, emplastri de mucilagine, præmissis pediluvio tepido eradicatur.

3. *Condyloma callus, Calus ou cal*. Vide Senerti lib. 5. cap. 5. L.

Est tumor excrescens ad committuras ossium fracturorum, seu periosteis fracturas colligatis intumescens, quæ mole nocet aut deturpat artus, differt ab exostosi ratione ortus.

4. *Condyloma ganglion*, Heister. de Ganglio cap. 171. L.

Est ipericum, firmum, indolens, album, tendinibus vel ossibus accretum, sed lateraliter mobile, pili ut plurimum magnitudine, in manibus, pedibusve vulgo obvium. Resolvitur, sed difficulter, frequenter frictione, pressione per laminam plumbeam, emplastro de vigo cum mercurio, imo repetitis malleoli quibus: demum potest extirpari per incisionem, sed raro ita nocet, ut ad operationem deveniendum sit.

5. *Condyloma sicut, syphilis* Græcor. sic. L.

Eici vocantur condylomata podicis aut vulvæ, quæ sicut fructum teterunt; qui cogniti fuerunt *Martialis*, adeoque longe ante cognitam syphilidem; dantur autem hodie sicut syphilitici.

6. *Condyloma thymus, scrotis, penduloque*, &c. D. Variant condylomata syphilitica pudendorum, & ani, alia cristas, alia flores thymi, alia braccia caulifloram refertur, tum figura, tum colore, unde diversa nomina.

Hæc diversæ excrescentiæ syphiliticæ sunt indolentes, & excidunt quandoque in usu balnearum, saltem adhibita hydrargyrosi; verum si his resistant, vel catharteticis erodende, vel forcipibus sunt excidendæ durante hydrargyrosi.

Cave ne confundas condyloma ani cum martiscis. Vide *Hæmorrhoides*, *Gloss. IX.*

7. *Condyloma porrum, Penureau*. D.

Est carnis immersum, vix extra cutem prominens, de cætero verrucæ simile: aliud est purum, aliud syphiliticum, quod genitalibus adnascitur. Curatur ut verruca.

#### XXV. VERRUCA; *verruca*.

Est excrescentia cutanea prominens, condylomate minor, sensu destituta, indolensque, nisi confundatur cum carcinomate primæ speciei.

Difficile est verrucam a condylomatibus generice distinguere, nisi quod verruca omnino cutanea est, & censetur tumor ex papillis nervis induratis genitus; nisi circiter magnitudinem, & figuram æmuletur, cui concolor est, nisi cum nævo sigillo complicetur, quod non ita rarum est. Differt a porro quod extra cutem emineat, immo sæpe petiolata sit, porrum vero, ut condylomata omnia, infra cutem radicatum sit.

1. *Verruca simplex, verruca, acrochordon* Græci. L. Est fere petiolata, solitaria, sæpius congenita, digitis, collo aliisque partibus adnascens, pili magnitudine, differt a carcinomate, acrochordone, aliisque spociobus, quod nullo modo doleat, & sine

& sine seorsu refectari possit, plores sunt quandoque in corpore, sed ab invicem sejunctæ, non gregales. Curatur affricu foliorum heliotropii Europæi, campanulæ hederacæ, ebelidoniæ majoris, euphorbii succo &c.

2. *Verruca grægalis*, an *fermica* Latinorum? L. Dantur sæpe in facie alibi quæ exiguae verrucæ, densæ, confusæ, caput aciculæ adquantantes, etiam in apice nigrae, congenitæ sæpius, omnino indolentes, de cetero myrmecis similes.

3. *Verruca syphilitica*, *verruæ venolique*, Astruc. l. 3. c. 9. C.

Pudeodis, & podici adnascitur; acquisita est, & a visu syphilitico pendet; si scissilis & earibus immerita *perum* vel *porrus* vocatur.

Verrucæ simplices vel setæ equinæ aut fili ferici intervento ligantur, vel vossili extirpantur, vel apice derafæ, spiritu salis, aut si fortius requiritur, oleo vitrioli, aqua forti comburuntur, aut acicula infixæ ad candelam valde exalefca similiter uruntur, vel lapide infernali eroduntur, cavendo tamen ne cathæreticum, & causticum viciniam lædat; verrucæ vero syphiliticæ, præmissa hydrargyrosi, pulvere sabine puro vel paxillo ocreæ additæ temperato, apice prius derafo, sensum eroduntur. Vide plura apud Ill. Astrucium.

### XXVI. PTERYGIUM; Ongles.

Est excrefcentia carnea vel membracea vasculosa ad oculi cantum exorta, alam expansam referens, & versus corneam se extendens.

Differt ab encanthide figura sua membracea oon sphaeroidæ nec granulosa; a sarcomate quod palpebris adnascitur, & sphaericum est, pterygium vero in ipso oculi cantu præcipue nasali adhæret.

1. *Pterygium ungula* Heister. Chir. cap. 57. Saint-Yves chap. 23. anglot. L.

Differt maxime a caligine, quam onyx, vel unguis excitat, licet nomine convenire videantur.

Curatur vel medicamentis vel operatione. Medicamenta sunt lenia cathæretica, ut alumenustum, vitriolum album, imb viride æris, quæ cum faciebo mixta, & tenuissime pulverata pterygio inspergantur semel quovis die, & pterygium recens absumunt. Si vero pterygium sit v. tus, & magnum, filotrajæum debet dextra manu forcipibus dissecari, & residuum levibus cathæreticis absumi; sufficit tamen post operationem sero, & mane aqua vitæ vulous fove-re. Vide *Caliginem*.

2. *Pterygium pannus*, lo *Dræpau*. L. Frequentius est illud pterygium in quo cum tela palpebras etiam nesciente, & versus pupillam extensa, sunt venæ rubellæ, turgidæ. Vide *Caliginem*. Eodem modo curatur quo prius, sed venæ varicosæ dextra manu sunt separandæ & secandæ, atque cohesio eom palpebris solvenda.

Com pterygiis male confunduntur diversæ carcinomata oculorum, quæ ab iis maxime dis-cernantur.

*Sanguis Nofologia Methodica* Tom. I.

### XXVII. HORDEOLUM, *Orgelot*.

Est tumor durus vix sensu gaudens, cuticon-color, raro rubens, in palpebrarum limbo ensesceos, sphaericus, pilo ut plurimum minor.

1. *Hordeolum grande* Actii; *Kritio* Græcis; *Grain de grêle*. L.

Est hordeolum durius, & scirrhusum, immobile in parte interna palpebræ, corpus pello-cidum continens.

2. *Hordeolum chalazium* Heister. Chir. c. 43. L. Est tuberculum mobile io limbo palpebræ scirrhusum.

3. *Hordeolum siccum*, *Circum des paupières*. L. Est tuberculum phlegmonodeo-scirrhusum.

4. *Hordeolum steatomatosum* Sennerti, *Orgueil*. Est parva lupia limbi palpebrarum plena mucos sebaceo vel melleo.

5. *Hordeolum verrucosum*, *verruæ des paupières*. L. 6. *Hordeolum hydatidum*, *Aguila* Sennerti. L.

Curatio fule videatur apud *Heisterum*. Si ro emplastro de mucilagine, vel diacbylo tum resolvitur, tum in pus mutatur; steatomatosum lanceola aperitur, & contentum exprimitur; cetera similiter exciuntur, vel aperientur, vel lapide insectoali corroduntur.

### XXVIII. BRONCHOCELE, *Goutte*.

Est excrefcentia vel tumor scirrhusus anticæ partis colli; ægri *gutturones* dicuntur.

1. *Bronchocele Boitum* Roucalli Med. Europæ pag. 228. & 109. L.

Bergomi familiaris est, & *hernia gutturis* vocatur; est steatomatosus vel scirrhusus tumor glandularum thyroidearum. Rusticos sæpius afficit quam cives, & mulieres præ viris, quod tribuit eruditus *Pasta* debilitati harum partium ob vomitus frequentes gravidarum: sæpe hic tumor dependet a gutture adinftar pyri; quandoque sponte in suppuratum abit; sæpius ita indurefcit ut cartilaginis instar resistat.

Licet hic morbus hominem detorpet, vocem ejus lædat, mentem hebetet, dyspnæamque creet; pauci sunt qui eum medicamentis aut ferro aggrediantur, ne discusso tomores graves, pectoris morbi, ut tussis, asthma, succedant, imo phthisis, nisi tamen affectus recens fuerit, qui solus tuto potest curari. Puerperas magis afficit quam virgines.

Curatio. Spongiz marinæ torrefactæ pulverem devoratum auxilii plurimum asferre constat; alii untuntur adstringentibus, ut galla, spongia cynosbati, cupressi strobilis, alumine; alii soleis calceorum torrefactis; alii *Pasta* laudat antea-tilia remedia, præmissa phlebotomia & cathar-si, s. usum salis prunellæ, cujus scrupuli duo in aquæ pluvialis uncias quatuor bibat singulis diebus per quadraginta dies, 2. quotidie leniter frietur tumor, & superimponatur spongia tincta in urina tepida cum octava parte salis prunellæ, 3. laudat etiam cyathum aquæ marinæ singulis diebus per mensem & semissem mane epotum, qua aqua etiam Broncho-cele-



elle foveatur & inde forte *Russell* Anglus hoc medicamen ad strumatum curam transtulit. Huic medicamini urinam a rusticis in ascite, auriginque usurpatam, & ab *Schroeder* laudatam substituit. 4. demum si valentiora remedia requirantur, præscribit *Audor* saponis tres scrupulos in aquæ uncis quatuor dissolutos, aut bolum saponis superhibendo decoctum saponariæ plantæ, quo utitur etiam pro asthma humido; sapo autem in patella crustam albam sanguinis mire dissolvit; 5. Denique acetum scilliticum ad cochlearia duo per mensuram usurpatum, & extus bronchole appositum, modo morbus non nimis inveteratus sit, optimum remedium censet.

Tumores vero vetustiores vel suppurantibus, vel Chirurgi volveleæ tamtummodo cedunt.

1. *Bronchocele ventosa*, *Roncalli* Med. Eur. p. 109. *Hornia colli emphysematica* *Plateri*; *torium allis*; L.

Curatur emplastis carminativis, aut sinustilia sint, ad fomenta spiritalia deveniendum est. Cura autem non succedit apud eos, quorum collum ab infantia crassius est.

3. *Bronchocele sarcoma* *Roncalli* Med. Europæ pag. 353. L.

Illæ species quæ non pendet a lymphæ spissâ in maculorum interstitiis, textuque glandularum congesta, sed ab ipsâ partium excrescentia, medicamentis insaniabilis procul est, sed quibus signis innotescit, hoc non docet *Roncalli*. Familiaris est hic morbus Helvetiis, Germanis ad Goslarum, Pedemontanis, Brixianis in Statu Veneto, &c. an aquis nivalibus, an cibis crassis ut callianis tribuendum?

4. *Bronchocele aquosa* *Montalti* synops. L.

Hydrops gutturalis tunc cognoscitur, & diureticis potissimum aceto scillitico, curari debet, præmissis catharticis: fumus etiam spongiæ combustæ in collum deductus indicatur.

XXIX. EXOSTOSIS; *Phadartbroace*, *nodus*, *Freind*. Hist. Med. Part. II. *Hypertrophia* *Ludwig*. Chirurg. si totum os intumescit; *E-parsum*, *Exostosis*, *Spina ventosa*.

Est ossis tumor vel totalis, vel partialis.

Ossa brevia carpi, tarsi, finis laque exostosi laborant: totum os intumescit, osium vero majorum, ut tibiæ, femoris, humeri, crani, pelvis, &c. exostoses sunt partiales: nunc tumet os in zona seu peripheria sua, nunc in parte antica, postica, &c. Aliæ partem intimam ossis emollit, aliæ extimam tantum laminam habent aut reciproce; aliæ dolent, aliæ minime, aut tantum ratione motus musculorum, quos ossis figura conica, acuta lædit. Cum interiorum tument osium pelvis, crani, sterni laminæ, plura phaenomena superveniunt, quorum principium cognitu difficile est, & cura sæpius inutilis. Numquam substantia ossis tumet nisi remollita fuerit, aut tumet periosteum vel internum, vel æternum.

1. *Exostosis benigna*, *Petit* Malad. des os, Tom. 2. pag. 430. L.

Mitissimis vel nullis stipatur symptomatis, quorum ratio ex situ, figura, magnitudine tumoris, & partium adjacentium munis explicari potest; e contra malignæ excitant symptomata ex indole vitiosa humorum tantum explicabilia, seu soventur a dyscrasia humorum syphilitica, scorbutica, cancro, &c. Cognoscitur itaque benigna ex eo quod desunt signa cujusvis dyscrasiæ.

Principia procacatrica sunt vulnera, ictus contusiones, eczematæ, varices, ulcera partis prægressa, quorum ratione succus nutriticus periostei cespitat, fibras osseas laxat, emollit, unde in his vasculis cumulat, tumorem excitat.

Quæ sunt in ossibus artuum quandoque lædunt motum figura sua, mole, situ; aliæ sunt omnino innotuæ: quæ sunt juxta organa visus, auditus, loquelæ, has functiones diversifimus lædunt.

Exostoses nullum in cute superjacente ruborem aut tumorem excitant; verum quæ ab ulcere excitantur, cariem, vel osteoarcolium ossis sæpius accerunt.

Illæ species non attingenda, nisi gravia incommoda cieat, in quo casu os est serra excideudum, dein exfoliatio procuranda.

2. *Exostosis rachitica*, *Petit* Malad. des os Tom. 2. pag. 440. *Phadartbroace* *Severini* L.

1. Pueros aggreditur non adultos; 2. quos tamen olim aggressa est, non ideo dimittit adulescenti, quod rachitis sanata sit; 3. ossa spongiosa spinæ articulum afficit; 4. minime dolent nec initio nec in statu; at diros excruciant dolores cum evanescunt exostoses: hoc pueris accidit, cum nodi eorum recedunt. Dolores illi sunt vel intermittentes vel continuæ, & a periosteo oriuntur.

Si dolor intus adit cum carie, quibus denique succedat exostosis, hic morbus *phadartbroace* vocatur. Nullis medicamentis cedit; aut si sit *phadartbroace* seu abscessus in osse inde fistula, febris lenta; frustra etiam si amputatio, cum a pari vitio sanguinis alia ossa deinceps afficiantur.

3. *Exostosis cancrosa*, *Petit* ibid. pag. 478. G.

Cognoscitur ex eo quod præcesserint dolores per intervalla lancinantes in periosteo; tumor fuscus est, sensum accessit, parvus fuit initio, & exacte circumscriptus; sunt venæ varicosæ in vicinia; maxime vero cognoscitur, si sint allicubi carcinomata.

Solo lactis & balnearum usu ac narcoticis mali atrocitas est demulcenda.

4. *Exostosis serophulosa*, *Petit* Malad. des os, pag. 480. T. 2. G.

Cognoscitur ex signis serophulæ, scilicet. 1. glandulis colli, axillarum, inguinum, mesenterii induratis; 2. facie turgidula, turgidis labiis, naso, genis; muci narium uberi fluxu, oculis lacrymosis.

Longo usu lactis decoctis sudoriferis, licet mercuriali quandoque resolvitur, si recens sit.

5. *Exostosis scabulosa*, *Petit* Malad. des os, p. 443. T. 2. G.

Cogno-



Cognoscitur ex hypochondriacis signis; ex laesudinis spontaneis, doloribus artuum: spuratione frequenti; scitida; dentium mobilitate, nigrore, pinguium tumore, lividitate, eruptione, scitore, cutis, maxime tibiarum, maculis 1. amplis, violaceis; 2. purpureis, corymbosis, miliaribus, pungentibus vel pruriginosis; 3. papulis cuticulis moris filimilis; medio magis rubris; 4. fixis vel luteis, quandoque squamosis.

Exostosis apud scorbuticos multo rarius est carie, & non nisi in scorbutico recenti observatur; ut caries in inveterato: unde apophyses dissolvuntur, franguntur, tabo putri replentur.

6. *Exostosis syphilitica*, Petit Malad. des os, pag. 473. Tom. 2. C.

Cognoscitur ex signis syphilidis, ut ulcerculis, bubonibus, pustulis, porris, doloribus nocturnis post gonorrhæam suppressam, aut impurum contactum, vulgo concubitus. Vide *signa syphilidis*. Illæ in tibiis, & cranio potissimum apparent, & quandoque dolores atroces in ossibus medullis excitant, atque hydrargyrosi non raro resistunt, syphilidi tantum inveteratæ superveniunt.

Si recens sit, & sine carie, litu mercuriali diu protracto, præmissis præmittendis, evanescent; si sit caries externa, seu nodus, ea radenda, ferro candenti, vel aliis causticis absumenda; si sit spina ventosa, caries interiora exedens, trepano aperendum est, & detergendum. Vide *Heister. Chirurg. l. 5. c. 9.*

7. *Exostosis variolosa*, Petit Malad. des os, T. 2. p. 481. Hilden. cent. 4. obs. 95. C.

Quæ genua potissimum aliæ apophyses in tumorem elevat, brevi post variolam malignam accedit suppuratio, & caries, unde fistulæ, pædarthrocae insanabiles.

Curatio non admittit; longo lacticio. rum usu æger sublevatur.

8. *Exostosis spuria*, Ludvig. Cheir. p. 191. L.

Ille dicitur quæ periosteæ & ligamenti ossium adhæret, neque substantiam ossis ullo modo afficit; ille tumor mollis est vel digito cedens, & dolens quandoque in suppuratum abiit, relicta in ossis carie.

9. *Exostosis osseæ antennis*, Ludvig. ibid.

Est tumor fungosus sub periosteæ, fibris ossis intertextus.

### XXX. GIBBOSITAS; *la Boffe*.

*Ægi Gilii*, *Gibbus* etiam dicitur ipse morbus *Heister*.

Est osium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, distorsione, aut alio principio oriunda.

1. *Gibbositatis spinalis*; Græcis *cyphosis*; *bossa de l'épine*. L.

Ea est quæ pendet ab spinæ distorsione, quæ est duplicis ordinis: nam in aliis virus spinæ inflexæ alii dextrorsum, alii sinisterum spectant; in aliis vero flexura alternatim ad anticum corporis, mox ad posticum partem vertit, unde caput obliquum simul evadit, & fa-

cies vel prona vel supina apparet. Incrementum inæquale vertebrarum, tunc ab antica, nunc a laterali parte; huic affectui ansam præbet, ut videre est in iconibus scelerorum gibborum musei; *Regii a D. Biffon*, & *Danbarn*, in *hist. natur. delinçatis*.

Principium est sæpe virus rachiticum, & tunc sine causa evidenti pueris supervenit: aut hæreditaria est, vel a casu, lapsu, idu, quem infantes passi sunt, oritur, maxime si thoracibus ferreis vel balneaceis, stridioribus, & incongruis constingatur pedes; aut recens nati stridius involvantur. *Borelli Cons. 2. Obs. 59.*

Videatur commentarius *Galenii* in *l. Hippocratis de articulis*, ubi tres species recensentur.

2. *Gibbositatis scapularis*, *Gibbus alatus*; *bossa de l'omoplate*. L.

Non confundenda est cum prominentia relativa tabidorum, in quibus, ablupeis carinibus, os omoplate eminere videtur, cum tantum adeps in vicinia deficiat; illa autem pendet vel ab scapula e sede dimota, aut exostosis patiente, aut extorsum a lateate subtus scirrho projecta.

3. *Gibbositatis sternalis*. L.

Ille verisimiliter a principio interno procedit, dum tenellus adhuc est infans, aut fetus in utero vivit, si abscessus, musculus inæquiter trahentibus, sternum extorsum flectatur; in pueris althma vel dyspnœa quandoque præcedit gibbositatem, & qui gibbi ex asthma fiunt, ait *Hippocrates*, ante pubertatem moriuntur.

4. *Gibbositatis costalis*, *Scoliosis* Græcor. L.

Rarissime accidit ut vitium in costis sit tantum, ut plurimum vero a vertebris repandis, vel spina in partem oppositam inflexa, costæ distorquentur; unde ad primam speciem recidit illa.

5. *Gibbositatis lordosis*, *Gouey Chirurg. p. 166. Mémoires de Trevoux 1722. L.*

Homo qui gibber fuerat, dissectis post mortem musculus rectis abdominis, illico reclus evasit, unde concludere pronum est, spinam dorsum ab horum musculorum fortiori tractione inflexam fuisse, unde ea species gibbositatis. Hinc intelliguntur auxilia convenientia, si species cognoscatur.

6. *Gibbositatis scirrhosa*, *bossa squarrosa*; L.

Est ea quæ a lupia aut sarcomate dorsum producit, aut tumor scirrhosus est, qui gibbum mentitur. Quænam auxilia chirurgica in his affectibus convenient, fusc docet *Hoisterus* loco citato; quæ vero medicamina indicentur, videbis, dum de *Bacchido*.

### XXXI. Lordosis.

*Ægi Caigneux de ancurches*.

Est osium distorsio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ defleunt.

1. *Lordosis compennina*; *Ægi Compennes*, *Gall. Caigneux*. L.

Compennes vocantur qui pedes intorsum contortos habent, aut juxta quosdam quorum tibiae

recte quidem sunt, sed in genubus contiguae; inferius vero divaricatae, & distantes.

2. *Lordosis vulgaris*. L.

Valgi differunt a compernibus, quod tibiae habeant non rectas, sed exorsum convexas, pedibus, femoribusque approximat.

3. *Lordosis varum*. L.

Vari sunt quorum tibiae inflexae sunt, ita ut introsum fiat convexae, pedibus, genubusque a se mutuo recedentibus, furis vero approximat.

Auxilia mechanica petuntur ab ocreis coriaceis, quibus infantum pedes induuntur, sed eorum profunt, & saepe multum nocent, si artiores, rigidiores, aut male fabricatae sint.

## ORDO QUINTUS.

*CYSTIDES* aut *Tumores capsulati*; a *Cystis* vesica, vel *Cystis* capsulae; Gallis *Kistis*.

**S**unt protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas, contentis, vel receptacula quaevis diligendibus.

**XXXII. ANEURYSMA**, *Abcessus spiritus* Amati Lusitani; *Aneurysme*.

1. *Aneurysma spurium* Heister. Chir. pag. 397. cap. 12. part. 2. sect. 1.

Est tumor a crure extra tunicam fibrosam arteriae ruptam effuso, & sub cute intra textum cellularem collecto; is vix pulsatur, nisi exiguus, & nisi vulnus internum notabile sit, respectu tumoris; si enim apertura arteriae sit exigua, & amplitudo aneurysmatis magna, tunc imperius sanguinis illud subeuntis est exigui, & molis majori sanguinis communicatus vix percipi potest.

Istius vero duae sunt varietates; unum siquidem est *simplex*, quod multos annos perseverat; alterum vero *complicatum* cum immobilitate, dolore, corruptione, ac gangraena partis. Inveni in simili aneurysmate brachii thrombum cruoris nigrum, & durum qui plures annos perseveraverit pugni magnitudinis.

Aneurysma spurium est vero periculosius, quia quandoque sanguis in textu cellulari effusus dolores, livores, & gangraenam inducit; huic ansam praebent punctiones a lanceola arteriam perforantes.

2. *Aneurysma verum*, *Aneurysme veri*. D.

Est tumor sphaeroides, sensim incrementis, cuti concolor, pulsans, qui initio pressione recedit, rursus revertitur: sic autem a vi sanguinis in arteriae parietes agentis, & ejus contractilitatem superante, citra vulnus tunicae ejus fibrosae, saltem in ejus cavitate penetrans; duplici principio debetur, scilicet vel admodum auctae sanguinis actioni in arteriae parietes, quod fit in curvatura aortae aut juxta cor, quia cum crescit imperius sanguinis, ille agit in majori ratione contra superficies ari arteriae directe oppositas, quam in parietes ari parallelos; ideo

sic ut ab hac causa aneurysmata tantum fiant juxta cor, verum si ab obice quovis, ut grumo vel concreto polyposo intra arteriam adacto, opponatur magna sanguini retro appellenti resistentia, tunc actio sanguinis in latera valvis crescit eo magis, quo vis a corde impressa major est, & quo major est inde oriunda vasculosa, aut major obex, ut demonstrat ill. *Bernoulli Hydrodynamica* sect. 12. §. 6. fig. 72. & haec aneurysmata quae recte *activa* dici possunt, etiam ut plurimum sunt interna. Vide *Palpitationem*, *Aphma Pleurodynum*; &c.

Aneurysmata vero externa fere omnia *passiva* sunt; nec enim pendunt a vi, nec ab actione sanguinis aucta, sed a resistentia parietum imminuta ob laxatam, vulneratam, erosam alterutram ex arteriae tunicis, ut accidit in phlebotomia, cum leviter lanceola perstringitur, minime vero perforatur; arteria aplasia, valido conatu quandoque distrahitur, & debilitata intumescebat.

Eo validius pulsatur aneurysma 1. quo validius pulsatur ipsa arteria, seu quo major est, cordique proximior, 2. quo aneurysma minus est, & flexibilis; cum enim inveterascit, saepe tunicas, & lamellas ossae adipiscitur, unde, & ratione voluminis majoris, & incrustationis durioris, minus pulsatur, maxime si ejus cavitas concreto polyposo, vel grumoso sit infarsa.

Curatur aneurysma recens assidua, moderata pressione, vetus vero operatione chirurgica apud Heisterum videnda.

3. *Aneurysma cylindroides*. D.

Saepe aneurysma his vix observatur extus; aut in aorta, & carotidibus non infrequens est.

**XXXIII. VARIX**, *Medicis Graecis Kirsor*, *Aristoteli ixia*, *Varice*.

Est dilatatio venae a sanguine, quae cognoscitur ex eo quod sensim crescat, pressa recedat, iterumque revertatur, & livescat, ut venae cutaneae turgidae solent.

Interea duplex est varix, alter *solitarius*, qui sphaeroides ad nucis magnitudinem, imo ultra excrecere solitus, non raro cum dolore; alter *nodosus* in tibus bajulorum, imo gravidarum non infrequens.

Varix pro affectu quandoque salutariter habetur maxime hypocondriacis, melancholicis, splenicis; nec debet citra remedia generalia curari, solitarius non raro post se ulcera mali moris relinquit. *Nodosus* observante *Crusio* est in majoribus venis simul, & in minoribus ad eas devenientibus, & fere semper oedemate aut lymphaticorum vicinorum infarctu stipatus, unde ossa supposita ab iis facile laeduntur; cum venae sectione ejusdem diametri decuplo minorem fundant sanguinis copiam quam arteriae, ex his ruptis decuplo minus impender periculum, si aequae maturae silistur haemorrhagia.

Varix feroti & funiculi (permatici) dicitur *foetalis*; ad umbilicum barbare vocatur *varix umbilicalis*.

*hæc*: vulgo etiam pro varicibus habentur mariscæ, de quibus hic agendum.

**XXXIV. MARISCA.** *Tumores hæmorrhoidales, male Hæmorrhoides; Hæmorrhoides.*

Mariscæ sunt tumores in ani margine enati, rubri, sæpe dolentes, & cruorem sæpe fundentes, sponte dein recedere soliti.

Ex eo quod sanguinem fundere solitæ sint, ac rubræ, plurimi eas inter vasorum hujusce partis aneurysmaticos, aut varicosos tumores recensent; verum nulla in iis relictis sensibilis observatur cavitas, immo compressæ non magis cedunt quam phlegmone, si sit infarctæ, adeoque in hanc sententiam vix devenire possunt.

Hæmorrhoides a Græco *αἵμα & ροή*, est fluxus sanguinis ex mariscis, unde mulier in Evangelio *hæmorrhœissa* dicta fuit, quod sanguinis jacuram pateretur; cum vero fluxus sanguinis diversus sit a tumore, alio nomine hic fluxus, alio mariscæ indigitari debent. *Mariscæ* mariscarum nomine videtur intellexisse tumores hæmorrhoidales.

*Tunduntur tumida Medici videntur mariscæ.*

Mariscæ a textu cellulari per sanguinem inibi congestum distenso efformari crediderim; ideo vero ibi ex arterioli minimis in rectum cellularem adigitur, quia magnæ pressioni ibi sanguis exponitur, minusque resistit cutis tenerior in recti extremo: premitur autem ibi locus sanguis, tum quia refertur columna venosa hepatis labyrinthi tractura bis venosa facta, tum quia ab incessu, a sacibus induratis difficilis est via huic sanguini & in stantibus vim trusivam sanguinis adauget gravitas verticaliter premens; quo vero major est pressio a columna arteriosa, majorque resistentia ex parte venosæ, eo fortius premuntur latera vasorum, unde auditus in lymphaticæ & textum cellularem.

Mariscæ dividuntur in internas & externas, ambæ in *cæcæ*, & *aperiæ*. Vide *proctalgiam a mariscis*; ita tenebimus, dysuriam, nec non hæmorrhoidem, cujus mariscæ apertiæ sunt principium, ut *proctalgiam*; cæcæ, inflammatae sæpius constituntur.

**XXXV. HYDATIS.** *Hydatide.*

Ut varix alius est sphæroideus follicularis, alius nodosus, & ramosus, ita hydatidis alia ex nodis seu globulis lymphaticis seriatim corollæ instar dispositis, & margaritis referentibus constat; sed hæc species trans eam non apparet, & in vulneribus tantum observatur. Vide *Consultationes*, & *Physiologiam D. Deidier Professor. Mompel.*

Alia vero hydatidis est cystis solitaria subspæræica, quæ collecta lymphæ torget, ad ovimagnitudinem accedens, quæ proprie hygroma *Boerhaave* dicitur, quasi cystis aquosa.

Differt hygroma ab œdemate ut aneurysma ab ecchymomate. Sic *exophthalmia* ab aucto hæmate a quo est hygroma; *hydræcema* est hygroma

seroti; *crystallina* est hygroma præputii; est *hydaribus* hygroma articuli, vidi & hygroma palpebræ &c. *phlyctæna* est hygroma exiguum epidermidis.

Hydatides vero sunt principia quorundam morborum internorum, sed hæcenus signa desiderantur. Num decet hydatidem bygromatis nomine designare?

1. *Hydatidis hygroma*. L.

Est folliculus lymphæ turgidus.

2. *Hydatidis corollata*; *hydatidis en chapelet*. L.

Est hydatidum series ex lymphatico vase turgido.

3. *Hydatidis cellulosa*. L.

Est congeries vesicularum pellucidarum a lymphæ in textu celluloso congesta.

**XXXVI. STAPHYLOMA;** *Staphyloma, Clou.*

Est cystis aquosa a cornæ proptosi, & dilatatione, vel ab uvæ hernia trans foramen cornæ elapsa.

Aliud est staphyloma *Gunzii*, cui convenit prima definitio, aliud staphyloma Veterum, quod impossibile, & fictitium videtur *Gunzio* optimis rationibus in hac opinione suffulto. Vide *Disputationes chirurgicæ H. Halleri, & Caligini species*.

**XXXVII. LUPIA,** *Loupe.*

Est cystis vel folliculus materiem pulvaceam non purulentam continens, unde differt ab hygromate, quod continet fluidum aqueum, & ab apostemate, quod purulento fluido turgidum est.

1. *Lupia Meliceris*, *Melissæ* aliis L.

Est folliculus fluido viscido consistentiam mellis adepto turgidus; pulti similis videtur materies, tunc atheroma vocatur, sed est mera varietas.

2. *Lupia leucoma*, aliis *Lipoma*; *Loupe graisseuse* L. Est folliculus adiposa materia turgidus aut sebo firctus.

**XXXVIII. HYDARTHROS;** *Tumour blanche.*

Hydrops articuli vulgo nomine *tumour albi* ab Anglis indigitatur: *Essais & Obs. de Médec. à Edimbourg*, T. III. p. 464. a *Castello* refertur ad meliceriam. Differt ab hygromate quod synovia in hyarthro non folliculo proprio, sed capsula articulari vel cellulæ vicinis continetur. Fusæ de hyarthro agunt *Essais d'Edimbourg*, tom. 4. art. 18. p. 20.

Nihil utilius est quam fonticulum pone innuere, quo serum superfluum exhauriatur.

1. *Hydarthros Synovialis*, *tumour blanche* Th. Simon *Essais d'Edimbourg*, ar. 18. & 20. to. 4.

Est intumescencia articuli, potissimum generis alterutris, cum doloribus, & sensu fluctuationis sine caloris imitatione.

Principia sunt sæpius contractions, ephemera lactea, accedit contraçtura musculorum flexorum, difficilis motus partis, ejusque rigiditas.

Curgatur cathartics iteratis, affusione frigida juxta methodum *Chrysal.*, vel calida juxta *Le Dran*, cauterio parti oppositæ inusæ, unde vacuatur synovia acris ibi collecta.

2. *Hydarthrus flautentus*; *Gonagra Zacuti*, Lusitani; *tumor genu loco puris ventum emittens*; River. cent. 3. obs. 13. & *Zacuti* Lusitani, lib. 2. Prax. adm. obs. 163. L.

Mulier 30. annos oara ab octo mensibus tumorem in parte inferiori femoris, & ipso genu patiebarur; nullus rubor aderat, sed dolor a quo claudicabat, tandem tumor proeminuit binis in locis, intus scilicet & extus, cum mollitie, & fluctuatione; pus inesse putabant omnes; potentiale cauterium externo tumori admodum fuit; postea scalpello incisa fuit eschara, & aperto tumore status quidam emanavit, & oil ultra.

Quandoque existimat homo quod super membrum ejus, sicut genu, sit apostema indigens perforatione, quare perforat ipsum, & egreditur vegetitas tantum, *Avicenna* 3. tom. 2. c. 19. In casu *Zacuti* aderat præterea pulsatio, & aperto tumore status tantum exiit.

### XXXIX. APOSTEMA; *Apostemo, Abscess, Dépis.*

Est collectio materię purulentę, vel inchorose nodique coarctatę, seu clausę.

Fit per conversiõem substantię partium in pus vel malę indolis.

Illā conversio fit per motum Intestinum oon magis cognitum quam conversio io chylum, io cruorem, in tabum, seu digestio, hæmatosis, putrefactio, &c. licet enim cognoscamus adhesionem mutę partium in mixto heterogeneo disperfarum huoc motum tribuendum esse, ignoramus tamen differentias earum operationum specificas; faver quidem in phlegmone suppurationis arteriarum pulsus; verum sine cruore suppurant interiora ossium tarsi, crystallia lens, & sine inflammatione suppurant vomice; quomodo vero differat pus verum a pulcemelicridum, hoc inveiendum restat. Quædam putrefactio incipiens videtur ad digestionem, & ad suppurationem carniū requisita, non vero perfecta, quę facit carnes specificę leviores aqua, cum pus sit specificę gravius.

1. *Apostema abscessus*; *abscess, apostume*; D. Est illud quod progressa inflammatione phlegmonodea partem ipsam, io qua residet, in pus convertit, ioerfectis utriusque musculorum contentum, miõime vero capsula propria involutum; differt itaque a vomica & ab apostasi.

Præcedit partis tumor, rubor, tensio, pulsatio; accedit albedo, mollities, fluctuatio in apice tumoris, dolor miõuitur, mollities & albedo extenduntur; demum rumpitur cutis in apice attenuata, & fõnditur pus. Hic status jam vocatur *vulnus suppurans*, si pus laudabile; *aleus* vero, si vitiosum, & sanari difficile. Pus illud mora & aeris accessu, acre, frigidum, corrosivum evadit, unde aeris accessus effcaute arcendus, ulcus leniter oleoedum, detergendum; putredo balsamica arcenda, siccitas omnia præcavenda, ut vegetare queant vascula molli & leni pure involuta, quę vegetatio,

successive crescens usque ad libellam partis, dein firmatæ adepta, constituit *cicatricem*.

Curam apostematis, ulceris, cicatricis videtur apud omnes Chirurgicos Auctores.

2. *Apostema apostasi*; Gall. *dépis*.

Est collectio puris in parte, sine hujus partis inflammatione prævia, sine partis ipsius assumptione, sed per metallasim aliunde advenientis, aut quasi per secretionem ibi congesti.

Hęc apostasis licet Neotericorum opinionio contradicat, multiplicit observatione confirmatur. Meiomi non vidisse per plures dies in uxore Coosilarii Auditoris typholaborante plurimas apostases, quę quovis mane in digitis, manibus, brachiis, sine ullo tumore, dolore, rubore, calore prævio, apparebant; apertę vero fõndebant pus album lincrum, & hoc effuso cito coalescebat vulnus.

3. *Apostema synchysis*, *dissolutio vitrei*; *oil fõndu*; C.

Est mutatio vitrei aquei, & omoiõum in bulbo oculi contentorum in pus viscosum, coctum, quod successu temporis mutatur partim in serum luteum, residuo inspissato; vide *Saint Yves*, pag. 221. *Maitrejan*. Part. II. Chap. VIII.

4. *Apostema hypopyum*; vide *Caliginem ab hypopyo*.

5. *Apostema diapyses*; vide *Caliginem a diapyesi*; C.

6. *Apostema onyx*; vide *Caliginem ab ongue*.

7. *Apostema parulis*, *parulis* Sennerti, est apostema gingivarum.

8. *Apostema empycele*; D.

Est apostema testiculis, vel scroti.

9. *Apostema spina ventosa*; C.

Est apostema osium.

10. *Apostema vomica*; C.

Est collectio puris intra folliculum contenti, & in viscere quodam, ut pulmone, hepate, geniti, verum hoc non est inter affectus externos sed in principiis morborum ascendendum.

11. *Apostema phalangum*; *Feurche* Diction. de santé.

Est abscessus digitis operariorum superveniens.

### XL. EXOMPHALUS; *Exomphale*.

Est cystica quęcumque collectio fluidi ad umbilicum, seu cystis umbilicalis; unde ab omphalocoele differt.

1. *Exomphalus flautentus* Heister. Instit. Chirurg. tom. II. sed. V. c. 114. §. 2. *pneumacophale* Dionis Operat. de Chir. Dem. 2. L.

Dubia est hæc species, nec exemplo Heisteriano satis probata videtur *Platneri*. Signa ac curationem tradit Dionis loco citato. Vide *Tympanismus*.

2. *Exomphalus aqueus* Platneri Instit. Chir. §. 796. *Hydromphalus* Pauli Æginetę, Heisteri, Dionis, Col. de Vilars. L.

Observatur in gravidis dystocie enixis, iofantibus asciticis, & sæpius in iis qui omphalocoele laborant, vix ex *Platneri* absque omphalocoele & ascite oritur, signa habet hydroceles infra legeda; scilicet mollior est fluctuans, regredi nescius, & ad candulam pellucidus.

Curat.

Curationem hydrocephali vide apud Auctores citatos: hanc etiam erugit curatione hydrocelis infra tradenda.

3. *Exomphalus truncatus*, *Hematomphalus* Græcorum: præmiuntur effusio de varicemphalo de Dionis Operat. Chir. Dem. 2. A.

Differt tantum loco ab hæmatocelo; ceterum illdem signis gaudet, causas agnoscit eadem nec dispar est curatio. Vide *Hæmatocelum* infra.

4. *Exomphalus varicosus*, *Circumscissus* Græcorum; 2. effusio de varicemphalo de Dionis Operat. de Chir. Dem. 2. C.

Pendet ab anevrysmatica arteriarum umbilici dilatatione. Vide signa ac curationem anevrysmatis. 5. *Exomphalus parulens*, *emphysematus* Pauli; *Emphysematus*, D.

Est apostema regiois umbilicalis; ex signis & curatione apostematis huic cognosces, atque curabis: vide *Heisteri Institutiones Chirurgicalis*.

#### XLII. OSCHEOCELE, Oschecele Perdulcis, Hernia fausta.

Est protuberantia scroti a cystice collectis inibi fluidis, seu cystis intra scrotum.

1. *Oschecele fluctuans*, *Emmatocela* Auctorum. L.

Hanc speciem memorant quidem plurimi, illeque egregii in arte vtri; attamen nec exemplis, nec rationibus satis luculenter stabiliunt; itaque de hac dubitant, recentissimorum Primarii vide *Heisteri Chirurgiam*, tom. 2. part. 2. sect. 8. c. 127.

2. *Oschecele aquosa*, *Hydrocele* Heister. Chir. Platner Instit. Chir. *Hydrocele* Sharp Recherch. crit. Arnaud. Traité des Hernies, Le Dran Operations de Chir. Bertraodi Mem. de l' Acad. R. de Chir. T. 3. L.

Variat loco; nunc enim serum colligitur in membrana testiculii vaginalis cavo, (hydrocele faccata vulgo) nunc in cavo scitio textus cellularis scroti, nimirum inter tegumenta & dartoo, vel inter darton & cremasterem: hæc male negatur *Sharp*, modo cavum sibi cudit aqua in textu cellulari membranarum vaginalium, tum funiculi, tum testiculii, tum utriusque, modo tandem intra saccum herniosum partibus provolutis, vel positus, vel non positus fit serosa collectio. Hæc varietates peculiaris habent signa, quibus distinguantur. Consule Auctores citatos, & in primis *Bertraodi*. Hydrocele cognoscitur protuberantia molli, fluctuante, (renititur summo prelo, si humore distendatur nimio) sordidaphana, nisi sero seta sit turpitudo, gravi, figuram pro vario corporis situ mutante, æquali, glabra, indolentis, nisi complicetur, pressioni facilis, difficillius cedente per eam tamen nec minuenda, nec in ventrem refundenda, post pressionem sublatam illico resiliens, nisi cutem scroti simul cedema teceat: urinis a longo tempore servatis non crescente, nec iis immixtis decrescente; tandem venis varicosis stipata. Cum *sarcocèle* combinatur aliquando, & tunc *hydro-sarcocèle* *Heister* audit.

Curatio pharmaceutica fit extus ope topicorum resoluentium, discurrentium, roborantium, exsiccantium, intus vero adhibitibus hydragogis, diureticis, resolventibus, tonicis. Curatio chirurgica duplex est, palliativa & radicalis. Palliativa quæ quandoque, sicut rarius, perfecit sanar, in seri eductione ope paracenteseos identidem repetendæ tota sita est. Radicalem obtinebis, 1. sectione in scroto facta, ope caustici, quo superioribus ad inferiora; 2. ope caustici, quo longitudinaliter scrotum aperies; 3. adhibito seraceo, quod ope acus grandioris per supremam ac lateralem scroti partem deorsum trajicias. Sunt & aliz methodi, ut methodus *Ruysschii*, *Marini*, circumforaneorum. De his omnibus vide *Heisteri Chirurgiam*, 6. de Hydrocele.

3. *Oschecele hydatidosa*, *hydatidocela* Græcorum, *hydrocele* ab *hydatibus* funiculi spermatici, Operationis de Chir. de le Dran, *Bertraodi* Mem. de l' Acad. R. de Chir. Tom. III. *Hydrocele* ab *hydatibus* omenti prælopi seu *epiplocele* *hydrocelico-hydatidosa*, *Lamortier* Mem. de *Piquet* dans les Mem. de l' Acad. R. de Chir. Tom. III. *Hydati* scroti *circoscili* *fuscedens*, *Vaodermonde* Journ. de Med. Nov. 1759. L.

Affinissima est præcedenti. Vide apud Auctores citatos signa & curationem huiusce speciei.

4. *Oschecele Malabarica*; *Oscheo-hydrocele* vulgo Medicis; *Hydrocele Malabarica* *Kempfer* Amœn. Fasc. 3. Obs. 7. *Andrum* Malabaris, *Endemium*, vel *Andu-vaja-Ku*; Vide iconem *Dionis* Oper. de Chir. C.

Oritur ab erysipellate scroti singulis mensibus recidivo cum novilunio, quo post alterum diem cessante, erosus lymphaticis, in scroti cavum confluit liquor serosus, subalbus, luna crescente crescentis & ita scrotum distendens, ut immixta acie educendus sit; liquor ille quandoque rufus, viscosus, vel sanguinolentus est.

Principium in aquis regni *Cochinelle* pronuntiant populares, aquis scilicet sale acri, corrosivo scatentibus: addit *Kempfer* ventum noctu frigidum, qui etiam interiora domuum subiens, morbos exasperat, & convulsionis excitat horrendas visu, hic tamen nihil ferentes exitiis. Aggreditur hic morbus etiam advenas diu immorantes, & molestus tantum inassuetis; per totam hominis ætatem durat, & incurabilis est.

Curatio palliativa est uoica, scilicet ut singulis mensibus instillo phlebotomo e lætere scroti alterutro ad imam partem aquæ educantur.

Præcaveatur hic morbus depurata aqua potulenta per arenam in puteis coagellata; hæc cautio viget in regno *Mangati*; ubi est diversorium quod *Brahmani* singulari in firmis pietate extruxerunt, ibique prandium quotidie parant simis ex sylva vicina confluentibus. Ibi cum oryza coacta baculus exponitur, quem prima advectionis simia manu occupat, ut alias a prandio arceat; hinc certamen inter illas, cujus spectaculum, data elemosyna simis destinata, viatores redimunt.

5. *Oschecele varicosa*, *circoscila*, *circocela*, *circocela* Aucto-

Audorum, ut Dionis operat. Heister. Chir. Planer. Instit. Chir. Sharp. Recherech. Crit. C.

Est varicosa venarum spermaticarum, vel scrotalium dilatio. Posterior oculis patet; priorem cognosces intumescencia funiculi spermatici, quæ statim omentum prolapsum exhibere videtur; ad adhibita majori attentione palpo percipiuntur venæ spermaticæ dilatatae, atque in tortæ: acervim vermiculorum tangere te credere: flaccida est utplurimum in affectu hocce, & mollis epididymis, quamvis aliquando major perficiatur, conveniunt discutientia, subligaculum suspensorium, roborantia, adstringentia, quæ utplurimum abunde sunt, affectu nihil periculi includente: si dolor nulla alia via sedandus varicosum venæ spermaticæ ramum teneat, tunc is ligandus, atque excindendus est ex Sharp; minus bene fuaudent nonnulli coïncaſu amputare testem: vide Variis gener.

6. *Oscitella feminall, Spermatocele* Auditorum ut Verduc Chirug. Astrucii de morbis ven. Arnaud Traité des hernies. L.

Alia est venerea, quæ ex syphilide confirmata, vela gonorrhæa suppressa ortum ducit: alia vero simplex, quæ a variis causis natales habet. Cognoscitur intumescencia testiculi, epididymidis funiculi calida, renitente, dolorifica; abire potest in apostema, fistulam, scirrhum, hydrocelem, sarcocelem, carcinoma. Hanc facit semen suis ductibus hærens, eoque vellitans, distendens.

Curatur venæ sectione repetita, potu refrigerante, laxante, clysteribus emollientibus, topiis, primum laxantibus, emollientibus, anodynis, dein resolventibus, ac tonicis.

7. *Oscitella cruenta; Hernia sanguinea* Celsi, Pauli Aeginetæ: *Hæmatocele* Heister Chir. To. II. Bertrandi Mem. de l' Acad. Royale de Chir. Tom. III. A.

Debetur utplurimum causæ externæ contudenti, dilaceranti, raro internæ rodenri: signis gaudet hydrocelis ad caudalam non pellucidæ, sed potius valde obscuræ cum aliquali nigrore. Interdum sola seroti sectione, vel perforatione cognosci potest. Curatur occisione seroti artificiosa, qua sanguis educitur, postea purgatur vulnus, & tentatur vasis aperti consolidatio; raro sufficit punctio, sub qua affectus utplurimum recidivat, vas spermaticis, ac testiculo corruptione tentatis, quæ tamen in ventrem non penetravit, viget castrationis necessitas.

8. *Oscitella purulenta, Hernia humoralis* Heister. Chir. Dionis Dem. 4. *Empyretela* Græcorum. C.

Est puris collectio intra scrotum; signa habet abscessus, vel apostæos. Curatur incisione, qua educitur pus, vulnere remediis apostemati dicatis mundato, & ad cicatricem perducto.

9. *Oscitella adiposa, Liparocela* Hollerii de morb. intern. Adipseri Chir. Reneaume Essai sur les Hernies, Sharp. Rech. crit. L.

Lupia est intra scrotum enata, lipoma, vel hæstoma referens; diagnôsim habeto ex signis

lipomatis, hæstomatis, quorum curatio lipoceli sanandæ competit.

10. *Oscitella albuginea; Spermatocele syphilistica, Albogeda* VV. Cockburn the cure of Gonorrhæa c. 8. & 9. vulgo *Gonorrhæa remissa dans bouffes*. C.

Est tumor testiculi qui supervenit gonorrhææ virulentæ suppressæ; mitigatur dolor, tensio & calor phlebotomis, potu leniente, emollientibus, cataplasmatibus emollientibus; sedata inflammatione resolutiva & potissimum hydragrogis adhibentur.

## ORDO SEXTUS.

### E C T O P I Æ.

*Proteses, celes, parathremata* Græcorum; *Prolapsus, hernia, aberrationes, luxationes* Latinorum; *Déplacement, écbats, descentes, hernies, aberrations, luxations*.

(Hanc Ordinem elaboravit D. Cusson, Doct. Med. Muspel. & Reg. Sciens. Sor. Sedal.)

Sunt affectus partium organicarum in situ mutato: eclopiarum character est partis solidæ e sede nativa defectio sensibus obvia; affines sunt admodum affectus eclopi cum protuberantibus: verum in eo discrepant hi duo morborum chirurgicorum ordine, quod in eclopiis protuberantia, quæ essentialis non est, a solidis sede propria emotis pendeat; in protuberantibus vero tumorem faciant fluida aut congesta, aut solidis plus æquo accreta.

Dividuntur Eclopiæ in prolapsus, herbias, & luxationes: cadunt in partes molles prolapsus & herniæ; in partes vero duras luxationes: in prolapsus pars sedem mutans nuda est, & sensibus immediate exploranda venit: in herniis sub communibus saltem integumentis delitescit pars e loco dejecta, & sensibus mediate tantum, non immediate obvia sit. Notandum partes prolapsus nunc oculis patere etiam aote lapsum, nunc vero tantum postquam prolapsus sunt: procidunt & etiam partes, quas nec lapsus quidem oculis subicit: verum eæ tunc immediate rangi possunt. Circa hernias hoc quoque notandum, partem herniosam fere semper erumpere e nativis quibus coercetur claustris; dari tamen herniæ genus unum & alterum, in quo, servata etiam propria cavitate, pars nihilominus situ non gaudet nativo. Exempla subministrant parorchidii species, & uteri inclinationes: hinc nec sub prolapsium, nec sub herniarum titulo, verum sub aberrationum nomine (melius forte) *Gaubii* veniunt Eclopiæ hujuscemodi; in parathrematibus loco nativo emovetur pars dura, ut ossæ, cartilaginea, vel situm mutat.

Ideo partes in loco nativo continentur, licet adione musculorum, & vi gravitatis sæpe extra protrudantur, & a sede recedere nitantur, quia vires quibus coercentur, seu retinentur, æquales sunt, imo majores viribus eas expellere nitentibus; vires retentrices sunt cutis, tendinum,



dinum, ligamentorum capsularum elasticitas, contractilitas, crassities, numero, densitati fibrarum proportionalis est eae vis: sitaque pars quaedam e sua sede dimoveatur, necesse est omnino ut vis expellens, sive viva, ut nifus, motus, saltus, clamor, ietus; sive mortua, ut pondus partis, ejus pressio, momentumque quo vis utitur, faciant productum majus, quam quod a viribus retentricibus refultat.

Unde sequitur quod quaecumque Ecopia trihuenda sit, vel principio activo, seu cuidam violentiæ, ut auctis viribus expultricibus, vel contra cuidam laxitati, seu debilitati, seu imminutis viribus retentricibus. Ex his diversis principiis, diversa prorsus oriuntur symptomata, diversaque pendet curandi methodus; nam ubi Ecopia fit per violentiam, tunc est dolor, tensio, calor; & e contra cum fit a laxitate, nullus est, vel minor multo dolor, minor irritatio. Propterea in primo casu partem in pristinum sedem reponere difficilimum, retinere facilius est; in secundo e contra partem restituere sedi prout est, in ea vero firmare non ita facile; denique ratione curæ, ubi pars loco emoveatur per violentiam, laxantia, lubricantia, anodyna, phlebotomia auxilium sunt; e contra cum a laxitate fit Ecopia, exsiccantia, roborantia, irritantia, aromatica, tonica profunt. Errant ergo qui omnes paratopias, tanquam a laxitate oriundas, eadem methodo curandas censent, & distinctionem vere mechanicam ab Antiquis traditam inter vires expultrices & retentrices contemnunt, aut non capiunt. Errant etiam qui omnem partis elevationem, seu profuberantiam a fluidorum flasi, tanquam a causa proxima, repetunt, cum a vi contentorum absoluta, vel respectiva ad continentis resistantiam adacta repeti debeat.

Sub hoc ordine militant genera sequentia, Exophthalmia, Bepharoprosis, Hypostaphyle, Paraglossæ, Proproma, Exania, Exocyste, Hysteroptosis, (hæc prolapsus sunt;) Enterocoele, Epiplocele, Gastrocele, Hepatocoele, Splenocoele, Hysterocoele, Cystocoele, Encephalocoele, Histeroxolia, Parorchidism, (hæc vero herniæ, nisi nltima duo genera, non hernias, sed aberrationes esse velis;) Exarthrema, Dialstasis, Loxarthrus, (hæc tandem ophtharopias.)

**XLII. EXOPHTHALMIA;** *Magnitudo nimia, prolapsus, expressio oculi* Latinorum; *Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi* Boerhaave de Morb. Oculi. Part. II. cap. 5. *Exophthalmia, Hydropthalmia, Buphthalmus, seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Epistomus* Græcorum, Mauchart Diss. de Hyd. ophthalmia, & oculi paracentesi Inter Haller. Disput. Chir. Tom. I. *Grossen contre nature, hydropisie, cancer, rhitis de l'œil.* Maitre-Jan Part. II. chap. 6. Saint-Yves Part. II. chap. 1.

Est bulbi oculi procidentia, aucta, vel non aucta sensibilibiter nativa ipsius magnitudine;

exorbitat itaque oculibulbus plus minus distensus, ac tumens, vel extropulsus, ac prolapsus, vix mutata ipsius mole, neque a palpebris quæ sanum de cetero oculum clauderent, tegi potest.

1. *Exophthalmia hydropica.* *Hydropthalmia, Buphthalmia* Mauchartii. *Hydrophthalmia* Platneri Instit. chirurg. §. 764. *Hydrophthalmia* Boerhaave. *Turgescencia vitrei serosæ* Mauchartii. *Hydrophthalmia serosa vitrei turgescencia mixta*, ejusdem. *Hydropisie de l'œil* Saint-Yves. *Grossen contre nature de l'œil, Extension non contrôlée du corps vitré* Maitre-Jan. D.

Species hæc debetur nunc aequi humoris incremento (hydropthalmia), nunc incremento vitrei (serosæ vitrei turgescencia), nunc utrique (hydropthalmia cum vitrei turgescencia combinata.)

Hydropthalmiæ signa sunt successivum bulbi oculi augmentum, cum tensione turgida, atque exorbitatione; cornea plus solito elevata ac prominens, iris profundior, & ab interna corneæ superficie remotior; pupilla immobilis, nunc amplior, nunc strictior (eadem remanet pupillæ mobilitas & magnitudo juxta Antonium Maitre-Jan) visus ab initio illibatus, successively debilior, obscurior; dolor nunc mitis, obscurus, circa oculi fundum, nunc gravior cum ejusdem lateris affecti hemicrania, stupore partium faciei, aliquando & emphysemate, odontalgia, insomnis, tandem sub ulteriore molis incremento epiphora, ecropium.

Turgescencia vitrei serosæ signa sunt notabilis bulbi oculi exorbitantis augmentum, cum insigni ipsius duritie, ac tensione turgida; umbra lenti crystallinæ affusa a limbo vitrei circa ipsam elevati; strabismus versus superiora; dolor nunc obtusus, nunc vehemens; notabilis visus imminutio; iris convexa ad corneam magis approximata pupilla plus solito dilatata, & parum omnino mobilis.

Hydropthalmiæ cum vitrei incremento combinatæ difficilior diagnosi, quod ad curationem non magni interest. Hanc tamen licet hariolari ex mole ocularii bulbi nimia, velocius incrementum; ex ipsius duritie insigni, ex strabismo, ex pupillæ magna dilatatione, ex iride profundiori, & corneæ elatiori. Hæc exophthalmiæ hydropicæ varietas composita, nunc debetur sero acriori, nunc vero mitiori in oculum depulente, in primo casu symptomatibus jam didicis sociatur inflammatio interna externaque, febris, agrypnia, quæ a secundo casu exulant.

Hanc speciem, non neglecta, si vigeat, ophthalmia, curabis phlebotomia, catharticis repetitis, resolventibus internis spiritibus, discutientibus oculo admotis, vesicatoriis, setaceo, fonticulis, immo & oculi paracentesi in sclerotica, vel corneæ instituta. (*Vide Mauchartium loci citatis.*)

2. *Exophthalmia purulenta* Maitre-Jan, part. 2. chap. 6. *Exophthalmia hypopycia* Boerhaave loc. cit.

In hanc speciem abic species præcedens, si inflammatio a sero acriori in oculum depulente inducitur in suppuratum abierit. Post dolorem atro-

atroces inflammationem intus & extus adu-  
dam, tumefactionem summam membranarum  
oculi album efformantem, palpebrarum inver-  
sionem, epiphoram calidam & acrem, turbatur  
tandem oculus, & sic partium interiorum sup-  
puratio, ac destructio. Labente tempore tan-  
dem rumpitur, & exulceratur oculus cum puris  
effluxu, dolorum lavamine, successiva partium  
deterfione, bulbi ocularii immutatione, ac de-  
mum cicatrice. Curationem sequentem recipit  
hæc species: pure penitus facto, si summa sit  
inflammatio, & dolores atrocissimi, aperienda  
cornea in ea parte per quam viam sibi parat  
pus conclusum, aut in parte declivi quacun-  
que, si nullam specialiter affectare pos videatur.  
Ea ratione doloribus majoribus a ruptio-  
nis spontaneæ procrastinatione oriundis occur-  
retur, adacta ultra uveam lanceola, pure eua-  
cuato, & mundato per collyria abstergentia o-  
culo, tandem cicatrix inducitur.

3. *Exophthalmia cancerosa, cancer de Paul S. Yves, part. 2. chap. 1. C.*

Sanguis spissus vasa membranarum oculi in-  
fluit, easque valde crassas reddit, ac veluti  
carneas: inflammatio & dolor incipiente morbo  
moderata, eo progrediente sensim auferunt,  
tollitur visus. Gravis prorsus est ægrotatio hu-  
jusce modi, membranarum oculi quasi cancer,  
qui licet quandoque non exulceretur, nihilo-  
minus tamen temporis successu dolores atroces  
parit cum febre, ac tandem morte. Sola oculi  
exstirpatione sanitas aut vita servari possunt.  
Vide *Antlorum citatum*.

4. *Exophthalmia traumatica Maitre-jan, part. 2. chap. 10. D.*

Oculus saxo, pila lussoria, fuste & similibus  
violenter percussus, non solum contunditur cum  
interiorum rupture, atque contusione; verum  
etiam disruptis membranis communibus, mus-  
culis, aliisque quibus gaudet vinculis, exor-  
bitat aliquando, extruditur plus minus prolap-  
sus, immo in idu violentissimo partium non-  
nullarum adhuc integritatem fragmentis tantum  
sustentatus dependet. In leviori malo remedia  
est partium disruptarum agglutinatino, reposito  
intra orbitam oculo: in malo vero graviore,  
quoniam separatorum coalescere impossibilis est,  
infinita vinculorum, quæ superiunt, pau-  
culorum sectione, & exhibita hæmorrhagia, feb-  
ris & inflammationi necretur per phleboto-  
mias, clysteres refrigerantes, dietam tenuem:  
suppuratio facta, pars a pure mundabitur,  
& tandem suo tempore cicatrix inducetur. Vi-  
de *Antlorum citatum*.

5. *Exophthalmia a protuberantia. L.*

Variar multifariam hæc species; extruditur  
enim oculus.

(a) Ab exollesu introibitali, *Petit Maladies des os chap. de l'Exopht.*

(b) Ab apostemate introibitali, *Maitre-jan part. 3. chap. 1.*

(c) Ab hæmatocystide introibitali, *Maitre-jan ib.*

(d) A scirrhus, cancro glandulæ lacrymalis,

*Boerhaave part. 2. cap. 7. Gortor. Chirurg. repurg. lib. V. c. 10.*

(e) Ab hydatidibus introibitalibus, *Positivum ac supra.*

(f) Ab adipis introibitalis intumescencia, *S. Yves part. 1. chap. 19. 20.*

(g) A lupia introibitali, *Maitre-jan ib.*

(h) A gummate introibitali, *Affruct. Traité des tumeurs, tom. 2. liv. 6. chap. 6. pag. 190.*

Non protuberantia quævis intra orbitam ena-  
ta exophthalmiam valet producere; verum ea  
tantum quæ satis magna ac profunda est: qua  
proportione crescit protuberantia: moles, pari  
passu extruditur oculi bulbus, vix quoad ma-  
gnitudinem nativam mutatur: facilis in univer-  
sum est hujus speciei diagnosi, aut non ita fa-  
cilis varietatum distinctio: bas ut ab invicem  
differmines: lege Auctores citatos ad quos bre-  
vitat causa amandat te volumus. Quoties  
pro indole protuberantia, cui natales debet  
exophthalmia, varianda est. Hanc tibi dabunt  
*Feissus, Astrucius Maitre-jan, S. Yves, Boerhaave, & Astruc*, in locis fide quilibet varietate  
allegatis. Vide insuper *exophthalmos, apostematia, hydatidia, lupia, scirrhus, carcinomati genera*.

6. *Exophthalmia paralytica, Maitre-jan part. 3. chap. 2. L.*

Debetur hæc species paralyti musculorum bul-  
bi oculi introitum trahentium, seu musculorum  
oculi rectorum, salvis obliquis. Vide *signa pa-  
ralytica nec non ipsius curationem*, hinc habebis  
speciei hujusce diagnosim ac therapejam.

7. *Exophthalmia critica, D. Chaptal obser-  
vante. D.*

Observabatur hæc species in homine univer-  
salem passio tetanum, qui judicatus est materiam  
morbosam decubitus in oculum: intumuit ad pu-  
gni magnitudinem oculi bulbus mirum in mo-  
dum exorbitans, & ruptione fundens ichorem  
copiosissimum pure mixtum. Postulat remedia  
exophthalmia purulentæ.

8. *Exophthalmia a comatibus; huc Ectropismus  
ex visu paralytico Pauli Æginetæ, Aetii. Ectropismus  
ex sortamine athletico Aetii. D.*

Exprimuntur aliquando oculi, ut prominen-  
tes permanent. Oculorum expressiones ex visu  
laborantium dolore pariter coningentes sapient  
purgationibus in parte succedentibus solvantur;  
proinde has moliri atque juvare competit.  
*Paulus Ægineta 1. 3. c. 22. Aetius part. 2. serm. 3.  
cap. 66.*

9. *Exophthalmia a strangulatu, Ectropismus ex  
strangulatu Pauli Æginetæ, Aetii.*

Ita exprimuntur ac eliduntur oculi ut exerti  
perleverent: quibus ex strangulatu hocce vi-  
tium oritur, incisio venæ cubiti præsidio est.  
*Aetius, Paulus Ægineta ibidem ac supra.*

10. *Exophthalmia a chemosi Saint-Yves part. 2. chap. 3. c. 6. Astruc de morbis venericis lib. 9. chap. 3. §. 1. D.*

Oritur hæc species ab idu in oculum aut en-  
jas vicinas infectis, a decubitu ad conjuncti-  
vam critico in febribus contagente, a lentore  
phlo-



phlogistico a parte inflammata ad conjunctivam translato, ab humoris qui in gonorrhœa virulenta funditur parcius vel nequaquam effluentis metallis in conjunctivam facta. Signa diagnostica sunt conjunctivæ rubræ, dolentis, calentis tanta intumescencia, ut ad digitum transversum emineat; cornea veluti in sœvæ rotundæ fundo depressa jacet; adest dolor capitis, & oculi maximus, gravitas supra orbitam, agrypnia, febris, palliatio; antrorum prominens oculus, nec a palpebris, quæ claudi nequeunt, & etiam extrovertuntur, penitus tegi potest. Similem symptomatibus gaudet chemosis venerea cum isto tamen discrimine quod in ista conjunctiva emidissima videatur, dura ac carnosa, & per innumera ipsius puncta stillet materia spissa, acris, flavescens, humoris gonorrhœici proflus similis. Curationem deprome ex *Tœ*, & *Affruciis*. (Vide *Exophthalmum chemosum*).

#### 11. *Exophthalmia a Staphylomato L.*

Locum habet hæc species quotiescumque staphyloma, sive fiat integra, sive divisa cornea, ad tantam molem affurgit, ut semper nuda, partim saltem, protuberantia remaneat: neque a palpebris tegi possit pars oculi anterioris prominens. (Vide *Staphylomatis genus*.)

**XLIII. BLEPHAROPTOSIS.** Manchartii; *Blepharoptosis*, *Lagophthalmus*, *Ektrapium*, *Ektrapium* Græcorum; *Palpebra superioris casus*, *retractio*, *palpebrarum introversio*, *extroversio* Latinorum; *Chûte*, *relaxation de la paupière supérieure*, *travillement des paupières*, *trichiasis avec introversion des tarfes*. Vide *Platner*. *Instit. Chirurg.* §. 577. §. 584. *Maitre-jan* part. 3. chap. 18. 19. 20. 21. *Saint-Yves* part. 1. chap. 8. 9. 10. *Dionis* *Dem.* 6. *Boerhaave* de *Morb. oculi* part. 1. cap. 5. *Heister*, *Chir.* Tom. 1. part. 2. sect. 2. cap. 45. 46. 48. *Gorter*, *Chir.* repurg. lib. 5. cap. 6.

Est palpebræ utriusque vel alterutrinus elongata, retracta, introversa vel extroversa Ectopia cum symptomatibus in diversis speciebus variis.

1. *Blepharoptosis genuina*, *Blepharoptosis* Græcorum; *Casus*, *lapsus palpebra superioris* *Platneri*, *Boerhaave*; *prosis* *Heisteri*; *chûte*, *relaxation de la paupière supérieure* *Maitre-jan*, *Saint-Yves*, *Dionis*. L.

Fit hæc species 1. a vulnere musculi frontis temporis, & palpebræ superioris levatori inflicto, 2. a tumoribus quibuscumque majoribus pondere suo palpebram deorsum trahentibus, 3. a deflexionibus inflammatoriis vel aphlogis palpebram elongantibus, 4. a mera relaxatione palpebræ perferum superfluum inducunt, 5. tandem a palpebræ paralyti, quæ nunc constans est, nunc vero periodica. (Qualiter nocte recurrentem cum epiphora mucina Blepharoptosim paralyticam refert *Cantouss* in *Transact. philos.* 1738. n. 449. quam sanarunt aquæ Belloniacæ mûchæ assusæ). In hac specie palpebra superior elongata a cione musculi ipsam elevantis attol-

li nequit; hinc vel nullo modo, vel non sufficienter denudatur oculus, atque ita nulla fit visio ut plurimum, nisi palpebra continuo manu elevetur. Parent hujus speciei varietates. Circa quintam notabis, quod paralyti simul afficiantur gena ejusdem lateris, laxior maxilla, lingua, oculus, partes aliæ. Varietates 2. & 3. curabis depresso morbo primario, cui illæ natales debent; 4. conveniunt focus roborantes, spirituosius; 5. adoriens remediis antiparalyticis extus, & intus usurpatis: quæ si minus bene cefferint in duabus hisce varietatibus, curatio petenda est ex operatione chirurgica in palpebra prolapsa, vel in cute frontis instituta, quæ etiam utere ad sanandam varietatem 1. (Vide *Platnerum*, *Dionis*, & *Heisterum*).

2. *Blepharoptosis lagophthalmus*. Vide Auctores in characteris citatos; nil de *licore*, *lagophthalmio*. L.

Fit in palpebra superiori, 1. a mala conformatione, 2. ab exsiccatione ab ophthalmicis indulta nimium adstringentibus, 3. a musculi palpebram referantis spasmo, vel tono nimio, 4. quod sæpius evenit, a cicatrice, vulnera, ulcera, ultionem, palpebras, immo & frontem afficiunt, sequente. Hanc cognosces palpebræ superioris retractione, quæ fit ut parum descendat, oculumque non contegat somni tempore. Exulat palpebræ extroversio; exsiccatur primum cornea, dein pelluciditate amittit: in palpebra inferiori observatur & etiam id vitii genus, neque alias agnoscat causas. Hujus speciei varietates; quæ a spasmo vel paralyti proficiuntur; remediis morbis hisce dicatis debellare facies. Si magna sit retractione, medelam non recipit affectus. In mola leviore curatoria effe possunt humectantia, emollientia, laxantia, tractio in sensum contrarium ope manus, emplastorum, spleniorum sæpius instituta; quæ si minus proficiant, ad Chirurgicam operationem confugiendum esse volent plurimi, reuertuntur *Gorters*, & *Antonius Maitre-jan*; sectionis instituendæ rationem vide apud citatos Auctores.

3. *Blepharoptosis Ektrapium*. (Vide Auctores modo citatos.) *Ektrapiement*. L.

Hæc species in palpebra utraque, aut frequentius in palpebra inferiori observanda, fit 1. a membrana palpebrarum internæ laxitate per diuturniorem emollientium usum inducunt; 2. a protuberantia intra palpebras enata, 3. ab obstericatione, si nimium infantis oculi ab obstericis digitis nimium vexati fuerint, 4. ab operatione fistulæ lacrymalis, si nempe separantur tarsi in magno cantho, 5. a marginali diallysi, quando per vulnus, ulcus, finditur palpebrarum margo, retractis, & retortis fissuræ angulis, 6. tandem & cicatrice vulnera, ulcera, ambulationem expiente.

Hujus speciei signa sunt palpebrarum brevitates ac extroversio, ita ut pars rubra interior turpem generans aspectum promineat, nec sufficienter oculus contegatur. Curatur varietas 1. usu roborantium adstringentium, exsiccantium diu-

diuturno, 1. tollitur protuberantiæ curatione per congrua remedia, vel ejus ablatione per cautellam, excisionem artificiosam, 4. sanavit *Le Dron* operatione in *Mem. de l'Acad. de Chir. T. 2.* legenda. Medelam non recipiunt varietates alie. Chirurgicam operationem suadent nonnulli, quæ *Antonie Maitre-jan* non probatur. (Vide *Mauchartile & Kechel* dissertat. de *Elthropio*).

4. *Blepharoptosis entropium*, (Vide *Aufores citatos*) *Trichiasis avec inversion des tarses*. L.

In hac specie quæ sub nominibus trichiasis, dystichiasis, phalangiosis, ptosis etiam venit oculo, obvertuntur carni cum vis pilis, accedentibus ophthalmiæ a trichiasis symptomaticis. Conversionem faciunt 1. Emphysema, oedema &c. partes palpebrarum exteriores occupantia; 2. debetur & etiam contraxioni membranz internæ palpebrarum ex *Diem*, nec non juxta *Antonium Maitre-jan*, a stridura quam facit humor qui lippitudinem siccam duramve inducit, si nempe in oras palpebrarum depluens ipsas externe tamesfaciat atque induret. In varietate 1. ea usurpanda venit medendi methodus, quæ oedemati, emphysemati, &c. competit; quam, si opus sit, excipient remedia ophthalmiæ dicata; operationem eibirurgiam eo in casu ab Antiquis, imo & Neotericis celebratam rejicit *Antonius Maitre-jan*. In varietate altera incisionem longitudinalem proponit *Diem*; auctor vero modo laudatus emollientia, artificiosam cilioram avulsionem, & ophthalmiæ remedia; nequaquam autem ipsi probantur tum ciliorum pungentium extroflexio, & agglutinatio, tum usio ope cantheri actualis, tumea remedia quibus impediti perhibent ne cilia denuo succrescant; ceterum locus est in hac specie futuræ scicæ; a *Diem* laudatæ, qua si non resiliuntur cilia confugiendum esse dicit *la Faye* ad operationem ab Antiquis propositam modo mitiori peractam, eo scilicet quo in *Blepharoptosi* vera ab ipso celebratur. Vide *Aufores citatos*.

**XLIV. HYPOSTAPHYLE;** *Staphyle seu Uva, hien seu columna, infantium seu lorum, Craspedon, Columella bicornis* Aræti Auctor. Lib. 1. cap. 8. de affectibus columellæ; *Uvula prelapsus* Nenter Tab. 25. cap. 8. *Uvula preducta* Heister Chir. T. 2. p. 656. *Uvula inflammata, catarrhus, paralysis*, casus Gorter Praxis Med. Syst. pag. 165. *relachement de la luette*, *Dionis* Dem. V. *Chôte de la luette, luette basse, luette tombée*.

Est gurgulionis seu uvulæ laxatæ, inflammatæ, ulceratæ, incrassatæ, attenuatæ, bicornis, procidentia cum molestia, ac difficultate inter deglutendum; tussis, nausea, expulsiōne fere continua, & quandoque dyspnœa, nec non pestilissimo.

*Nota.* Aræti columellæ affectus memorans prolapsum uvulæ quinquefariam dividit, scilicet in columnam, uvam, lorum, craspedon, & uvulam bicornem. In columna phlegmone crassescit

gurgulio in longum protensus, rubens, & a bali nique ad extremum aqualis. In uvula in parte sui extrema rotundatur, crassescit, livet, subnigrificat gurgulio, figura, colore, magnitudine uvæ similis. In *Craspedo* in tenuem, & oblongam membranam definit columella habens in extremo veluti urinaculum. In lora membranz ab utraque parte uvulæ adjacentes in latum explicantur, veluti vesperilionum alæ. Tandem bicornis redditur uvula geminis membranis hinc atque inde pendebitis. Videntur autoptæ an recipiendæ sint hæc omnes species: nobis vero bina sub specie totum hocce genus continetur.

1. *Hypostaphyle ab inflammatione; Inflammation uvula* Celli, lib. 6. cap. 14. Aræti, de curat. acut. lib. 1. cap. 8. Nenteri, Heisteri, Gorter, &c. *Inflammation de la luette*. A.

Elongatur ac procidit forma varia gurgulio tumidus, calens, acnte dolens, ruber vel lividus; inflammatio in suppuratum nonnunquam abit, major est & deglutendi, & spirandi difficultas in hac specie quam in subsequenti. In graviori malo prompta a strangulatu perniciem impendit. Curatur venæ sectiōne, alvi dictione, collutione emollienti antiphlogistica, subadstringenti, scarificationibus. Vide *Aufores citatos*.

2. *Hypostaphyle a laxitate; Prolapsus uvula* Nenteri; *Productio uvula a pignita* Heisteri; *Oedema uvula* Gorter; *Catarrhus uvula* ejusdem; *Casus uvula* Dionis, Gorter; *Prependentia uvula paralytica* Gorter; *Relachement, chôte, paralysie de la luette*. L.

Laxatur, elongatur uvula, colorem nativum nunc servans, sed attenuata; nunc pallida, frigida, oedematosa. Curatur hæc species applicatis spirituosis, roborantibus, adstringentibus, acerbis, adhibitis interne catharticis, resolventibus, tonicis. In casu paralytico competit curatio blepharoptosis paralyticæ; quæ si non proficiat, amputatio instituenda, compressa, si opus sit, hæmorrhagia ope stypticæ. Vide *Aufores citatos*.

**XLV. PARAGLOSSE;** *Lingua extumescens, magnitudo, inflatio* Galen. Method. Med. Lib. XIV. Valerii de Taranta Philon. lib. 2. cap. 59. Marc. Donat. Med. Histor. mirab. lib. 3. cap. 4. *Lingua retrahilis, exertio* Gorter; *Glossocoele* Gaubii Pathol. §. 242. *Lingua extrusa* idem §. 253. *Renversement de la langue dans le gosier*, *Petit Mem. de l'Acad. des Sec. 1742. avalement de la langue, chôte de la langue, retrahion de la langue, grandeur excessive de la langue, sortie de la langue*.

Est linguæ motu deglutitorio in fauces revolutæ vel ore extrusæ, exundantis, exertæ cætopia, imminuta, vel auda ipsius magnitudine: accedunt symptomata alia in speciebus variis varia.

1. *Paraglosse deglutitoria, Lingua verata resolutio in fauces* Petiti, *Glossocoele seu hernia lingua* Gaubii; *avale*.

avalement de la langue; *chôlé*, *trouvernement* de la langue dans le gosier. D.

Hanc speciem observare datur in recens natis; lingue fræno præpostere aut nltro modum secto, immo & aliquando nulla instructa fræni sectione ( Vide observationes a *Petio* relatas ). Linguam vorant, & mortem spiritu Intercluso sibi inferunt Nigritæ, ut berorum verbera iniqua nesciantur; testantur historici; & Auctores fide digni. Quotiescumque id vitii contingit, primum labia, & buccas movere ceas natus eodem modo ac dum uber exsurgit. Auditur sonus quali in deglutientibus; mox subito ingruit suffocatio, lingua que nativam servat magnitudinem, tunc temporis per deglutitorum nifum hausta, in fauces plus minus revoluta, & suppositam epiglottidem claudente. Avertitur suffocatio, & lethum imminens, si digito in os immisso linguam reponas, aut si oblatum digitem lingua exstugas puerulus, qui si sibi relinquatur brevi in suffocationem iterum incidit, lingue restitutione denuo tollendam: verbo recurrit & suffocationis periculum, & repositionis necessitas donec linguam noviter in ore retineat, quod splenilo ac congrua fasciacione præstitit *Petio*: valent hic locetiam que linguam vulneratam in eodem situ remanere cogunt. Infantulum alterum qui fræno licet integro, linguam tamen vorabat, enarvavit *Petio* excubitis assiduis, & ad motis vix expersfacto atheribus. Ceterum si hanc five illam viam in eas, eam per longum tempus terere memineris. Plura vide apud *Petio*.

2. *Paraglosse glossomphus*, *Intumescencia lingua nimia Galeni*; *Magnitudo*, & *Inflatio lingua* *Valefci* de Taranta; *Tumores lingua miri* *Marcelli Donati*; *Grandeur excessive de la langue*, *tumeur de la langue*.

Varietates plures habet hæc species: enim vero lingua portentoſe intumescit ita ut ore capi nequeat, v. ab inflammatione ipsam decinente; 2. a defluxione seroso-pituitosa in ipsam facta; 3. a catarrho, 4. ab hydrargyrosi minus caute adhibita, 5. a tumore inflammatorio glandularum ipsius basi inpositarum, &c. Cognoscitur hæc species magnitudine lingue ore non continendæ, exandantis, exertæ; facili varietatum digno. In 5. lingua tumore compressa craſſefcit, elongatur, lateſcit, dentibus non coerenda, diaphana, dura, albida.

Varietatem 1. curabis venæ sectione, alvi ductione, colluvionibus; refrigerantibus, acidis, nitroſis, &c. 2. vero emeticis, hydragogis, clysteribus acutis; hydragogis, &c. 3. competunt remedia catarrhi, 4. debellabis ea methodo qua salivatio nimia hydrargyroſeos tempore contingens reprimitur, 5. curata sunt glandularum phlogiſtice inſarctarum suppuratione, tumoris apertione spontanea, ac munda-tione per congrua remedia.

3. *Paraglosse exortoria*, *Lingua exortio*, *Gortieri* Syll. Prax. med. pag. 160. *Lingua extruſa* *Gambii* Pathol. *ſortio de la langue*, L.

In hac specie lingua involuntarie exeritur, *ſortio de la langue*, Tom. I.

& maximam partem extruitur, eadem remanente nativa ipsius mole; sit id vitium vel musculorum linguam retrahentium paralysi, vigente simul exercentium musculorum adione, vel convulsione tonica aut clonica musculorum linguam extrorsum trahentium. Pendet a morbis cerebri. Vidi puerum annos natum duodecim in præludio variolæ convulsionibus per biduum integrum diu vexatum, cui lingua convulſive per intervalla mire exerebatur, & maximam partem extrudebatur. Remedia postulat ea Paraglosse quæ sibi poſcit morbus cerebri, unde ſololeſcit.

4. *Paraglosse retractoria*, *Retraſio*, *contractio* *lingua* *Gortieri* ibidem ac supra; *Retraſion de la langue*, L.

In hac specie citra voluntatis Imperium ita retrorſum trahitur aut contrahitur lingua nativum ſervans volumen, ut a dentibus lateraliter vel antice multum diſſent. Pendet a morbis cerebri: ex specie præcedenti abunde intelligitur. Hanc enarvabis morbum primarium, cui natales debet, depulſoris. De Paraglosse traumatica mentionem injicit. *Fol. Platensis* *Prax. lib. 11. C. 2.*

**XLVI. PROPTOMA** *ſeroti*, *labii inferioris*, *mammarum*, *præputii*, *auricula* *prolapſus*. *Chéto*, *relaxation*, *allongement du ſerotum*, *de la lèvre inférieure*, *des mammelles*, *du prépuce*, *de l'oreille*.

Est partis externæ, etiam ante lapſum conſpicuæ, & a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diſſerſe præſidentia.

1. *Proptoma ſeroti*, *Rachis* *Græcorum*; *relaxation du ſerotum*, *Dionis* Dem. IV. L.

A ſero inſurgente ita laxatur, & elongatur ſerotum, ut inter ſemora valde propendeat; levis affectus est *Rachis*, cui occurreſ brachio ſecato, ſuſpenſorio vulgo diſto, exſiccantibus adſtringentibus; nuſquam tentanda operatio chirurgica, niſi in ægris quos promptæ ac radicalis curationis cupido tenet: huius inſtituendæ rationem lege apud *Dionis*. Seguentes proptomatis ſpecies ſatis ſit enumerare.

2. *Proptoma labii inferioris*. (Vide *Ptyaliſmum*.)

3. *Proptoma mammarum*, L.

Artificioſe produciuntur apud incolas inſule *Pormoſæ*, apud *Papous*, nec non apud *Ægyptios*: aſſere appoſito deprimuntur, & elongantur manib.

4. *Proptoma præputii*, L.

Tantum eſt vulgo huius partis prolapſus apud *Ægyptios*, ut perſiſtent artifices, qui ſitula impari monent eos qui circumiſſione indigent, ut hiſce in regionibus ſiciunt ex proſſo ſunt caſtratores.

5. *Proptoma auricularum*, L.

Artificialis eſt hic prolapſus apud *Siatheos*; percutiuntur auriculæ; ponderibus onerantur; foramen pugni magnitudinem adæquat; tandem ad humeros niſque auricularum deſcendunt.

*ſortio*. An ad proptoma pertinet ea carnis moles, quæ mulieribus *Hottentotis* in pube enaſci-

G tur,

tur, atque deorsum propendit pudenda obtegens? an huc referenda magnæ illæ plicæ incute abdominali quorundam mulierum conspiciendæ? an huc etiam labiorum vulvæ magnorum parvorumque elongationes in mulieribus nonnullis observandæ.

**XLVII. EXANIA, Proffusæ Pathol. Meth. Edit. 3. Morbus paralis Gerhamenſum Lib. Regum I. cap. 3. Prolapsus ani Andorū, ut Plateri Prax. Lib. II. cap. 2. Nenteri Tabul. 126. &c. Châte du fondement Dionis Dem. IV. pag. 393. Arnud des Hernies Tom. I. chap. 28. Levret Obs. sur les Poly-pes Sect. 3. pag. 165.**

Est sphincteris, ani, & intestini recti inverſi procidentia; extuberat, & rubet ad podicem pars prolapsa, plus minus longa, atque incrassata, reducibilis semper in principio, & nisi fœviat strangulatio, vel obſtet nimia ejus crassities. Species omnes variant quatenus nunc tantum marginatur anus annulo crasso, Gallice *bourlet*; nunc vero intestinum rectum forma botuli, Gallice *bandin*, plus minus longi, propendit; ad pedis unius longitudinem visum est descendere.

Inflammationi, strangulationi, gangrænæ obnoxie sunt omnes exaniæ species. Inflammari, sphacelari cognosces signis inflammationis, & gangrænæ generalibus. Strangulationem adesse declarabit irreducibilitas ab inflammatione pendens. Est & alia irreducibilis species, quam patitur pars prolapsa, exulante etiam inflammatione, si nempe mirum in modum hujusmoles increverit. Inflammationem, & exiende natam strangulationem depellere stapes iteratis venæ sectionibus, emollientibus soſis, immo mitiora resolutentia accipientibus forma cataplasmatibus, soſtus, linimenti, &c. nec non prompta reductione; si sæcum in intestino recto morantem suspicio sit, ex clystere educendæ, antequam repositioni te accingas. Adversus gangrænâ hic loci certe ægerime sanandam, vide quæ sub sphaceli genere dicta sunt. Si reductioni obſtet nimia partis prolapsæ incrassatio, ad eam impetrandam viam sternent phlebotomiæ, & emollientium resolutentibus sociatorum assidua, & constans applicatio.

1. *Exania primaria*; L. Vide Auctores citatos.

Variat in marginalem & botuliformem; variat etiam prout causam nullam habet evidentem, seu spontanea est; vel quatenus diversas agnoscat causas procatarrhicas, ut planctus, clamores, sessionem in sellis perforatis diuturniorem, conaminosam sæcum duriorum dejectionem, &c. Diagnosim habeto ex signis genericis, & ex morbi primarii, a quo sobolescat, defectu. A morbis prius causis procatarrhicis, illa species, quæ symptomatice contumaciore est, curatur reductione in variate botuliformi, & in pueris difficilior obtinenda, (de hac vide Arnud) & si nata parte, ope latus, spleniorum, fasciatio-

nis, adstringentium. In pueris hæc vulgo facta sunt, modo clystere molliores, auxiliiores addantur fœces, quoties alvum deponere volunt; quibus si nihilominus ani prolapsum revocet alvi egestio, ani latera memineris sustentare digitis, cum fœces nitantur expellere: hæc, si necessaria sit, navare tibi possunt operam aduſti, quos longa quies, & jam dicta auxilia sanant, si recens sit exania; si fœces duriores morbo ortum dederint, supervacaneum dicere existimamus, curationem esse clysteribus aspiciendam, quibus ex molli ac solvi possint. Hæc irrita si sint, & habitualis hac procidentia ani, etiam extra alvi dejectionem erumpentis, tunc locus est pessarii (vide Arnud,) vel vesicæ vervecinæ a *Levetio* in anum inditæ, vel brachetis Soretianis. In exania quacunque botuliformi, si ita jubeat irreducibilitas, vel gangrænâ, ligatura injecta extirpari potest pars prolapsa, neque successu carcerunt nonnulla instituta ea in re tentamina.

2. *Exania ab alvi fluxu*; D. Vide Auctores citatos.

Variat in marginalem & botuliformem. Pendet a prægresso fluxu diarrhoico, dysenterico, tenesimodeo, qui cum signis genericis hanc speciem sistit; sublati fluxu per remedia diarrhœæ, dysentericæ, tenesimæ appropriata, iuxta genium causæ, cui natales debet unaqueque horumque morborum species, auxilia, hic certe majorem habitura efficaciam, quam in exania primaria, non alia adhibebis, quam quæ in specie præcedenti proposuimus.

3. *Exania a calculo*; A. Vide Auctores citatos.

Calculosis ob conaminosam mictionem, immo & nonnumquam lithotomiz celebratæ tempore, contingit aliquando ani prolapsus, signis calculi præsentiam communiter indicans, necnon genericis cognoscendus; variat in marginalem & botuliformem; de pulso morbo primario, pars prolapsa reducenda, & in loco firmanda, ut jam docuimus.

4. *Exania a dyſtocia*; D. Vide Auctores citatos.

Adoritur hæc species gravidas, quibus longus & difficilis fuit parturitius labor; variat in marginalem & botuliformem. Ex charactere generico, & prægressa dyſtocia eruitur specifica diagnosi; valet hic primæ speciei curatio.

5. *Exania paralytica* Fel. Plateri Prax. Lib. II. cap. 2. Dionis, Nenteri locis citatis. L.

De hac mentionem injiciunt *Nenteri* & *Dionis* quos vide. Mire laudat *Juncerus* in ea specie liquorem florum verbasci in unguenti consilientiam redactum; curationem lege apud *Platerum*.

6. *Exania traumatica*; Nenter loco citato. B. Cadit ex præfato Auctore in eos quibus musculi ani levatores in lithotomia discissi sunt; desperata res est, nisi statim a principio exquæ sit vulnerariis medela asseratur.

**XLVIII. EXOCYSTE**, *Prolapsus, inversio vesicae urinariae* Auctorum, Salzmanni Diss. de Hern. Vesicæ inter Halleri Diss. sel. Tom. III. Solingen de mulierum & infant. morb. chir. pag. 741. *Renversement de la vessie urinaire*, Noël Obs. Recherches sur la hernie de la vessie par Verdier, Mem. de l'Acad. R. de Chir. Tom. II.

Est membrana tum vesicæ corpus, tum ipsius collum interne obvelientis procidentia per meatum urinarium facta: inter magna vulvæ labia conspiciendam sese præbet pars prolapsa, nunc forma vesicæ, rotunda, diaphana, clausæ, lotio plenæ cum ichthuria: nunc vero forma botuli oblongi, penduli, inferne aperti, cum urina emittendæ difficultate.

1. *Exocyste Nolianna: Prolapsus, inversio tunicae interioris vesicæ: Renversement de la membrane intérieure du corps de la vessie*: Verdier loc. cit. L.

Observat Noël, in virgine urinae retentionem frequentibus stipitam motibus convulsivis, passim protuberantiam ovi gallinacii magnitudinis, quæ vesicam referebat tenuem, subdiaphanam, urina foetam, exus clausam, e meatu urinario erumpentem, a tunica nervæ, quæ vesicæ corpus interius obducit, inversa efformatam; brevifato fundæ est virgo; apertæ cadere inventi sunt ureteres in ius ipsorum insertionem obstructi, ita diametro aucti: ex colon adulti crassitie æquarent, & urinam: facta tunica nervæ a carnosa separatione, inter utramque fundentes: hinc tunica nervæ corpus vesicæ interius vellicant inversio, & per uretram extrusio; an convenit in eas speciei prolapsæ apertio, immo & extirpatio?

2. *Exocyste Solingeniana, colli vesicae urinariae inversio* Solingen, Salzmanni loc. cit. *Renversement de la membrane intérieure du col de la vessie*.

Mulier pluries dyflorice enixa, & verberibus in ventrem infusum a marito exceptæ accidit, ut, cum abdominis subsidia, & urinae excremendæ difficultate, meatus urinaris inversus digiti minoris longitudine propenderet; scilicet tunica, quæ vesicæ collo interius obtenditur, inversa ac per meatum urinarium elapsa botulum efformabat inter magna vulvæ labia conspiciendum, deorsum propendentem, & ima sui parte patulum: methodus cruratoria a Solingenia adhibita fuit hujusmodi: Præmissis solum convenienter, ope specilli corio molliore, atque spongia instructi, necnon liquore adstringente munici, collum vesicæ prolapsum in sedem nativam restituisse allaboravit, & ipsum in hocce situ per commodum subligaculum continere, æque firmare annis est; an, si minus proficiant modo dicta, hic & etiam extirpatio?

**XLIX. HYSTEROPTOSIS**, *hysteroecoles nuda* Pathol. Method. Edit.; *Relaxatio prolapsus, procidentia, inversio uteri vel vaginae* Auctorum, ut Heisteri Inst. Chir. T. II. Gunzii de Herniis, &c. *Relâchement, chute, descente, renversement de la matrice ou du vagin*. Arnaud Tom. I. Chap. 22. &c. Puzos sur les maladies de la matrice, Sabatier Mem. de l'Acad. R. de Chir. Tom. III.

Est uteri vel vaginae procidentia, cognoscenda per protuberantiam in vagina observandam, antextra ipsam propendentem, ab utero prolapsa, inversa, vel a vagina inversa, prolapsa, efformatam, reductibilem saltem initio, stipitam doloribus ad renes, & inguina, pondere hypogastrii, incesso difficili, teneismo, urinae frequentia aut difficultate: cave hysteroptosis cum uteri vel vaginae polypo confusda.

Inflammari, strangulari, gangræ nascere, exulcerari, adhærere, & valde intumescere citra inflammationem possunt hysteroptoses species completæ, quorum accidentium diagnosim subministrant signa inflammationi, gangræ, & ulceri propria, necnon irreducibilibus, quam faciunt nunc inflammatio, nunc habent partem prolapsam cum vicibus alligantes absente inflammatione; nunc tandem, eadem exulante, necnon adhærentiis, uteri, vel vaginae moles nimia.

Remedia inflammationis, & exinde natae strangulationis sunt venæ sectiones iteratæ, emollientia forma varia applicata, aut mitioribus resolutivis maritata, clysteres refrigerantes, foveæ laxante abdomini applicati, diætæ tenuis, potus refrigerans. Gangræ remedia vide sub *Sphaceli genere*. In casu gangræ refracturæ uterum prolapsum, vel inversum afficientis, una superest, quamvis incerti eventus sit, extirpatio uteri; vaginam inverfam sphacolosam sunt qui extirpatæ velint; sicut qui nolint, vide Sabatier, Leves, aliosque.

Adhærentias sola tollere valet sectio chirurgica. Intumescientiam partis prolapsæ nimiam debellare conabaris venæ sectionibus, emollientibus, resolventium societate fluatis, longo & assiduo usu adhibitis, clymatibus, fomentis hypogastrii-impositis, &c. Exulcerationes uteri, vaginae, reductione facta, vel sponte, vel injectionum vulnerariorum ope sanantur.

1. *Hysteroptosis, uteri prolapsus*: vide Auctores citatos; vulgo *relaxatio, lapsus uteri*; *Relâchement, relaxation, descente, chute, procidentia de la matrice*. C.

Variat hæc species in incompletam (relaxatio uteri,) & in completam (lapsus uteri); variat etiam principiis: causæ remotæ vulgarissimæ sunt graviditas abnormis, labores gravissimi, dinturni, conatus in ferendis, elevandis ponderibus editi, partus difficiles, obesitas nimia. Tandem variat quatenus contingit prolapsus nunc citra graviditatem, nunc vero graviditatis tempore, scilicet modo ineunte, modo propecta graviditate, immo & instante partu.

In prolapsu uteri incompleto citra graviditatem contingente, labitur deorsum oterus vagina inclusus, protuberantiam sistentem in se invicem pyriformem, a pertura transversali oblonga in sui extremo perforatam, circa cujus basim moveri potest digitus circulariter adtus. Neque credideris uteri demissione modo dicta certo indigitarum ipsius prolapsum; mulieres enim sunt utero nativae demissioni citra prolapsum, ut sunt altiori, praesente visceris huiusce procidentia, itaque certa est uteri relaxatio, sicut jam dictis, in situ erecto, incessu, aut alvi depositione, queratur aegra dolores in femoribus, inguinibus; crassiones ad renes, obscurum molestiae sensum in toto pelvis ambitu, cum aliquali leucorrhoea antea exulante; qui dolores horizontali decubitu sensim evanescent, ita ut mane se morbo immunem crederet mulier, nisi motus de die praestiti hebetes dolores revocarent.

In prolapsu uteri completo foras conspicitur hocce viscus plus minus extrusum, vaginam & vesicæ partem adherentem abripiens, subsequen- tibus a tergo abdominalis visceribus nonnullis pendulis; protuberantia est subcylindrica, superne huius, inferne in sui extremo angustior, ibique a pertura sedta transversali, oblonga, qua statim temporibus catamenia effluunt. Uterum tegit vagina inversa, aeris contactu colorem cutis indicans, & spatium vacuum nullum relinquens, per quod transeat digitus. Interea aegram vo- xant dolores jam dictis similes, immo majores, si subito fiat prolapsus, urinae sudentis diffi- cultas non rursus, aut frequens desiderium, nec- sion tenesmus continuus. A prolapsibus comple- to & incompleto differunt polypii uterini & va- ginales, 1. irreducibilitate, 2. dolore iterata ad ipsorum reductionem sequente tentamina; 3. figura quæ non inversæ, sed directæ pyriformis est, scilicet superne angustior, inferne latior: his adde quod in extremitate inferiori trans- versum non sint perforati; prolapsus qui fit graviditatis tempore, a procidentia completa citra ingravitationem observanda, distinguitur protuberantia volumine majori, figura rotun- diori, & foris inclusio.

Curari potest radicius uteri relaxatio, post u- surpata remedia generalia, scilicet venæ sectio- nem & cathartum, jussu scilicet vulnerario adstringen- tibus, opistis stomachicis, tonicis, subcardia- cis, decubitu horizontali, clunibus elevatis, lon- go tempore servatio; sacculis adstringentibus aro- maticis in vino, aut in aceto calido infusus, vul- vae applicatis; vaporibus plantarum aromaticarum in vino meraciori rubeo coctarum vaginæ hauritis tandem (si juniora admodum si aegra ac valida.) ingravitatione, servatio toto graviditatis decursu, partus tempore, & primis duobus puer- perii mensibus situ horizontali. Radicius tolli nequit completus uteri prolapsus, namque tan- tum admittit curationem palliativam, quam in eo sita est, ut uterus reponatur, & in debita sede contineatur pessarii adminiculo, quod frequen- tibus aq. tepidæ aqua vulneraria mixta injectio-

nibus elotum servabitur. De varia pessarium forma, ac materia vide *Arnold*, *Sabatier*, alios- que; pessarii vulgaribus, si minus uterum repo- situm contineant, succedat spongia brachio e- lastico sustentata, aut pessum peculiare a *Surrey* inventum. In prolapsu per graviditatem decur- sum contingente, tentanda est repositio, quæ quandoque satis de facili obtinetur, praesertim si minus provecta graviditate, ea statim insti- tuitur, evacuatis prius vesica atque intestino rec- to, & imperato convenienti situ. Si ob prove- diorem graviditatem, ac procidentiam non satis recentem, obtineri nequit restitutio, satius est uterum foras derelinquere, quam matrem, for- tumque itritis vexare tentaminibus: tunc ute- rus fascia convenienti sustentandus, & lecto assignanda mulier, donec solitum graviditatis ter- minum attigerit; si partus tempore contingat uteri procidentia, nec fortis exitum naturæ com- mittes, nec operationem adhibebis Cæsaream; aut uterum sustentatam sensim ac sine sensu di- latabis, foras extrahes, placentam merodo *Levretiana* separatam educes; tandem uterum, qui sponte contrahitur, restitues.

2. *Hysteroptosis*, utriusque, vide *Audouin*, *Ci- tatos*, uteri depressio, perversio, inversio, vulgo en- foncement, perversion, renversement de la matrice.

Variat hæc species inversionis gradu, scilicet 1. inversione levi (depresso); 2. inversione majori, adque scilicet orificium uteri inclusi- ve, 3. inversione incompleta, 4. completa. Va- riat etiam principii proegumentis; pendet enim uteri inversio nunc a parte, (quod ut frequen- tius, ita periculo plenius est,) nunc a poly- po, modo ab immodica menorrhagia, aut leu- corrhoea, modo ab obesitate, quibus nunc ve- hementes editos addit *Puzos*.

Inversionem uteri statim a parte accidentem, sive hanc accersit obstetricatio imperita, sive nativum uteri vitium, cognosces 1. depresso hypogastrii, seu defectu intumescens rotun- dæ, circumscriptæ, in hypogastrio vulgo pos- tantum observandæ, 2. exploratione, qua, in casu inversionis incompleto, persentitur in va- gina protuberantia sere semisphærica, superfi- cie subæquali donata, inferne non perforata, uteri collo tanquam annulo cincta, stipata do- lore acuto in inguinibus, ac renibus, pondere molesto in hypogastrio, hemorrhagis plus minus- ubere, tenesmo eos conans inducente, qui u- terum magis ac magia præcipient, ac tandem penitus invertant. In casu completo depresso, ni hypogastrii adhuc majori adungitur protu- berantia extus conspicienda, irregulariter ro- tunda, cruenta, levis, imperforata, molli in- spensa pedunculo, quem annuli ad instar cin- git orificium uteri, stipata doloribus vividioribus, hæmorrhagia uberiori, continuis lipothy- miis, quas brevi excipiunt sudores frigidi, convulsiones, delirium, mox intra tres qua- tuorve horas passissime superviens.

Inversionem uteri quas facient polypus ute- rinus, menorrhagia & leucorrhoea immodica,

aque



atque obesitas, difficilior quidem diagnosi; hæ enim fere semper incompletæ, & rariores multo sunt; atque enim istæ fere semper insigniuntur symptomatibus, quæ in inversione a partu observari diximus. Itaque has varietates, tum ubi completæ sunt (quod rarissimum) quando certe de facili cognoscuntur, tum in casu incompleto (quod frequentius,) ex causâ procumbentiarioliari utcumque licet. Quamvis major sit affinitas inversionis uteri, quam ejusdem prolapsus eum polypos uterino, levi tamen attentione ab ipso dignoscitur in versio qualiscumque; nec rei difficultatem evincunt errores hæcenus commissi: etenim in distinguenda a polypos inversione uteri incompleta, faciem præterdunt polypos irreducibilibus, indolentia sub primis attractibus observari solita, tandem dolor iteratis ad repositionem tentaminibus superveniens: collum vero polypos, quod non cavum, sed solidum est, & circumpositis solum ac liberum; vagina & vesicæ urinarie pars, quæ deorsum non rapiuntur, verum in sede persistant nativa præsentem polypos, præcipua sunt quæ ab eodem inversionem incompletam determinant: de his vide *Livret Observations sur les Polypes & Mémoires sur les Polypes de la Matrice & du Vagin Mém. de l'Acad. R. de Chirurg. Tom. VII. & Sabatier ibidem.*

Inversionum uteri duplex est curatio: radicalis altera, altera palliativa. Inversionem a partu, quæ fere una curationem radicalem admittit, curabis facta citissime uteri repositione, quæ facillime æt plurimum statim a partu; si tamen in ea obtinenda multum frustra insudaveris, & sub operosiori entheiresi mulier convellatur, aut animolinguatur, tunc satis est uterum intra vaginam occultare, hic loci dein retinendum possorim auxilio, quam non impetrandam repositionem persequi: vide *Puzos, & Sabatier Obs. XI.*

In inversione a polypos, a menorrhagia, a leucorrhæa, unicuique prævidium in repositione cum morbi primarij sanatione. Inversio ab obesitate nimia unam recipit curationem palliativam; inutilis enim esset reductio uteri, quem assiduo in verrere pinguedinis incumbentes pondus: sita hæc est in postorio credis injectionibus a sordibus mundaudo, quo retardabitur mali progressus. Pessio etiam locus tantum est in inversionibus omnibus in quibus impossibilis, aut frustranea est repositio: Inversio uteri, quæ caducius curari nequit, durius habet mulieres juniores menstruatas, quam vetulas, & non menstruatas: priores enim veant catamenia uberius; leucorrhæa fortius acrior, excoriationes, dolores intra vaginam nusquam ferendi, nisi injectiones frequentes, ac congruum levamen afferrent. Posteriores vix aliquando aliud patiuntur incommodum præter molestiam inter incendendum.

3. *Hysteroptosis vagina prolapsa*; vide Auctores citatos, unde a relaxata, de lapsu, in versu, vulgo relaxatione, desinit, cito præterveniens. In vagina D.

Varia hæc species proidentia magnitudine: velut in lapsu, inversio audit, prout minor, & major: Nosologia Methodica. Tom. I.

vel major est pars vaginæ prolapsa; varietetiam principijs. Cause, quibus debetur, multiplices sunt; pondera graviora genata, incessio nimia, conaminosa alvi depositio, vaginæ durior tractatio, calidæ abusus, leucorrhæa diuturna, dyslocia, decubitus a partu neglectus, &c. Fallo credebant Veteres in vaginæ & ani proidentia, omnes vaginæ & intellini recti tonicas semper prolabi; una sæpissime tunica interior, aut ipsius tantum pars laxatur, inverteitur, erumpit, ab aliis quæ nativum circiter locum servant separata.

Prolapsus vaginæ primum sese dat conspicendum sub forma anuli crassi, Gallice *Bourlet*, irregulariter plicati, intra quem immisso digito facile præsentitur collum uteri tunc temporis demissum, crescit protuberantia siu erecto diu protrahit; imminuitur longo decubitu; stipatur pondere hypogastrii, tenesmo frequentissimo, & meiendi difficultate, quam facit canalis urethræ mutata directio: prolapsus infensescit, & neglectus artis auxiliis, crescit, elongatur, indurefcit protuberantia infernam adhuc aperturam gerens, qua suo tempore effluunt catamenia; symptomata tunc observanda eadem sunt, ac ea quibus stipatur uteri proidentia, & ægre admodum ab invicem distinguuntur binæ hæc hysteroptoses (species in multis simillime: differunt tamen his paucis signis; uteri prolapsus protuberantiam sistit superne parum duram, extremitate sua inferiori, quæ augustin est ut plurimum, & apertura oblonga transversali perforatur, os tunc resistenter; vaginæ prolapsus proveditilimus protuberantiam exhibet ubique æqualiter duram, inferne vulgo latorem, & apertura instructam valde irregulari.

Levior vaginæ prolapsus curatur facile reductione absque labore tunc obtinenda, & partis prolapsæ in sede nativæ retentione, ope adstringentium, aut passerii congrui; si inveteratus sit prolapsus, difficulte sit repositio; hæc tamen impetrare poteris, si ea adhibueris, quæ ad partem prolapsam, si alium intumuerit, reducendam facere supra diximus. In continenda parte labor est plurimus; vulgo manca sunt pessalia communia, quorum in locum necessum est sufficere bracheria elastica spongiam sustinentia. Laudat maxime *Puzos* in vaginæ proidentia brachierum, quod Academiæ Chirurgicæ proposuit *Martinez*.

An in vaginæ prolapsu maximo irreductiliter tentari possit, etiam exultante gangrenâ, vaginæ extirpatio? Certe cum successu tentata fuit, & tentari quidem posset, nisi vocaret periculum extirpandi, vaginæ loco, uteri, aut vaginæ & uteri simul. Vide *Abruc de morb. mulier. Tom. IV.*

4. *Hysteroptosis completa*; vide Auctores citatos.

(a) *Proidentia completa uteri vscum dorsum abripientis*.

(b) *Inversio completa uteri vscum dorsum abripientis*.

(c) *Prolapsus completus vagina vscum dorsum abripientis*. Cuius completæ, & inversæ completæ de la matrice, en du vagin, & de déplacement de la

*vesse urinaire*. Coar. Peyer Collect. Acad. Tom. III. pag. 300.

Hanc speciem jam indigitavimus, ubi de prolapsu uteri, ac de hujus & vaginæ inversione completis egimus. Diximus deorsum rapi vesicæ urinariæ partem adhærentem. Cognoscitur hæc species ex prolapsu & inversionis jam dictorum præsentia, ex urinæ difficultate, retentione, ex ipsius rivo superiori afficiente, dum emittitur; tandem ex mutata in eundem sensum canalis urethræ directione. Curatio intelligitur ex iis quæ in specierum 1. 2. 3. curatione proposuimus.

### L. ENTEROCÆLE.

Hernia intestini quælibet, tum simplex, tum composita, tum sacco, tum sacco destituta; itaque pertinet hæc *hernia intestini incompleta*, sive *inguinalis*, (*bubonocœle* Auctorum prima, seu *enterobubonocœle*.)

*Hernia intestinalis completa*, quæ *scrotalis* (*aschoecœle* Auctorum prima, seu *enteroschoecœle*), vel *labiorum vulvæ*.

*Hernia intestinalis cruralis seu femoralis* (*merocœle* Platneri seu *enteromeroecœle*).

*Hernia intestinalis ovalaris* (*hernia foraminis ovalis* Garengot Mem. de l'Acad. R. de Chir. Tom. I.

*Hernia intestinalis ischiatica* Bertrandi Mem. de l'Acad. R. Chir. T. II.

*Hernia intestinalis vaginalis* Garengot ibid. Levret. *Hernia intestinalis umbilicalis*, (*sphærocœle prima* seu *omphalocœle* primus Auctorum.)

*Hernia intestinalis ventralis*, *hypogastrocœle* Auctorum prima.

Huc etiam herniæ eadem compositz; huc tandem herniæ iam dictæ, a peritonæi ruptione pendentes. Vide Dionisii, Garengot, Heisteri, Gortelii, Platneri Chirurgi; Le Drau Operat. de Chir.; Gunzii libell. de herniis, Arnaud des Hernies. Tom. I. & II. Sharp. Operat. de Chir. & Recherches sur l'état présent de la Chir. Mem. de l'Acad. R. de Chir. Tom. I. & III. Halleri Disput. Chir. Tom. I. & c. *Herniæ de l'alto*, *incompleta* & *completa* *herniæ crurales*, *herniæ du trou ovalaire*, *herniæ de l'échancrure sciatique*, *herniæ intestinales du vagin*, *herniæ du nombril*, *herniæ ventrales*, *enterocœles*, *épiloenterocœles*, *raptures*.

Est Intestiporum trans annulos inguinales, arcus crurales, foramina ovalia, emarginaturæ ischiaticæ, umbilici annulus, vaginæ parietes, vel abdominis musculos elapsorum ecopia, quam fittie protuberantia ad varia abdominis loca modo memorata observanda, statim sæpius parva, sensim crescens, pressione aut commodo corporis seu de facili regrediens saltem initio, situ mutato, aut conatibus edicis rediens, tensa, flexilis, elastica, glabra; aequalis, a contractione murmur edens, frigore aliquo modo contractilis, calore vero expansibilis mirum in modum sæpe increfens, cum duritie sub spiritibus

retentione aut rursus, vel alvi dependens conaminibus, symptomatibus tum acutis, tum chronicis variis, ex compositione, & complicatione oriundi stipata.

Debetur enterocœle causis omnibus quæ sustentacula laxant, vel claustra interioris solvunt, quæ sunt serum exsuperans, oleosa, nifus validi deorsum directi, idus externi citra continui solutione, vulnera, cicatrix iterum aperta, apoplemata, &c.

Enterocœlis species possunt strangulari, abscedere, irritari, adhærere, taxim respuere ob nimiam ipsarum molem, tandem cum vera aliorum viscerum hernia, aut vulgo sic dictis herniis spuris combinari.

Strangulationem duplicem pati potest intestinum herniosum: altera sit ab apertura quæ exitum permittit; altera a sacco hernioso. Caute distinguendæ sunt hiæ illæ stranguationis species. In prima, cui omnes enterocœles subjacent, protuberantia acute dolet, calet, subrubet, intumescit, tenditur, indurefcit, progredi, & regredi nescia; a protuberantiæ loco dolor sensim ad umbilicum usque extenditur; superveniunt tormina, nausæ, vomitus ciborum primum, dein chylosus, biliosus, a stercoraceo vix abluens, tandem stercoreus: nihil emittit alvus, ne statim quidem qui per superiora erumpunt cum molestia summa, & imminenti suffocationis specie: (in stranguatione, quam patitur enterocœle ab intestini appendice efformata, aut intestinum herniosum perstriatum, cum pervia sit tuba intestinalis, facies, statim emittit sane potest alvus, licet nihil quandoque emittat): accedit meteorismus, febris: augentur ac desistantur symptomata jam dicta, superveniens tandem singula, ac moribus convulsivis.

Curatur hæc stranguationis species situ congruo statim usurpando, venæ sectionibus promptis, ntheribus, sæpius iteratis; fomentis, cataplasmatibus, sub primo morbi exortu repercutientibus, quibus, nisi prompte proficiant, succedent emollientia aut sola, aut resolventibus maritata; tentaminibus ad repositionem impetrandam variis, blanda manu per intervalla repetitis, clysmatibus oleo defraudatis, tandem, si hæc irrita fuerint, celotomia de qua vide *Ambrosii* citatos. Ceterum toto stranguationis tempore alimentis omnibus interdicendis etæ æger, cui satis fuit paucula potus congrui cochlearia, aut quid simile ad seim utcumque solandam.

A stranguatione jam dicta differt ea quam facit saccus hernialis; in eo quod 1. in illa hernia reducatur simul, non vero successi ve, ut in præcedenti; 2. quod cum partibus contentis una reducatur saccus, qui in præcedenti ultimo loco reponitur, si regreditur, & quandoque, restitutus etiam partibus contentis, non regreditur; 3. quod repositionis tempore non obmurmuret intestinum, ut sit in præcedenti; 4. quod reductione facta, persistent symptomata, & crescat dolor, secus ac in præcedenti, nisi per repositionem excipitur volutus; 5. quod reductione impetrata, si hernia ad vesicæ latius afficiat,

fre-



frequens melendi desiderium, & dolor obtusus inducitur; si musculo psoadi, & vasis cruralibus incumbat; in arca omni supposito exoritur stupor, quæ in præcedenti exultat; 6. quod si facile regreditur, & exeat, eandem præ se ferat hernia renitentiam, dum exit ac antequam reduceretur, quod locum non habet in præcedenti; 7. quod immisso methodice digito in aperturam per quam regressa est hernia, eandem in ipsa persentiat renitentia, ac dum totas digito exploratur: neque adhuc renitentiam, accedit ea quam præ se ferunt intestina, et si aere plenissima; tunc enim cum strangulata non sunt, sed si se patiuntur, & digito cedunt: hic verum globum lufurum (Gallice *kallon*) aere factum tangere, te crederes. Primarium est in ista strangulationis specie signum hocce ultimum, quod abest in præcedenti. Proprium est strangulationi a sacco herniali, quæ in enteroceles faciat cadere tantum potest, quod dum fit redactio absque celotomia, non intra peritonæi cavum reducat hernia, sed tantum sub ipso peritonæo, superata apertura exitum dante, recondatur. In hac specie præsidio est una celotomia, sub qua tantum datur repositioni locus; (Vide ea de re *Sharp Researches crit. & Anand Tom. II.*) Symptomata in intestini peristitione, & hæcæ Littrianæ strangulatione observanda, trademus modo, dum scilicet de irritatione sermo erit.

Strangulationi, five ab apertura quæ exitum dedit, five a sacco hernioso inducitur, nisi obviæ eant repositio, aut celotomia prompta, corruptitur hernia, succedentibus apostemate, gangræna. Signa apostematis non alia hic loci sunt quam quæ supra proposita fuerunt ubi de apostemate. Signa gangræne sunt pulsus parvus, concentratus, intermittens, vomitus absque conatu, flatus quandoque per anum emissi, abdominis depressio, extremorum frigus; &c.: cessant tormina, vomitus, singultus; protuberantia fit complanata, mollis impressionis digito factæ tenax, livida, indolens. Curationem tribident *Arnand, Sharp, Gangrege, Heisterius*, (vide *Halleri Dissert. Chir. Tom. III. Diss. 70.*) de *la Peyronis*, atque *Louis Mem. de l'Acad. de Chir. Tom. I. & II.*

Strangulationem mentitur irritatio, quæ ut aliis causis, sic adherentiis quandoque natales debens, in omnibus enteroceles speciebus locum habere potest. Irritationis signa sunt protuberantia dolor, colica recurribus remotionibus assidens, alvus difficilis, aut libera, vomitus, etiam stercoreus, nec non singultus, minus tamen frequentes quam in strangulationis casu; tandem febris quæ non aque cito hæcæ irritata ac strangulata supervenit: quæ quidem symptomata, etsi mitiora sunt dum viget irritatio, quam dum strangulatio, pessimi tamen ominis essent, nisi periculum metam contemperaret tuba intestinalis flatibus ac facibus pervia; fatemur perviam pariter esse tubam intestinalem in strangulatione partiali, quam intestini peristitionem

vocamus (Gallice *pinement de l'intestin*), nec non in hernia Littriana five appendiculari, licet probe incarcerationa sit: aliter intestini peristitionem, & irritationem exinde petitur discrimen quod in peristitione protuberantia vix doleat, & nulla adiint tormina, vel tantum dolores colici, obscuri, fugaces, & intervallis maxime distitis recurrentes. Superveniens hæcæ Littrianæ strangulatio difficilior ab irritatione distinguitur; strangulationis hujusce signa sunt ex *Littræ* singulis nullus aut rarissimus, vomitus pariter nullus aut multo minor quam in herniis vulgaribus incarcerationis, qui nusquam etiam est stercoreus, nullus abdominis meteorismus, nulla tensio, nec intumescens, flatuosa, protuberantia tardius efformanda: moles minor, inflammationis, doloris, febris, aliorumque symptomatum remissior gradus, & serior exortus, tandem alvus toto strangulationis tempore libera, ac facibus, flatibusque pervia. Strangulationem hæcæ, si non satis ab irritatione determinant modo dicta, certe distinguunt operatio chirurgica, quando alia auxilia mitiora frustra adhibita fuerunt necessario instituenda, quæ tantum appendicem oculis subjicit.

Irritationis, quam vera strangulatio excipit nisi malo occurratur, remedia sunt venesectiones, clysmata emollientia oleo defranda, fomenta, cataplasmata ex emollientibus anodynis, & resolutivis mitioribus protuberantia, & abdomini applicanda, oleum amygdalarum dulcium cochlearum ore assumendum, narcotica, antispasmodica, diætæ tenuissima, potus diluens, laxans, temperans; quæ plus minus repetita, si irrita evadant, ad operationem chirurgicam tandem deveniendum (vide *Arnand de Herniis Tom. II. par. 2.*)

Adhærentiæ obnoxie sunt enteroceles species omnes; de illis legatur *Arnand* qui eas in agglutinativas, fibrosas, carnosas, & gangnosas dispescit *secundo modo citato*. Cum adhærentiis nunc viget, nunc exulat strangulatio; strangulatione absente, modo partes emotæ in abdomen regrediuntur licet adherentes; modo non regredi possunt, & foras remanent; in 1. casu nisi scilicet regrediuntur partes emotæ, si intestinum sibi inter ipsi adhæreat, queritur æger levem colicam, a colica vulgari, ægre tamen distinguendam, quatenus remediis vulgari colicæ appropriatis non cedit; diætæ sobria ac regulari levatur æger; pessum datur vero remedium usu quod hujus colicæ a vulgari colica caute distinguenda necessitatem adstruit. Si omento adhæreat intestinum, ægrum male habent colica post cibum assumptum, & tractiones stomachi, augescens digestione progrediente, & cessantes hac penitus peracta; si sacco herniali adhæreat intestinum, non solum queritur æger de levi colica; verum etiam de fornicationis sensu herniam occupante; quæ symptomata ipsum potius efficiunt post cibum uberius assumptum, quam jejuno stomacho aut sobrie pasto; in 2. casu ubi scilicet partes emotæ non regrediuntur, hæc præter symptomata jam dicta omnia, foras re-

manent irreducibiles, mollitie tamen ac flexilitate gaudentes: & ad aperturam exitum dantis ostium colligi possunt, si sacco adherent adhærentis expecto: si vero cum circumpositis adhæreat sacculus, hæc non ita facile colliguntur, & sub restitutione frustraneæ tentaminibus sequuntur interim partes herniæ annexæ. Auxilia varia in diversis adhærentium speciebz ac casibus usurpanda deprome ex *Arnoldi Tom. II. part. 2.*

Absentibus strangulatione, inio & adhærentiis, præ mole nimia repositionem respuere possunt enterocæles vastius tumentes; tunc liberata prius a flatibus, & facibus tubæ intestinalis parte herniosa, valet demum, si opus sit, et Medecina, qua uterum prolapsum, eadem de causa irreducibilem, ad repositionem perducimus; ceterum eo in casu non continus, sed interpolata adhibenda est taxis. Vide *Gunzium de hern.*

Combinari possunt enterocæles species cum epiplocele, cyflocele, hydrocele, sarcocèle, parorchidio: (Vide *Enterocæles compuestas*.) Vastius hujusce generis species sub familia triplici coordinamus: 1. completitur enterocæles simpliciter saccatas; 2. enterocæles compositas saccatas; 3. tandem enterocæles insaccatas, seu saccus hernioso destitutas.

#### A. Enterocæles simplices saccatæ.

1. *Enterocæle incompleta seu inguinalis; Bubocæle intestinalis seu vulgaris* Auditorum supra citatorum; *Escorbubocæle* eorundem; *hernia intestinalis de l'alto*; *bubocæle vulgaire, ou intestinale, enterobubocæle*. A.

Nunc solitaria est, nunc geminata; annularis est simplex, & saccata; protuberantiam facit exiguam siliit, ut plurimum regredientem; (obstant regressui strangulatio, adhærentiæ) terre semisphæricam, ultra inguen non extentam; accidentibus chronicis raro; acutis vero, ut strangulationi, sæpissime obnoxia, nisi ars suppetias ferat. Cave hanc confundas cum bubone (citra quod vide *Plasteri Institutiones Chirurgicæ*) cum testiculo ad anulum morante (Vide *Dionis Oper. de Chir. & Quædam alia Disput. Anat. Haller. T. V.*), cum intumescencia ligamenti rotundi, in gravidis iterum obliquum gerentibus, nonnunquam observanda.

Duo sunt quæ curam herniarum obloquunt, alterum ut partes herniosæ ad nativas suas sedes propellantur, alterum ut in eis retineantur. Hæc præstant taxis, decubitus horizontalis protractus, brachierum, adstringentia, roborantia escicantia extus applicata, & intus usurpata, pellicentia per alvum, urinas, sudores, attenuantia, resolvantia, aperientia, vitæ, & potus escicicans, incidens, adstringens, roborans: quæ auxilia pro causarum diversitate varianda, ut methodice procedat curatio. (Vide *Arnoldi & Gunzium de hern.*)

Obsoleverunt cauterio, punctum aureum, cauterizatio, sutura regia: his successit sacci herniosi ligatura a *Sansio* cum successu celebra-

ta. (Vide *Sharp Rectorch. vrie. & Gunzii libellum de herniis*). Noras præstare utique in multis ægris ea potius adhibere; quæ herniarum augmentum impedire queunt, quam ipsas tollere.

2. *Enterocæle completa, ascibocæle intestinalis seu Enter-ascibocæle Auditorum; enterocæle labiorum vulvæ vermicem*, *Enterocæle ou hernie intestinale complete, ascibocæle intestinale ou Enter-ascibocæle, enterocæle des grandes lèvres*. D.

Nunc solitaria est, nunc geminata; simplex est, saccata & ex annulis inferioribus versus multum extensa. Præcælit enterocæle incompleta, artificiosius subligaculi negotium pro causa agnoscit. Protuberantia major est quam in precedenti, gradatim crescens ita ut tandem portentosa fiat, ex subrotunda plus minus longa evadens, scrotum in viris, magna vulvæ labia, imo & his suppositis femoris partem in feminis occupans, ut plurimum adhærens ac proinde raro regrediens, (regrediebatur initio), strangulationi raro obnoxia; quæ si contingat periculosissima, accidentibus vero chronicis, ut dyspepsia, flatulencia, colica, tridionibus visciferum abdominalium dolorificis, nausæ, lipothymia, lassitudine sæpius stipata.

Curatio intelligitur ex præcedenti specie. In casu irreducibilitatis nulla arte tollendæ, brachierio sacciforini suspensorio vulgo dicto locus tantum est. Si possibilis sit repositio, & vastius tumet hac species, memineris iuxta *Gunzii* præceptum taxim non continuo, sed partitis vicibus, insituere. Forte in unam speciem melius coirent enterocæle 1 & 2; nullum enim essentiale discrimen inter se sistent.

3. *Enterocæle appendicularis*, *Hernia ab ilei diverticulo Morgagni* Adv. Anat. III. p. 3.9.; *hernie partielle*, *hernie fermée par l'appendice de l'ilem*, *Littre Mem. de l'Ac. Roy. des Scienc.* an. 1700. *Hernie formée par l'appendice de l'intestin*, *Enterocæle appendiculaire*. L.

Incompleta statim, temporis successu completa fieri potest; simplex est, saccata, ex annulo alterutro in scrotum tandem delabens; in casu Littriano fiebat ab intestini ilei appendice fistulita, prodesto scilicet hujus intestini latere mesenterio opposito in canalem inferne clausum, qui per anulum delapsus, in scrotum sensim provolutus fuerat. Hanc enterocæles speciem stabilivit potius quam descriptis laudatus auctor; neque ex *Morgagnio*, *Ruyshio*, *Palpao*, qui ipsam memorant, hujus diagnosi lux major affunditur. Itaque difficile sit hujus a præcedentibus distinctio: adesse tamen suspicari utcumque licet ex protuberantiæ exiguitate, gracilitate, tardiori incremento, ex parietum partis sacco hernioso inclusæ tenuitate summa, ex annuli exitum dantis strictura, robore, ex necessitate pressionis ab inferioribus ad superiores in appendicem materiebz feculentis surgentem leniter exercendæ, ut scilicet in intestinum exoneretur; ex appendicis præsertim externæ figura singulari, tandem ex rasiore, dum reponitur, obmutuatione. E specierum præcedentium, curatione

eruenda est hujus speciei therapeia. Si incarceretur hæc hernia, signa habet peculiariora superioris recessus, quibus ab enterocolicis aliis strangulatis discrepat. Vide apud *Littreum* quid sub hac strangulationis circumstantia agendum sit pro casuum diversitate.

4. *Enterocelo partialis sive peristictoria*; *Hernia ab altero intestini pariete* Heister Chir. T. II. cap. 116. *Pinceaux de l'intestin*, Arnaud des hern. Garengot Oper. de Chir. des hern. Art. V. ubi. XXI. 2.

Per nativas abdominis aperturas labitur intestinum, quandoque non integram, sed ab uno tantum ipsius latere. Observatione constat hanc intellui perstrictionem ab annulo inguinali umbilicali factam fuisse. Possit in aliis abdominis aperturis, immo & in locis, ubi abdomen aperturis non hiat, integro vel diviso peritoneo, perstringi intestinum necesse est qui non videat, & forte prostant ea de re historiae in quas non incidimus; hujusce speciei diagnosim sufficiens nullam notamus; inter hæc, & enterocellem appendicarem summæ est affinitas, certis saltem morbi temporibus; immo hæc in appendicarem de facili transiri potest. Cui Arnaud regulimus signa intestini perstricti, cui supervenit strangulatio sub hac circumstantia: sæpius pro epiplocele incarcerata venditata fuit hæc species, celotomia errorem committente. Quoad curationem vide auxilia supra proposita.

5. *Enterocelo cranialis*, *Hernia intestini cranialis seu enteromercalis* Auctorum, ut Kochii Hall. Disp. Chir. T. III. diff. 71. &c. *merocelo intestinalis* Platneri Inst. Chir. §. 348. *Hernia cranialis de l'intestin* Arnaud &c. *Merocelo intestinalis*, *Enteromercalis*. D.

Solitaria est ut plurimum, rarissime geminata, simplex, saccata ab intestino infra ligamentum Paupartii elapsu pendens, puerperis frequentior quam viris ac puellis, probabone vendibilis, ab eo tamen de facili distinguenda. (Vide *Platnerum* §. 123.) Protruberantiam exhibet vulgo exiguam (ovum gallinaceum vix excedit cum maxima est) bubonoceli fere similem, nisi quod bubonocelo proprius a pudendis sit, & iugine paulo inferiori; merocelo vero in parte inguinis superiori a pudendis remotiori, & fere supra femur prominat; a flexione tibiæ magis dolentem, adhaerentis valde obnoxiam. Quoad curationem convenit cum enterocelo prima.

6. *Enterocelo ovalaris*, La cause differt de hernia ventrali inter Haller. Disput. Chir. T. III. *Hernia intestinalis foraminis ovalis* Gunzii; *hernia intestinalis du tron ovalaire des es pubis* Garengot Mém. de l'Acad. de Chir. Tom. I. *Hernia du tron ovalis* Sharp Recher. Critique *Enterocelo du tron ovalis*. D.

Hanc speciem certe raram negarant plurimi; observatis vero tum suis, tum & alienis adduxit Garengot Mém. de l'Acad. de Chir. sæpius notata est, geminata aliquando, feminis quam viris frequentior, simplex, saccata, ab intestino efformata per foramen ovale elapso, eo scilicet

foraminis hujusce spatulo nervorum, ac sanguiductuum transitui dicato, & ad marginem superiorum posito, quod sub nomine sinusitatis ischii venire solet; protruberantia quæ, cum non satis provecta est enterocelo hujusmodi, nulla in eum deprehenditur, nunc rotunda est, nunc oblonga, sedem habet in superiori, & interna femoris parte prope perineum in viris, prope alterum ex magis vulvæ labiis in sequiori sexu, eo scilicet loco qui foramini ovali, seu musculo obturatori externo respondet inter musculum pectineum, & primum tricipitis caput.

Curationem erue ex iis quæ in specie prima diximus.

7. *Enterocelo ischiaticus* Bertrandi Mém. de l'Acad. R. de Chir. To. II. Rech. sur les hernies de la vessie par Verdier; *Hernia ischiatica de l'échancrure ischiatique*. D.

Vidit Bertran. in latere dextro herniam ab intestini ilei parte subligamentis sacrosciatatis elapsa, & per alteram ex emarginaturis ischiaticis erumpente factam. Pro ea curanda satis sunt auxilia in prima specie memorata.

8. *Enterocelo vaginalis*; *Hernia in vagina feminæ* eveniens Gunzii, lib. de hern. *Hernia intestinalis dans le vagin* Garengot Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. I. *Enterocelo vaginal* Levret obs. sur les polyp. sect. 2. L.

Hæc species simplex est, saccata, ab intestino parietes vaginæ partu multiplici labefacta, laxato intendente efformata. Protruberantia albidæ, molliuicula, character enterocolis generico insignita vaginam primum occupat, & dein magna vulvæ labia supereminet, provoluta ulterius intestino. Curavit hanc speciem Garengot repositione, & pessari, quod a similitudine cum dolii operculo nomen habet, adnuculo; *Hæmorrhoides* vero ope spongiæ ex aqua leviter aluminosa expressæ, quam digitis, per quos restructa fuerat hernia, compressa immittebat; frustra sunt, immo & noxia pessaria vulgaria.

9. *Enterocelo umbilicalis*; *Enteromphalus* Auctorum; *Omphalocelo*, seu *omphalitis intestinalis* eorumdem, ut Teichmeyer, inter Disp. Chir. Haller. T. 3. differt. 67. &c. *Vitium umbilici* Gunzii; *Hernia intestinalis du nombril* Arnaud Tom. I. *Enteromphale*. D.

Simplex est, saccata, ab intestino per umbilici anulum, aut proxime ad ipsius ambitum elapso efformata, epiplo-enteromphali rarior; adortur fere tantum pueris recens natos: protruberantia quæ magnitudine variat, notis in charactero generico allegatis insignitur, male negat *Dionis* umbilicum nunquam promittere, nisi ruptum; prominere etiam ex intestino, aut omento, aut ex utroque in saccum peritonæi provoluta testantur observata fide dignissima. Curationem nunc palliavimus tantum, nunc & etiam radicalem admittit enteromphalus. Vide speciem enterocolis primam.

10. *Enterocelo ventralis*; *hernia in testini ventralis* Auctorum; *Hernia ventris in testini* Gunzii, Platneri;

vis hypogastrocele intestinulis la Chauffe inter Halleri Disput. Chir. Tom. III. Diss. 68. *hernia ventralis de l'intestin* Arnaud; *hypogastrocele intestinalis*. D.

Variat sede hæc species; & quamvis ad superficiem abdominis omnem, ubi a perturis non hiat natus, extuberare possit, attamen ut plurimum loca aponeuropica potius quam musculosa intestino intumescunt; itaque vulgarior sedes est in linea alba, vel semilunari, vel supra annulos, arcusque cruales. Simplex est hæc enterocoele, factata, ab intestino laxatas aponeuropicos, fibras, & peritonæum in sinum agente, vel eundem peritonæi saccum trans ductos musculorum fasciculos cogente efformata. Protuberantia incertam habet molem, & characteristica generis notas præ se fert. Cave ne pro omphalocelis, aut umbonocelis speciebus vendites eas intestini hernias, quæ ad umbilicis, aut annulorum vicinias exoriantur, vere ventrales habende: immo datur hypogastrocelis species genuina a relatione aponeuropicos obliqui externi enata, quæ non solum inguen elevat, verum etiam in scrotum descendit. (vide *Gunzius* & *la Chauffe*.) Cave ne te fallat ea ventris hernia quæ, *ba Dran* annotant, (*Opus de Chirurg. pag. 146.*) vulnus fibrarum musculorum rectorum minus bene coalitum sequitur, nulla protuberantia extos visibili stipata. Curationem palliativam commodius recipit, quam radicale enterocoele ventralis, attamen radicitus curari potest; (vide *Enterocoele primum*.) Hypogastrocele in pueris evanuisse non semel vidit *Gunzius*, perficata ad ignem cum adipe taxonino bis terve in die protuberantia, immo, quando recidivam fecit hernia, perficato toto abdomine quod vim passum esse videtur, & injecta in super ipsi, potissimum inferius, fascia lata ex molli, sed firma materie parata.

#### B. Enterocoeles factatae, complicate.

11. Enterocoele epiploica-incompleta; Epiploenterocoele intestinalis, seu incompleta Auctorum, ut *Gunzii* inter Halleri Disput. Chir. Tom. III. &c. *umbonocoele epiploica-antica* eorumdem; *hernia intestinalis de l'épiloïque de l'abdo.* Arnaud; *umbonocoele epiploica-intestinalis*, *epiploenterocoele incompleta*. D.

Est species enterocelis prima, cui loca est epiploice; itaque ex epiplocelis 1. (vide infra) & enterocelis 1. signis, atque curatione eruenda ipsius diagnosi, ac therapeia. Notandum in epiploenterocoele omni tempore regredi intestinum, omentum partim, vel penitus, irreducibile manente.

12. Enterocoele epiploica-completa; *epiploenterocoele completa* Auctorum, ut *Gunzii* loco modo citato, &c. *escheocoele epiploica-antica* eorumdem; *enterocoele saburum vultus epiploica* eorumdem; *hernia intestinalis de l'épiloïque complete* Arnaud, &c. *escheocoele epiploica-intestinalis*; *enterocoele epiploïque des grandes illores*, *epiploenterocoele complet*. D.

Est enterocelis 2. species cum epiplocele 2.

combinata; notis ergo binæ hujusce hernia cognoscenda, & ex adhibenda in utraque mendum modo curanda.

13. Enterocoele cystocolica; *cysto-enterocoele* Auctorum, *hernia cystica-antica*, seu *enterocoele cysticalem inducens* eorumdem; *hernia intestinalis compliquée de cystocele* Sharp. Recherch. Critiq. Verdier de la hernie de la vessie urin. Mem. de l'Acad. de Chir. Tom. II. *cysto-enterocoele*.

Est enterocelis completa ac factata species, quæ sibi cystocoelem, seu herniam cysticam adsciscit, sacco bernioso inter descendendum sensum trahente partem peritonæi, quæ postice vesica tegitur, atque ita ipsam vesicam, easque in annulum abripiente, sub certis circumstantiis: signa præ se ferre, quibus enterocoele completa, ac cystocoele cognoscenda se præbent. Ex binæ hujusce hernia mutuanda est curatio; potest omentum huic speciei mixtum esse; tunc ex trium hujusce vicerum hernia exurgit enterocoele epiploico-cystica.

14. Enterocoele parorchidialis; *parorchido-enterocoele*, seu *hernia parorchido-antica* Auctorum; *hernia intestinalis compliquée de déplacement de testicule*, Mery chez Garangeot, Tom. I. Obs. XVIII. *parorchido-enterocoele*.

Est enterocelis inguinalis species, cui mixtum est parorchidum. In casu Meryano, aperto sacco hernioso, testiculus cum intestinis confusus, & in annulo positus inventus est, sive a seniori descensu; sive a retractione id loci occupare; speciei hujusce diagnosi, & therapeia ex combinatis enterocelis, & parorchidii caractere, & curatione desumenda.

15. Enterocoele hydrocelica; *hydroenterocoele* Auctorum, ut *Heisteri*, &c. *hernia hydrocelico-antica* eorumdem; *hernia intestinalis compliquée de hydrocele*, *hydroenterocoele*.

Est enterocelis species, cui mixta est hydrocele: combinantur ergo signa herniam intestinalem, & aquosam indigentiam. Curationem eruc ex iis quæ supra diximus, dum de therapeia hydrocelis & enterocelis egimus.

16. Enterocoele epiploica-cruralis; *epiplo-enterocoele cruralis* Auctorum, ut *Mauchartii* Disput. Haller. Chir. Tom. III. Dissert. 66. &c. *hernia cruralis*, seu *merocoele epiploica-antica*; *hernia cruralis ne s'insin.* & de l'epiploon Arnaud; &c. *merocoele epiploica-intestinalis*, *epiplo-enterocoele cruralis*.

Est enterocoele cruralis, seu entero-merocoele, quæ comitem habet epiplocele; cognoscitur ex combinatis herniarum intestini, & omenti-femoralium signis; & hujus curationem subministrat, auxiliorum utrique dicatorum conubium.

17. Enterocoele epiploico-ovularis; *epiploenterocoele ovularis* Auctorum; *hernia epiploica-antica foraminis ovalis* eorumdem; *hernia epiploica-intestinalis par le trou-ovalaire*, Malzaval chez Garangeot, Mémoires de l'Acad. de Chir. Tom. I. p. 714. *epiplo-enterocoele du trou oval*. D.

Hanc speciem intestinum, & omentum per-

loræ.

foramen ovalent alterutrum, vel utrumque pro-  
voluta faciunt: adfunt igitur enterocelis & epi-  
ploceles signa. Circa curationem ex bina hæce  
hernia hauriendam legatur *Garengeotus loco est.*

18. Enterocelo epiploico-ischiatrico; epiplo-entero-  
cele ischiatica, seu hernia omenti & intestini is-  
chiatica *Verdier*. Mem. de l' Acad. de Chir. T. II.  
hernia dorsalis *Papen Epist.* ad Haller inter ejus  
Disp. Chir. Tom. III. hernia epiploico-intestinalis par  
l' *Échancrure sciatique*; epiplo-enterocelo dorsal. D.

Hæc speciem observabat *Papen* in virgine  
rustica vultu tumescente: protruberantia ab  
ano ad suras propendebat; per emarginaturam  
ischiatricam elapsa fuerat pars omenti, jeju-  
num & ileon cum annexo mesenterio, cæcum,  
colon inferius & pars recti; (vide locum ci-  
tatum.) Nihil est quod addam de epiplo-entero-  
celis dorsalis curatione tum palliativa, tum  
radicali, quotiescumque huic posteriori locus  
est; quæ ex jam dictis, & modo dicendis fa-  
tis intelligitur.

19. Enterocelo epiploico-vaginali; epiplo-entero-  
cele vaginalis *Auctorum*; hernia epiploico-ent-  
rica in vagina evanescens eorumdem; hernia epiploi-  
co-intestinalis par le vagin; epiplo-enterocelo vagi-  
nal *Levret*, *Obi.* fur les polyp.

Est enterocelo vaginalis cum epiplocele mix-  
ta: ex bina hæc hernia speciei illius signa, &  
curatorium methodum habet.

20. Enterocelo epiploico-umbilicali; epiplo-entero-  
celomphalo *Auctorum*; hernia intestinalis & omenti  
umbilicalis *Gunzii*, *Arnaud*, *Teichmeyer*;  
hernia epiploico-intestinalis du nombril; epiplo-  
enteromphala. D.

Vulgatior est simpliciter composita hæc ompha-  
locele. Enteromphalo sacculo si omentum ad-  
das, exsurgit species hæc signis enterocelis &  
epiploceles mixtis dignoscenda, & mutatis ex  
utriusque hujusce hernie curatione auxiliis ad-  
scienda; observatur in infantibus, gravidis,  
asciticis.

21. Enterocelo epiploico-ventrali; hypogastrocelo  
epiplo-enterica *Ign. Lachausse*; hernia intestinalis  
& omenti ventralis *Auctorum*, ut *Platner*,  
*Gunzii*, &c. hernia ventralis de l'intestin & de  
l'epiploon *Arnaud*; hernie de l'intestin & de l'e-  
piploon sur-ombilicale, sous-ombilicale, ventrale  
*Garengeot*, Mem. de l' Acad. de Chir. Tom. I.  
hypogastrocelo epiploico-intestinal. D.

Variat loco hæc species; quæ nunc in linea  
alba supra & infra umbilicum, nunc latera ab-  
dominis tener; sequitur ascitem, graviditatem,  
vomitus vehementem; sic ex hypogastrocelo  
intestinali cum epiplocele combinata. Signa  
habet enterocelis & epiploceles (accetatum);  
unde magnitudinem visa est non semel excre-  
scere epiploenterocelo hujusmodi.

C. Enterocelos in saccata, seu sacco Luvio de-  
flectu; Gallice ruptures.

Observ. Peritonæi ruptionem adesse colligitur  
ex causa herniam inducente, & si scilicet ea

natales debeat vi cuidam magnæ, aut affec-  
tus dialyticis prægressis; vim magnam patitur  
peritonium in grandi saltu, lapsu graviore,  
ictu valido, conatu ingentiedito, &c. affectus  
dialytici sunt vulnera tum accidentalia, tum  
& chirurgica penetrantia, apoplemata, cicat-  
rix iterum aperta; 2. ex subitanitate herniæ;  
3. ex dolore vivo primo quo fit hernia tem-  
pore; (notabis subitanitatem, dolorem vivum  
& vim magnam prægressam indicare, ut  
plurimum, peritonæum ruptum esse, nequaquam  
vero ita certo ut sub his circumstantiis una pe-  
ritonæi dilatacio non suum locum habeat;) 4. ex  
sacci herniosi defectu: deficiat saccus, si minus  
velatæ, palposiudice, videantur partes hernio-  
sæ quam vulgo esse solent; & si reposita sta-  
tim hernia; nulla, dum restituitur, aut cum  
restituta est, appareant sacci vestigia, qui vel  
ultimo loco regredi solet, vel plane non re-  
greditur post reductas partes herniosas; 5. ex  
tæxos statim ab hernia facta tentatæ diffi-  
cultate, impossibilitate; 6. ex strangulatione ci-  
tissime superveniente; 7. ex apoplemate semper  
ex *Garengeot* peritonæi rupturam sequente; 8.  
tandem ex celotomia: hæc una certo, pen-  
etrantia vulnera, scissures chirurgicæ, apople-  
mata, cicatrix denuo aperta verisimillime; re-  
liqua modo memorata conjunctim peritoni-  
æi rupturam, & sacci herniosi defectum de-  
clarant.

22. Enterocelo bubonico; hernia inguinalis  
rupta peritonæi *Auctorum*; rupture de l'aine  
intestinalis, ou epiploico-intestinal. D.

Variat incompletam & completam: sit ab  
intestino, vel solo, vel cum omento trans an-  
nulos, facta in peritonæo solutione, elapso,  
& in inguinâ, vel scrotum descendente. Co-  
gnoscitur hæc species charactere generico, si-  
gnis ruptæ peritonæi, & sede anatomica. Cu-  
ratio intelligitur ex specie enterocelis prima,  
si restitutio obtineri queat; alit cum repositio-  
nis summa sit difficultas, immo & impossibi-  
litas, strangulatione, confestim superveniente,  
perita manu adhibenda est celotomia, ejus  
ope sublata strangulatione, & separatis, si ne-  
cessè sit ac congruum, adherentis, repositio  
obtinetur, &c. Vide *Garengeot*, *Oper. de Chir.*  
Tom. 7. ch. 24. & 25.

23. Enterocelo mercurio; hernia cruralis ru-  
pta peritonæi *Auctorum*; rupture crurale, int-  
estinalis, ou epiploico-intestinal. D.

Fit ab intestino, vel intestino & omento per  
peritonæi dialysim subtilissimam Paupartii pro-  
volutis. Hujus diagnosi eruitur ex charactere  
generico, signis peritonæi ruptæ, & sede ana-  
tomica. Vido curationem speciei præcedentis.

24. Enterocelo omphalico; hernia umbilica-  
lis, seu omphalocelo rupta peritonæi *Auctorum*;  
entoromphalus; epiplo-enteromphalus *Dionis*;  
rupture du nombril intestinalis, ou epiploico-int-  
estinal.

Variat in intestinalem & epiploico-entericam;  
quotiescumque hernia sit in ipso umbilici annulo,  
super.



fæpiſſime rumpitur, raro dilatatur peritonæum: probant recentiorum obſervata. Itaque ut minus bene in herniis umbilicalibus unam ruptionem admittit *Diuis*, ita & alii perperam hanc reſciunt, peritonæi dilatationem ſemper hic loci adſeſſe exiſtantes; (vide *Heiſterum* & *Gunzi-um*.) Speciei huiuſce, quæ inteſtinalis, aut epiploico-enterica eſt, diagnofiſi habeto ex charactere generico, ſignis peritonæi rupti, & ſede anatomica, quæ ſcilicet umbilici annulus, vel ambitus ipſius proximus eſt. Omphaloceleſi aperto per punctiōem lanceola ſacram hydromphalo in homine aſcite laboranti ſucceſſive vidit *Varnarus*, *obſ.* 22. Curatio intelligitur ex modo dictis.

25. *Enterocèle hypogaftrix* h. hernia ventralis rupte peritæque Auctorum; *Ruptura ventralis inguinalis*, on *Epiploico-inteſtinalis*. D.

Variat ſede hæc ſpecies; nullæ enim eſt abdominis pars aperturæ carens, quam occupare non poſſit; debetur autem peritonæi ſolutioni, quam vulgo excitant abdominis penetrantia vulnera, tum accidentalitè, tum arte facta, apoſtemata, cicatrices denno apertæ; ſolutum ſemel peritonæum nunquam, vel ſere nuſquam coire multiplici conſtat obſervatione: hinc fit ut trans diſtinctos prægreſſus hiule labia viam ſibi inveniat inteſtinum aut ſolum, aut omento ſtipſum. Character ſpecificus deſumitur ex nominis genericis, peritonæi rupti ſignis, & ſede anatomica; quoad curationem nihil eſt quod ſiſtamus quæ jam protulimus.

**LI. EPIPOCLE**; hernia omenti ſimplex, compoſita, ſaccata, ſacco hernioſo carens; itaque pertinet huc *hernia omenti incompleta*, ſeu *inguinalis*, (*inbentelo* Auctorum altera, ſive *epiploicoboccele*) completa, quæ vel *ſerotalis* (*oſeolocæ* Auctorum altera, ſeu *epiploſeolocæ*) vel *labiorum vulvæ*; *cruralis* ſeu *femoralis*, (*merocèle* Auctorum altera, ſeu *epiplomerocèle*; *vaginalis*, (*hernia omenti intra vaginam*); *umbilicalis*, (*epiplocephalus* Auctorum, *omphalocèle*, ſeu *exomphalus*, *altare* eorumdem) *ventralis*, (*hypogaftricæ* Auctorum altera). Hæc etiam herniæ omenti compoſitæ huc tandem herniæ jam diſtinctæ ruptæ peritonæo: Vide Auctores ſub enterocelis genere citatos. *Herniæ inguinales*, *completæ* & *incompletæ*, *cruralis*, *umbilicales*, *ventrales*, *vaginales* de *Epiplois*; *Epiplocæ*; *Enteropiplocæ*; *Rupturæ*.

Eſt omenti per annulos inguinales, arcuſeruales, in umbilici annulo, trans vaginæ parietes, vel abdominis muſculos elapſi ecſtopia hernioſa; quam cognoviſſes protuberantia ad varias abdominis ſedes modo dictas obſervanda, lente ſæpius exoriente, ægro nequidem animadvertente, tardius creſcente, ſponte per ſolum ſitum congruum nunquam, per preſſionem ſub congrua corporis poſitura tactam, etiam initio, non penitus regrediente, niſi exigua ſit, diſſicilis aut partim tantum, ſi maior, conatus ſub

mutato corporis ſitu editis ad priſtinum ſtatum revocanda; ægre, cum regreſſa eſt, continenda, molli, inequali, rugoſa, membranas craſſas ſub digitis volubiles ad tactum referente, impreſſionis digito ſacæ tenaci, ſubcomplanata, a preſſione, contrectatione, reſtitutione non obmurmurante; a ſpiritu retento, & ſub alvi deponende conatibus non multum intumefcente; dolorem, renitentiam, moleſtiam quam enterocèle minores præ ſe ferente; decubitus corpore extenſo, inſtrum trunco erecto diſficilem, anxioſum, impoſſibile ita ſæpe inducente, ut ad ſolandos dolores colicos, ad effugiendas tractiones moleſtas, ſugilatum, vomitum, corpore incurvato incedere, ac jacere non raro cogatur æger epiplocelæ completa præ primis laborans; tandem ſymptomatiis tum acutis, tum chronicis variis ex compoſitione & complicatione ortum ducentibus diſtata.

Cauſas eaſdem agnoviſcit epiplocelæ quas enterocelæ; quibus addit pinguedinem omenti nimiam, & ipſuſad ſuperiora ruptionem, cuius exemplum habet *Fantenus*.

Epiplocelis ſpecies poſſunt ſtrangulati, abſcedere, ſphacelari, adhærere, taxim reſpuere, & cum herniis aliis combinari; ſtrangulatio hic, ut in enterocèle, & ab apertura exitum dante & a ſacco ernioſo proſiciſci poteſt; ſigna utriuſque huiuſce ſtrangulationis eadem ſere ſunt, ac quæ in gemina inteſtini ſtrangulatione propoſuimus. Monemus tamen minus intenſa, ac urgentia in epiplocelis, quam in enterocelis ſtrangulationibus ſymptomata eſſe: hæc præcipua nota inter ſe diſſerunt enterocelis, (ſuppendicularem & perſtiſtoriam excipias in quibus hæc etiam repetitur,) & epiplocelis ſtrangulationes, quod in illis non deſcendat alvus eſti emolliata; in his vero vel ſponte, vel ſaltem ſollicitata reſpondeat. Obſervata fuerunt epiplocelis ſtrangulatæ exempla, in quibus venter ſupprimebatur, quæ & explicari diſſicilia admodum, & a petitis cæteroquin viris pro enterocelis ſtrangulatæ ſpeciebuz falſo fuerunt venditata; (vide *Gunzi-um* de omenti *hernia*.) In his ultimis caſibus ægre quidem obtinetur pactis hernioſæ notiſia; hæc tamen ſubminiſtrare poſſunt cognatum herniæ genus, ſi iam prius vidiffe medenti contigerit; ægri relatus, ſi herniæ ſux rito obſervatæ hiſtoriam accuratam tradere valeat; tandem epiplocelis notæ non raro in hernia utut ſtrangulata adhuc conſpicuæ: quas quidem ſatentur ſub hæc circumſtantiâ omentum hernioſum non ſemel exiſſe, ut enterocelis characterem utcomque inderet; (vide *Garangæſi*, *Piſſat Mem. de l'Acad. de Chir. Tem. III. Gunzi-um*;) quæ ſi obſcuriora ſint, plenam in ſtrangulatione epiplocelis aſſundit lucem ſectio chirurgica. In gemina omenti ſtrangulatione preſidio eſt celotomia, cuius opo ſubſiſti, ſi opus ſit atque expediat, adherentis, & laxata conſtrictione, omentum mole exiguum ac ſanum reponitur; ad magnam vim provolatum, ſi ſanum ſit & ædificiſſe, legitime juxta quod-

dam

dam intus propellitur, juxta alios in eo quodam casu melius excus relinquitur, aut quidem, ut aliis placet, amputatur: quæ etiam fieri volunt, quando sanum est, & repositi nequit: intumescentum, scirrhosum, gangrænodeum; facta ex quorundam mente ligatura, vel ea, ut rectius jubent alii, ommissa, ad partem usque sanam resecatur in ventrem refundendam secundum. Vide *Pépiet Mem. sur la ligature de l'Épiploon; Mem. de l'Acad. de Chir. T. III.* Ceterum remedia tum externa, tum interna, quæ in intestini strangulatione ab apertura facta proposuiamus, hic quoque locum habent, celotomiamque prægredi debent. Notat *Gunzius* nullum inveniri epiplocele cum dolore immobilis exemplum; quæ post externorum usum restituta fuerit, & nisi sanguine profuse missio redduci possit omentum, aut causa doloris tolli, firmiter persuasum habet ad celotomiam statim deveniendum esse.

Omentum herniosum, quemadmodum intestina, nisi satis cito accedat celotomia, aut repositio, apostemate rarius, gangræna scississime corripitur, quod ultimum vicii generis repetitis ad taxim nunquam de facili obtinendam ventaminibus & crebrius & citius contrahit, quam ex contritione a sacci herniosio orificio, vel ab apertura quæ exitum permittit inducta. Ut rariore omenti inflammatio, ita & raro in apostema abit pars hujusce modi: cuius vicii non alia est diagnosi, ac curatio, quam quæ ex apostematis genere superius tradito habetur. Ex iis quæ de gangrænodeo intestini mododiximus, necnon ex iphaceli charactere, ac curatione eruantur etiam gangræne omento hernioso hærentis signa, & auxilia huic infesta.

Ad hærentis contrahendas pronissimum omentum est: hoc e sede emotum non solum sacco; visceribus foetis, partibus per quas elapsum fuerat, si saccus deficeret, accrevisse: verum etiam circa vesicam, inguinam, peritonæon, utero, aliisque visceribus citra herniam adhæsisse probant cadaverum sectiones. Signa omenti cum intestinis provoluti, ipsique adhærentis dedimus supra supposito taxeo possibilitate, cum adhærentis enteroceli expediebamus: sub eadem taxeo possibili suppositione, si omentum solum sacco herniali adhæreat, non de colica queritur æger: verum de levibus tractionibus in regione stomachi, majoribus si plus alimenti assumpserit. In casu adhærentiarum piplocelis simplicis aut compositæ taxim respuunt, præter symptomatica jam dicta; sub bino casu modo proposito observari solita, corporis incurvationem, & sub trunci extensione singultum, vomitum, foras insuper remanent partes regressæ nesciæ, molles tamen, flexiles, & ad aperturæ exitum dantis ostium colligi valentes; si sacco adhærentæ adhærentiarum immunit: difficillius autem ad idem ostium colligendæ; frequentibus interius partibus annexis; si saccus circumpositus accrevit. Quod ad curationem attinet, vide *Arnand des hernies avec adhérence Tom. II.*

Circa omenti restitutionem nunquam spontaneam nunquam facili negotio obtinendam, animadvertere supervacaneum ducimus, huic locum non esse vigentibus strangulatione sive a sacco, sive ab apertura facta, & adhærentis plurimis, præsentè omenti etiam sani vi magna emota, obstantè ejusdem intumescentia, scirrhositate, immo & aliquando abscentibus mododictis. In his casibus omnem adimplent paginam brachierum pila concava, suspensorium; celotomia, nisi ab hac manum trahat auxiliorum mitiorum juxta saniora artis præcepta adhibitorum successus.

Viscera in ectopiæ societatem cum omento hernioso venire solita, nec non herniæ, ut vocant, spuræ; cum quibus idem combinari potest, patebunt ex specierum epiplocelis compositionum causa infra tradendo. Sub familia triplici epiplocele varias distribuiamus, quarum curationem generalem sequentibus præceptis includimus.

Si omentum reducibile exiguo modo descendit, ex peritorum sententia, facta repositione, brachierum pila convexa instructum applicandum, & usurpanda auxilia de eorum genere, quæ supra in prima enterocelis specie proposuimus: his tamen adversatur *Gunzius*, qui semper noxium esse vult omenti restitutionem; & prælare asserit idoneam vincituram, ne porro devolvatur, omento opponere, quam difficile repositionem sepe tentare. Itaque eo in casu, de curatione palliativa tantum sollicitus, brachierum pulvinari instructum, probè herniæ magnitudine excavato, imponendum suadet omnia repositione: idem præstandum esse si parva sit, aut irreducibilis, epiplocele, nemo est qui non videat. Si omentum ad magis vim provolutum sit, sive taxim tunc certe difficillimam admittat, sive respuat, ratione gangræne a vi ad restitutionem necessaria metuendæ, & periculi cum ab omenti restituti contumescencia, scirrhositate; tum a pressione in viscera facta, oriundi, mensureris brachierio sacco potius quam pila utroque excavata protuberantiam sustentare; sunt qui insigniam epiplocele, si reducibilis sit, reponere, & locum herniæ pila convexa munire non satis verentur; celotomiam, & omenti a strangulatione, inflammatione, gangræna liberi resectionem perperam instituant, ut radicalis obtineretur curatio; mox cito terminatam vidit *Sharp*. In entero-epiplocelibus quoad utramque partem irreducibilibus, vincituræ saciformis locus tantum est: si repositi patiatur intestinum omento regredi nescio; sunt qui tunc sub ligaculo sacco tantum uti jubent; dantur alii, inter quos *Sharp*, qui brachierio instructo pila molliori, & ad herniam probe accommodata applicato, nihil mali ex pressione uti omentum facta procedere posse asseverant. Si taxim admittat intestinum, & omentum, pater jam quid medentis agendum veniat. In epiplocelibus complicatis simplicibus tum compositis, ex supra dictis eruenda est therapia.

A. *Epiptocelos simplices saccata.*

**Nota.** Hæc cognoscendæ se præbent simplicitate, sacci herniosi præsentia, charactere generico, & sede quam occupant varia; curatio vero ex generali methodo haurienda venit; has itaque satis sit nominasse.

1. *Epiptocelo incompleta seu inguinalis, bubonocelo omentalis, seu epipto-bubonocelo* Auditorum; hernia omentalis de l'aine ou incomplete, bubonocelo epiptique, epipto-bubonocelo. L.

2. *Epiptocelo completa, ophocelo omentalis seu epipto-ophocelo* Auditorum, epiptocelo labiorum vulvæ eorumdem; hernia epiptique complete, epiptocelo complete, ophocelo epiptique, ou epipto-ophocelo; & epiptocelo des grandes lèvres. L.

3. *Epiptocelo cruralis, merocelo epiptica, seu epipto-merocelo* Auditorum; hernia omentisfemorialis seu cruralis eorumdem; hernia cruralis de l'épiptum, merocelo epiptique, epipto-merocelo. L.

4. *Epiptocelo vaginalis, hernia omenti intra vaginam eveniens* Auditorum; hernia epiptique dans la vagin, epiptocelo vaginal. L.

5. *Epiptocelo umbilicalis, epiptomphalus* Auditorum; epiptocelo sive epiptomphalus omentalis eorumdem; hernia epiptique du nombril, epiptocelo epiptique, epiptomphalo. L.

6. *Epiptocelo ventralis, hernia omenti ventralis; seu, hernia ventris, epiptica* Auditorum; epiptocelo omentalis eorumdem; hernia ventrale de l'épiptum, epiptocelo epiptique. L.

**Nota.** Epiptocelos ovalem, & ischiaticam enterocelibus harumque partium æque possibiles non proponimus, utpote quæ exemplo nullo apud Auctores legendo, nobis consent.

B. *Epiptocelos saccata compositæ.*

**Nota.** Continet hæc familia primum eas epiptocelos quibus accedit intestinum; cognoscuntur ex sacci præsentia, enterocelis supervenientis societate, characteribus genericis epiptocelæ, & enterocelo combinatis, tandem loco quem occupant. Curatio obtinetur mixta generali epiptocelis therapie ea medendi methodo, quæ enteroceli competit. Eas sigillatim persequi supervacaneum ducimus, utpote quæ eundem sint ac herniæ epiptocelo-intestinales in 1. generis præcedentis familia recensitæ: hoc unum intercedit discriminis quod in iis, quæ ad hoc genus pertinent, epiptocelo primaria sit, secundaria vero enterocelo: in iis vero quæ sub genere præcedenti proposuimus, primario provolvitur intestinum, omento secundario accedente; hinc epipto-enterocelos incompletam, completam, cruralem, ovalem, ischiaticam, vaginalem, umbilicalem, ventralem illas vocavimus: idem assumptis, eisdem adjectis sub nomine entero-epiptocelum veniunt; quamvis has ab illis separatas exhibuimus; fatemur tamen nullam, inter utraque vigere notabilem differentiam; atque ita posse, immo & debere con-

jungi. Continet & etiam hæc ipsa familia sequentes epiptocelis species, quæ licet ex secunda generis præcedentis tribu possint satis intelligi, has tamen juvat sub speciali nomenclatura describere.

7. *Epiptocelo cystocolica, cysto epiptocelo* Auditorum, seu hernia cysto epiptica, epiptocelo cystocelen inducens eorumdem; epiptocelo ou hernia epiptique compliquée de cystocelo. Verdier, de la hernie de la vessie urin. Mem. de l'Acad. de Chir. Tom. II. Cysto-epiptocelo. D.

Quod præstat intestinum in enterocelo cystocelica, hoc etiam præstat omentum transannulos herniosum: eo descendente ita sensim trahuntur peritonæi paria vesicam posticam obtegens, & ipsamet vesica, ut sub certis circumstantiis in anulum tandem abripiantur, omenti sacæ comites. Minus bene Sharp nullam agnoscit cystocelam, nisi quæ ab intestino, omento, aut utroque primum emotis secundario proficiat. Signa hujusce speciei desumuntur ex cystocelis, & epiptocelis completæ notis. Curatio ex bino hoc genere desumenda. Si epiptoceli intestinum, & vesica accesserint, sit triplicata hernia quæ epiptocelo enterico-cystica audit.

**Observ.** Nullum exemplum epiptocelis parorchidialis apud Auctores legere contigit; hanc tamen enterocelo parorchidialis non minus possibilem esse, nemo est qui non videat; & extitisse, atque observatores effugisse verisimilima est conjectura.

8. *Epiptocelo hydrocolica, hydro-epiptocelo* Auditorum; hernia hydrocolica-epiptica eorumdem; epiptocelo compliquée de hydrocelo, hydro-epiptocelo.

Est epiptocelo cui juncta est hydrocele, atque ita ex combinatis herniæ omentalis, & æqualis signis cognoscenda, & juxta methodum utrique competentem tractanda; hydrocelis autem epiptocelen comitantis dux sunt insignes varietates; 1. quæ frequentior est, sit sero collecto intra cystidem vulgarem, extra saccum herniosum positam, & ab ipso plus, minus pro epiptocelis magnitudine occultam (Vide *Le Dron Opus. de Chir.* pag. 186.) altera sit sero collecto intra hydatides omenti herniosi superficiem tegentes, atque ita sacco inclusas herniales (Vide *Lamorie observationem apud Pigeon Mem. de l'Acad. R. de Chir. Tom. III. pag. 404.*).

C. *Epiptocelos saccata defixæ, Gallice Ruptures.*

**Nota.** Peritonæi ruptione conveniunt Epiptocelos simplices, & compositæ sacco carentes cum enterocelibus insaccatis, nec disparia in utrisque sunt signa, quibus ruptum esse peritonæum demonstratur (Vide familiam generis præcedentis tertiam.) Conveniunt, & etiam loci in quibus solent contingere; observantur enim epiptocelos insaccatæ ad inguina, arcus crurales, umbilicum, & in omni abdominis superficie aperturis nativis defixitæ, non secus ac enterocelos a ruptione factæ: non discrepat contentorum indoles. Itaque in iis sigillatim enumerandis



operam non locabimus, & 3. enteroceleum familia intelligendis: neque earum curatio immoriamur, cum abunde sint, quæ jam protulimus; cæterum nulla separatur differentia essentiali entero-epiplocele, & epiplo-enterocele a peritonæi ruptura enatæ. Legatur observatio quam ad secundam hujusce generis familiam ascriimus. Possunt itaque, immoderata specie conjungi; brevitas causa trifariam tantum hernias intestinales, & epiploicas secumimus, quæ forte melius quadrifariam dividi potuissent.

**LII. GASTROCELE** Ign. la Chauffe; *Hernia ventriculi*, Fab. Hildani resp. ad Doring. pag. 915. Blegny Zod. Med. Gall. Ann. I. Febr. Obs. 2. pag. 44. Gunzii libell. de hern. cap. 20. Ign. La Chauffe Diss. de hernia ventrali, & Kirschbaum Diss. de hern. ventriculi, inter Disput. Chir. Halleri T. III. Diss. 68. 69. *Hernie de l'estomac* La Faye fur Dionis pag. 121. Arnaud. Tr. des hernies, Præface p. 81. Sharp Rech. Crit. Chap. I. Garengot Mem. de l'Acad. R. de Chir. Tom. I. p. 703.

Est ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricæ patientes, immo & per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa ad duorum transversorum digitorum a cartilagine xiphoidea distantiam ad minimum enascentes ex Gunzio, proxime vero sub cartilagine xiphoidea aut ad ipsius latera ex Garengot, & Arnaud: quam sinit protuberantia flexilis, elastica, glabra, æqualis, post pastum aucta, jejunio ventriculo imminuta (nisi stomachi parietes laxati admodum sint, aut cum peritonæo coaliti) magnitudine varia (a cerasina vel olivari ad majorem, maximam excrevit,) horizontali corporis situ, sub quo levamen tempore præsertim digestionis persentiscit æger, sensum evanescens, situ corporis erecto aut nisu edito renovanda, dolore stomachi, anorexia, bradyæpsia, vomitu habitualibus aliisque symptomatibus stipata, ut ea sileam quæ ipsi ex compositione accedunt.

Obs. Interdum tam parum eminenti protuberantia sese prædit gastrocele, ut in obsecis præprimis minus facile diagnosi obtineatur. Cave igitur ne in contumacibus ventriculi affectibus, quorum causa probabilis non invenitur, alias singas dum accusanda veniret ventriculi hernia; memineris etiam iis in casibus regionem epigastricam ægro stante ac tussire jussu primum explorare, ne frustraneam decubitus horizontalis explorationem reddat.

Causæ gastrocelis observatione comprobatæ sunt vomitu valida, spontanea, aut ab emetico concitata, fortis nixus in pondere elevando editus, violenta scapularum ad posteriora retractio, & similia.

De complicationibus, quas pati possunt gastrocelis species, nullam mentionem injicimus, tum quod ex iis quas patitur enterocele intelligi possunt, tum & etiam quas nullam memorant

Autorum historiarum. Compositiones patent ex specie secunda.

1. *Gastrocele simplex*; *Hernia stomachi simplex*, Fabricii Hildani, Blegny, Gunzii, Arnaud, Garengot locis citatis; *Hernie de l'estomac, gastrocele simple*, G.

Cognoscitur hæc species, quæ ab uno sic stomacho, facit præsentia, sociorum viscerum defectu, & charactere generico. Variat locus protuberantiae toto spatio, quod cartilaginem xiphoideam, & umbilicam interjacet. Excipit Gunzium partem hujusce spatii superiorem. Repositione & bratherio pila molliori planiuscula ad locum accommodata instructo obtinetur curatio: his vim adit patens tenuis, sed roborans, vidus ac potus, nec non situs congruus, femoribus scilicet adductis, & inclinato capite. ( Vide Gunzium ).

2. *Gastrocele composita*: *Hernia stomachi composita*, Amyaudi Transact. Philoſoph. nu. 422. & ibi. an. 731. n. 422. Gunzii, Ign. La Chauffe. G.

In ista specie stomachum herniosum comitantur viscera abdominis varia fere pariter emota, ut intestina ex Philoſoph. Transact. omentata ex Ign. La Chauffe; intestina, & hepar ex videri Auctori. Variat sedes herniæ hujuscemodi. De gastrocele ventrali, epiploica, atque intestinali sermo est apud Gunzium, La Chauffe, & intrans. Philoſophicis. Gastroceleum umbilicalem ex intestinalis, & vesiculæ fellæ parte stomachi sociis factam habet Amyaud. Cognoscitur hæc species facili præsentia, characteribus genericis gastrocele, necnon enterocele, epiplocele, hepatocele combinatis, & sede occupata, quæ scilicet est epigastrum vel umbilicus. Curatio eruenda est ex gastrocelis præcedentis atque generum consociatorum therapeja.

**LIII. HEPATOCELE** Gunzii libell. de hern. p. 4. *Hernia hepatis* E. N. G. Dec. I. Ann. II. & Dec. II. Ann. VII. Bohnii Chir. rational. p. 230. *Hernie du foye* Arnaud des hern. Tom. I. *Hépatocèle*.

Rarum hocce genus herniæ observatione quidem stabilitum, nondum tamen sufficienter descriptum, sit ab hepate trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum elapso. Ejus characterem auctoris perficiendum sic condimus. Cognoscitur hepatocele, 1. loco quem occupat protuberantia, ( ad umbilici vicinias, & in ipso umbilico fuit hæcenus observata ); 2. explorato hepate quod ex hypochondrii dexteri regioni in protuberantiam tendere percipitur; 3. protuberantiæ, quæ livida ac congenita est, firmatæ parenchymatica; 4. defectu signorum enterocele, epiplocele, gastrocele, & in primis hysterocelen indignantium. Species, quas tantum allegabimus, sunt numero biæ.

1. *Hepatocele ventralis*; *Hernia hepatis prope umbilicum* VVolf. Strigelli, E. N. G. Dec. I. Ann. II. obs. 83. Bohnii loc. cit. *Hernie du foye ventrale, Hépatocèle ventral*, D.

Viennæ natus est infans cum tumore circa umbilicum ad pugni magnitudinem, coloris lividi, qui procephalocoele gangrænosa impoſuit; applicatis medicamentis calidioribus, & antiphlogiſticis, & inde aucta adhuc inflammatione miſſus exſpiravit. Aperto ad tumorem dictum cadavere, ſtatim prodit in conſpectum ſubſtantia hepatis, quod inflammatum reſertum eſt; itaque non ex umbilici protuberantia ortum ducebat tumor, verum ex hepate (forſan vitio conformationis) prolapſo, diſſiſſa linea candida, quæ inter muſculos rectos conſtituitur. *Strigelius.*

2. *Hepatocele umbilicalis*; *Hernia hepatis in umbilico* Reifellii E. N. G. Dec. II. An. VII. obſ. 6. Schulzii Aſſ. Phyſ. Med. vol. I. obſ. 226. *Hernia du foye*; *hepatocele umbilicalis*. D.

Vidit *Reifellius* puerulum ex utero tuliffe in umbilico tumorem rotundum, pomi magnitudinis, lividum, duruſculum, diſtentum, cui vaſa umbilicalia in vertice adhuc adhærebant: quibus dein aſcendiſſimis, reliqua membrana tumorem tegens incepit putrilaginem aſſumere: intra paucos dies puer a lacte, & cibo abſtinent obijt totus marcidus. Poſt mortem detracta membrana, qua umbilicus fuit extenſus, tumor apparuit puniceus, qui ſeparatus a cute, & muſculis eſſe ex parenchymatis colore, & textura conſequebatur ipſum hepateo vialiqua detrufum aut delapſum, quique hepatocele dici poſſet. Fuit conjectura matrem conſuſum fuiſſe, quod negavit; lapſum vero conſeſſit.

Obſ. An. ad genus bocce referenda eſt ea herniæ ſpecies a pinguedine enata, quæ eo ligamento hepatis ſuſpenſorio dicto, vel a latere huius interno ex cartilagine xiphoidea quaſi propendet? Pinguedinem hanc ab hominibus parum alias obſiſſe in ſacrum peritonæi proſolutam reperiſſe aſſertit *Gunzius*, & in cadavere vidit oculatiſſimus *Daviſſardius*, anatomicæ peritia nulli ſecundus.

LIV. SPLENOCELE. *Gunzii libell. de hern. pag. 4. hernia lienis* Fab. Hildani Epift. LV. pag. 999. *Spigelii de corp. hum. fabric. lib. VIII. cap. 14. Ruyſchii Adverſ. Anat. Dec. II. pag. 23. Hernie de la Rate, Arnaud des hern. Tom. I. pag. 29. Splenocele.*

Eſt lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere ſiniſtro parietes, vel per inguinalem quædam lateris anulum elapſi ectopia hernioſa, cujus diagnofi tradendæ minus quam veritati adſtruedæ faciunt Obſervatorum quos citavimus ſide digniſſimorum hiſtoriæ; characterem quo genus hocce donamus iſi incudi reddant quibus vidiffe contigerit. Cognoscitur ſplenocele, 1. loco ad quem exuberat hernia, (abdominis latus ſiniſtrum ſub umbilico, & inguinis ſiniſtrum anulum viſa eſt protuberantia huc uſque tenuiſſe); 2. explorato liene, qui ex regione ſiniſtri hypocondrii in protuberantia tendere percipitur; 3. firmitate protuberantiæ parenchymatica; 4. defectu ſignorum, quæ ſibi aſſumunt enterocele, epiplocele, & præ primis hy-

ſteroccele. Obſervationes quibus evincuntur generis bujuſce ſpecies, ſatis ſit retuliſſe.

1. *Splenocele ventralis*; *hernia lienis ventralis* Fab. Hildan. loco citato; *Hernie de la rate ventrale*; *splenocele ventral*. C.

Mulier triginta annos nata, tumore magnitudine capitis infantis in ſiniſtro latere ſub umbilico laborabat: erat ille rotundus, & facile ex una in alteram partem ducebatur; cultro anatomico inſectus eſt lien adeo magnus, ut inferior ipſius pars, quæ in tumorem rotundum indurata fuerat, ad os pubis fere propenderet: ita *Hildanus*.

2. *Splenocele inguinalis*; *hernia lienis inguinalis*, ſeu *ſplenocele* Ruyſchii loc. cit. *Hernie inguinale de la rate*; *splenocele inguinale splenobuloccele*. C.

Vide ſemel berniam, ubi lien in inguen delapſus replebat dilatatum peritonæum. Mulier in noſocomio Amſtelodamenſi fuerat annoſa, cui lævo inguine ingens tumor, qui habebatur pro placenta uterina poſt partum relicta, atque ibi accreta; alii putabant frigidum apoſtema: ſed in cadavere certo vidi lienem eo ſeſeſſiſſe, atque hanc produxiſſe berniam: ita *Ruyſchius*.

LV. HYSTEROCLE; *hernia uteri*, *Sennerti*, Lib. IV. Med. Præf. Part. II. ſect. II. cap. 27. *Doringii* Epift. ad G. Fabr. Hildanum de bernia uterina p. 193. *Graaf de mulier. organ. cap. 8. Ruyſch Adv. Dec. II. pag. 23. Hernie de la matrice*, *Arnaud des hernies* T. I. pag. 29. *Sabatier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. Tom. III. *Hysterocele*.

Eſt uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos internæ abdominis mediæ parietes elapſi ectopia hernioſa; quam cognosces 1. loco protuberantiæ in hoc genere obſervandæ, (ad annulos inguinales, ſub umbilico, & proxime ad inguina viſa fuit hæſſenus); 2. exploratione colli uteri, cujus mutata deprehenditur nativa directio; 3. protuberantia dura, renitente, gradatim ad maximum uſque volumen increſcente, & pelvi poſſe oſſa pubis emergente, utero graviditate vera, vel ſpuria diſtentum continente, reddibili partim, vel penitus ſaltem initio, immo & quandoque ad ipſum geſtationis terminum; 4. exploratione Puzoſiana, immiſſo ſcilicet in vaginam manus alterius digito, dum manu altera protuberantia comprimitur; 5. graviditatis veræ, vel ſpurie ſignis; atque ita cum ſæpius adſit vera ingravido, motionibus ſæcis certo tempore intra protuberantiam perſentiſſis.

Cauſæ hysteroceleſis obſervatione compertæ ſunt iſtus validi in ventrem, niſus magni editi, prægreſſa peritonæi a vulnere, abeſſu etiam curatis ſolutio, graviditate præſente, aut accedente.

1. *Hysterocele inguinalis*; *hernia uteri inguinalis*, ſeu *hystero-buloccele* *Sennerti*, *Doringii*, *Sabatieri* loco citato. *Hernie inguinale de la matrice*; *hysterocele inguinal*, *hystero-buloccele*. D.

Mulier in inguen. sinistrum peritæa ferit: laxatur peritonæum; paulo post oboritur ibi loci tumor, qui brevi tempore ob summum incrementum intra abdomen recondi nequit: protuberantia includitur uteris gravidus, ita in dies sæpe audit dilatatus, ut ea facci instat, aut cucurbitæ majoris oblongæ fere propendeat, & sævus motiones & tactu & visu tandem percipiatur. Simile vitium in inguine sinistro patitur paupercula novem liberos enixa, in primo partu sola sibi consilere cogitur ab obstetricibus deserta; etsi mali aliquid in abdomine sibi hinc evenisse sentiat, nihilominus tamen oculos ex ordine naturaliter, ac fassæ parit. Non multo post partum octavum ad inguen sæpiuscule persentiscit malum in primo partu acceptum, ibique quidpiam mediocrius quantitatis extra abdomen sibi excidere animadvertit; tumor in dies ita & magnitudine & longitudine increvit, ut tandem vesicam bubulæ spiritu distentam æmuletur, & ad genua usque propendat; accedunt non dubia fœtus vivi in protuberantia inclusi signa, ægra interim dolores magnos perpetiente, sive cubare, sive sedere conetur. In bino hocce hysterocelis inguinalis casu adhibita est sectio Cæsarea cum bonis infantis: matris vero malis rebus. Tutius in hac specie instituitur repositio, si obtineri queat, & ea impetrata fœtus expulsio naturæ aut arti melius committitur.

2. *Hysterocelo ventralis, hernia uteriventralis* Graafii, Ruyschii loc. cit. *Hernia ventrale de la matrice, hysterocelo ventral*. D.

Geminum abdominis locum occupare observata est hæc uteri hernia; in exemplo Graafiano latus sinistram parum infra umbilicum tenebat; in Ruyschiano vero latus pariter sinistram inferne & proxime ad inguina, non tamen in ipso annulo, quod speciei præcedentis proprium est. Vidit Graafius mulierem de summis ventris, & renum doloribus, necnon de anxio in hypochondriis sensu querentem: quæ symptomata ita, dum capite demisso decumbebat, augebantur, ut in lecto sedere semper cogeretur præ nimia abdominis mole, quod ante viginti quinque annos tumere inceperat citra causam ipsi notam. In laetæ sinistram paulo infra umbilicum magis elevabatur abdomen quam alibi, nec parum ubique renitentiam palpo objiciebat: aperto cadavere inventæ sunt in abdomine quatuor liquoris fœtidissimi pintæ, necnon tumor rotundus magnitudine portentosus spatium reliquum implens, quadraginta libras pendens; uterus fuit herniosus, cujus substantia ante unum, postice & lateraliter duodecim pollices crassa, partim scirrhosa, partim glandulosa, ac globulis rotundis, induratis ovarum vitellos æmulantibus, feta observatur; ea vitæ temore implebat materies nigra fœtidissima, falso germi, molæ aut placentæ natales debens, & pugnæ æquans magnitudine. Ante viginti quinque annos, labente 2. aut 3. graviditatis mense vesiculam aqua plenam placentæ destitutam excluserat mulier, subsequente per sex,

septemve menses lochiorum fluxu uberrimo, cui compressio superveniebat abdominis protuberantia modo descripta. Narrat Ruyschius casum mulieris, cui ingens tumor directe ex cavo abdominis procedens circa inferiorem ipsius partem quam proxime inguinis dudum hæserat; brevi autem suppuratus bene sanabatur: accedente haud ita diu gravitate, uterus fœtu crescente tumens in saccum dilatabat peritonæi locum cicatricæ obdundum, qui uti solemne est in peritonæi atque abdominis abscessibus, necnon in vulneribus in cavum abdominale penetrantibus etiam rite curatis, præacquisita debilitate pressum validum sustinere imposuit. In hujuscemodi peritonæi sinum insinabatur uterus eo usque, ut tandem eum fœtu incluso ad genua usque penderet antrosum. Instantibus deinde partus laboribus uterum cum fœtu intra abdomen reponere obstetrix; sique felix evaderebatur puerpera, edito per vias naturales bene nato fœtu.

Obs. An ad hocce genus pertinet ovariorum hernia quam memorat Arnaud, & in puelles cadavere ad inguinalem anulum extubereare Veyrat vidit ex Verdier?

LVI. CYSTOGELÆ. Platneri Inst. Chir., Iga. La Chausse de hern. ventrali; *Hernia cystica* quorundam; *Hernia vesica urinaria* Salzmanni Diss. Inter Halleri Diss. Chir. T. III. Diss. 72. Gunzii Libell. de hern. &c. *Hernie de la vessie urinaire*; Mery Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1733. Garengot Oper. de Chir.; Levret Obs. sur les polypes; Sharp Rech. Crit.; Verdier Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. II.; *hernia cystique cystello*.

Est vesicæ urinariæ trans annulos inguinales; sub arcibus cruralibus, & per laxatos, diductos perinæ, hypogastrii, necnon vaginæ parietes elapsæ ectopia herniosa; quam sinit protuberantia in locis jam dictis observanda; initio parva, sensim cretens, pressione, aut commodo corporis situ regrediens; murata corporis postura, aut nisu edito revocanda; mollis, & membranas crassas, flaccidas, sub digitis volubiles tactu referens, si vesica lorio vacua sit; fluctuans, si adsit lotium; majori donata volumine post servatas din' urinas; decretescens, aut fere evanescens iis emissis; quæ leviter compressa excitatur in ægro meijendi desiderium; si vero validior sit compressio, sequitur mictio plena, vel stillatitia. Cæterum affectui socia redditur urinæ retentio, mictio difficilis; vel dolorifica, ut omittam symptomata varia ex compositione & complicatione ortum ducentia. Notabis dari ægros in quibus nulla succederet urinæ emissio nisi manibus admotis protuberantiam elevarent, ac præmerent.

Causæ cystocelæ sunt communes, vel propriæ communes ex herniis aliorum viscerum, membranaceorum in primis, intelligendæ reducuntur ad ea quæ fibras laxant, quæ tonum ipsarum frangunt subita, vel lenta distractione, quæ tandem contenta in abdomine, deorsum magis argent. Propriæ vero sunt, & parietum vesicæ

cæ ampliatio ab urinæ retentione, difficultate prægressus iudicanda, quam sequitur, evacuata urina, eorumdem flacciditas, atonia, contractionis sufficientis defectus; 2. vesicæ figura singularis graviditatis tempore contingens; ea enim ab utero gravido ad ossa pubis pressa lateraliter exporrigitur, figuram iudens veluti brachiata, vel deorsum expandi cogitur; 3. tractio a visceribus aliis prolapsis; sic vesicam trahunt intestina, omentum, uterus, vagina & loco nativo dejecta; 4. parietum vaginæ per partum multiplicem distensio, debilitatio, quæ scilicet sufficienti sustentaculo vesicam ex hac parte defraudat; 5. fibrarum muscularum tum vesicalium, tum vesicæ circumpositarum recessus ab invicem distensione productus, quo nimirum labefactatur clausuri coercentis robur. Minus bene *Schorpæ* prævia enterocele, aut epiplocele cystocele semper pendere vult, tertiam ex assignatis causam tantum agnoscens; observatione enim non semel constitit heruiam cysticam solitariam simplicem primariam enatam fuisse. Nec iure meliori uni conformationis vicio in utero contracto, non vero causæ adventitiæ, eam adscribit *Mery*; potest equidem quandoque vitium conformationis locum habere; verum non aliam causam agnoscere ventrat rationum momenta adversus *Meryanum* sententiam, a *Verdier*, *Salzmanno* relata.

Obnoxie sunt cystocelis species varix calculo, obstructioni, inflammationi, strangulationi, gangrænæ, irritationi, adhærentiis, tandem compositioni.

Calculos sæpe continet cystocele annularis, necnon vaginalis. Horum signa sunt renitentia, strepitus, dum pars herniosa præsertim vacua digitis contradacta, perceptus; deinceps dolores a concretioniibus huiusmodi excitari soliti. Docent te casus a *Thoma Bartholino* enarratus, quod etiam si nec palpus, nec strepitus calculorum præsentia denotent, nihil tamen de ipsorum abscentia concludendum veniat, præsertim si ægrum vexant dolores calculosi. Viti sunt calculi viam sibi in iuguline patefecisse, apertura obassiduum urinæ effluxum in ulcus fistulosum abeunte; calculus ita quandoque obturat herniæ orificium, ut ex parte vesicæ herniosa in aliam exonerari non possit lotium; hoc si contingat strangulatam dicunt cystocelelem, obstructione nomine melius salutandam. In crustatione calculosa ita clausum vidit *Bertrandi* herniæ cysticæ orificium, ut in desuæti cadavere, non nisi post eam diffractam, introducti stylus potuerit; vesicam felleam figura ac capacitate æmulabatur pars vesicæ urinariæ cæcopia, hominis scitidi drachmis aliquot sæta, quam pro sacco hernioso in omenti & intestini herniis observando, ast hic partibus emotis vacuo, de facili habere potuisses; Præsidio est lithotomia specialis, qua denudatis per celotomiam in cystocele inguinali calculosa partibus, citra vero talem denudationem in vaginali calculo etiam sæta, sufficienter inciditur vesicæ pars cæcopia, & calculus

extrahitur, cavendo ne pars incisa in ventrem resudatur; deligato, ut in vulgari lithotomia fieri solet, valere, avertitur ulceris fistulosi ex continuo urinæ per vulnus effluxu metuenti periculum catheteris tubulosi immisione, qua urina ad vias solitas revocatur.

Inflammatione corripì possunt omnes herniæ cysticæ species: tunc signis cystocelis genericis adduntur dolor acutus, calor, febris, vomitus, singultus. Ex *Farin* observatione, si simplex sit cystocele, quæ inflammationem patitur, vomitum singultus sequitur; si vero ea inflammata epiploceli, aut enteroceli mixta sit, singultus vomitum præcedit; orificium partis herniosæ nunc penitus ob inflammationem vigentem clauditur; & lotio ex ipsa in aliam vesicæ partem evacuari nescio, strangulatio accedit; nunc vero irrita inflammatio fatis hiat, quamvis constrictum, ejusmodi orificium, ut urinæ & vesicæ parte cæcopia per pressionem expulsa in aliam huius visceris partem via pateat; exulat tunc strangulatio, præsertim inflammatione. Curatur cystocelis inflammatio venæ sectione iterum atque iterum celebrata, applicatis topicis, evacuata ope lenis pressionis in protuberantiam & hypogastrium factæ urina in cystocele contenta, si exulet strangulatio; quam si inflammatio induxerit, tunc acu ad apicem tricuspidata, & tubulo inclusa perforari debet hernia, ut extrahatur lotium; dein venæ sectionibus iteratis & impositis emollientibus, immo & resolventibus inflammationis occurrendum; quæ si auxiliis jam dictis cedere renuat, unica spes est in celotomia. Deuodatis huius ope partibus, dilatatione facta auferitur apertura exitum dantis constrictio, & in ventrem resunditur pars vesicæ herniosa, nisi obstat præseus ipsius conditio, vel adhærentiarum separationi minus aptum iudoles: deligato vulnus, ut moris est, in bubonocelis operatione, & cicatrice facta; locus hic splenio & brachio firmatur. In cystocele epiploceli, aut enteroceli mixta, si celotomia celebrare cogat inflammatio refractaria, meminerit Chirurgus nullam sacci herniosi partem auferre, ne una eademque scissio & sacci & vesicæ partem eximat cum malis ægri rebus.

Quemadmodum enterocele inflammata corrumpitur quandoque, ita cystocelis inflammatio nonnumquam abit in gangrænâ. Huius signa ex enterocelis gangrænoide æffectionibus satis intelliguntur. In desperatissimo hocce casu nulla alia via remanet, quam quæ pro corruptis intestini herniis a *Louis* inuenta suadet *Mém. de l'Acad. de Chir.*

Ab urinæ in parte vesicæ herniosa morantis copia ita stimulari, irritari possunt huius parietes, ut, quamvis absit inflammatio, ea sere tamen accedant symptomata, quæ in cystocele inflammata observari modo diximus; scilicet dolores acuti in protuberantia, nausea, vomitus, singultus. In hernia cystica cum intestinali combinata, sæpe junior vidit irritationis huiusce exemplum, memoratis *Verdier*, Eugatur hæc acci-

accidentia urinæ evacuatione ope catheteris, scroti elevationis; & pressio in protuberantiam factæ, obtinenda; præcaverunt vero si vesicam herniosam manibus elevatam ac compressam exonerare meminerit æger, statim atque vastius tumet.

Adhærentias contrahunt herniæ cysticæ non fecus ac intestinales, & epiploicæ: probant exempla a *Verdier* relata. Legatur inculenta dissertatio, quæ enterocelis & epiplocelis adhærentias profecutus est *Arnaut*, & exinde adhærentiarum cysticarum theoria & therapia eruat. Adhærentiæ suspensionem injicit cystocelis irreducibilitas in nullam aliam causam refundenda; præsentem nescit celotomia.

Combinatur cystocèle, epiplocele, procidentia inversione uteri ac vaginæ. Vide *Cystocelos*.

#### A. Cystocelos simplices.

1. *Cystocèle inguinalis*; *Hernia inguinalis vesica urinaria* *Audorum*, ut *Verdier*, *Mery*, *Petit*, *Platneri*, &c. *Cysto-bubonocèle eorumdem*; *Hernia inguinalis de la vessie urinaire*; *Hernia cystique de l'aine*; *Cystocèle inguinal*; *Cysto-bubonocèle*. D.

Variat hæc species in incompletam, & completam, in solitariam & geminam. Præcedit urinæ retentio, vel dysuria, vigente hacce hernia etiam observanda: vesica per annulos inguinales elapsa, tumet inguen tantum in casu incompleto, inguen autem & scrotum in casu completo, protuberantia quæ notis gaudet in charactere generico memoratis: exulat alius visceris simul herniosi societatis; cave ne ipsam cum hydrocele confundas. Notabis faccum herniosum in enterocèle, epiplocele, aliisque herniis etiam incipientibus præsentem, partemque emotas includentem, in herniæ cysticæ inguinalis principio deficere; neque adesse; nisi satis cystocèle increverit; eumque ante vesicam tunc positum, nunquam ipsam includere.

Curatio modo sequenti perficitur. Interdictis ægro pinguibus, oleosis, necnon remediis diureticis, parva ipsi potus quantitas concessa, movendus est ut mingendi desiderio utitur frequentissimè obtemperet; & ut quantum poterit in latas herniæ oppositum decumbat, quo in situ si difficultatem experiatur in emittendo torio herniam replente, suppetias ipsi ferent protuberantiæ elevatio, ac compressio, necnon sitas resupinus clunibus elevatis, sub quo nunquam etiam absque compressione succedit missio in alia corporis postura impossibilis; 2. facta sciti in cystocèle contenti naturalis, vel artificialis evacuatione, liberato per clysterem a fordibus intestini recto, ægro in postura legitime constituto, tentanda est partis vesicæ herniosæ repositio, eam adhibendo encheiresim, quæ in intestini, vel omenti restitutione usurpatur: quæ penitus impetrata brachio congrua pile instructo convexa manendi est annulus inguinalis; 3. si cystocèle completa sit, non accretis, reductionis tamen impatiens, apponendum est subligaculum sacciiforme, suspensorium

vulgo dictum, & tela parum extensili factam, paulo minori quam est protuberantiæ moles donatum cavitare, in dies, prout decreverit herniæ volumen, minuenda, & liquore adstringente ac roborante madsacienda. Annulus inguinalis attingente cystocèle, in suspensorii lincum sufficitur brachium palmarium gaudens latiusculo subconcavo, in planum, dein tandem in convexum mutando; quod tunc deponetur, cum nullum de perfecta curatione remanebit dubium; 4. si vesica circumpositis adhæreat, locus tantum est suspensorio vulgari; nisi celotomia, sub qua leviores adhærentias perita manus tollit, periculum facere velit æger.

2. *Cystocèle cruralis*; *Cystomerocele*; *Hernia cruralis vesica urinaria* *Levret* apud *Verdier*, obs. XI. *Hernia cruralis de la vessie urinaire*; *Cystocèle crural*; *Cystomerocele*. D.

Fit hæc species a vesica urinaria sub sigamento Poupartii in mulieribus prægnantibus, puerperis, hydropticis provoluta. Cognoscitur signis genericis, sede anatomica & simplicitate. Differt a præcedenti notis iidem, quibus enterobubonocèle a merocele intestinali distinguitur; scilicet majori a genitalibus distantia, & loco sibi proprio, quem in inguine superiori, & fere super anteriorem femoris partem obtinet. Adest urethræ obliquitas cathetere immisso detegenda; ex præcedenti specie huiusce curationi eruitur.

4. *Cystocèle perinaalis*; *Hernia perinaalis vesica urinaria*; *Hernia perinaalis cystica* *Audorum*, ut *Mery*, Curad patris apud *Verdier* obs. XIII. *Hernia cystique du périnée*; *Cystocèle du périnée*.

In hac specie ad perinæum, nonnihil ad raphes latera, elabitor apud gravidas vesica urinaria, juxta vaginæ & intestini recti partes laterales obrepens, ab utero sæcto distento pressa, musculorum ani levatorum fibras fasciculatim coactas diducit, separat, eumque attollit, spatium nativo sustentaculo defraudatum subiens. Cystocelem hancce characterem generico insignitam specificè determinat locus affectus & simplicitas; post partum spontaneæ evanuisse observata fuit: quod si non contigerit, valet hic ea curandi methodus, quam speciei cystocelis primæ attribuimus.

4. *Cystocèle hypogastrica*; *Hernia vesica urinaria supra pubem*, *Le Dran* apud *Verdier*, obs. XIV. *Hernie de la vessie par-dessus les os pubis*; *Cystocèle hypogastrique*. D.

Vocabatur *Le Dran* ab homine annosato 40. ob urinæ retentionem, quam plures aliæ præcesserant, periculosissime decumbente: præter tumorem, quem vesica lotio distenta supra pubem efformare solet, aderat præterea tumor alter longe minor ad latus musculi recti positi, priore paulo elatior, & tam facile cedens. Extractis per catheterismum urinæ libris tribus, evanuit protuberantia major supra pubem sita, & cessavit urinæ effluxus. Levi pressione in tumorem alterum facta nova successit urinæ emissio, qua tumor hicc deletus est. Irrito levamine

per cathetere n, qui in vesica derelictus fuit allato, fatis brevi fundus est æger, neque facta est cadaveris aperienti copia. Putat *Le Dran* tumorem minore sacum fuisse urinæ magna copia secum a tunica vesicæ urinariæ nervæ inter ductas tunicæ carneæ fibras protrusa efformatum, qui in vesicæ partem majorem ægre exonerabatur, ob contritum a fibris carneis sacci hujusce orificium.

3. *Cystocoele vaginalis*; *Hernia vesica urinaria intra vaginam eventus* Robert apud *Verdier*, obs. XVIII. *Hernie de la vessie urinaire dans le vagin*; *Cystocoele vaginal*. D.

Inter fibras tunicarum parietes vaginæ efformantium diductas viam sibi aperit vesica urinaria, membranas vaginæ elevans in protuberantiam signis cystocelibus genericis gaudentem, e vaginæ parte osibus pubis respondente emergentem, ejus orificium occupantem, hanc in muliere gravida 40. annos nata, quam frequens ac dolorificum urinæ fundendæ desiderium divexabat, partus tempore observavit *Robert* memorante *Verdier*. Deducitur hujus speciei diagnosi ex charactere generico, sedæanatomica, & simplicitate. Cave ipsam confundas cum enterocoele vaginali, hysterocystocoele, & propriis cum hydrocele quam in cavo scitio testis cellularis vaginam cum recto alligantis efformatam observavit *Bertrandi* in muliere gravida uterum antrosum inclinatum gerente. (Vide *Bertrandi Mem. sur l'Hydrocele*, *Mem. de l'Acad. de Chir.* T. III.) Valet in hac cystocelis specie ea curandi methodus quæ adversus enterocoelem vaginalem *Garengot*, & *Arnould* bene relinquit, scilicet vesica reposita vaginæ immittitur pessarium a similitudine cum dolii operculo nomen habens, longitudinaliter in medio perforatum, & binum genens funiculum, quo extrahi possit, nisi adhibere mavis spongiam ex aqua aluminosa expressam, qua enterocelen vaginalem ab *Hanellia* curatam fuisse supra diximus.

(B) *Cystocelæ compositæ*.

6. *Cystocoele enterocelica*; *Enterocystocoele*; *Hernia enterocystica*; *Hernia cystica enterocelica* inducens *Auctorum*; *Cystocoele* ou *hernie de la vessie compliquée d'enterocoele* *Verdier*; *Enterocystocoele*. D.

In hac specie quæ enterocoele cystocelica frequens minus est, primaria est hernia cystica, intestinalis vero secundaria, intestino saccum a peritonæo per vesicam ectopiam raptò tandem efformatum subeunte. De cætero eadem signa præ se fert ac enterocoele cystocelica, nimirum signa herniæ cysticæ, & intestinalis combinata: itaque utraque quoad speciem jungenda, licet cystocoele hic primarius sit affectus, illic vero secundarius. Pater ex his hocce herniæ generis curatio speciei istius.

Cystoceli primariæ comites sese addere possunt intestinum, & omentum simul, tunc ex utrum horumque viscerum hernia exurgit cystocoele epiplocoenterica.

7. *Cystocoele epiploelica*; *Epiplo-cystocoele*; *Hernia*

*epiploco-cystica*; *Hernia cystica epiploelica* inducens *Auctorum*; *Cystocoele* ou *hernie de la vessie compliquée d'épiploele* *Verdier*; *Epiplo-cystocoele*.

Quemadmodum in specie præcedenti cystoceli primariæ adjungitur enterocoele secundaria, sic in ista specie eidem in societatem venit omentum in suum peritonæi per vesicæ descensum similiter rapti provolutum. Composita hæc vesicæ hernia signis convenit specificis cum epiplocele cystocelica a qua ideo minus bene separaretur quoad speciem, quamvis posterior secundaria hic sit, illic vero primaria, neque dispar est curandi methodus in utraque. Si in hac specie omento etiam addatur intestinum, sit cystocoele enterico-epiploica.

8. *Cystocoele* ab *hysteropse*; *Hysterocystocoele* a *Hernia cystica uteri vagina prolapsa*, *inversis* accedens *Auctorum*; *Hernia cystica se mêlant à l'hysteropse* *Verdier*; *Hysterocystocoele*. D.

Eadem prorsus species est hæc cystocoele ac hysteropseis composita, de qua supra.

9. *Cystocoele lumbaris* *Clar.* Doct. *Brun* Lugdunensis, *Reçue Scientiar.* Societ. *Monsp.* Journ. de Med. Tom. XXI. L.

Mulier a longo tempore, præter diversâ symptomata, tumorem mollem vix fluctuans in regione lumbari antica sub hepate gerebat, quique omnibus auxiliis resistebat. *Clar.* *Brun* consultus invenit illum tumorem dextre manu tractatum evanescere, & tunc uberem urinæ fluxum excitari, unde deduxit esse cystocelæ novam speciem ex vesicæ, vel potius pelvis renum summe dilatatæ, hernia præductâ, cui appositis chirurgicis auxiliis mulier sanitatem recuperavit.

LVII. ENCEPHALOCELE Corvini Diff. de hern. Cerebri inter Haller Diff. Chir. T. II. Diff. XLVI. *Hernia cerebri*, Reissell Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obs. 115. Lechelli ibid. Obs. 153. Trevv. Comm. Litt. 1738. Hebd. 52. n. 3. Tacconii Diff. de humano monstro Bononiæ nato; Corvini ibid. *Hernie du cerveau* *Le Dran* Obs. de Chir. obs. 1. *Hernie du cerveau*; *Encephalocele*.

Est cerebri, cerebelli aut utriusque, verbo Encephali, per ossa cranii non penitus ossificatorum hiatus prorumpentis, ectopia herniæque, quam cognoscens protuberantia quoad magnitudinem, figuram, locum cranii quem occupat varia, integumentis communibus supertexta colore nativo donatis, nisi addit gangræna; in infantum capite tantum observanda, congenita, molli, indolenti, (inflammatione renitens, ac dolorifica sit) ut plurimum fluctuanti, ad circumferentiam suæ basos circulo cincta oleo digitis explorando, & ossificationis defectum includente, symptomatibus nullis gravibus stipata, saltem initio, sive parva sit, & in vertice aut lateribus capitis posita sit, gravissima vero symptomata, ut paralytism, convulsionem, soporem, anæsthesiam, &c. secum trahente occupat teneat, aut si vilius tumeat, alibi licet sita,

Cave



Cave ne confundas cum aneurysmate spurio quod in puerulorum capite sæpius per istum, aut capillitii tractionem produciuntur. ( Vide citatam *Le Dran* observationem. )

Causæ encephalocelis sunt, 1. collectio lymphæ visibilis subtilissimæ, quæ cerebrum irrorat, atque ab exsiccatione defenditur, in parte cranii interni singulari facta: hæc enim posita magis premuntur partis ossis collectioni respondentis vasa; atque exinde impeditur in ea nutritio & ossificatio, dum utraque in reliquis cranii ossibus perficitur; cedit parhujusmodi debilitas, minus resiliens; correspondente encephali portione in ossis defectum sensim ac sine sensu infinata, & superposita in protuberantiam attollente. 2. Pressio quæcumque externa major in una cranii parte, quam in reliquis; hæc enim inducitur similis ossificationis defectus. 3. Præsentem per causas jam dictas in quodam cranii loco ossis hiatus, sitamen quæcumque de causa protuberantiam nondum formata sit, hæc excitare potest partus diuturnus, difficilis, qui hiancibus foramine peregrino cranii ossibus, forte primas fert in encephalo trans ipsam adigendo.

Encephalocelis species inflammari, suppurari, sphacelari possunt; quæ cognoscuntur signis inflammationis, apoplematis, gangrænæ præleniam indignantibus: curatio eruitur ex attributa hinc morborum generibus therapæa.

1. *Encephalocèle simplex*; *Hernia cerebri simplex* Trevii Comm. Litter. loc. citat. *Hernia simplex de cerevis*; *Encephalocèle simplex*. C.

Hæc species a cerebro, cerebello, aut utroque tantum facta protuberantiam sinit signis generis insignitam, sensim, ac sine sensu incrementem, ob defectum collectionis serosæ nulla spissatam fluctationis sensu; variare potest sedem, quam occupat, & contento, quatenus nunc cerebrum, nunc cerebellum, nunc utrumque continet. *Trevius*, qui rarissimæ hujus speciei casum unus habet, vixit infantem in cuius capite super os verticis sinistræ, prope ipsum verticem & occiput, prominēbat tumor florenti circiter magnitudine, & pollicem ferme altus; sic & in altero latere similis tumor, minor licet, aderat, qui tamen sponte evanuit; non difficerat in ambitu tumoris hiarum ossis deregere; curatus fuit puerulus, adhibita methodo *D. Le Dran*. ( Vide speciem sequentem. )

2. *Encephalocèle hydropica*, *Hydro-encephalocèle*, seu *hernia cerebri compressa* Corvini, Tacconii, VVarneri, obs. chir. XI. pag. 59. *Hernia cerebri fluctans* Le Dran; *Hernia cerebelli purulenta* *serosa* Reisselii; *Encephalocèle, ou hernie de la cervelle avec épanchement de serosité*; *Hydro-encephalocèle*. C.

Hæc species, quæ præcedenti frequentior est, & a cerebro, cerebello, aut utroque fit; addita simul magna serosæ colluviei simplicis, aut pure mixtæ copia, cognoscitur protuberantia naturæ genericæ præseferente, & fluctationis sensu donata. Variat hæc species, 1. ratione loci, ut in parietali dextro ex *Le Dran* obser-

vatione, in occursu parietalium cum osse occipitali ex historia *Tacconii*, in osse occipitali ex *Corvini*, *Reisselii*, *VVarneri* exemplis; 2. ratione contenti: cerebrum includebat protuberantiam in casu *Tacconiano*, *Corviniano*, cerebellum in *Reisseliano*; 3. ratione conjunctorum; serum tantum addebatur encephaloceli in observationibus *Le Dran*, *Tacconii*, *Corvini*; serum vero ac pus ex prævia inflammatione genitum in *Reisseliano*. Hanc in ultima hacce observatione protuberantia fuit primum dura, tensa, & aperta, serum limpidissimum fudit, succedente materię purulente stillicidio, post septem hebdomadas morte commutata.

Curatur hæc species, 1. Impositis & protuberantiæ per plures dies, immo, & menses, splenis densissimis spiritibus vini, aut aqua viæ madidis, consueto corporis involvulo tantum sustentatis, per 24. horas absque nova humectatione derelictis, eo sine ut duriora facta protuberantiam, quam sustentant, leviter comprimant. Hac methodo non solum *Trevius* encephalocelē simplicem curavit, sed & *Le Dran* compressam, evanescente protuberantia, dissipato sero, & ita promota ossificatione, ut post mensem unum foramen, quod magnitudine parietalis fere mectebatur, maxime coarctaretur, & tandem post decimum penitus clauderetur. Quæ encephalocelibus parvis, paucis sero foetis, verticalibus, aut lateralibus proficit methodus, hæc manca est, si de occipitalibus aut vultus in quacumque capitis parte rumentibus agatur. In his enim uni fere curationi palliatiæ, quæ in protuberantiæ munimine tota jacer, locus tantum est: vix ac ne vix quidem radicali; licet in morbis extremis extrema quoque adhiberi possint remedia. Indicationes hic adimplendæ sunt, 1. cerebrum roborare, a sero nimio expurgare; 2. lympham in protuberantia collectam dissipare; 3. partes emotas ab externis injuriis defendere repositas; 4. ossificationem hiatus promovere; 5. protuberantiæ cystides contractas reddere, aut removere; 6. symptomatibus, ut paralyti, convulsivis, exoriationi, inflammationi, gangrænæ imminenti obviam ire. Vide *Trevium* loc. supra cit. & *Salemannum*, *dissert. de tumor. quibusd.* ser. Notabis circa indicationem secundam, si medicamentorum tum extus, tum intus adhibitorum ope evacuari lymphæ nequeat, de inhibendo provide aeris accessu, & de cavetandis cerebri, & ejus propaginum læsionibus sollicito, lympham apertura facta paulatim esse tibi educendam, nisi promptiorem evacuationem jubeat imminens gangrænæ periculum; quamvis apertionem ut internecinam dissuadeant viri nonnulli in arte gravissimi: aut minori ratione ligaturam sensim in dies contringendam adhibere malint alii. Notabis circa tertiam indicationem partes emotas facilius ab aeris injuriis defendi, si apertura parva fuerit, & lente ac successively lymphæ educatur; si ad aperturam majorem faciendam coegerint rerum circumstantiæ, pressio sine debita linea minui regumenta,

& vincula chirurgica; lymphæ evacuatio, lenta præsertim, partium retrocessioni favere potest; quæ si non contingat, ad eam impetrandam tentanda est *D. L. Dran* methodus; an ne ea quidem proficiente, uniuersi & auferri potest pars cerebri emota, ac retrocedere nescia?

3. *Encephalocèle* Lechellii, Eph. Natur. Cur. Dec. II. Ann. II. obs. 153. *Hydro-encephalocèle spinæ bifida mixta*; *Hydro-encephalocèle*, ou *hernie du cerveau avec épanchement, compliquée de spinæ bifida* C.

Vidit *Lechellius* recens natum duabus instructum protuberantiis; altera in medio occipitis sita, juglandis magnitudine æquante, molli, pilis obrita; altera in spinâ dorsi posita, & ovi magnitudine donata; in hydrocephalum completum incidit tandem puerulus, quo & vivis sublati est. Cadaver apertum exhibuit lympham protuberantias replentem, spinam bifidam in lumbis, & foramen peregrinum in occipitali osse. Curatio intelligitur ex specie præcedenti.

*Obsv.* 1. Si quis cum *Cervinus* velit suben-  
*cephalocelis* genere spinæ bifidæ species cogere, is me non habebit reluctanter: si trans foramen peregrinum in ossibus cranii præsens, a lymphâ collecta adigantur solæ cerebri membranæ, cerebro ipsum non emoto, an morbus ad encephalocelam referendus venit? An sub suturarum cranii diastasi contingit quandoque encephalocèle hydrocylica?

*Obsv.* 2. An condendum est pneumonocelis genus? Hoc statuere videtur observatio *Foubertiana* in *Temo primo des Mem. de l'Acad. R. de Chir.* legenda, & iunxit clarissimus *Gunzius*.

**LVIII. HYSTEROLOXIA;** *Obliquitas uteri* *Roedereri* Elem. art. obstetric. §. 449. 507. *Levret.* observ. sur les accouch. *Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri* *Deventer* cap. 46. 47. 48. *Ruysschii* observ. XCVIII. *Inclinatio, obliquité de la matrice*, *Sabatier* Mémor. de l'Acad. de Chir. Tom. III. &c.

Est uteri, sæpius gravidi, & contra quam in hysterocèle sit, abdominis clausuræ contenti situs in obliquum aberrans; quem cognoscere, axi pelvis legitime constituto, ex mutata orificii uterini directione, quod exploratum nunc anteriora, nunc posteriora, nunc latus alterutrum respicere deprehenditur, ne symptomata hæc vel illa omittam in speciebus variis diversa; diagnosim genericam speciali robore.

1. *Hysteroloxia anterior*; *uterus antrosum inclinatus*; *uterus in partem anteriorem obliquus*; *inclinatio uteri* *Audoum*; *venter propendulus* *Latinozorum*; *Matrice tombée en avant* *Deventer*; *inclinaison de la matrice en avant*; *voûtre en besace*. L.

Debetur hæc species insertioni placente, non in fundo uteri, sed ad partem ipsius anteriorem factæ, ac debilitati musculorum abdominalium. Cognoscitur abdomine supra os pubis propendente, atque magis in gravidæ ledentis femoribus

incumbente, hypochondriis minus tenis ac repletis, orificio uteri solito altiori, difficillime, partim, & quandoque non nisi integra manu in vaginam immissa, explorando, os sæterum directe fere respiciente, digitum difficile, & solum fere flexum admittente; urina majori in gradu ob vesicam compressam suppressa, vel contineri impote; tenesmo molesto, tractionis sensu in pelvi, summa lucedine, autetiam situm mutandi difficultate, partu difficili, leuto, doloribus spuris, frequentioribus, vehementioribus stipato, capitis fontis vertice ossi sacro obverso, occipite ad osium depulso, si recte situs sit fœtus, liquoris amnii vesica oblonga, gracili, botuliformi, iusto citius rumpenda; cuius ruptionem assiduum aquarum stillicidium excipit. In hac specie, graviditatis tempore, abdomen suspensorio sustentandum, lecto diutissime adigenda mulier: instante partu ex gravissimis *Auctoribus* obstetricatio instituenda sub decubuo corporis sita, pelvi elata, thorace demisso, abdomine interea ope mantilis pluries complicati, & a duobus ministris genarum ac validis sustentati elevato: ex *Levret* vero facillius succedit partus, si gravis genibus ac cubitibus iuniat. Plura vide apud *Deventer*, *Levret*, *Roederer*, aliosque.

2. *Hysteroloxia posterior*; *uterus retrorsum inclinatus*; *uteri reclinatio* *Audoum*; *uterus in partem posteriorem obliquus* *Roederer*; *Matrice renversée contre les vertèbres* *Deventer*; *inclinaison de la matrice en arrière*. L.

Hanc speciem negat *Sabatier*; admittunt cum non paucis *Deventer*, *Levret*, & *Roederer*. Pendet, præcipue præsentē placente insertionē ad partem uteri posteriorem, ab ossi sacri eubere symphyse osium pubis nimis vicino, & lumborum vertebriis in posteriora flexis, concurrente sæpius pelvis angustia. Cognoscitur tumore abdominis altius ascendente, minus prominente, magis complanato, vomitu versas graviditatis terminum, crebriori & majori, dyspnœa, inspiratione uempe parva & frequenti, capite ossibus pubis inhzrente, urethram comprimente, cum lotii suppressione, pubis regione tensa, elata, acriter a pressione doleute, uteri orificio facile attingendo; in inferiora directe respiciente, immo ex *Deventer* ad anteriora converso, & margine inferiori tantum explorando, tandem fonte pulsantē ad os uteri delatente. Obstetricationem in hac specie adhibendam vide apud *Roederer*.

3. *Hysteroloxia lateralis*; *uterus in latera obliquus* *Roederer*; *uterus lateraliter inclinatus*; *obliquitas uteri proprio dicta* *Audoum*; *Matrice inclinée sur les côtés* *Deventer*; *inclinaison latérale de la matrice*; *obliquité de la matrice*. L.

Variat hæc obliquitas in latus dextrum & in sinistrum; variat etiam quatenus nunc cum uteri intorsione combinatur; nunc non combinatur. Huius speciei causam præbet sæpiissime placente non in fundo, sed ad latera uteri facta insertio; præbere & etiam potest ligamentorum in alterutro latere debilitas. Huius speciei signa sunt



sunt abdomen in medium apicem non prominens, sed subcomplanatum, depressione obliqua longitudinali, aut non media scilicet cum tumore a depressionis linea hinc inde gemino; protuberantia dura a muliere in alterutro abdominis latere a primis graviditatibus mensibus perlentata, semper augecens, fixa, ventre reliquo magis dolorifica, motiones factus in latere obliqui opposito manifestiores, crebrioribus; quandoque extremitatem ejus lateris, cui moles uteri incumbit, stupor, claudicatio, varices, tumor glandularum inguinalium, femoris in ipso partu erociatus, & similia; orificium uteri solito altius, difficile attingendum; margine inferiori tantum explorandum, lateris obliqui oppositi respiciens; urinae difficultas plus minus magna; partus difficilis, tardigradus, doloribus spuriis crebrioribus, vehementioribus stipatus; caput foetus vaginæ utero transversum adum, pelvimque decussans, vertice ossibus pubis, illi, necnon ischiis, si in pelvis cavitatem decidat caput, obverso appellente; liquoris amnii vesica oblonga, gracilis, botuliformis, iusto citius rumpenda, subsequente assiduo aquarum stillicidio; funiculi excidentia quandoque contingens; brachium facile procidens, ulteriorem capitis descensum omnimodo impediens; collum denique in vaginam depressum, extensum, cum eiorio factus morte, malum non inhihet decubitus assiduus in partem obliqui oppositam; experientia teste, Circa ea quæ in hac hysteroloxia specie peragenda sunt, vide *Deventer* & *Leuret*, *Rosdager*, aliosque.

4. *Hysteroloxia citra graviditatem; lateralis uteri non gravidi inclinatio, seu obliquitas* Ruysschii obs. XCVIII. *Inclinaison latérale de la matrice, ou obliquité de la matrice sans grossesse.*

Nonnunquam exploratione comperit Ruysschius citra graviditatem in lateris hoc vel illud torqueri uterum a situ naturali aberrantem in ventribus, quæ dolorem hypogastrici, continuum mingendi desiderium, & tenebrarum frequentissimum querebantur. In cadavere autem uterum in lateris sinistram inclinatum semel vidit. Hanc native posituræ mutationem a prava conformatione oriri quandoque, neque semper accusandam esse graviditatem cum ipso credi potest.

LIX. PARORCHIDIUM; *Testiculorum serior descensus vel retractio* Felici Plateri Mantiss. Observ. Ambr. Paræi Lib. VII. Thom. Bartholini Hist. Anat. Morgagni Advers. IV; Dionis Oper. de Chir. Dem. IV; Quælmaltzii inter Halleri Disput. Anatom. T. V. Dissert. I; Verdier sur la hernie de la vessie Mem. de l'Acad. R. Chir. Tom. II; *Déplacement des testicules; testicules dans le ventre, dans l'aine, près de l'aine retraction des testicules, intrusion des testicules.*

Est testiculi unius, vel utriusque, cujus post natiuitatem sedes naturalior scrotomem sita, in alienum aberrans; quam fetus natus in utero cognosces scroti exploratione, testiculo

hinc, vel utrumque vaeul, necnon scde quam ambo vel alteruter occupant: porro vel serius descendens testiculus hic, ille, aut uterque nonne abdomine occultatur, nullibi conspicuus, nunc in annulis exuberat, nunc infra hæret ipso proximus, vel nativum jam nactus locum viam emensam remeat ad annulos retractus, aut intro pressus.

1. *Parorchidium a sero descensu - serior testiculorum descensus* Fel. Plateri, Paræi; Thom. Bartholini, Dionis, Morgagni, Quælmaltzii, Verdier loc. cit.; *Testicules dans le ventre, dans l'aine, près de l'aine; descensu tardive des testicules.* L.

Variat tristariam hæc species, vel enim abdominis cavo delitescit testiculi nulla sui præbentes indicia; vel in annulis monticulorum instar extorberant; vel ipsi proxime subiacent magis adhuc prominentes. Hujus speciei signa sunt defectus testiculi unius, vel utriusque in scroto, in quod nunquam antea penitus provolutus est, necnon ipsius præsentia in variis locis modo memoratis. Notabis varietatem hujus speciei secundam cum dolore esse sæpe conjunctam, & a testiculorum descensu distingeri. Testiculi quandoque, ubi semel inventi sunt, ibi resistant; ut plurimum tamen temporis successu, & etiam non raro statim a natiuitate, in scrotum descendunt, patriis laribus valde licentes. Si diutius post natiuitatem hanc suum descensum morerentur, commotionem in ipsis excitant ut plurimum pubertatem adveniens, falsos validos, venus præmatura, & similia. Varietas prima naturæ committenda est; secundæ competunt applicata emollientia; tertiæ decet expectatio. Cave ne annuli abdominalis per testiculi descensum dilatiati apertura patentior herniæ viam subleant. Cave etiam ne protuberantiæ in varietate secunda & tertia ad annulos observandæ subligaculum apponas, & emplastra roborantia, herniam male accusans: quod si jam ab imperito Chirurgo factum invenias serius vocatus, præsto tibi sunt remedia tum externa, tum interna, quibus inflammatio immixta, aut facta depellitur, & lenitur dolor.

2. *Parorchidium a retractione testiculorum retractio*, Suberini, apud Soleanandum sect. IV. conf. 18. Quælmaltzii loc. cit. *Retraction des testicules.* L.

Retractioni testiculi unius, aut utriusque ex scroto in inguinis ansum præbet calculus renum ac vesicæ, incensus citator in iis qui innotibus instituendis minus assuescidi humum celeriori pede statim signant, urinamque magis ac diutius cohibita, &c. Retractionem testiculorum ab hac ultima causa in puero vidit Quælmaltzius stipatam doloribus exquisitissimis, scroci tanta contractione, ut nullum adfuisse crederes, protuberantia in inguinibus dura, dolente, a testiculis efformata, tandem incensus impotentia, quam emollientibus applicatis, & præscriptis antispasmodicis curavit. Retractionem testium a celeriori gressu ut præsentem quies sanant, ita futuram præcaveat incensus primum moderatur. Quoad primam varietatē, vide *Calculi liberatio* A.

3. *Parorchidium ab introfessione, testicularum in inguen intruso* Solenandri Conf. sect. IV. conf. 13. *Intrusion des testicules dans l'aine, introfession des testicules.* L.

Pueri subinde manuum tractatione nunc hunc, nunc utrumque testem sursum attolunt, & premendo inguini inferunt, ut ibidem aliquandiu inhaerent cum valetudinis ut plurimum dispendio, nisi paulo post pristinae tedi restituatur; ut omitam peritonæi relaxationem, ab intrusione hæcè indutam, quam facile hernia dein excipit. Virumque succus durior contra ephippii partem anteriorem ita allisit, ut testis alter gravi pressione contortus, in inguen sinistram introduceretur, nunc nullo modo reduci potuit. Supervenit ibidem tumor, dolor; graviter per plures dies eques decubuit; tandem augecente febre e vita excessit, priusquam inlitteretur scio-celotomiae similis, qua mali sanationem modentum nunc promittebat, aperto cadavere inventus testicularis sub peritonæo inter abdominales musculos ita inhaerescens, ut neque ipsis conatibus, neque adhibita etiam sectione integra valetudine inde auferendus videretur; vide *Solenandrum loc. cit.* Narrat Auctor modo memoratus casum viri qui a febribus diversis curatus in testiculi retractionem incidit. Ut exclusum dimitteret testiculum, hunc magno nisu & labore manuum frictionibus exercuit; unde in parte graves dolores excitati sunt. Restitito post dies circiter 12. testiculo, cum ex enjusdam fusu oleum terebinthinum per biduum illineret, tantus calor & dolor in ea parte excitatus est, ut ab inunctione abstinere cogeretur, adhuc testiculum illum percepit altero longiorem, magis propendentem, debiliorem, flaccidum, & cremasere resolutum non retrahendum; an hoc testiculi vitium quartam constituit parorchidii speciem?

*Observatio.* Hyteroloxia & parorchidio non continentur omnia aberrationum genera; situm etiam nativum mutat, quin tamen abdomen in herniam elevet, stomachus deorsum provolutus, & in pectus actus; (ultimam hanc aberrationem herniam stomachi internam vocat *Kirshbauminus*; vide *Haller. Disp. Chir. T. III.*) Mutant eodem quoque modo lien, hepar, intestina; aberrat adhuc foetus in conceptibus intrauterinis, prædictorum viscerum, & aliorum, si quæ sint, aberrationes, memoratas potius quam sufficienter describas, aut optis relinquimus concutiendas, in debita genera conciliandas, & generico donandas characteres.

LX. EXARTHREMA Græcorum, *Exarthrosis*, *Pararthrum* eorum. *Luxatio*, *subluxatio*, *distorsio* Heister. Infr. Chir. T. I.; Boerhaave aphor. comment. T. I. Gorter. Chir. repurgat. cap. VI. Platner. Instit. Chir. §. 1090. 1213. *Luxation*, *entorse*, Petit Malad. des os, T. II. Col. de Vilars Chir. T. V. de Lafaye Princ. de Chir. Duverney Malad. des os, Tom. II.

Est separatio contiguis in osium articulis diarthrosis, non vero immobiliter combinatis, quam cognosces 1. impotentia ad motum parti luxatæ native competentem partiali vel plenaria, nec sensibilitati subjecti dolorem a motu sibi metuentis tribuenda, nec alteri morbo; 2. mutatione figuræ, & posituræ nativam a mala conformatione, & ab alio morbo non pendente; 3. dolore vario, ut plurimum observando, aliunde non repetendo; 4. protuberantia ad novam partem occupatam; 5. cavitate ad partem ab ossis derelictam; 6. musculorum ut plurimum tensione majori in parte luxationi opposita; 7. conversione alterius ossis extremi in partem luxationi oppositam sæpius observanda; 8. accretione, vel prolongatione partis luxatæ, (vix sensibilitate mutatur longitudo in exarthrematibus incompletis); 9. repositione nunc difficili, difficillima, impossibili; nunc vero facili.

Principia exarthrematis sunt violentia externa, ut ictus, lapsus, saltus, nissus, &c. contractio musculorum voluntaria, vehementior, aut convulsiva, musculorum eorumdem paralysis, ligamentorum, capsularum articularium relaxatio, debilitas, elongatio nimia, dialysis, intumescentia, collectio synoviae lentescens, indurata in articulum cavo; intumescentia acetabulorum, eorumdem protuberantia a callo, excrecentia intus enaris; tumor glandularum mucilaginosarum scirrhoueas, capium ossis intumescentia, apostema articulare.

Exarthrema dividitur in simplex, compositum complicatum, in incompletum & completum, dici etiam potest obliquum, vel directum, pro ut os luxatum respectu ad situm nativum obliquo modo se habet, vel merus est juxta nativam articuli directionem ejus descensus. Alia causam agnoscunt externam; internam alia; hinc specierum divisionem ducimus.

Exarthrematis curatio sita est, 1. in partis luxatæ repositione; 2. in ejusdem in loco nativo retentione; 3. in symptomatum dissipatione. Primum obrinetur extensione, contra-extensione, impulsionem, quæ manu, mantilibus, laqueis, machinamentis peraguntur. Repositam probe fuisse partem cognosces sono obscuro sub repositionis negotio percepto, figuræ, posituræ, ac longitudinis alienarum mutatione in legitimas, ac sanas; doloris remissione integra motus membri restitutione. Repositionem citissime instituendam differre cogunt partis intumescentia, inflammatio, nisi hæc faciat os luxatum.

convulsiones, fractura articulo vicina. Alteri prospicitur quiete, fasciatio accorata, sita partis luxatæ naturali. Circa bina hæc puncta, plura vide apud *Autores citatos*, quæ brevitas ergo prætermittimus. Symptomacibus occurrit modo vario, accidentium scilicet indoli accomodato.

(A) *Exarthremata a causa externa.*

1. *Exarthrema, luxatio simplex, exarthrema completum simplex a vi externa* Auditorum citatorum, ut Petit cap. 1. Col. de Vilars art. X. Duverney cap. 1. *Luxation complète & simple par cause externe.* D.

Variat hæc species, 1. parte luxata, quæ nunc est humerus, nuocarpus, digiti, femur, maxilla inferior, &c. 2. regione luxationis, quæ modo fit superne vel interne, modo interiorum aut exteriorum: debetur violentiæ externæ; subito accidit, & fere semper non nisi in enarthrosis, aut arthrodii, vix in ginglymis, his adde signa generica 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. dolorem vividum in instanti, quo luxatio fit, & diu post eam factam, motum versus unam partem minus difficilem quam versus alteram, & repositionem egre obtinentam. Signa specialiora pro parte varia, completa, luxata, observanda legantur apud *Auctores citatos*. Curatur hæc species repositione, splenio simplici resistentibus madido, quiete, situ partis naturali, & fasciatio plas minus firma pro luxationis renovandæ periculo, partis incumescencie, dolori, febrî, si supervenerint, obviam itur per venæ sectiones, narcotica, &c.

2. *Exarthrema subluxatio simplex; Exarthrema incompletum simplex; confusum, a vi externa* Auditorum, ut Petit, Col. de Vilars, Duverney loc. citat. *Luxation incomplette & simple par cause externe.* B.

Variat ut præcedens hujuscemodi species, 1. parte luxata; 2. luxationis regione, violentiam externam pro causa pariter agnoscit, subito fit, vix alia observatur in ginglymis, locum etiam habet, sed rarius, in enarthrosis & arthrodii, his adde signa generica 4. 5. 6. 7. nec non impotentiam ad motum versus partem quamcumque æqualem, dolorem viridiorum, majorem articuli protuberantiam, vix mutatam activam membri longitudinem, repositionem ceteris paribus minus difficilem quam in præcedenti. Curatio intelligitur ex prima specie.

3. *Exarthrema diversum, Exarthrema incompletum instantaneum a vi externa* Auditorum, ut Petit T. II. cap. 14. Duverney T. II. cap. 3. &c. *Exorse.* B.

Pugacissimum hocce exarthrema derepente fit, & a violentia externa dicitur originem: cadit in enarthroses, arthrodias, & ginglymos, cognoscitur dolore acuto, intumescencia articuli calida, difficultate ad motum statim exigua, quandoque, mox magna, ossis capite locum nativum retinente, atque ita immutata membri figura, ac positura. Inchoari debet curatio

repercussione statim a facta distorsione tantum applicanda; quæ si non sufficiant, aut malo non satis recenti applicari nequeant, præsidio erant quies debita, dieta tenuior, venæ sectiones iteratæ, clysmata, topica varia, ex emollientibus scilicet, laxantium, anodynorum familia deprompta, si urgeat dolor & inflammatio; ex resolutivum vero primo miorum, dein potentiorum genere erant, si modico gradu vigeat dicta symptomata: tonicis spirituosissimis, solventibus, aquis & lulis thermalibus claudenda curatio.

4. *Exarthrema complicatum; Luxatio complicata a vi externa* Auditorum supra citatorum; *Luxation compliquée par cause externe.* D.

Variat hæc species parte luxata, & luxationis regione, accidentia cum quibus complicari potest exarthrema hocce, sunt vulnus, fractura, ecchymoma, convulsio, paralysis, inflammatio, apostoma, gangraena, streptitus, &c. Pendet hæc species a vi externa, subito fit: signa præ se fert exarthrema 1., & 2., prout completum, vel incompletum est: his adduntur signa affectionibus complicatis propria alibi legenda; curatio ex speciebus 1., & 2., nec non ex peculiari accidentium memoratorum therapia intelligitur. Longius excurreret hæc species, si vitiis singulorum exarthrematum mixtum pecuniariis hic maneret curatio, quam idcirco ab Auditoribus sub genere allegatis peti volumus.

(B) *Exarthremata a causa interna.*

5. *Exarthrema a convulsione: Luxatio a musculorum contrahitione convulsiva, vel spasmodica* Auditorum, ut Petit, Col. de Vilars, la Faye, Duverney, &c. *Luxation causée par la convulsion.* D.

Variat hæc species parte luxata, & luxationis regione. Exarthrema hocce in nullam aliam causam refundendum præcedunt, atque inducunt validæ convulsiones, spasmi, crampi, quibus caput ossis ex acetabulo expellitur. Dolorificum est cum incipit, cum fit, & cum factum est, difficillime reponitur, extensionibus ad repositionem necessariis summum, quo ex cruciat, dolorem adhuc augmentibus: his adde signa generica, atque ossis obliquitate. Indicationes curatoris sunt caput ossis repõnere, repositum in acetabulo firmare, & interim convulsioni occurrere, quod pro varietate causarum, quibus ea natales debet, modo vario perhibetur. Vide *markes convulsivos*.

Ex hæc specie intelligitur exarthrema, quod debetur contrahitioni musculorum voluntariæ quidem, aut vehementiori, sic oscitatione majori luxari potest maxilla inferior, &c. Patet curatio ex specie prima.

6. *Exarthrema a paralysis; Luxatio a musculorum paralysis* Auditorum, ut Duverney, &c. *Luxation causée par la paralysie.* L.

Variat hæc species parte luxata, simplicitate, cui nemps solitaria est paralytis luxationem excitans; & complicatione, quando nimirum paralytis miscetur ligamentorum laxitas, signis genericis,

Et 2. adde partis emaciationem, dolorem ut plurimum levem, repositionem facilem; difficultatem partis repositæ; sponte, nisi detineatur, statim iterum luxandæ contentionem, adhibita etiam legitima fasciatione, directum membri descentum, ipsius longitudinem majorem, caput ossis in suo acetabulo vacillans, ab eo recedens, & spatium vacuum inter seipsum, atque acetabulum reliquens, majorem nullam musculorum tensionem in una parte quam in altera, nullam pariter alterius ossis extremi conversionem in partem determinatam. Varietas solitaria & varietas complicata gradu tantum inter se differunt. Celebrata repositione, & injecta accurata fasciatione, paralysis remediis congruis ex morborum paralyticorum therapia petendis est oppugnanda. Vide *Duvernoy*: his addenda venit speciei subsequenti curatio.

7. *Exarthroma a desmochaunoss; luxatio a foras ligamentorum laxitate* Audouin, & Duvernoy. &c. *Luxation par le relâchement des ligaments*. L.

Variat hæc species parte laxata: pendet a seto luxuriante, & ligamenta laxante citra musculorum paralytum; gradatim fit; exulat partis emaciatio; adfuit cum signis n. 1. 2. 4. 5. 6. 7. memoratis dolor, intumescencia articuli, accuratio membri: non minorem vim exigit ad sui repositionem, quam quæ sit a causa externa, & fasciatione validiori indiget, ut debite contineatur: reducta pars nativam sedem etiam absque fasciatione servat quando quiescit, motu edito statim luxanda. Curatur repositione, fasciatione accurata, hydragogis, sudorificis, laconico, diureticis, topicis spirituosis, aromaticis, stimulantibus, aquis ac luris thermalibus, vapore alcoholis accensi, sufficibus aromaticis, tonicis, vesicatoriis, diætâ excitante; diaphoretica, diuretica.

Hinc intelligitur exarthroma a ligamentorum debilitate morbos diuturniores excipiente, stimulantibus, analepticiis, spirituosis, unctionibus mercurialibus post repositionem & fasciationem debitam curandum; intelligitur & etiam exarthroma a ligamentorum diabrofi per materiam purulentam facta sobolescent, quod sanationem vix videtur posse admittere; neque obsecrum est exarthroma, quod ligamentorum debilitati nimiam ipsorum elongationem excipienti natalis debet.

8. *Exarthroma a desmophlegia; luxatio a phlogodes ligamentorum intumescencia* Duvernoy loc cit. pag. 21. 60. & 62. *Luxation par le gonflement des ligaments*. L.

Locum habet ex *Duvernoy* in femorum ac genuum ligamentis, quæ ut plurimum per deflexionem aut decubitum intumescita, cavum articuli impleant, & caput ossis extrudunt cum dolore intenso, sub singula articuli motione augendo cum articuli prominentia majori, partis indifferentiæ ad motum in sensum quemcumque exercendos; eiusdem inflammatione, variisque aliis symptomatibus. Curatur auxiliis antiphlo-

gisticis celeriter adhibitis, phlebotomia præsertim, topicis emollientibus, anodynis; quibus dolore sedato succedent resolutiva: his adjuncti debent epispastica, & cauteria ad majorem resolutionem impetrandam.

9. *Exarthroma passivum; luxatio a synovia lentescens* cepia Audouin citatorum; & *Luxation par l'abondance de la synovie*. L.

Variat in hæc specie pars laxata a synovia spissiori & exasperata, non vero copiosiori, ætæui ac serosiori, quæ speciem septimam potius produceret, extruditur caput ossis, quod licet ad acetabuli margines & intra, repositione tentata, de facili admoveas, nusquam tamen in hujus cavum intrudere penitus poteris, resistentiam persistentem insuperabilem; & strepitum audies qualem edit arghilla mollior pinata; exulat dolor; eminet articulus in omnes sensus qui native ipsi competunt & movendas; in ginglymis directus fit descensus, ac prolongatus, præsentibus signis genericis 1. 2. 4. 5.; absentibus vero 6. & 7.: in arthrodii autem & enarthrosis elevatur os, ac decuratur membrum vigentibus signis genericis 1. 2. 4. 5. 6. 7. Curatur hæc species; 1. repositione, qua quantum fieri potest in acetabuli cavum caput ossis intruditur; 2. fasciatione valida caput idem in cavi fundum urgente, ut synovia ad circumferentiam expressa, & sic magis externa facta melius pateat actioni solventium ac discutientium parti imponentorum; 3. agitatione diuturna capitis ossis in suo acetabulo sub singulis deligationibus præstanda; ut scilicet velut pistillo synovia conqvascetur, attenuetur, & sic perpirationi, aut resorptui idonea reddatur.

Hinc intelliges hoc exarthroma, quod idem, lapsum in articulum validiores serius excipit, a synoviae lentescens collectione potissimum pendens; scilicet nulla facta istius, aut lapsus tempore luxatione, impulsu tantum violentis ossis capite in acetabulum, contunduntur partes intra ipsum hospitantes, subsequente obstructione, inflammatione, apostemate, & præprimis synoviae coactione, qua laxatis ligamentis, distensa capsula, temporis successu ossis caput tandem extruditur; casus hic mature dignosceendus est, ut nempe prævertatur luxatio; postquam contigit, nulla arte tollenda. Vide *Audouin* citator, & *Petion* præprimis de *la luxation de la cuisse à la suite d'une chute sur le grand trochanter*.

10. *Exarthroma tephacum; luxatio a synovia coherescente* Cod. de Villars, Duvernoy, &c. *Luxation par la concrétion de la synovie*. L.

Variat hæc species parte laxata; observatur in rheumatismo articulari, & arthritide; cognoscitur tardigrado mali incessu, doloris absentia; repositione impossibili, quamvis ad co-phum usque satis facile adducatur ossis caput; strepitu, qualem edit corpus solidum percussum, percepto, dum tentatur repositio; eminentia articuli, mobilitate ejusdem in omnes sensus qui native ipsi competunt. Vix ac ne vix quidem sanationem admittit hæc species: *tem-tari*.

tati tamen possunt, ut repositioni via sternatur, medicamentis varia, quæ materiem concretam emolliunt, solvunt, ac ligamenta & tendines roborant. Vide *Duverney de l'ankylose*, II. p. 350.

Hinc elucescit diagnosi ac curatio, si quæ sit, exarthrematis a callo in acetabuli cavitate genito, ab excresecientia ibidem enata, ab intumescencia glandularum ejusdem mucilaginosarum scirrhoua: intelligitur etiam exarthrema tophacea ligamentorum induratione, quæ memorata admittit medicamentorum genera. Vide *Duverney T. I. cap. 1.*

11. *Exarthroma exofseficum; luxatio a capitulo ossis & acetabulum intumescencia* Petit, Col de Vilars, Lafaye, Duverney, &c. *Luxation par le glissement des os & des cavités des os.* L.

Variat hæc species ossis luxato, parte intumescita, quæ nunc ossis caput tantum, nunc acetabulum dætaxat, nunc vern utrumque est; necnon causa memoratam intumescenciam, & exinde luxationem inducente, quæ modo virulenta est, nimirum rachitica, scrophulosa, syphilitica; modo autem simplex, ut vita in locis uliginosis, paludosis; minerarum plumbi, mercurii, fodicatio. Cognoscitur hoc exarthrema visu & tactu; scilicet capita ossium intumescere, ipsorum acetabula magis patere, complanari, deleri, & inter utraque congruam exalare proportionem sensum percipitur; hinc tardigrade increfcentis mirum in modum tandem prominere articulus, vix tamen mutata utplurimum ob rarissima exarthrematis hujusce completionem membri figura; canislarum varietatis accommodanda venit curatio in casu incompleto quandoque impetranda. Intumescencia rachitica remediis rachitidis; scrophulosa vero remediis scrophulæ appropriatis impugnanda venit; syphiliticæ competunt unctiones mercuriales; aere sicco, calido, regime simili hydragogis; & aquis præsertim thermalibus depellere convenit intumescenciam, quam loca uliginosa, paludosa fecerunt. minerarum fossoribus litum mercurialem proficuum esse posse ex eo concludit Petit, quod in anatore, intumescencia ossium a mercurio inducitur, & cum exarthremate fere completo exinde enato conjuncta, laborantem hydragryi ope sanaverit.

*Nota.* Exarthrema hereditarium, vela prava conformatione ex utero allata post nativitatem inducunt consulto omittimus, ex memoratis speciebus intelligendum. Vide *Col de Vilars & Andri Ortophédia.*

**LXI. DIASTASIS** Græcorum; *ossium recessus* Latino; Petit T. II. chap. 8. & 13. Lafaye Princ. de Chir. pag. 474. Duverney T. II. ch. 1. & 5. *Diastase, écartement des os.*

Est ossium, cartilaginum immobiliter combinatum, seu per raphen, harmoniam, synosteocondriem, synchondrosium unitorum, aut per syndesmosim sensibilibus immobilibus connexorum

separatio, seu recessus ab invicem, partialis vel totalis; quem cognosces 1. spatio vacuo inter partes combinatas, symphyli absque medio, vel symphyli cartilaginea, aut ligamentosa subimmobili (si fractura vel ruptio adfuerit) observando, vel spatio non quidem vacuo, æst nativum superante inter partes synchondrosi, vel syndesmosi immobili connexas, si exulans fractura aut ruptio, pariter observabili; 2. mutatione posituræ, in dictis partibus ad invicem, obliquitate respectivam, situm relativum alienum ipsis inducens, 3. doloris præsentia; si recessus subito, aut saltem prompte fiat; ejusdem vero absentia, si sensum ac sine sensu contigerit.

Diastasis nunc simplex est, nunc vero complicata cum fractura, inflammatione, &c.

Principia diastases sunt violentia externa, ut ictus, lapsus, &c. hydrocephalus, polypos narium, graviditas; protuberantiæ quævis interiorum enatæ, ossa unita extrorsum agentes; partus, syphilis inveterata, scorbutus, inæquale cartilaginum ossa necientiam incrementum; pondus partium symphyim hinc trahens, pressio, situs; latus ossium unitorum alterum assidue urgentia, constants musculorum nonnullorum hyperstonia, Diastases ergo alie sunt a causa externa, alie vero ab interna; hinc sunt specierum divisio.

#### (A) *Diastases a causa externa.*

1. *Diastasis violenta; luxatio, diastasis symphyum cum vel sine media a causa externa* Auditorum, ut Petit, Col de Vilars. T. V. p. 227. Duverney; *Diastase ou écartement des os par cause externe.* B.

Variat hæc diastasis symphyseos separatæ specie, quæ nunc est raphica, nunc harmonica, nunc synosteocondrica, modo syndesmosica subimmobilis. Violentia quævis externa, ut ictus, lapsus, &c. huicæ osteoparotopice ansam præbet, hujus exempla sunt suturæ cranii, ossa nasi quadrata per vim externam separata, coccyx, appendix xiphoidea per ictum: lapsum interiorum luxata, fibula inter incedendum a tibia violenter recedens, &c. Diagnosim habeto ex signis genericis, & causa allegata. Varietas hujusce speciei raphica in puerulis citra fracturam locum habere potest; in adultis cum fractura semper complicatur; hanc a diastasi secunda potissimum distinguunt, dolor, & causa procacior; neque inter varietatem harmonicam, & diastasi tertiam aliud discriminis intercedit, necnon varietatem inter synosteocondricam, & diastasi quartam. Varietas synosteocondrica nunc complicatur cum fractura cartilaginis, nunc vero citra fracturam hujusmodi evenit: in hoc ultimo casu, si pessumdetur cartilaginis & ligamentorum elater, constans est in symphyli recessus; si vero salva remaneat eorumdem elasticitas, recessus est instantaneus, partium durarum synchondrosi unitarum

rum vera distorsio dicens: vide *Diastrum sextam*. In fibula locum habet varietas syndesmofica; in hanc cadunt quaecumque de synchondrofica modo diximus, si cartilaginis hic loci deficientis fructuram demas. Curatio sita est in partium semotiarum approximatione, ac restitutione, id eundem fasciatione, tandem in symptomatum ablatione: quæ omnia ex exarthrematis speciebus a causa externa inductis intelliguntur. Vide *Antiores citatos*.

(B) *Diastrum a causa interna.*

2. *Diastrum raphicum* *diastrum*, seu recessus suturarum cranii Auctorum. ut Duverney, &c. *Ecartement des sutures*. L.

Adoritur hæc species pueros hydrocephalo interno laborantes: peodet a sero collecto, mollia cranii ossa separante: cognoscitur charactere generico, symphyseos ossium separatorum specie, & signis hydrocephali, cuius prognosim sequitur; ac therapejam admittit. Si hydrocephali tollendi aliquæ daretur ratio, locus esset gradarius ossium separatorum approximationi, & fasciationi congruæ: id dies sensim strigendæ.

*Diastrum harmonice*, *diastrum ossium nasi* Levret Obf. sur les polypes; *Ecartement des harmonies*. L.

Huiusce speciei varietatem a polyponarium inductam refert Levret: id ea ossa nasi quadrata per polyponarium sensum incrementum extorsum adta, atque ab invicem separata fuerant, diagnosis varietatis Levretianæ eruitur ex charactere generico, ex symphyseos ossium separatorum specie, & ex polyponariæ præsentia. Indicationes curatoriæ sunt polyponum tollere, (Vide Levret loc. cit.) ossa separata approximare, restituere, ac firmare; hinc erue *diastrum harmonice* allorum diagnosim, ac therapejam.

4. *Diastrum synchondroica*, *diastrum cartilaginis narium* Levret Obf. sur les polypes, p. 246. *Ecartement des synchondroes*. L.

Huiusce *diastrum* varietatem a polyponarium facta apud laudatum Auctorem etiam legitur, cartilagine nempe narium per hanc excrescentiam a suo loco dejecta. Notabis symphysem quæ os & cartilago, non vero ossa, ad invicem ope cartilaginis intermediæ uniuntur, nobis sub nomine *synchondroica* Levretii *diastrum* indignant. Curatio ex specie præcedenti intelligitur. *Diastrum cartilaginis xiphoideæ* a causa interna facta aliam speciei huiusmodi varietatem subministrat.

5. *Diastrum epiphytica*; *Diastrum epiphysium* Duverney T. II. c. 1. p. 9. *Séparation des épiphyses*. L.

Epiphyses, quamvis in subiectis iniunioribus ope cartilaginis intermediæ cum ossis reliquo unitæ sint, ab eo tamen absque fractura separari possunt. Observatur in scorbuto, & in syphilide inveterata. Signa diagnostica eruantur ex charactere generico, vacillatione epiphysæ fracturam mentiente, & affectuum memoratorum præsentia. Inducuntur remedia syphilidis

& scorbuti, epiphysæ separatarum ad os reliquum appressio, & fasciatio debita.

6. *Diastrum synchondroica*, *Diastrum synchondroica* Fabr. Hildan. centur. VI. obf. Pozos des Accouchemens p. 7. Duverney loc. modo citat. *Diastrum*, *ou écartement des synchondroes*.

Locum habet hæc species in ossibus pubis, in ossibus ileis & sacro, in coccyge, sita vi interna distendente, & ossa huiusmodi synchondrosi unita ab invicem removente, obliuatur & etiam in vertebrarum corporibus, si nempe cartilago intermedia magis incrementum uno latere, quam in altero vice cuncti fungatur, qua hinc magis ab invicem recedant vertebrarum corpora. Curatio obtinetur subleata vi interna distendente, ossium distorsum facta approximatione, & injecta congrua fasciatione. Ex gibbositatis genere petantur auxilia in incremento cartilagois inæquali usurpanda.

XXII. LOXARTHROS; *Perversio capitis ossium ac musculorum appensorum* Duverney Tom. II. cap. II. *Arus vari* Duverney Tom. II. cap. III. *Gibbositatis scapularis* Auctorum, *Perversio de la tête des os & des muscles baze, baze scapulaire, en puitrine allée, Agri banchroches*.

Est ossium cum motu sensibili articulatorum situs relativus id alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiva persistens citra exarthremata & spasum. Caput ossis nativum acetabulum servat, nec definit acetabulum caput ossis sibi dicati excipere, mutatur constanter in peregrinam directio nativa, qua sibi respondet ossa mobiliter combinata, quin contractioni spasmodicæ, hoc veioat tribuendum; exulant itaque ab loxarthri genere exarthremata & spasmus, una peccat ossium positura respectiva, & coincidentia nativa, quæ in alienas mutatur permanet.

Priocipia loxarthri sunt perversio situs nativi ossium, & positura nativæ musculorum appensorum post motus varios vehementiores, cartilaginis acetabulum, vel ossis caput obducentis incrementum majus in uno latere quam in altero, partialis acetabuli, vel capitis ossis exostosis, materies tophacea articulationem integram occupans inæqualiter, vel tantum lateralem ejus partem citra aokylosim, teosio musculorum & ligamentorum major in uno articulo latere quam in alio, quam inducere valent vitium hereditarium, malus situs id utero, oblietrix ossis infantis rudius tractans, mala fasciatio, pressio validior inter brachia, dum circumferuntur infans, pravus situs diuturnior, & alia bene multa.

1. *Loxarthros perversus*, *perversio capitis ossis & musculorum appensorum* Duverney T. II. ch.

2. *Perversio de la tête des os & des muscles*. L.

Cootingit nonnunquam ut brachium verbi gratia, in varios sensus validissime motum moveri jam prorsus nequeat, quia scilicet mutatur

tatur situosus natus, & nativa musculorum appositione posita, revoluta in sui cavitatis ossis capite, & ita constitutis brachii musculis, ut jam edendis, quibus dicat sunt, motibus, sunt impares, nisi nativum in situm celeriter reponatur os & musculi brachii, motui præceptis imminet ruina. Omnem paginam adimplent. 1. prompta capitis in acetabulo revoluti restitutio, excitatis nimirum motibus variis in sensum præcipuis huic oppositum, sub quo contigit memoria perverto, 2. fasciatio debita, non minori diligentia hic loci injicienda, quam si exarthremate incompleto brachium fuisset tentatum.

2. *Loxarthrus anisotomicus*, artuum, maxillæ inferioris flexio ab inequali musculorum, ac ligamentorum tensionem Duverney T. II. c. III. Varii, vulgi, compertes, brachia vara, maxilla inferioris tortura Latinorum: Pieds bots, bras tordus, machoire de travers. L.

Variat hæc species parte affecta, nam enim pedes extro, vel intro flexuntur, nuoc genua, modo cubitis, modo maxilla inferior; pater diagnosi ex charactere generico, partibus intro vel extro flexis, necnon causa allegata, crescit malum in pueris, dum levaminis gratia artus flexosus in partem vulgo detorqueatur, quam major musculorum & ligamentorum tensio occupat. Curatio tota sita est in usu machinamentorum, ut ocrearum & similium instrumentorum, quibus ad situm nativum respectivum ossa leniter adducuntur, & in eo continentur, ac firmanur, cave hanc speciem pro lordosi veodas; huc pertinent coarctans capitis in latus alterutrum detorsio, inclinatio, reclinatio a tono musculorum huic prevalente inducæ, nisi mavis ad obliquitatis genus amandare.

3. *Loxarthrus gibbosus*; gibbositæ scapularis, seu alata Auditorum: Bosse scapulaire, poitrine allee. L.

Ista species intelligitur ex præcedenti, cum quæ secundum causam convenit, discrepans tantum parte affecta. Vide *Gibbositatem scapularem*, seu alatam.

4. *Loxarthrus intrarticulæ*; artuum flexio a mutata partialiter superficierum articulationum libella, vulgi, variis compertes, brachia vara, maxilla inferioris tortura Latinorum: Pieds bots, bras tordus, machoire de travers. L.

Affinis est speciei 2. *Loxarthrus* hujuscemodi artuum, maxillæ inferioris flexionem sub se passim recipiens, differt vero quod causam quæ in ista specie in cavitæ articuli hæret, in 2. vero extra ipsam constituta est. Partialiter mutatur acetabulum, vel capitis osium libella nativa, si 1. cartilago distas partes obducens magis crescat in uno latere quam in altero, 2. si in acetabulo, aut in ossis capite hinc assurgat exostosis, 3. si in ossibus bino acetabulo excipiendis, ut est maxilla inferior, aut in ossibus unico acetabulo, aut dupli cavitæ instructo exceptis, ut sunt *gongylidi*

plicati, materies tephacea in illis acetabulum alterum, aut in istis unam acetabuli cavitatem teneat, vel si ossibus unia acetabularibus superficiem acetabuli omoem tegat lamina tephacea hinc crassior, aut lateralem tantum ipsius partem, exulante ubique ankylosi. Variat itaque *Loxarthrus* hinc pro lordosi nomine venditandus, & parte affecta, & principio progrediendo. Hujus diagnosim habeto ex charactere generico, partibus affectis, & causa allegata varia. Ex causa *Loxarthri* hujusce varietatem primam inducente de facili colligitur quid *Loxarthri* secundi therapie, quæ memoratæ varietati competit, veniat addendum. Varietates hujusce speciei exostotica & tephacea, exarthrematum exostotici & tephacei curationem admittunt, additis quo tempore, si pristina redeat superficierum articulationum libella, machinamentis congruis pro partibus elongatis adducendis, sustentandis, & articulo coercedo, firmando.

Nota. Ad huoc ordinem referri etiam possunt lordosis & gibbositæ, quæ genera sub alio ordine militare jussit classem hujuscemodi Auditor Clarissimus. Hæc sunt varia procedentiarum, herniarum, aberrationum, & osteoparopiarum genera, quæ a nobis delibata potius quam pro rei dignitate tractata fuisse ultero fatemur, solum as profequi vetabat instituti ratio quæ suis classibus præfixit Professor celeberrimus. Satis sit morborum & eorum genera legitime constructa genuino charactere, ætiologia experientia, innoxia donasse, species varias sub generibus singulis militantes collegisse, nominasse, distinxisse, tandem indicationes curatorias genericas, específicas ubique, quantum oportuit, ac licuit, proposuisse, non neglecta interim prognosi, atque ætiologia peculiaribus, quæ quidem si pressiori sermone semper, compendiosius & raptim nonnunquam præstitimus, id nobis excusationis fidem facit, quod sub generibus omnibus, sub singula specie Auditoris allegavimus, e quibus cuique fas sit meliora prolatis depromere.

## ORDO SEPTIMUS.

## P L A G A E.

Sunt solutiones continui, illæ vero vel sunt in partibus carnis, ut volnus, ulcus, vel in ossis, ut fractura, caries. Rursus aliæ sunt a causis mechanicis, ut instrumenti scindentis, pungentis, contudentis impetu in corpus humanum, aut reciproce corporis nostri in hæc instrumenta impetu, unde tenacitas partium superatur, ut in vulnere, fractura, vel hæ solutiones sunt a causa physica erodente, dissolvente, ut accidit in ulcere, carie. Hinc quadruplex plagarum partitio.



LXIII. VULNUS: *llesure.*

Est solutio mechanica continui in carnibus cum laborum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationemque tendens.

Differt a punctura per hiatum laborum, ab ulcere per causam mechanicam, ut vim instrumenti secantis.

Fibræ & membranæ corporis, cutis potissimum, magna vi tenacitatis invicem coherent, ut patet ex immensis ponderibus, quæ a lorummento cutis citra rupturam sustinentur: Vide *Hæmorrhagique Experience* 22. Vis ea tenacitate major requiritur ad vulnus insilgendum, quæ ope instrumenti secantis nisi lineæ applicata commodissime effectum suum consequitur: scilicet vero fibræ, quæ in cute sunt maxime elasticæ, hinc & inde retrahuntur; hinc laborum hiatus, vasa sanguifera secta sanguinem fundunt, cujus residuum, in vulnere valis coagulatum, inflammationi ansam præbet, si vulnus rite exsuctum fuerit, inde vero suppuratio cicatricæ terminanda. Symptomata vulnere sunt dolor in cute, nervis, tendinibus, perioleæ acrior; sanguifluxus maior, prout arteriæ ac venæ plures majoresve lauciantur, hiatu laborum major in vulnere transversio, amplo, minor in longitudinali & brevi; deinde inflammatio tumore, calore, rubore, dolore, tensione, pulsatione stipata, post paucos dies suppuratio, seu puris albi, inodori, blandi exortus cum inflammationis mitigatione, hinc carniū regeneratio & cicatricæ.

Vulnera simplicia hic tantum recensemus, quæ vero in cavitates corporis penetrant illa sunt principia aliorum morborum, de quibus passim in aliis Classibus egimus, ut hæmopticois, orthopnoæ, asphyxiæ, peripneumonix, &c. si pulmones vulnerentur, hæmatemesis, eardialgiæ, ascites cruenti, si abdominis viscera lædantur.

Hinc diagnosticus vulnerum varia est, nec ea sigillatim pertrahere, multo minus curationem tradere, nostri instituti est. Sufficit potissimas varietates vulnere simplicium indicasse.

1. *Vulnus simplex, Playe simple.*

Illud est quod instrumento puro, secanti debetur, quodque carnes tantum, non viscera nec ossa, attingit, quod sine amputatura, sine confusione, non igniti instrumenti ope factum est.

Illud vero, cum sanguis nullo viro inquinatus est, sponte sanatur, modo aeris accessus debita deligatione molli caveatur; corpora peregrina ex fundo vulnere extrahantur; coagulata sanguinis eluendo foras educantur, labia vulnere, si nimis pendula, ope futuræ aut splendorum, fasciarum, emplastrorum, in convenienti situ retineantur, inflammatio ope phlebotomiæ, viqus reguis, cataplasmatum emollientium, discutiat, sed de his legantur scripta chirurgica.

2. *Vulnus sclopetorum, Coup d'arme a feu. A.*

Est illud quod fit mediante corpore duro a bombardis, tormentis bellicis, sclopetis ope pulveris pyrii exploto. His vulneribus insidit excitatur vehementer tremor & concussio totius generis nervosi, ex qua post aliquot dies gravissima symptomata excitantur, eo vero majora quo partes nobiliores amplius, profundius vulneratæ sunt, quo simul ossa fracta, contusa, majorem stragem passa sunt. Vulnera illa labia adusta, nigra, siccæ, confusa offendent, gangræna, suppuratio, animi consternatio non raro accedunt, quæ omnia minus ab ambulatione quam ab impetu valido dependent.

3. *Vulnus virulentum. C.*

Est illud quod a morfu canis rabidi, sive summe irati, sive hydrophobi producitur, hujus sequelas vide dum de *Hydrophobia*, vel illud est quod infigitur viro quodam affectu, ut syphilitico, scurbutico, leproso, & hæc vulnera in ulcera ut plurimum abeunt, quæ vero hydrophobis, illa in ulcera gangræna sapius mutantur. Sola vulnera hydrophobiam inducunt per longum tempus simplicia & pura videntur.

LXIV. PUNCTURA. *Piquure.*

Differt a vulnere, quod in punctum corporis tantum agit instrumentum, & sine laborum hiatu fit solutio cutis.

Exigua est, aut nulla, sanguinis effluxio, aut per parte puncta interna, & difficili exitu sanguinis in fundo hærentis & putrescentis, non raro gravia subsequuntur symptomata.

1. *Punctura simplex. B.*

Præcipuum symptoma dolor est, qui in cute, nervo, tendine est omnium maximus, nervus quidem est sola pars sentiens, sed cutis nervis est citissima, unde acriter dolo; tendines vaginæ nervis præditæ dolent etiam, immo stylo intra nervos adacto vidi enatos dolores atrocissimos, aut in annosis subiectis ossium anæsthesiam adipiscunt. Nervis tendinibusve amputatis dolor cito evanescit, aut pândis, femalaceris dolor durus est, & tristissimus, immo tetanum, excitat. In tendinibus id pariter fit ob continuum distractionem fibrarum integrarum a fibris sectis se se retrahentibus, tendine enim masculique sunt continuo tensi, adeoque in nifu continuo ad se se decurrandum, si paucæ fibræ totius musculi nifi subsilient, eas distrahendi adeoque cruciari necesse est: unde remedium est sectio transversa tunc nervi, tunc tendinis, antea vero dolor balsamicis puris, non rancidis unguentis, est delinendus: oleum tebebinthinæ in hoc casu puncturæ infunditur, cataplasmata emollientia tumori cito oriundo applicantur, phlebotomis inflammatio arceatur. Vide *Convulsionem a nervi punctura.*



2. *Punctura a cuspide fracta*; Echardo, D. Tissot Avis au Peuple. A.

Si apex styli, aciculæ, spinæ, aculei, ligni, &c. in fundo puncturæ relinquatur, maxime in partibus nervosis, ut sub ungue, inde dolores acerrimi excitantur, & oborta dein plegmone recrudescunt. Causis punctuolæ arte Chirurgica educatur, secus cataplasmatibus emollientibus, narcoticis dolor sedetur & suppuratio promoveatur, natura hanc excitat ut peregrino corpori exitum parat, ars, incisione abscessus opportune instituta, naturæ succurrit.

D. *Punctura venenata*; *Piquure venimeuse*. D.

Puncturæ venenatæ sunt vela vegetabilibus vel ab animalibus, & quidem inter vegetabilia sola est apud nos urtica, cujus puncturæ non sint mere mechanicæ; in spinis enim hujus plantæ adest succus acidus corrosivus, qui per tubulum in apice spinæ patulum insunditur, hujus vero veneni antidotum nos latet: pars urticata vivide dolet, tamen, inflammatur.

Quoad venena animalia puncturis insundenda præcipuum est venenum viperæ seu colubri veri; duos scilicet hic coluber in ore gerit aculeos ossæos, plicatiles, cavos, quorum basis premit totidem folliculos succo venenato turgidos, qui in vulnus effunditur, cum animal iratum mordet. Antidotus præcipua est alkalium volatile, sub forma vel salis vel fluoris, ut aqua lucæ, cujus guttæ aliquot puncturæ affunduntur, & sex vel septem omni hora intus sumuntur ad sudorem proliciendum: hoc sudore per diem continuato venenum foras ejicitur: hujus Antidoti defectu valet succus raphani, erysimi, nasturtii, sinapis, crucæ intus & extus admodum: valet & caro viperina intus sumpta, vel ejus pulvis.

Præter viperæ nullus coluber, nulla lacerata venenata est, sed dantur insecta quæ venenum enim aculeo insundunt, ut vespa, apis, culex pipiens, culex pulicarius, crabro, & secundum quosdam Anthores aranea & scorpius.

Contra apum puncturam nullum melius remedium invenit Ill. Reamur ipsa aqua frigida continuo renovata, in qua pars puncta immersa tenetur. Ad his omnibus alkali volatile conveniat. Quidquid sit ex horum insectorum veneno dolor fugax levisque tumor sequitur, nullum vero vitæ periculum, ad summum ex morfu viperæ nisi obvium eamus. Vide *Dissertationem nostram, in Rothemagensi Scientiarum Academia coronatam, de venenatis Gallia animalibus*.

Si vespa apifve pupigerit, aculeus acicula extrahendus, folla petroselinii tusa applicanda, decocto florum sambuci tepido pars fovenda, pauxillum theriacæ puncturæ applicandum alii suadent, sed malleum Reamurii remedium adhibere.

De punctura hystricis, raze gloriose, trachini, &c. vide *Dissertationem de venenatis*

*Gallia animalibus*. De punctura furis infernalis vide *Malidem, & systema Naturæ D. Linnæi*.

## LXV. EXCORIATIO. *Excoriature*.

Excoriatio est cuticulæ vel cutis a carnibus separatio. Excoriatio est solutio quæ nullam altitudinem, & tantum latitudinem & longitudinem habet. Punctura habet tantum altitudinem, vulnus altitudinem & longitudinem.

### 1. *Excoriatio viva*. B.

Est violentia separatio cutis a carnibus vivis subiectis; fit per ictus oblique inflictos, potissimum supra partes ossibus sustentatas, ut cranium, anteriora tibie, digitos, &c. ea summe dolorifica est & sæpe cum contusione. Nihil est utilius quam cerato Galeni, aut puro, aut liquore Saturni saturato, primum dolorem delinire.

### 2. *Excoriatio phlyctænæ*. D.

Est ea quæ fit in partibus erysipelatosis per amplas phlyctænas obortas in partibus ambustis, in gangrænosiss & anthrace affectis, deum a vesicatoriis appositis, ea vero solam epidermidem a cute semoverit. Ea exigite resolutiva anodyna, ut decoctum florum sambuci; in casu vesicatorii butyrum, ceratum; in gangræna decoctum kinkinæ, &c.

## LXVI. CONTUSIO; *Mentisfure*.

Est textus carnosus, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta & valorum coneritio ecchymoma sæpius inferens. Fit a corporibus obtusis partes molles cum impetu ferientibus, quæ licet cutem, utpote tenuissimam, solvere non valentes, carnium subjeclarum molliorum textum lacerant & destruant, unde effusio cruoris in textu cellulari, dolores obtusi, inflammationes sympathicæ, suppurationes aut gangræna.

### 1. *Contusio universalis*. A.

Ea est quæ fit a lapsu ex alto, a ruina domus vel mineræ corpus obruentis, a magnis ponderibus mollioribus ex alto corpus obruentibus. Requiritur quies, potus diluens, phlebotomia pro viribus repetita, in volutio totius corporis in pelle ovis vel bovis recens excoriati, diæta tenuis.

### 2. *Contusio partialis*. D.

Periculosior est quæ epigastrio, abdomini inferat, quæ pectori, etiam si nulla fractura illata sit; rumpuntur enim quandoque vasa sanguinem intus fundentia. Requiritur phlebotomia, somenta ex oxycrato calido, potus ex decocto florum sambuci, chamæmeli, sero lactis mellito, diæta tenuis; dein ad resolutiva fortiora deveniendum, ut cataplasma ex parietaria

ria confusa cum aqua vitæ, vulneraria, &c. intus infusum ex vulnerariis herbis.

## LXVII. FRACTURA; *Fracture*.

Est separatio violenta & mechanica ossis in fragmenta in se invicem non coherentes.

Sic enim ossa longitudinali rima dehiscant, alterutro vero extremo sibi mutuo cohereat residuum ossis; fractura proprie non dicitur, sed fissura.

Portentosa vis requiritur ad frangenda ossa secundum axim compressa, verum si osse ipso, tanquam veste commodo, utatur, appposito hypomochlio, vel infuso ictu contundente, maxime vero si corpus hominis cum impetu feratur in extremum ossis prælongi, ut tibiæ, cruris, quo tanquam veste utatur, inde fractura facile sequitur.

### 1. *Fractura sciendi; Fracture tranchante*. D.

Ea est in qua ossis fragmenta sunt pauca & non contigua, sive sit transversa, sive obliqua quæ periculosa, sive fiat ab ictu corporis secantis, contundentis, sive a globis plumbeis vi ignis explosis & artus nitide secantibus, quæ ultima fracturæ, utpote complicatæ cum vulnere sclopetario, bujæ vulneris prognosim sequuntur.

### 2. *Fractura atterenti; Fracture avec fracas*. D.

Est ea quæ ossa in minima fragmenta quasi commolita sunt & comminuta; ut accidit cum a plastro onusto fibræ conteruntur.

Fractis ossibus artuum, si eorum extrema e loco suo dimota fuerint, musculi, vi sua elastica retrahi, partem fractam attrahunt, disloquant, artum decurrant, periosteum, vasa, membranas vicinas mire dilacerant hæc ossa per vim distracta, hinc dolor atrox, inflammatio, pyrexia, convulsio, pervigilium, in capite vero morbi convulsivi, soporosi, in pectore orthopnoea, pleuritis, malaque alia pessima, dolorificæ etiam operationes exigentia, quæ apud Auctores aptos inquirantur.

## LXVIII. FISSURA; *Fissure*.

Est separatio ossis in duas partes rima tantum diffusa, & alterutro saltem extremo coherentes.

Ea potissimum locum habet in ossibus laminatis, ut cranio, & est cum vel sine ossis fissi depressione, cum majori vel minori hiatu, cum majori vel minori cerebri commotione, inde vero morbi capitis dirissimi, de quibus *Chirurgica scripta* consulantur; periculum vel a commotione cerebri vel ab extravasatione cruoris dependet potissimum. Vide *operationem trepani*.

## LXIX. RUPTURA; *Rupture*.

Est tendinum vel ligamentorum aut castiliginum solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.

Sic rumpuntur tendines Achillis in vehementi saltu, ligamenta articularum in exarthemate fractura, ligamenta vertebrarum, cartilagine acrabulum in articulis efformantes, membrana aponeurotica calyptram circa caput articulare efficientes, ea omnia morbos extus sensibiles procreant, sed præterea ruptis ligamentis viscera colligantibus, uterum, lienem, hepar in sua fede firmantibus, morbi interni cognitu difficiles excitantur.

## LXX. AMPUTATURA, III. Linnæi Gen.

### 241. *Compuere*.

Est solutio continui in partibus tum mollibus, tum ossis, cum artus, articuli vel partis totali separatione a residuo trunco; vocatur exstirpatio si de mamma, teste carcinomate agatur; amputatio vero est operatio quæ fuit hac vulnera vel hæc fracturæ quas Amputaturas vocamus.

Vana est spes agglutinandi partes detruncatas, nisi de dentibus avulsis questio sit, licet initio partium plurimarum in plantis, digitorum in avibus succedat. Superest ut sanguis fluxus sistatur compressione, boleto igniario, linreo carpto appresso, ligaturis; ut inflammatio dolorque arceantur vidu tenui, situ commodo, phlebotomiis, potu antiphlogistico, & ut cicatrix concilietur.

## LXXI. ULCUS; *Ulcère*.

Est partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel atcumque vitioso.

Differt a vulnere suppurante, cuius pars forte sine ulla erosione aut dissolutione solidiorum sit, aut nullo vitio inquinatum est, sed album, spissum, blandum & cicatrici accelerandæ aptum, quippe quod granulæ carnis incrementum juvat & ab aere tutatur, ulceris vero liquor est vel tabum, vel ichor, vel pus acre, foetens, rodens, quod ut plurimum a cacochymia sanguinis fovetur. Ulcus vel in corpore cacochymico, vel a vulnere neglecto male curato, vel ab apostemate aperto procedit, vel suppletur caro exesa ab excrecentiis fungosis, vel saltem fundus amplus definit in orificium amplius, & in hoc discrepat a sinu, fistula, &c.

Ulcus species juxta *Heisterum* sunt ulcus cæcætheum, callosum, cancerosum, dysepuleicon, erysipelatosum, fistulosum, putridum, scorbuticum, serpiginosum, venereum, verninosum, &c. quibus addit cutaneum & superficiale quod exulceratio est, & ulcus fascinarum ac magicum de quorum realitate dubitare licet.

## LXXII. EXULCERATIO; *Exulceration*.

Est ad ulcus quod exoriatio ad vulnus, vel est exoratio ulcerosa suppurans; unde patitur differentias easdem ad exoriatio & easdem species ac ulcus.

## LXXXIII.

LXXIII. SINUS; *Clapier; Sinus.*

Est cavitas ulcerosa, cujus fundus amplus, sæpe multiplex, definit in angustum orificium.

Fit non raro ex parte difficile exeunte, quod partium motu prellum, juxta textum cellulorum, vicinarum partium intercapedines penetrat. Ut vero sanetur, sinus mutandus est in ulcus patulum.

LXXIV. FISTULA; *Fistule.*

Est cavitas ulcerosa, sinuosa, cujus parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit; parum differt a sinu, & ut sinus, in ulcus mutanda est, ut ulcus in vulnus mutandum ut sanari queat.

LXXV. RHAGAS; *Geryure.*

Est solutio continui sicca in partium marginibus, ut in labris, papillis, podicis, vulvæ marginibus: differt ab ulcere defectu poris & ichoris. Aliæ rhagades sunt congenitæ, ut Rhaghas lagotoma, vulgo *bes de lièvre*: aliæ ulcerosæ, siccæ, ut Rhagas veneræ: aliæ simplices, ut Rhagas a frigore, quæ labiis, & rusticorum manibus pedibusque hieme accidit; nec non Rhagas ab acribus, ut accidit ancillis lixivium calidum incaute tractantibus. Dantur & Rhagades malignæ extensæ in lepra Aftuzienfi, frambesia Americana &c.

LXXVI. ESCHARA; *Escarre.*

Est crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagmentata. Si pars quedam cauterio actuali vel potenciali comburitur, ea pars sicca, dura, aspera, sensus & vitæ expers, proprie *Eschara* dicitur, quæ grisea a lapide infernali, argentei coloris a butyro antimonii, nigra a plumbagine, igne evadit; ejus lapsus est opus naturæ, quæ suppurationem partium suppositarum excitat, juvatur autem cerato Galeni, butyro, & similibus. Verum Escharæ nomen etiam extenditur ad fibras & filamenta, laciniales membranarum in ulceribus mortuas, ad crustas siccas, nigras, quæ variolæ, pustulis, herpeticis, lepræ, aliisque similibus exanthematicis superveniunt.

LXXVII. CARIES; *Carie.*

Os suo periosteo denudati decoloratio, ac peritas, extoliatin & subsequens fragilitas ac erosio *Caries* dicitur, cujus varii gradus hæc definitione continentur; Caries enim incipiens se prodit periostei separatione, colore ossis albo, semipellucido, dein nigritante, odore fetidissimo; Caries vero perfecta ichoris fetidi exitu, fragilitate teredinosa, asperitate & excavatione ulcerosa determinatur. Dividitur Caries in siccam, quæ diutissime & in dentibus sine foetore & dolore permanet, & in humidam quæ citius progreditur, os excavat, & ichorem fetidum non sine dolore emittit. Caries incipiens est ossis necrosis, progrediens est ossis ulcus. Laminarum ossearum, quæ mortuæ sunt, separatio per squammas facta *exfoliatio* dicitur: mortuorum squamarum a vivis separatio, opus naturæ & artis, Cariei curationem absolvit. Ars utitur causticis, scalpulis, & tum os cariosum facile ab aliis auferri potest, ut dens cariosus, articulus, ea extractio vel amputatura promptius est auxilium. Caries dividitur in param, phyliticam, scorbuticam, scrophulosam, &c.

LXXVIII. ARTHROCACE. *Epine*

*Venteuse.*

Est ulcus medullæ ossium, sæpius in epiphysibus, cum carie, exolenti & dolore: quia pueris rachiticis scrophulosisque sæpius accidit *Pedarthrocace* dicitur, & ob dolorem ac tumorem intus cavum *spina ventosa* Latino-barbaris vocatur. Arthrocaces tot sunt species quot exostium & carierum; dantur scilicet puræ, veneræ, cancerosæ, variolosæ, scorbuticæ, rachiticæ. Vide *Clar. Petit maladies des os*. Dolor nunc pendet ab exostoseos acumine, nunc a periostei interni erosione.

Brevissimam tum plagarum, tum quorumvis vitiorum, synopsis tradere fuit animus, non vero eorum diagnosim, species, prognosim, & curam docere, quod vultum opus exigeret; vitia enim repreciosum tantum tanquam principia elementaque & symptomata diversorum morborum, de quibus in Classibus sequentibus sumus solliciti. Qui plura voluerint illi eximia *Prisii*, *Platneri*, *Garengot*, *Heisteri*, *Lidovighi* opera Chirurgica consulant.

## CLASSIS SECUNDÆ SYNOPSIS.

## F E B R E S.

**CHARACTER.** Syndromes frigoris, successivique caloris cum artuum debilitate & pulsus vi adaucta, sæpe quoad frequentiam.

**ORDO I. CONTINUÆ.** *Pyrexia semel crescit, & semel decrevit in decursu ægritudinis.*

- I. **E P H E M E R A**, *febre ephemera*, decursus ægritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.
- II. **S Y N O C H A**, decursus intra septimanam, incrementum successivum.
- III. **S Y N O C H U S**, *synochus*, decursus intra duas saltem septimanas, pyrexia major.
- IV. **T Y P H U S**, *febre maligna*, decursus ad tres septimanas & ultra, pyrexia nulla, aut exigua, debilitas maxima.
- V. **H E C T I C A**, *febre lenta*, decursus ultra mensem, pyrexia exigua, debilitas parva.

**ORDO II. REMITTENTES.** *Pyrexia pluries in decursu morbi crescit & decrevit, non omnino recedit, typus sæpe confusus.*

- VI. **A M P H I M E R I N A**, *amphimerina*, remissio quotidianæ typus servat, frigus in paroxysmis.
- VII. **T R I T Æ O P H Y A**, *tritophia*, remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum.
- VIII. **T E T A R T O P H Y A**, *quarte continua*, remissio quartanæ typum servans.

**ORDO III. INTERMITTENTES.** *Pyrexia pluries in decursu ægritudinis desinit & recurrit cum intervallis lucidis.*

- IX. **Q U O T I D I A N A**, *febre quotidiana*, accessus similes quolibet die accidunt.
- X. **T E R T I A N A**, *febre tierce*, accessus similes alternis diebus revertuntur.
- XI. **Q U A R T A N A**, *febre quarte*, accessus similes duobus interpositis diebus redeunt.
- XII. **E R R A T I C A**, *febre erraticque*, accessus similes distantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

## CLASSIS II. THEORIA.

**MORBI FEBRILES, seu FEBRES.**

1. **G R Æ C I S** pyreta (& pyretica nomenclata); *Latinis febres; Anglis fevers, agues; Hispanis febres, calenturas; Germanis Fiebers; Italici Caldeaze, febre; Morbi critici Ill. Linnæi.*

2. *Ægri Græci pyrecontes, pyretici; Latini Febrilentes, febricitantes; Anglice Feverish; Hispanis achacosos de calentura; Germanis feberbaftig; Italici febrosi.*

3. *Etymologia febris & febriculæ a ferreo, incallescere, vel a febris expurgio; nomina tamen Græca, Hispanica & Italica ab igne & calore potius derivantur.*

4. *Febres sunt dum fore tertius omnium qui sunt morborum partes. Sydenham.*

5. *Character; vires pulsus respectu ad vires artuum adauctæ, ut plurimum vero pulsus solito frequentior cum virium voluntati subditarum imminutione. Vires autem pulsus adaugentur in ratione magnitudinis & frequentie duplicatæ conjunctim. Vires vero artuum eo minores sunt, quo tardius, rariusque, ac quo pauciores, vel minores simulartus moveri possunt. Datur itaque febris quoties 1. vires artuum iisdem permanentibus vires vitales cordis, &*

*arteriarum, maxime quoad frequentiam, intenduntur, 2. Viribus artuum imminuunt, vires vitales eadem permanent, modo nec sopor, nec anæsthesia, seu insensibilitas artuum adit; sopor enim & paralytis impediunt ne vires artuum voluntati subditarum exerceantur, 3. Viribus artuum adauctis, vires pulsus augentur in majori ratione, ut accidit in phrenitide, 4. Viribus artuum imminutis, vires vitales intensiores evadunt, aut eadem persistant ac in statu sano, vel demum in minori ratione decreverunt.*

*Historia Generalis.*

6. *Initio frigus, horror, pallor, pulsus exilis, sitis, carebaturia, &c. in augmento & statu calor, sitis, virium prostratio, fectitas, anxietas; in declinatione, sudor humidus mitior, urinæ subrubræ, sudor.*

7. *Symptomata 1. in functionibus liberis intellectus & motus; assidue corpus occupat & lecto prosterit, maxime in continuis & exacerbantibus acutis, nec non in intermittentium accessibus. Situs eo magis horizontalis, supinus & immobilis, quo vires artuum magis prostratæ; hinc febrilentes abstinent lubentius a negotiis, loquela, gestu, motu totius, nisi anxietas*

\* Signum febris pathognomonicon est pulsus æstertio. cum dolentia totius corporis (speciali lassitudine, febri\* que accedenti motus ambulationis & Diemer. Med. Sep. p. 137.

tas urgeat; luce vividâ, sonis validis, attentiorne defasigantur; stantes vacillant, tædio, & fastidio allictorum laborant, languent vires animi in studendo, ratiocinando: caput sæpe vertiginosa gravitate, cephalalgia, immo in statu acuturum, delirio, agryphia tentatur.

8. 2. In functionibus naturalibus appetitus, pulsus & respiratio; famæ evanescit in continuis & exacerbantibus, nec non in intermittentium accessibus, immo accedit carniû, iusculorum, salicorum fastidium; sitis vero intenditur, & crescit cum morbo, nisi caput delirio vel sopore tentetur; Venus silet, vinum, tabacum, cupediæ fastidiuntur; pulsus ab initio ad finem frequentior solito, nisi delirio, vel comate, aut simili affectu caput tentetur, ut in malignis; initio exilis, & quandoque intermittens perstante frigore, atque tunc cardinaliæ, nausæ imminet, in statu vero plenus & validus, pulsationibus distinctis, si plethora defuit, secus confusus in fine molliis, minor. Respiratio in frigore difficilis, brevis, semper frequens, eodem prorsus tenore quo pulsus incretens quoad numerum & magnitudinem, ita ut ex illa, ut ex pulsu, febris possit dignosci.

9. 3. In excretionibus; saliva deficit, arescunt fæces, sputa, ulcera exsiccantur, urina in frigore emissâ limpida, albi in declinatione paucâ, rubra, servida, & in intermittentibus luteritia, seu quasi lateribus rubris pulveratis turbida; perspiratio in frigore parca, in calore magna, sudor in fine copiosus, post certas synochos & tritophyas olidus.

10. 4. In alterationibus; cutis inest febre, aut accessu sicca, pallida, scabra, venæ nullæ in frigore febrili, capilli cum rigore rigidi, seu horripilatio, annuli digitorum laxiores; frigus cum rigore & in accessu tremula maxillarum, artuum, saltem cutis concussionem, unguium livore, apicis digitorum corrugatione; labia, palpebræ pallent, lingua in putridis pallet, alba, vel flava; in malignis lingua & dentes calidæ etiam nigro, sicco muco obducuntur, & tunc odor foetidus, putris proprius exhalat. Oculi in acuturum vigore splendent, in gravissimis & pertinacibus febribus extinguuntur; calore accidentis genæ rubent, labiaque; cutis turgida, mollis evadit; annulis itridioribus videntur, venæ turgent, pilis hæcescunt, calor sensum crescit & intenditur usque ad gradum 32. immo æstus ultra 36. si thermometer manu contingatur; non crescit tamen eadem ratione quam pulsuum numerus intra eundem tempus.

11. Febris est innati caloris mutatio, vel declinatio ad statum præter naturam, pulsibus vehementioribus, ac crebrioribus redditis. Galenus, lib. 1. mod. p. 146. Hinc definitio febris algida: quæ ad ardetes complectitur, unde sine ratione a Neoterics reiecta; congruit apprine cum Boerhaaviana quæ horripilationem, deinde calorem cum constanti pulsu velocitate concurrentes fla-

stuit, aphor. 663. velocitas enim pulsus est vehementiæ simul & frequentię comes, ita ut alterutra crescente, modo non tantumdem decrescat altera, velocitas intensior sit; nostra vero nihil ab illis detrahic, sed tantum priores restringit.

12. Si cum Sennerto contendas febrem effecaloris naturalis in ignem mutationem, non te movebit difficultas a febribus algidis desumpta, cum in illis, si non extus, saltem intus calor sit, ultra modum adauctus, adeoque definitiones antiquæ sine jure a Neoterics exhibita sunt.

#### Theoria Febrium.

13. Ab una eademque origine promanant vires tum liberæ, tum naturales; priores artubus voluntati subdita, posteriores cordi & pectori potissimum prospiciunt; ambæ respondent emergentæ facultati animæ, ejusdem libertati scilicet & naturæ, quæ in eundem finem conspiciunt, nec invicem pugnant, quandiu perfectissima sanitas est; tum physica, tum moralis; ambæ quantitati fluidi nervi, quod facultatum instrumentum est, ejusque velocitati duplicatæ proportionem respondent.

14. In sanitate facultas non nisi exiguum virium suarum partem diversis organis, tum liberæ, tum naturaliter erogat, nunc quidem eadem musculo majorem, nunc minorem, prout usus & necessitas agendi videtur exigere; & quoniam cordis & respiratiois motus sunt semper necessarij noctu ac interdum, satis æqualiter ipsis vires tribuuntur, unde maximum dispendium; artubus, quorum actio ad vitam actualem non est semper necessaria, non nisi interdictum ad labores & exercitia interpolata vires erogantur, atque cum eorum actiones sunt maximæ, vires sunt ut eorum moles, demonstrante Boerho; non autem accidunt, nec opus est, ut omnes simul agant muscoli in toto corpore, licet in labore maxima eorum pars agat: quænam vero sit potentia absoluta musculorum omnium, qui simul agunt in operariis per duodecim horas quatuor die laborantibus, residuus vero somno, pallui & quieti impendentibus, docent Halesii, Dan. Bernoulli \* experimenta; ea scilicet æqualis est proxime ponderi pedis cubici aquæ singulis secundis ad unius pedis altitudinem elevatæ per horas duodecim continuato labore.

15. Potentia vero absoluta cordis, quod singulis secundis unciam unam & semissem linguinis ea velocitate emittit ex sinistro ventriculo, ut ascendat intra tubum verticalem ipsi aortæ aptatum ad pedes septem & semissem, æqualis est ponderi quadragesimi minoris, si per dimidietatem diem cor tantum ageret; adeoque cum labor ejus duplo longior sit, ejus absoluta potentia est ad musculorum in operariis liberæ agentium potentiam absolutam, seu laborem, ut 1. ad 20. calculum inivit, & benignissime communicavit Ill. Bernoulli.

\* Bernoulli Hydrodyn. pag. 199. D. Euler judicat hominē vim cum esse quæ horizontaliter procedendo possit eam altitudinem velocitate se pedem quoties secundo Mém. de l'Acad. de Berlin 1733, pag. 163.

16. Vis est *csula*, seu ratio sufficiens adionis actualis, ideoque vis aestimanda est ex pondere ducto in spatium dato tempore percursum, non habita ratione durationis laboris; quæ ultima consideratio vim a potentia absoluta distinguit atque ex hoc sequitur vim cordis esse ad vim musculorum voluntati subdiorum in statu sano uti. ad 40. vires enim ex effectibus aqualibus aestimantur, & effectus sunt ut 1. ad 40. ut mechanice gnari intelligent.

17. Jam vero vis, quam cor sanguini imprimit, distribuitur in omnes arterias in ratione quantitatis sanguinis eas simul trajicientis, adeoque in ratione earum officii ad eandem a corde distantiam: datur itaque ratio constans inter vires cordis, & vim cuiusvis arteriæ datur, ut radialis quæ in carpo exploratur, atque ex vi arteriæ radialis de vi cordis iudicamus.

18. Tunc optime valeamus, cum omnes functiones laetæ & constanter exsequimur, maxime vero cum proprium corporis pondus in ipsis locis acclivibus ascendendis non persequimur, ut monet *Saundersius*; itaque ex sensu levitatis propriæ, & ex gradu facilitatis ad ascensum scalarum, virium liberarum integritatem, seu proprie loquendo valetudinem nostram metimur; atque quo majus est onus gestatum, majorque simul gessandi hujus facilitas, eo facultas liberis motibus dicata major est.

19. Hinc patet cuicque Medico primum esse iudicare num in dato homine, cujus pulsus sanum & vires liberas affinitas novit, tum usu, tum analogia, vis pulsus sit in majori ratione ad vires liberas, quam in statu sano; quod quidem per approximationem tantum possumus exsequi & in his uti geometrica præcisio non obtineri potest, ita non est necessaria ad praxim.

20. Vis pulsus est ut vis sanguinis in arteriam pulsantem projecti, & ea ut vis totius sanguinis e corde ejeti: vis vero sanguinis e corde ejeti est, ut officii cordis sectio per quadratum velocitatis sanguinis multiplicata; verum quadrata velocitatum sunt, ut altitudines ad quas fluida possent motu sursum converso affurgere, aut quod eodem recidit, ut altitudines ex quibus delapsi censentur, ut eam quam obtinent velocitatem acquirant, si nulla foret ex parte mediæ trajicientis resistentia: ergo vis sanguinis ex dato officio in aerem emissi est, ut altitudo ad quam potest attingere.

21. Secta arteria temporali in homine sano adulto, sanguis ad septem pedes regio supra cor ascendere valet, ut docent experimenta hæmastica, sed velocitas sanguinis ex ea altitudine delapsi & horizontaliter effluentis est circiter æquali 20. pedibus intra secundum, ut docet Hydrodynamica; ergo velocitas totalis quam sanguis e cordis sinistrio ventriculo profluens potest concipere, est circiter 20. pedum in secundo.

22. In statu sano velocitas sanguinis per vas quodlibet, ut per venam brachii datum & æqualiter pertusam, est in eadem semper ratio-

ne ad velocitatem sanguinis aortam trajicientis, ita ut ea crescente crescat altera, decrecente decrescat; ergo velocitas sanguinis phlebotomia emissi, abstrahendo ab affricuum inæqualitate, est mensura virium cordis, cum saltus sanguinis est constans.

23. Velocitas sanguinis resistentias superantis, aut intra vasa fluentis multo minor est ejus velocitate, quam intra aerem potest conservare; prior *affualis*, altera *virtualis* inoccupatur; & quoniam verisimilimum est sanguinis velocitatem in aorta non esse actu majorem semipede intra secundum, velocitas actualis est ad virtutalem ut unum ad 40.

24. COROLLARIUM I. Detracta mole sanguinis antecessoris, circa toni cordis immutationem, velocitas actualis sanguinis crescit in minori ratione quam subduplicata resistentiæ immittentis; velocitates enim fluidorum mole inæquales promoventium sunt ut radices illarum massarum inverse; verum quoniam non potest detrahi sanguis, qui moles per aortam fluxura, seu ex officio cordis egressura, minuat; cumque velocitas sit ceteris paribus eo major, quo mples sanguinis major e corde per officia ejus tenditiosa & constantia egreditur, velocitas actualis crescere debet in paulo minori ratione quam est radix massæ sanguinis superstitis ad priorem massam.

25. COROLLARIUM II. Liquidiori facta mole sanguinis vel imminuta ejus visciditate per diluentia, calida, attenuantia, velocitas actualis sanguinis crescit in minori ratione quam subduplicata visciditatis decrescens: visciditas enim est resistentia molli movendæ analogæ, adeoque idem valet ratiocinium quod prius. Utrumque vero docet experientia.

26. COROLLARIUM III. Dilatatis officiiis minimarum arteriarum, velocitas sanguinis, actualis crescit in minori ratione quam subduplicata officiorum. Magnos affricus patitur sanguis arteriosus, dum officia ultimarum arteriarum superanda habet, ut patet experimentis hæmasticis *D. Hales* (*exper. 9. & p. 249.*) atque eadem lege fuit, ac si summa horum officiorum foret vigesima circiter pars officii aortæ. Notum autem est ex hydraulica quod magis deficiat effluxus ex parvo officio quam ex magno, id est major sit defectus in ratione diametrorum inverse, (*Mém. de l'Acad. R. des Sc. Carré 1706.*) ita ut officium, cujus diameter est 26. linearum, duplum aquæ effundat ejus, cujus officium est 20.; licet officia, adeoque effluxus, abstrahendo ab affricu, debeant esse invicem ut 703. ad 400., non ut 2. ad 1.: hinc sequitur quod si officiola arteriarum crescant ut 4. ad 7., effluxus crescant in majori ratione, seu ut 1. ad 2., adeoque velocitas sanguinis in arteriarum truncis major evadat.

27. Quoniam quo difficiolior est transitus sanguinis per vasa minima, ea pressio quam exercet adversus parietes arteriarum magis accedit ad totalem pressionem, (*Hæmasticæ pag. 260.*) atque

atque arteriarum tensio & renitentia est hujus pressionis mensura, ex hac tensione estimare possumus resiliens sanguini opposita, atque sub iisdem resiliens vis cordis est proportionalis quadrato magnitudinis arteriæ, & frequentię pulsus in se in vicem ductis, quod sic probari potest.

28. Ut sanguis a corde emissus arterias duplo magis deducat, necessarium est ut duplo majori copia intra datum tempus e corde exeat; verum quoniam officia arteriosa cordis sunt tendinea & vis mutabilia, sanguis illa trajiciens debet gaudere duplo majori velocitate, adeoque ex principiis hydraulices vi quadruplo majore propici; jam si pulsus sit duplo frequentior solito, quæ ejectio perhibebatur in uno secundo, perici debet in semisecundo, seu in tempore duplo minore quam (supposuimus); sed ut eadem sanguinis quantitas per officium idem ejiciatur duplo minori tempore, seu duplo velocitate, illud debet vi quadruplo majore projici, adeoque ut ejiciatur frequentius, vis debet intendi in ratione duplicata frequentię, quod erat probandum.

29. Quandiu fluidum libere per officia tubi emissaria effluit, tandiu nullam pressionem parietibus vasorum infert (*Hamast. 246.*) verum arteriæ, quæ nullam intus pressionem a sanguine patenterent, facillime flecti possent (ex demonstratis *Parigueni*), adeoque renitentia arteriarum est proportionalis pressioni sanguinis laterali.

30. Pressio autem lateralis sanguinis est proportionalis quadrato velocitatis respectiva, seu quadrato excessus velocitatis sanguinis subsequens supra velocitatem antecedentis, adeoque arteriarum renitentia huic quadrato proportionalis est.

31. COROLLARIUM. Si itaque eadem data arteriæ magnitudine & pulsus frequentia,

ejus renitentia sit duplo major, actio respectiva columnarum sanguinis duplo major est: si quadruplo sit velocitas respectiva, sexdecuplo major est, &c.

32. COROLLARIUM. Velocitas respectiva est, ut differentia velocitatum; si itaque velocitatis sanguinis antecedentis sit eadem, & tamen renitentia arteriarum quadruplo major, necessarium est ut velocitas sanguinis subsequens sit duplo major, adeoque ut vis cordis quadruplo major evaserit (*Hamast. 216. Pr. 21.*) Vires itaque cor contrahentes, si eadem sint ex parte sanguinis antecedentis resistentię, & eadem velocitas absoluta, sunt ut renitentię arteriarum.

33. COROLLARIUM. Vires itaque cordis sunt in ratione composita ex duplicata magnitudinis ac frequentię pulsuum, atque simplici renitentię arteriarum, modo eadem sit in subsequens vas libertas, adeoque virium vitalium ad vires artuum libera ratio cognosci potest.

34. *Frequentia* pulsus est numerus pulsationum intra datum tempus, qui vulgo solito major censetur, nisi expresse moveatur. Numerus vero pulsuum intra minutum diversus est pro diversitate ætatis, temperamenti & tranquillitatis, etiam in statu sano. Sic infantibus pulsus est frequentior quam adultis, biliosis quam pituitosis, recentibus quam jejunis, pathemate vel exercitio agitaris quam animo & corpore pacatis. Apud me horis matutinis, jejunum, & tranquillum, ab annis fere quindecim, pulsar arteria 72. vicibus intra minutum, dæmonstrat in his circumstantiis numerus pulsuum satis constans.

35. Si fumantur in qualibet ætate numeri pulsuum mediū hominum ejusdem altitudinis, illi numeri sunt inverſe, ut radices biquadrate eorum longitudinis corporis: *Robinson animal economy, pp. 14.*

*Ætati ætatis.*

*Longitudines corporum in pollicibus.*

*Numeri pulsuum ex observatione.*

*Numeri pulsuum ex theoria.*

			14	12	9	6	3	2	1	$\frac{1}{2}$	0
72	68	60	55	51	46	42	35	32	28	25	18
65	67	72	77	82	90	97	113	122	126	137	150 <sup>1</sup> 6. die
65	68	74	79	84	91	97	111	119	132	144	154

36. COROLLARIUM. Inde sequitur frequentiam pulsuum esse in diversis subiectis in minori ratione quam inverſa longitudinis corporum; nam puerorum pulsus non sunt tanto frequentiores pulsibus virorum, quanto pueri virorum longitudine superantur; etenim 18 : 72 :: 65 : 260; cui numero responder tantum 150.

37. In diversis animalibus vis cordis est in ratione composita ex quadruplicata diametri cuiusvis homologæ animalis, & ratione inverſa temporis quo cor contrahitur. *Jurin. Trans. Phil. de vi cordis humani, Theor. V.*

Vis enim est ut factum ex pondere ducto in ejus velocitatem; verum velocitas est ut spatium quod cordis parietes percurrunt in una



contractione divisum per tempus intra quod percurritur; atque illud spatium in diversis animalibus est ut diameter homologa cordis, majus scilicet in corde majori, minus in minori; moles autem ut cubus diametri homologæ, adeoque vis est in ratione directa quadruplicata diametri & temporis ad contractionem impensam inversa, conjunctim; quod erat probandum.

38. Illa propositio in initio principio ab omnibus admisso, scilicet homines & animalia ejusdem generis, eorumque partes in quovis genere esse corpora similia, quorum itaque omnes diametri homologæ eandem servant proportionem, modo recens natos & deformes excipimus.

39. Quantitas sanguinis quæ per ultimas arteriolas in venas transire potest, minor est quantitate, quam a cordis contractione debet expectari, nisi sanguinis antecedentis, & parietum vasorum obstruat resisténtia.

40. Etenim tota vis contractiva cordis impenditur partim in dilatandis arteriarum tubis, partimque in promovendo sanguine: *Jurini Theor. III.*

41. Atque motus qui in systole cordis communicatur sanguini præcedenti, est ad motum tunicis arteriarum communicatum, ut tempus systoles ad tempus diastoles: *Jurini Theor. IV.*

42. Verum in statu sano, ut multiplici observatione videre mihi contigit, tempus diastoles cordis, ejus systoles temporis æquale est, adeoque dimidia pars virium quas cor in contractione sua exierit in arteriarum tunicis diducendis, altera vero pars in sanguine promovendo, usque ad ventriculorum cordis alterum, absumitur.

43. Quantitas vero actualis sanguinis per arteriolas fluentis, seu ejus transfluxus actualis, non est nisi circiter vigesima pars transfluxus possibilis & virtualis, seu qualis foret ablatis omnibus resisténtiis: *Hamastal. pag. 218. n. 27.*

44. Sanguis itaque a corde projectus est intra majores arterias tam coactus, ac pressus, quam si transiret ex tubo vigentes latiori in angustiores, licet reapse ex angustiori in latiore transiret.

45. Pressio itaque lateralis arteriis illata a sanguine est ad pressionem totalem, seu maximam possibilem quam a data vi cordis possunt arteriæ sustinere, ut 399. ad 400. *Hamastal. pag. 249. num. 106.*

46. Si obstrukcióne, visciditate, confriktione, aut quovis modo transfluxus actualis sanguinis per minima vasa duplo minor evadat, quam in statu sano, pressio lateralis erit ad totalem ut 1599. ad 1600. Si vero is transfluxus sit ad sanum ut 2. ad 3. pressio lateralis erit ad totalem ut 3599. ad 3600. (*Hamastal. pag. 260. n. 108.*) eadem vi cordis superstitie.

47. Status *permanens* dicitur, quando intra datum tempus sibi æquales sunt pulsuum numeri, altitudines, & tensiones; in hoc statu sanguinis æqualis quantitas in quavis alvei arteriosi & venosi sectione circulat.

48. Obstruktus seu imminutus ultimis arteria-

rum orificiis, vires necessariæ ad cordis contractiones, subissimè velocitate & frequentia producendas sunt inter se, ut quadrata orificiorum superfluitum inverse (*Hamastal. pag. 312.*) Si itaque summa orificiorum in arteriis obstruktis sit ad summam in statu sano, ut unum ad duo, atque eadem quæ prius sit cordis contractio quoad altitudinem & frequentiam, vis cordis quadruplo major evasit.

49. Obstruktus quoad dimidiam partem ultimis arteriis, ut solitam magnitudinem servans pulsus frequentior evadit, vis cordis contractiva adaucta est in ratione composita ex duplicata inversa orificiorum superfluitum, & directa numeri pulsuum intra datum tempus: *Hamastal. pag. 309. num. 69.*

50. Obstruktus arteriis, vis cordis necessaria ad hoc, ut pulsus magnitudo major evadat, est in ratione composita ex orificiorum superfluitum duplicata inversa, & duplicata plenitudinis, seu magnitudinis pulsus: *Hamastal. pag. 316. n. 95.*

In praxi sufficere perfecta habere principia a *Col. Jurino in Transf. Phil.* tradita, quæ forte pluribus intellectu faciliora videbuntur, & hæc sunt.

51. Quoties pulsus sit celerior, (frequentiam cum celeritate confundit auctor,) aut minuitur resisténtia, aut potentia cordis augetur, aut minor solito sanguinis copia singulis vicibus ex corde exprimitur.

52. Si pulsus solito tardior fiat, (rariorem intelligit,) necesse est ut vel augetur resisténtia, aut potentia cordis minuat, aut major sanguinis moles e corde ejiciatur.

53. Aucta resisténtia, vel necessario pulsus retardatur, vel augetur cordis potentia, vel solito minus sanguinis e corde exprimitur.

54. Imminutus cordis viribus, vel minuat necesse est resisténtia, vel pulsus tardior fiat, vel minus sanguinis e corde ejicietur.

55. Auctis cordis viribus, vel augetur resisténtia, vel pulsus accelerabitur, vel plus sanguinis e corde ejicietur.

56. Imminuta mole sanguinis e corde projecti, vel acceleratur pulsus, vel cordis vires minuuntur, vel augetur resisténtia.

57. Aucta sanguinis e corde ejecti copia, vel pulsus tardior fiet, vel augetur cordis potentia, vel resisténtia minuetur.

58. Tota vis ad singulam cordis contractionem impensa absumitur in ipsa systole, & subsequenti diastole, tum ad sanguinem promovendum ad cor usque, tum ad arterias dilatandas. In arteriis enim vis sanguinis est duodecies major quam in venis; verum sanguis confluens in auriculam dextram, velocitatis suæ superfluitis maximam partem amittit; nam auriculæ sectio transversa est triplo major orificio cavæ, adeoque velocitas in illa auriculæ triplo minor, & vis viva in eam æqualem superficiem novies minor, proindeque fere centies minor quam in aorta.

59. Quoties in omni machinatione hydraulica fluidum, in loco ad quem deferendum antelevandum est, notabilem retinet velocitatem, magnum



gnum sit potentia absolute dispendium; nam si vis 7. pedum altitudinis sufficiat ad hoc, ut trans resistentias sanguis ad auriculam dextram debeatur, ibique habeat velocitatem animam, requiritur vis tanto major, quo velocitatis illius notabilia quadratum majus est, nec tamen major fluidi copia transferatur; ergo magnum est potentia absolute dispendium: Vide *Dr. Bernoulli Hydrodyn. g. 168.* Repugnat autem divina Sapientia, quæ machinam humanam effinxit, magnum virium dispendio effectum minore producere; unde sapientissime cavit Deus, ne sanguis magnam in auricula velocitatem retineret, quæ id tantum præstaret, ut cor fortius diducendo, ipsius contractioni resisteret.

60. Renovanda itaque vis contractiva cordis singulis pulsibus; sed quoniam in homine illud a machina & potentia inanimata fieri nequaquam potest, ut suo loco videbimus, reliquum est ut a natura peragatur. Verum cum frequentia exigat vires solito majores, natura ad has vires impensas instituendas non nisi motivis sufficientibus induci potest. Motivum autem est intendere circulationem sanguinis ob resistentias satisficientem, vel ob motus muscularum necessario augendam: prior necessitas datur in febribus, altera vero in laboribus immodicis, ut cursu, conversatione, & in pathematis vividis, ut ira, gaudio.

61. Ad hæc quidem resistentias circulantem sanguinem oppositis, velocitas ejus necessaria minuitur, si vires cordis incrementum; etenim velocitas sanguinis responderet quantitati a corde ejectæ directæ, & temporis intra quod eiecitur inverse; verum quantitas a corde ejecta est in statu permanente æqualis quantitati in venas tractæ; cum itaque ista ob resistentias minuitur, cordis evacuationem pari passu imminui necessum est.

62. Si itaque ob valorum obturationem, vel constrictionem, vel fluidorum viscositatem, non nisi dimidia orificiorum pars sit pertosa, data eadem vi cordis, velocitas in illis extremis orificiis, quæ semper est ut radix virium prementium, erit eadem; verum quantitates effluentes eadem velocitate per orificia inæqualia, sunt ut orificia; ergo duplo minor erit per vasa sanguinis transfluxus, adeoque cor non nisi dimidiatam sui sanguinis partem intra datum tempus eiecit.

63. Verum docet experientia quantitatem secretionum, quantitatem motus muscularis, adeoque omnium fere functionum vigorem, respondere velocitati sanguinis intra limites sanitatis, eamque velocitatem sanguinis duplo minor est, functiones omnes, calorem maxime & fluiditatem sanguinis, duplo minus intensas esse consequens est; quo statu confuso percepto, natura debet admodum molestari, adeoque juxta sympathia leges, vires suas exerere, ut functionibus vigorem & sanguini præstium velocitatem per majora vasa conciliet, simulque noxam, seu principium ægritudinis removeat.

64. Illud autem per externa motus instrumenta nequaquam præstare potest, nisi ligaturæ

externæ, pressiones, frigida applicata fuerint; & tunc animalia ipsa, natura duce, eas noxas pro viribus & mira solertia removeere contendunt, ut videre est in animalibus vinctis: verum quoniam sæpissime sanguis, vel humor viscidus crassus vasa infarcit, quoniam illud vitium per valorum oscillationes, muscularum vibrationes, sanguinis insequentis collisiones, liquidi feri mixtionem, potest tantummodo corrigi, atque cum illa molimina salubria imminuta sanguinis mole, evacuata primarum viarum sarcina, abstinencia a moribus in hunc finem inutilibus, felicius instituantur, natura ea omnia, vel ex his plura sibi parat subsidia.

65. Symptomata itaque noxiæ causæ se producant per languorem animi & corporis, functionum omnium, potissimum motus muscularis, tarditatem, sensum gravitatis & tædi, frigus in extremis, lassitudinem, capitis gravitatem, sæpe vertiginosam; quæ omnia ex retardato sanguinis circuitu facile deducuntur.

66. Symptomata vero naturæ opulatrici tribuenda, alia directe, alia indirecte materiam morbosam impugnant; indirecte quidem vomitus & diarrhœa, a quibus gravissimæ febres, immo accessus intermittentes non raro ordiuntur; natura enim, hac ejecta sarcina, vires harum materiarum coctioni impendendas atilius collocat, & sæpe fomitem morbi præcipit, deinde viribus adauctis per vasa salubrem non raro ceter hæmorrhagiam aut sudorem, undemoles movenda minuitur, & facilius feliciusque deinde per vasa provolvitur.

Directe vero obstructions referat, 1. *rigore* febrili, seu levis totius cutis iteratis contractionibus, *spasmo* fibrillarum muscularum, qui ad sanguinis fluxum conciliandum aptus est: 2. *auctis* cordis contractionibus, adeoque arteriarum pulsibus, unde sanguis viscidus, inter arteritur, & vehementius in obicem irruit, ut eum intera venulas adigat, & adigendo solvat, atteratque: 3. *aucto* simul calore, qui eximius est ad fluxum liquidis interitibus conciliandum infra gradum 36. Thermometri Reaumuriani, simulque felicissime vasa obstructa diducit, laxat, adeoque fluidis pervia facit. 4. Potum persitum & calorem imperat natura, eumque simul copiosum, frigidissimum, subacidum, ejus ope laxantur vasa, fluida diluantur, secretoria expelluntur, non verbo urgentissimæ implentur indicationes.

67. Verum quoniam ita connexa sunt corporis humani machinamenta, ut certi motus utiles cum aliis minus ad finem utilibus conjungantur, cumque in his angustiis maximi conatus sine maximis virium dispendiis, atque noxiæ exeri non possint, cum his sine mediis obtineri nequeat, prout hæc molimina plus vel minus necessaria sunt, natura his plus vel minus acriter incumbit, & urgentiori semper occurrens; per media utrumque noxia, noxam majorem pro viribus impugnat.

Carotides v.g. juxta aortæ ascendentes direc-

tionem in caput tendunt, ceteræ vero arteriæ statim ab ea directione descedunt; et quandiu fluidum per truncum ramis plus vel minus obliquis terminatum lentissime promouetur, tandiu eius pressio lateralis æqualis est directæ; nam fluida pressa quoquo verum premunt æqualiter, si lentissime provolvantur, adeoque ramos laterales & directos eadem velocitate subeunt, ac quantitate ipsorum orificiis proportionali. Verum si velocitas fluidi sit magna tunc temporis, more solidorum corporum, columnæ projectæ in directum fortius nituntur, & in latera non nisi repentinè valent agere. Hoc theorema novum experimento sæpe confirmavi: tubum rectum syringæ orificio aptavi, ex cuius latere tubulus alter oblique nascebatur; immisisti in truncum lentissime aqua, observavi quanta foret ex tubo recto & ex obliquo jactus longitudo; deinde vero fortius impulso embolo, constanter observavi jactus ambos longiores quidem evadere, verum ex tubo recto in majori ratione crescere jactum quam ex obliquo; inde facile est deducere velocitatem sanguinis vix notabiliter adaugeri posse, quin sanguis irruat in carotides in majori ratione, quam in ceteras corporis arterias, & in truncos rectos majori ratione, quam in obliquis eorum ramos.

Cum itaque necessitas exigit ut cor velocius contrahatur; impossibile est quin sanguis majori impetu subeat carotides, earumque ramos quam aortam descendentem, cum ad istam subeundam a via recta magis descedat, adeoque plures repercutiiones & inflexiones patiatur, a quibus tanto magis retardatur, quo ad angulos majores & frequentius reflectitur: non mirum itaque, si in febribus acutis vasa pia meningis sanguine turgeant in majori ratione quam vasa ceterarum partium, ac proinde dolores capitis, deliria, sopores, aliaque mala exinde sobolescant.

68. Pluries injecta per aortam aqua calida ex eadem tubi altitudine, observavi frontem multo citius incallescere aliis partibus; deinde collum, axillas, & abdomen; atque inde deducere primum est arteriolas in fronte repentes esse fluida magis pervias ceteris, seu minorem ipsis offerre resistentiam: sanguis ergo vivide a corde projectus illas velocitate minus retusa subire debet; unde calor & sudor frontis in febribus sæpius accedit.

69. Non potest sanguis majoribus cordis viribus in vasa minus pervia projici, quin affricus & collisiones intenduntur, quin arteriarum pulsus & tensio ac resistentia maiores evadant; verum calor est proportionalis collisioni, simulque partium tensioni, ac proinde calor intendi debet; verum aer pulmones calefactos subiens tanto citius calorem sanguinis absorbet, quo pulmones calidiores sunt, & excalescens respiratori nocet, ut docet experientia; a deoque tanto citius renovari debet, ut debitum & salubre sanguini refrigerium impertiat, simulque expiratus calidum & perspirabilem aeri onusum

vaporem secum auferat; natura itaque hujus mollioræ medelam invenit in repetita sæpius simulque majori inspiratione & expiratione, sine qua circulatio sanguinis cito fatisceret; unde in febribus vigente calore respiratio major & frequentior evadit in ratione caloris adaugeti. Anriqui Medici febris vehementiam ex gradu caloris aestimabant, ac constabat apud eruditos Hippocratem manibus pectori & abdomini sparsim admotis, de febris præsentia potius quam ex pulsu judicasse; placuit deinde Neotericis febrem ex pulsu, intra datum tempus, numero, atque Boerhaave eam ex pulsus velocitate, proindeque tum frequentia, tum magnitudine conjunctim emetiri. Verumtamen quoniam definitiones nominum ipsorum recepto significati convenire debent, cum omnes eos morbos febribus adscribant, in quibus pulsus naturali similis est, aut rarior molliorque cum summa virium liberarum prostratione, eosque morbos febrium malignarum nomine indigent, evidens est non ex frequentia pulsuum sola, nec ex ejus velocitate majori, febris essentiam esse repetendam, nisi velint cum *Deffore Visens*, Medico Italico, typhos seu febres malignas ex numero febrium expungere.

70. Secretiones ideo sunt, quia moleculæ fluidorum excurrente in laterales arteriolas lymphaticas admodum retardatæ possunt abripi a tubulis secretoriis, vi sudoria præditis, & illæ seligi quarum specificæ gravitas horumque tuborum specificæ gravitati magis convenit, (observante *Blasse, Hamburgo dissert. de Secretionibus*.) Verum urgente febre, sanguis majoribus cordis viribus urgetur; ergo intra ipsamet vasa arteriola lymphatica velocius truditur, adeoque cum fluida viribus inæqualibus hinc & inde pressa majori obsecundant, illa fluida secerenda Buenos circulationis abripiuntur, & sustinens vasorum eludunt; unde minor secretio urinae, salivæ, succi gastrici, intestinalis, muci narium, spermatis, quandiu vel frigore febrili coagulata hærent fluida, vel æstu febrili ultra secretiorum vasculorum ostia abripiuntur.

Natura non potest vires cordis & pectoris diutius adaugere, quin virium illarum penus decrescat; cum enim, quandiu febrilis labor perseverat, nulla vel modica fiat harum reparatio, quæ pectus, somnoque debetur; & magna simul omni momento fatearum impendit, cito potentia matrix fatisceret, si simul ad artus & partes voluntariæ subditas fluidi nervi solita mitteretur copia: quod ut avertatur malum, natura quidquid est fluidi nervi in vitalibus organis a quando impendit, reservat, & ab omnibus aliis partibus movendis, a quando abstinere; hinc virium liberarum imminutio & successiva prostratio.

71. Verum cum per aliquot dies in continuis, & per aliquot horas in intermittentibus illud febrile molimen exantillavit, & sic materies morbifica sufficiens atterita, diluta, atque ad excretionem parata fuit seu cocta, sunt a labore defici-

definit natura, tum ut vires superfluitates conferret, tum ut negotiis consuetis incumbat, adeoque febris accedit declinatio; mutatur scilicet fluidi nervi distributio; in organa vitalia major, & in libera minor fit, & hac anadoto inversa sensum accedit apyrexia.

72. Verum quoniam virium penus minor est confueto, licet virium solita restituantur proportio, non tamen solita restituitur quantitas adeoque febre declinante, artus non consuetum virium gradum statim recuperant, quod restituitur deinde viribus integris, restituta valetudine, fiet. Interea laxatis a calore rubulis secretoriis, resolutisque humoribus, pacato crurioris impetu, major fluidi fecernendi præsto est copia, major ad excretionem apertio; unde poris cutis emollitis & patulis, ubi sudor profunditur, urinae licet paucae & rutile flunur, saliva, macique omnes fluxiores evadunt, & sic sensum secretionem restituntur.

73. Situs corporis horizontalis, seu decubitus ad virium liberarum parcimoniam, utilis est; in illo siquidem situ, potissimum supino, nullius musculi contractione opus est, hunc itaque in febrili calore affectamus: utrum vero simul ad uberiores fluidi nervi secretionem consuevit hic non inquiri. Reduente vero apyrexia, & restituta sana virium distributione, æger orthostadium rursus affectat, musculis utitur, & suis muneris consuetis restituitur.

74. De virium dispendio. Sit vis cordis contrahendo impensa æqualis 2. libris, eaque sufficiat ad promovendam & expellendam ex arteriis in venas libram 1. sanguinis intra minutum per foramen ut unum; si jam illud foramen duplo minus evadat, & tamen velis ut sanguis per illud dupla prioris velocitate trajiciatur, eadem quæ prius erit trajecti sanguinis in venas quantitas, & ad hunc eundem, qui prius, præstandum effectum, primo vis cordis ratione solius velocitatis duplæ in officio debet esse quadrupla prioris, seu octo librarum; verum cum idem effectus ratione transfluxus obtinebatur per vim 2. librarum foramine duplo majori, evidens est quod illius solius effectus habita ratione, sex libras virium frustra impendantur, seu dispendium virium esse tres quartas partes vis requisitæ.

75. In illis circumstantiis si velis cordis motum duplo velociorem solito; cum positis primis conditionibus, foret confueto similis, vis eius quadruplo major requiritur, adeoque 16. librarum; verum foramine stante subduplo ut prius, non nisi duplo confuetæ trajicietur sanguinis copia, & sic hujus transfluxus ratione, effectus erit tantum duplus prioris, cum vires impensæ sine oduplæ, ergo iterum in hoc casu dispendium virium ad tres quartas partes virium huius duplo transfluxum necessarium affurgit, cum sufficere isdem positis virium duabus libris foramen duplum addere, ut dupla transfluxus sanguinis copia.

76. Ex his percipimus quanta fiant, & in fe-

bribus acutis, quas minimorum vasorum foret obstructio, virium dispendia, quæ ad circulationem sanguinis generale intendendam sunt frustranea, sed quæ ad sanguinem atterendum & repagula removenda sunt necessaria.

Si jam ea dispendia quæ quovis minuto fieri supponimus ducantur in totum tempus quo febris perseverat, v. g. in 24. horas, ut in ephemera simplici, quoniam supponimus præter duas libras impendi 74. intra horam 840. & intra diem 20160. libras impenduntur. Verum quoniam vires a corde intra diem impensæ sunt ad vires liberas quotidie impensas, ut 1. ad 20. (15.) cum cor intra diem vires 2280. librarum in sanitate supponatur impendere, & cæteri artus 57600. libr., summa virium impensarum erit 60480. libr.: aut in febre etiam quiescentibus artubus solius cordis motus 20160. libras impendit, vires vires ter majores quam in statu sano, qui calculus non quantitates virium impensarum veras & absolutas, sed tantum relativas exprimit.

In hoc exemplo supposuimus velocitatem cordis tantum duplo majorem, adeoque vel magnitudinem, vel frequentiam, vel utramque levissimè adauctam. Si etenim in statu sano magnitudo pulsus sit 1. & frequentia 72. intra minutum, jam vero magnitudo sit 1. & semis, & numerus pulsuum 108. velocitas cordis dupla prioris evadet, verum utramque in majori ratione crescere docet observatio (267.) Si itaque ex illo summo virium dispendio detrahatur exigua, quæ sit in febre per iuscula, quietem & somnum, virium restauratio, iactura multo minor potentia imminutio habebitur, nec mirum erit cito febricitantium potentiam imminui.

77. COROLLARIUM. I. Quo major est sanguis ductum obstructio, simulque febris impetus ejusque duratio conjunctim, eo majus & urgentius est periculum. (339.)

78. COROLLARIUM. II. Homo periculi conscius, vel animo linquitur, vel securitatem mentitur, vel conturbatur, quo se vertat nescius: unde assidue reflectiones & cogitationes, quæ somnum auferunt, vel turbant, assidue anxietates & iactationes, inconcinni tremulique artuum motus, pulsus intermittenti, inæqualitas, spasmi, similiaque symptomata, in ægris pusillo & inconstanti animo præditis, frequentiora.

79. COROLLARIUM. III. In morbis mente constare, & bene se habere ad ea quæ offeruntur bonum, secus vero malum ex Hippocrate, Quia illi conatus anxii & inconstantes ad materiam morbosam correctionem inutiles sunt, & tamen vires absument, vel quia vires superfluitates non impendantur, unde crescit materia morbosæ vis & sepe via.

#### De frequentia Pulsus.

80. Arteriarum sectio transversa duplex spectari debet, altera constans quæ in fine systoles, altera variabilis, quæ est excessus diastoles supra

supra sectionem constantem: si fingamus duos circulos concentricos, zona, inter duas illorum peripherias contenta, excessum illum exprimit, cui pulsus respondet; cum enim arteria utcumque plena sanguine nequaquam digitum explorantem feriat in systole, nec in syncope, pulsus non ex constanti sola, sed ex sectione variabili æstimatur; illud autem arteriæ augmentum debetur quantitati dimidiæ sanguinis in corde singulo pulsu ejus ejectæ; cum enim uniformis sit sanguinis in venulis minimis velocitas atque sectio, & sanguinis copia a corde ejecta dividatur in duas partes, quarum una ducit arterias, altera sanguinem antrorsum in venas promovet, atque demum tempus systoles æquale sit in sanitate temporis diastoles, quantum sanguinis transit tempore diastoles arteriarum in venas, tantum in ipsis arteriis diducendum impenditur, seu dimidia sanguinis ex corde ejecti moles arterias diducit, & pulsus facit, altera vero vel ipsi æqualis venas ingreditur.

81. Si vero obstruantur arteriarum officia, & vires cordis non satis incrementum, tunc arteriæ distenduntur illo superfluo cruore, & sic diameter constanti solito major evadit, quin pulsus pari proportionem crescat; nam cum minor exinde sanguinis copia tubos majores diducendos habeat, incrementum illud, quod pulsus metitur, est minus in ratione sectionis constantis adauget, & in ratione molis, ejectæ minoris: constat enim ex Geometria incrementa voluminum ab eadem mole addita esse eo minus sensibilia, quo volumina prima sunt majora.

Hinc patet quare datis obstructionibus, si vires cordis non augeantur, vel augeantur in minori ratione quam obstructionum quantitas, pulsus minor evadat, ut in præluudiis febrium, atque pulsus tanto minor est, quo moles dato tempore ejecta minor, & arteriæ sectio constantius major est.

82. Si vis motrix, quæ prius intervallis æqualibus applicabatur embolo machinæ hydraulicæ, eadem remaneat atque augeantur resistentiæ, vel quod eodem recidit, minuat orificium emisarium, nequaquam ex eo frequentior, sed e contra rarior evadet emboli. itus & reditus.

Sic in horologio oscillatorio, crescente rotarum resistentia, pulsationes oscilli singulis tardiores, ac proinde rariores evadunt; sic obstructio quoad dimidiam partem antliæ hydraulicæ, ac solis fabrorum ferrariorum orificio emissario, tardior est emboli, tardior valvarum solis quælibet depressio, ac proinde rarior, per experientiam.

*Demonstratio.* Vis inanimata eadē eodem semper modo agit, atque tamdiu premit fluidum effluendum, quamdiu superest illud fluidum, sed eo diutius superest illud fluidum, quo tardius evacuat receptaculum huic continendo dicatur, & eo tardius evacuat, quo sub eadem velocitate fluit per minus brisicium: cum itaque data eadem vi motrice, eadem in orificio sit velocitas, & per hypotheseum orificium sit dimi-

dio minus, tempus itus & reditus emboli erit dimidio minus, seu singulus itus & reditus erit duplo longioris durationis, adeoque rariores erunt illi itus & reditus.

Datis resistentiis, vel obturatis extremis arteriolarum in venulas hiantium orificiis, pulsus cordis frequentiores quandoque evadunt; hoc docet experientia, & unanimis Medicorum consensus. Sic vinctis arctissime ægrorum artubus, pulsus frequentior evadit, obstructis visceribus quandoque frequentior evadit pulsus. Verum si vires eadem cordi applicentur, aut si similiter ac antea applicentur, pulsus tardiores, ac proinde rariores tantum evadent, adeoque cum frequentiores evadunt, necessum est ut illæ vires sæpius, seu diverso modo & ordine quam antea, cordi applicentur.

Verisimillimum est naturam has obstruções & resistentias confuse persentire, & in multis circumstantiis ab illis molestari, (25.) atque cum ea sit sanitatis custos provida & urgentiori occurrat, ea quo periculosiores & majores sunt obstruções, eo sæpius de sortius cor contrahit, ut hæc repagula superet; si vero eum sæpius, si vero sortius cor contrahit, exinde velocitatem sanguinis intendit, adeoque materiæ obstruenti majorem vim infert.

83. Natura quandoque tantum pulsus magnitudinem, quandoque illius tantum frequentiam, sæpius utrumque adaugere conatur; & 1. magnitudinem tantum adauget, cum nullo metu perculsi & viribus integris prædita, obstruções removendum aggreditur: 2. Si vero obstruções difficiliter cedat, aut pertinacius resistat, aut in mora periculum sit, aut demum pathemate gravi natura molesteatur, tunc additis viribus & magnitudinem & frequentiam intendit, ut in febrium acutarum vigore: 3. Verum si vel maxima sit resistentia, ut cum. frigus febrile invadit, vel eum exsoluta est potentia motrix, ut in fine febrium lethaliū post magnas evacuationes, longam inædiam, in summo terrore, tunc frequentiam tantum intendit.

84. Impensa virium est semper proportionalis, 1. periculi gravitati, 2. potentie viribus: sed cum virium suarum parca sit natura, quando periculum obvium virium impensam seu accelerationem circulationis indicat, tunc si potentia sit exigua, pulsus frequentior & tantumdem minorem instituit; ea enim methodo intenditur sanguinis actio adversus repagula in ratione duplicata numeri pulsuum, & impensa virium minuitur in ratione duplicata magnitudinis pulsus, (37.) adeoque sub eadem virium impensa effectus optatus habetur. Si facultas sit exsoluta, materies morbifica cruda, & vires impense magnæ, in summo periculo versatur ægrorans.

85. Duplo major solito sit pulsuum numerus, velocitas ex hoc capite duplo major sanguini conciliatur; ergo vis sanguinis in materiam morbificam, seu columnas antecedentes, quadruplo major est. Verum imminuta simul pulsus magni-

gnitudine, ita ut duplo minor sit solito, vis cordis quadruplo minor est, adeoque impensa non est solito major; cum impensa virium cordis sit in ratione composita ex duplicata frequentia, & duplicata magnitudinis pulsus conjunctim.

86. Verum quidem est imminuta pulsus magnitudine affligi in angustioribus arteriis quam maxime crescere, (26) adeoque posse fieri, ut nullatenus lymphæ per arteriolas suas, nec sanguis per ultimos laterales sanguiductus progrediatur, unde frigus extremorum, aliaque mala deinceps eventura; verum quoniam urgentiori occurrendum est, saltem hoc artificio circulatorio per majusculos sanguiductus conservatur, & sic quantum fieri potest, cum viribus exsolutis vicia protrahitur, ab illis resistentiis cito suffraganda.

87. Acceleratio pulsus quoad frequentiam, cum summa motus sanguinis imminutione, videtur conamen Naturæ, quo motum illum vivificum excitare, & sic motum, quantum possibile est, protrahere contendit: *Bryan Robin. propo. 42.*

Canibus sanguinem successive detrahebat *Loewer* ad mortem usque, atque multum imminuta sanguinis copia pulsum frequentiore, molliorem, & minorem successive, usque ad mortem canis, observabat. In equis quorum pulsationes erant 38. intra minutum, antequam ad operationem molestantur, missi sanguinis 34. hbris successive frequentior pulsus evadere, qua proportionem debiliorem erat equus, usquequo 100. in minuto pulsaret arteria, & animal moreretur. *Exper. 1. Hamast.* Mulier menorrhagia laborans pulsum habebat maxime frequentem & exiguum, ita ut vix percipi posset, cum summa debilitate, anxietate, suspiriis, extremorum frigore, ex quo statu, quiete & nutritu intra breve tempus convaleuit.

Pulsus parvus & frequens est in summo frigore hiemali, febrili, in febrilibus male moratis, in convulsionibus, post venenorum coagulationem usum, in fuminis doloribus, adeoque sanguinis inspissatio, & vasorum contractio magna pulsus frequentem & exilem habent comitem, & pulsus frequentior atque exilior evadit, imminuit cordis viribus, ut in agone.

Pulsus frequentissimus & minimus erat homini in quo valvulæ aortæ ossificatæ dimidium orificii clauderant, sanguis ex arteriis in cor refluxabat; pulmones ingurgitabantur, aderat asthma ab hydropo pectoris, mors anno ætatis 50: accessit.

In palpitatione a polypo cordis, a compressu corde, & in experimento in quo reserantur nervi cardiaci, pulsus cordis frequentissimus, minimi & tremuli observantur.

Ab exercitio moderato & balneis calidis pulsus frequens & plenus, sed a labore immoderato, & balneis calidioribus frequens & parvus evadit, (observante *Galeno*) propter facultatis dissolutionem: hanc facultatem dissolvunt inedia, malignitas in morbis, pathematum violentia,

dolorum longitudo, & atrocitas, & evacuationes immodicæ: *Galeni de pulsibus ad tyranes.*

88. Detracta magna sanguinis copia, arteriarum capacitas respectu sanguinis e corde ejecti maxima est, adeoque tardius in vasis promoveretur sanguis, nisi aucto pulsuum numero urgeretur circulatorio qua propter in his circulantibus, ut faciliorem circulationem & vitam protrahat, natura frequentiam pulsus intendit, ut quod ex magnitudine deficit, eatenus compenseretur.

89. Unam quadragesimam tantum partem morborum febrilium lethalem esse docuit instituta a *pud Anglos observatio* (*Journ. de Savans. 1665.*) quod de intermittentibus intelligendum puto.

90. Causa febris est distributio fluidi nervi seu vitium in nervos cordis in majori ratione, quam nervos artuum; eo fine illa distributio, ut repagula circulationi sanguinis in minimis vasis opposita removeantur, & sic vasis sanguiferis libertas, & sanguini facilis aditus sentiantur. *Instrumenta* febris potissimum sunt cor & arteriæ. Materia febrilis, seu morbifica, multiplex est; sæpe chylus pravus, qui tum sua viscositate, vasa minima infarcit, tum sua acrimonia vasa sanguifera molestat, & ad contractiones sollicitat. Quandoque id præstant miasmata, tum sponte in sanguine enata, ob suppressas evacuationes assuetas, maxime ob perpirationem suppressam, purulea liquamina, putredinosa fluida, tum extus ex aere, cibis, potibus, in massam sanguineam delata: raro nititur natura ad vasa dilatanda & elonganda tantummodo.

91. Materies morbifica sæpe in sanguine lateret innoxia, nisi accessu vel aeris frigidi magis inspissata, aut crapulæ magis incrassata, aut animi pathemate, labore immodico in motum acta, aut phlogotonia, catharsis per caucelam institutis vel excitata, occasionem præberet nature, ut conatus suos febriles ad eam corrigendam vel eliminandam exeret, & hæc sunt potissima febrilium morborum principia, fusius in speciebus enumeranda.

92. Initio febrilium pondus corporis absolutum communiter est adauctum. *Robinson, Sanchez. sect. 2. aphor. 40. 50. 51. &c.*

93. Initio febrilium sanguis est viscosior, adeoque fæc, terra, & blocoque ditior quam in sanitate: experti sunt *DD. Langrish & Taber.*

94. Gravitas specifica lymphæ febrilium est ad gravitatem speciem ejus in sanitate, ut 1047. ad 10308. vel ut 10409. ad 10300.

95. Coagulum rubrum sanguinis est ad lympham quæ ab eo intra 24. horas separatur in sanitate, ut 1400. ad 1000. *D. Taber.*

Ad in epidemicis febrilibus pleuritidis, ut 3000. ad 1000. & in febrilibus vulgaribus, ut 2333. ad 1000. ex *D. Taber.*

96. Coagulum rubrum est ad lympham quæ ab eo separatur intra 24. horas, respectu ejus quæ in sanitate juxta *D. Langrish.*

In Synochis	ut 3993. ad 1000.
In quotidianis	ut 3614. ad 1000.
In Tertianis	ut 3154. ad 1000.



In Quartanis ut 2224. ad 7000.

97. Quantitas cohaesionis vel firmitatis coaguli rubri erat in febribus ad ejus firmitatem in statu sano

In Synochis	ut 1603	} ad 620.
In Quotidianis	ut 1575	
In Tertianis	ut 1151	
In Quartanis	ut 898	
In acutis inflammatoriis,	ut 4	
ad 1. vel	ut 2342	

98. Proportio principiorum per distillationem extrahorum a sanguine in febribus acutis ad quantitatem extractam ex sanguine sano erat

Salis volatilis	ut 139 ad 100.
Olei.	ut 144 ad 100.
Terræ	ut 100 ad 102
Salis fixi	ut 105 ad 130

99. Ratio lymphæ per distillationem educæ ad sanguinis massam totalem est in febribus acutis,

ut 100 ad 123

100. In febribus acutis lymphæ copia decrevit a statu sano ratione

Scilicet Lympha	a 123 ad 121.
Sal fixum	a 130 ad 105.
Crescit vero oleum	a 100 ad 144.
Sal volatile	a 100 ad 139.
Terra	a 100 ad 102.

101. Si urinae acrimonia æstimetur ex prædominio salis, olei & terræ, urinae acrimonia in sanitate ad acrimoniam primis diebus febris acutæ inflammatoriæ fuit in ratione 1 ad 2. seu 10 ad 19.

In febre ardenti primis diebus 100 ad 109.

In vigore febris ardentis 100 ad 135.

In decoctione ejusdem 20 die 100 ad 203.

Subsequenti die post noctem pacatam, & pridie sanatis

100 ad 173

102. COROLLAR. I. In febribus sanguis est viscidior quam in statu sano, atque quo viscidior est, seu quo proportio lymphæ diluentis ad cruentum minor est (93. &c.) eo febris acutior est.

103. COROLL. II. In febribus particulae activæ sanguinis, ut olea, salia volatilia, necnon terra crescent in dies usque ad declinationem, deinde vero decreverunt. Lymphæ vero & salis fixi proportio, crescente morbo, decrescit, post declinationem, seu in convalescentia crescit (98. 101.).

104. COROLL. III. Non solum subigitur, atteriturque sanguis a febrili motu moderato, verum ratione caloris & extricationis salis volatilis, resolvitur, & aptus evadit ad circulandum per vasa minima (101.).

*Praxis generalis Morborum, ut Febrim.*

105. Medici naturæ mihi ser & interpretes, si naturæ non obtemperet, naturæ non imperat; origines namque morborum & causæ longe abstrusiores sunt, quam ut humanæ mentis acies eo usque penetrare possit, sed pliusque natura novum opus exorditur, ubi conatus nostri desinere. *Baglivi pag. 1.*

106. Dicitur ratio morbum, quantumlibet ejus causæ (noxia & occasione) humano cor-

pori adversentur, nihil esse aliud quam naturæ conamen; materia morbosæ externi nationem, in ægri salutem omni ope molientis. *Sydenham, pag. 19.*

107. Alia sunt symptomata quæ debentur materię morbosæ, & prave fluidorum solidorumve dispositioni; & ea sunt symptomata materię morbosæ, quæ semper natura duce sunt impugnanda, ut frigus febrile; alia symptomata, quæ conatibus naturæ debentur, & ea sunt in debito teore servanda, idque potissimum incumbit Medico, ut naturæ conatus teopes excitet, vitiosiores moderetur, debite procedentes nequaquam turbet, quoties desint methodi longo usu confirmata, vel specifica auxilia quæ materiam morbosam alio modo, quam quem natura sequitur, corrigere valent.

108. Natura hoc tantum potest, ut scilicet materiem morbosam in vas, undeque premat & coarceat, 2. deo vero calore intenso, motu pueredinoso incipiente, dilutione conquoquat, resolvat, 3. vel ut vasorum iterata oscillatione, & musculorum accumbentium nisu, dividat, atterat, demum 4. ut perpiratione, diarrhæa, sudore, pyralismo, suppuratione, diuresi, materiem codam eliminet.

109. Ars vero non solum naturæ ministrare debet, eique obsecundare; sed etiam in malis casibus materiam morbosam ita mutare, & corrigere, ut eam deinceps natura facilius expellat; itaque quod sola natura non præstat, ars præstat. Sic methodus naturæ, ante corticis Peruviani inventum, erat fere unica, quam sequi possent Medici, & eaque in generalibus remediis, deinceps materię febris preparatione, coctione & demum expulsiõe consistebat; verum ea molimina non nisi post longum tempus, adeoque cum tædio & periculo ægrotantis cruciatu peragebantur tandem inventus cortex Cincinæ vel Kinæ qui materiem febrilem fluxilem, innoxiamque facit, vasisque rebus & tonum conciliat, unde sine sensibili evacuatione, correctâ materia, febris conatus cessat, seu febris sanat.

110. Itaque dicitur ratio, ut quoties desunt apta, certaque medicamina, quorum actione specifica corrigi possit materies morbosæ; naturæ molimina secutemur; quando vero adfunt, his apposite adhibitis, naturam a conatibus liberemus, verbo, ut naturæ materiam morbosam vel corrigere, vel expellere gelienti manus auxiliatrices porrigamus.

111. Prima indicatio est, ut potentiam labore assiduo exhauriendam pro virili, pastu & quiete convenientibus resarciamus, ita ut quo morbus brevior futurus est, eo minori, pariorique attritu æger indigeat, largiori vero quo diuturnior præsagitur.

112. Verum quoniam cibi solidi digestionis primæ, seu in primis visis, & secundæ, seu in visis circulatoriis, preparationem & proinde laborem expostulant, ut solvantur, atque cum viarium impensa in organis vitalibus roborandis sit necessitas, nec proinde in alias partes remere deri.

derivanda, diſtat ratio, ut eſculetis, coſtis ſeu liquidis, utamar in febribus, eoque magis ſucculentis & eupeptis, ac copioſis, vel repetitis, quò morbus diſtinetur; tennibus vero aqueis, blandis, raris & parcis, quo brevior futurus prævidetur.

113. Et quoniam ex obſervatis ſanguis initio febrium ſpiſſitudine, deinceps vero acrimonia peccat, ſiſque & calor ægrum diveſcat, neceſſum eſt ut potus ſit diſſuens & reſolvens initio, dein vero demulcens & refrigerans, ſiſque copioſus, ut hiſce omnibus indicationibus fiat ſatis.

114. Vires in motu musculari abſumunt, verum illæ ad cordis peſtorique motum utiles adhibentur, adeoque natura duce a moribus artuum liberis æger abſtinere debet, quod non aptus præſtabit quam ſi tacitus, pacatus, horizontaliter jaceat.

115. Verum docet obſervatio intellectus operationes, ut attentionem, ſtudium, reflectionem, nec non ſenſationem, memoriam & imaginationem, exerceri non poſſe circa virum abſumptionem, ut patet ex laſſitudine inde oriunda; adeoque cum viribus parcendum ſit, febrilis ab hiſce mentis operationibus, pathematique abſtineat, omnia negotia dimittat, niſi quæ ad mentis tranquillitatem conciliandam neceſſaria ſint; lucem, ſonnum, contactum, ſaporem, odorem, vividiores fugiat.

116. Si tamen exercitia mentis & corporis ad materiam morbiſicæ attritionem & contradictionem apta videantur, tunc temporis non vigen-  
t, ſed intermiſſa febre, aut propylactice ante exortum febris adhibeantur, quod ad intermittentes proſuiſſe docuit methodicorum & gymnæſticæ calorum experientia.

Sic præſcripta diæta & gymnæſtica, ad auxilia generalia, ex chirurgia & pharmacia petita, deveniendum eſt, ideoque generalia vocantur, quod in omnibus fere morborum, poſſimum acuto-  
rum, genericis, initio videantur neceſſaria, ea ſcilicet quæ plethoræ & cacochylæ medentur.

117. Omnes fere homines, poſſimum laetæ, & opipare viuentes, ac pigritiæ & deſidiæ deditos, multo magis quam ad ſanitatem neceſſarium eſt, ſe cibo, potuque ingurgitare docet obſervatio; hinc vero plus fabrarè in primis viis, pluſque ſanguinis & humorum cumulari conſequens eſt.

118. Aſt accedente febre metus eſt ne materies in primis viis contentæ, derivato in organa vitalia fluido nerveo, proindeque debilitato ſtomacho, indigeſtæ, mora vel fermententur, vel putrefcant, vel ad ſui coctionem naturam ſtimulentur, adeoque a negotio febrili avertant, vel demum in ſanguinem crudæ & dyſpeptæ deducantur, atque novum naturæ negotium, & materię morbiſicæ præſidium afferat. Unde initio morborum natura ſæpe viam a Medicis ineundam indicat, cum cacochylæ & anorexiæ cibum ſolidum vocantibus, cum naufæ, cardiægiæ, vomitu & diarrhœæ ſaburram eliminantibus, atque ſuadet ut ipſi per cathartica, emetica, clymata opitulentur: in morbo digeſtionis languent, recre-

menta in primis viis congeruntur, adeoque eo terminato ſaburra ſenſim collecta eliminanda eſt, & æger repurgandus.

119. Sed moles ſanguinis ſana major vires cordis incaſſum abſumit & prægravat, maxime cum ſanguis majori velocitate circumducendus eſt; ſit enim moles cruoris 20. librarum, quæ ducatur, velocitate unius pedis intra ſecundum, viſ impenſa eſt ut viginti; ſed ſi velocitate dupla movenda ſit, viſ hujus quadrupla requiritur: Jam vero minuatür una libra, viſ eadem ipſam promovebit paulo majori velocitate quam antea, in ratione ſcilicet ſubduplicata ponderum, verum quod maximi eſt momenti, maſculi cordis pauciori ſanguine inſarſi ſuos motus expeditius exſequuntur, & ex illa velocitate ſanguinis ſpiſſitudo facilius reſolvetur, atque ob hunc ſinem multiplicem ſanguis initio febrium acutarum mittendus eſt, quantum ex vaſorum plenitudine aucta excedere videtur.

120. Docet autem obſervatio, miſſo ſanguine, naturam ſæpius vomitionem ant diarrhœam clere, ſen ad auxilia generalia (116.) expeditiorem eſſe, adeoque ea duce & auſpice ſatius eſt in genere phlebotomiam cathari, quam cathariſm phlebotomiz præmittere.

Inſtitutis auxiliis generalibus, jam ad ea quæ febrium ordo, quæ genus & quæ ſpecies exigunt, deveniendum eſt; ſichorologiorum fabri, quæcumque ſit machinæ determinata læſio, a generali rotarum & axium deſerſione incipiunt, deinde peculiari viri medentur. Ut autem in infinitis numero caſibus, quos offert praxis, quo pacto ſe gerere debeat Medicus palam fiat, præmittenda ſunt Theoremata generalia, quæ a medicæ artis principibus longo uſu confirmata fuerunt.

#### Regula Præctica.

121. *Contraria contrariis tolluntur.* Contrariæ dicuntur quæ in eodem ente ſimul eſſe nequeunt, ut calidum & frigidum, tenſum & flaccidum, motus directio in orientem ſimul & occidentem ſen in plagas oppoſitas, quies & motus &c. Cum autem curare ſit idem ac morbi cauſas tollere, cum contrariis morboſo inducitur ſtans, primus curatur, adeoque contraria contrariis curantur. Ut autem contraria eligantur auxilia, prius cauſa morbiſicæ eſt recte cognoscenda, & diſtinguendæ cauſæ a principiis.

122. *Sublata cauſa tollitur morbus.* Nullus enim eſt effectus ſine cauſa, ſed omnis morbus eſt motatio evidens facta in homine, a deoque eſt phænomenum ſen effectus cauſæ eſt ratio ſufficiens cur ipſe actus exiſtat: cum itaque nihil ſit ſine ratione ſufficiente, ablata cauſa morbi, tollitur morbus: aſſertur vero cauſa morbi poſitis in eodem loco ejus contrariis.

*Methodus medendi* eſt ars invenendi & diſtribuendi auxilia, quibus ægritudo tollatur, ſeu quæ cauſa morbi tollant, & illa conſuſio ſeu inſinuatio quod morbi cauſa per contraria ſit auferenda, vocatur in diſtinctis, quæ fruſtra, obſervante *Piscennio*,

*vires*, dividitur in *prophylacticam*, *curatoriam*, *vitam* & *sympomaticam*, prout tollenda fuadentur morbi causæ, morbus ipse, virium debilitas & morbi symptomata. Cum enim sublato morbo tollatur necessario causa ejus est effectus, & tollantur symptomata, quorum concursus est morbus ipse, indicatio curatoria est simul prophylactica & symptomatica: verum ipsa debilitas symptoma est, adeoque sublato symptomatum concursu seu morbo, vires ipse servantur & restituantur, unde frustra vitalis indicatio a curatoria separatur.

123. *Ablatis morbi principii non necessario tollitur morbus*, sed ablata causa necessario tollitur; principium etenim est illud ex quo intelligitur alterius possibilitas. Cum itaque his positis morbus tantum possibilis sit, sed non existat necessario; datur aliud ex quo morbus existit, scilicet causa, qua persistente, persist morbus; ergo sublatis principii, si persist causa, morbus non tollitur. Vanum est itaque principia seu causas, ut ajunt, remotas tollere, nisi in quantum horum ablatione opus est, ut causa tollatur. Granum arsenici vellicat ventriculum, inde natura monita conatur per vomitum hoc venenum expellere; causa vomitus est determinatus ille naturæ conatus quo ventriculus sufficienti vi & directione apta contrahitur ut per œsophagum & os contenta expellat. Sublato conatu tollitur vomitus; verum quamdiu est venenum in ventriculo, hujusce conatus principium, ex sympathiz legibus Naturæ vires superflites urgentiori huic malo occurrunt, adeoque conatum vomitorium efficiunt; ergo ut tuto tollatur vomitus, ejus principium est removendum prius, deinde sedandus per narcotica dolor ventriculi, viresque per analeptica reficiendæ.

124. *Ablato principio, quod natura conatus determinat, ut plurimum natura conatus, atque morbus, qui hujus effectus est, cessat*. Hoc principium est *causa morbi*, quam idcirco nosse nostra refert quam maxime, & quam pro causa habent Medici, quasi conatus naturæ huic principia foret necessario connexus. Verum hallucinantur illi, quod principium cum causa confundant, & quod ex principio naturæ conatus mechanica necessitate fluere contendunt. Hujus erroris exempla præbet febris theoria, cujus quidem principium est sæpius obstructio a sanguine viscido: sed tantum abest ut hæc obstructio mechanice febrim inducat, quin e contra per se pulsus tardior, rationem, & minorem inducit, atque nisi natura vires cordis in majori ratione intendat, quam qua ab hisce obstructionibus absumuntur, pulsus naturalem magnitudinem & frequentiam attingere nequeat.

In hoc casu prima indicatio est distributionem virium inæqualem mutare in sanam; verum natura morborum medicatrix hoc solum præstare potest, adeoque hoc tantum Medico agendum incumbit, ut occasione, quæ naturam ad hoc inæqualem fluidi nervi distributionem determinavit, auferat. Auxilia vero visciditatem sanguinis, contracta sunt, diligencia, solventia,

atque quantia, &c. adeoque secunda indicatio fert ut ea auxilia, quæ occasione morbi debellant, adhibeantur; verum quoniam natura morbis medetur, quando occasiones sublatæ sunt, atque ad hoc ut scopum suum possit attingere, ea viribus continuo indiget; vires autem passu quiete, somno reparantur: huic indicationi, quam vitalem vocant, continuo satis est faciendum diæta & gymnastica convenientibus. Symptomata non sunt quid a morbo diversum, sed horum concursus, seu ut *Piscarnius* ait, complexio morbus est, atque natura symptomata urgentiora excitat quoties pars quædam causæ (noxie) urgentior est; adeoque ut urgentiori occurrat Medicus, juxta prudentiæ leges symptomatibus urgentioris causam debet statim aggredi: atque sic indicationes quæ primariæ se menti ratiocinantis Medici offerunt, seu quæ petuntur a morbo integro, ultimo sæpe loco sunt adimplendæ.

125. *Auxilia, quæ sibi mutuo omnino contraria sunt, inutilia sunt*, & quæ partim sibi sunt contraria, tantum valent quantum vi unus excidit vim alterius. Sic si æger refrigerandus sit, quod decem aquæ frigidæ cyathi præstare possunt, additis toridem aquæ calidæ cum frigida cyathis nihil officitur nisi diluendo, quod non agendum proponitur, & si dosis calidæ excedat quinque cyathis frigidam, æger calefit hoc toto excessu; cæteri oppositi se mutuo destruant, adeoque inutiles vel damnosius sunt; hoc non advertunt illi qui medicamenta simplicia contemnant, & ea inepte & inopportune combinant, Legi meretur hæc de re *Boyle de simplicium medicaminum præstantia differens*.

126. *Natura est morborum medicatrix, Hippoc. & sanitatis turix ex Galeno*. Natura etenim est facultas quæ ciet in nobis motus ad longævitate[m] moraliter necessarios, ut omnis ævi senserunt Medici. Illa vero ope fluidi nervi & musculorum vel membranarum motus illos exsequitur, partim a viribus seu fluidi nervi copia, partim a organorum structura & seu determinatos; ea enim cogitur uti instrumentis corporis qualia sunt, ut musculus utitur tantum clavicymbalo quale est, adeoque limitatos quod vim, & coactos quoad organorum situm & figuram, motus exsequitur natura, cujus agendi modum, leges, fines, errores, excessus, languores & impetus nemo melius intelligit quam qui in semetipso pathemata animi sedulus observavit; ea, siquidem animæ ipsius rationalia esse conatus ad bona consule percepta ad movenda, mala vero potissimum moralia removenda, facile quisque concipit. Attamen hos pathematum impetus esse rationi semper convenientes nemo concesserit: atque e contra docet philosophia eos esse intra justos limites continendos, adeoque nunc excitandos, nunc frangendos.

Idem de naturæ conatibus morbois dictum patet, licet etenim ratione finis ferper, sint salubres, evenit tamen sunt vel debito fortiores, ut, cui natura irritabilis stimulat, vel debito languiores, ut cum parietis laxa nobis sensus, solentur.

abum.



obunditur; inordinati, cum intellectus ipse metu, ira, desperatione vel alio modo agitur.

127. Unde hoc potissimum incumbit Medico, ut naturæ conatus efficacies coerciat, languidus excitet, inordinatos dirigat, ut docet Sydenham.

128. Natura non simulata monstrat modestibus, qua via sit incedendum. Galen. In morbis potissimum acutus Medici sapientes, si naturæ scopum in his non recte cognoverint, cunctari debent, & naturæ finem, tendentiam, conatus investigare ac observare, nec interea medicamina turbantia interponere.

129. Quo natura vergit, et dandendum est per loca convenientiora: Hippocr. Natura autem ut plurimum ducit materiem morbosam ad colatoria, uteris, intestinorum, vesicæ, entis, narium, uteri, &c. Si vero hujus conatus propter organorum, vel fluidorum vitium alio dirigantur, ut in cor, lienem, &c. ubi nulla sunt colatoria, immo si foris in pulmones, hepatis, cerebrum hujus conatus dirigantur, oportet Medicum naturæ motus animadvertere, & si quidem idoneus fuerit, subministrare, & adjuvare, si autem contrarius ac nemini, prohibere, transferre ac divertere, Galen. aphor. 21. sect. 1. qua vero in segre judicantur & judicata sunt, neque morore, neque viore aliquid sine medicamentis sive aliter irritando, sed sine, Hippocr. aphor. 20. sect. 1.

130. Prima intentio in morbis est materiam morbosam coactam per vias ordinarias, & loca proximiora amandare; aut si nullæ sint, aut non sint liberæ viæ, tunc eas sibi cudit natura, unde hæmorrhagie & suppurations. Natura ubi plurimum a morbo (id est materia morbosica) superatur, ne certare quidem adversus morbum aggreditur: Galen. 3. de casib. cap. 9.

131. Naturæ motus ordinati, determinatique sunt, ubi valida est & materiam dominatur, propriasque perficit operationes; indeterminati, inordinati & incogniti, si quando succumbat: Galen. lib. 3. de crisib. cap. 10. & lib. 2. de diebus decretis.

132. Natura, animalium servatrix est morborum finitrix ac decretrix, quod conveniens est servat, quod alienum est separat: Galen. lib. de facult. natur.

133. Naturæ tria opera quæ se consequuntur in morbis, concessio, secretio & vacuatio. 4. aphor. commentar. 22. & 23. ipsa sibi vias ampliat non cogitatione, partim vero ut convivere, scalpere, pandiculari, oscitare, tussire, singultire & id genus alia, quæque incedita natura & indocta quæ opus sunt, efficit: Epidem. Hipp. lib. vi. Galen. comm. 11.

134. Natura paulatim interdum operatur, quæ fieri non posse videntur. Gal. 7. aphor. comm. 36.

135. Historiam morbi specialis curandi perpectam habere nihil est in praxi præstantius. Si morbi cujuslibet historiam diligenter perpectam haberem, par malo remedio non quam non scirem adferre, varia ejusdem phenomenon, viam qua mihi incedendum so-

ret, hand dubiam præmonstrantibus. Sydenham præf. pag. 10. in febrium cura opus est specierum accurata diagnosi, quæ frustra quaeritur apud Neotericos. Stahl.

136. Ignorata morbi specie, indicatio à juvantibus & lædentibus sumenda nobis saltem relinquitur: cujus ope viam paulatim præterentes ægram in tuto possumus collocare, modo ne plus fatis properemus; quæ quidem sententia nihil ego quicquam extitisse esse autumo, nec re ulla alia febricitantium plures vitæ polari: Sydenham, anacaph. p. 158.

137. Perfecta & integra est indicatio in qua cuncta bene procedunt: primo melior est crisis quæ fit per evacuationem consuetam, quam quæ per abscessum; secundo per quam humor noxius & abundans, quam per quam alter evacuat: tertio quæ recto tramite, quam quæ non recto procedit: quarto post has, quæ facile toleratur: demum quæ cum coctione fit: Galen. in aphor. 20. sect. 2.

138. Quo magis jam processit methodus certa natura: eo minus tolerat interurbani. Stahl. casual. min. pag. 373. adeoque, ut monet Hippocrates, si quid movendum est, initio move.

139. Qualls est homo in moribus, talis est in moribus naturalibus, & tanto magis, quæ magis est urgens negotium; Stahl. Id docet experientia in febribus, & viris pacate negotia moralia pertractantibus; pacate ut plurimum & ordinate procedunt labores morbi: in junioribus, prævalenti & vivido ac tumultuario ingenio præditis, tumultuarie vivideque procedunt febriæ molimina; in feminis timidis, & quæ animo levi de causa perturbantur, conamina naturæ debilia & tremula, ac inordinata sæpe videntur.

140. In morbis quodlibet symptoma indicat auxilium ipsi contrarium & exigit; sic in febre calor indicat refrigerantia; frequentia pulsus sedantia; velocitas sanguinis motum compescantia; acrimonia fluidorum demulcentia; siccitas & sitis diluentia, humectantia; oris fordities, ventriculi pondus, nauseæ, cardialgiæ indicant emetica vel cathartica; debilitas musculorum analeptica, &c.

141. Quo plura sunt symptomata morbum constituentia, eo pluribus est satisfaciendum indicationibus; atque quo plura sunt simul negotia perpetranda, eo major diligentia, sagacitas, prudentiaque requiritur; adeoque eo sæpius errores admittuntur, seu major est difficultas: nisi Medicina sagax sit, & in medendo exercitatus, atque nisi singula scorum symptomata apprime distinguere & impugnare didicerit, is symptomata simul conjunctimque irrudentia difficile debellabit.

142. Quodlibet medicamentum vires habet diversas in unum aggregatas; sic ipecacuanha est eximium adstringens & emeticum; manna catharticum, bechicum, diureticum; nitram refrigerans, dissolvens sanguinem, diureticum; adeoque uno eodemque medicamine pluribus simul symptomatibus mederi possumus, modo recte sympto-

symptomatum principia & varias medicaminis vires ipsis oppositas cognoscamus, in quo magna requiritur Medici sagacitas & peritia. Calor v. g. crevit a viscositate sanguinis, solidiorum retentione, fluidorum & solidiorum motu velociori, nisi fortiori, stragula densioribus, alimentis salitis, aromaticis, &c. adeoque apprimè distinguendum est num datus calor compesci debeat per diluentia vel per laxantia, per sedantia & anodyna, vel per debilitantia, ut phlebotomia, catharsis, an stragula sint removenda, an demulcentia, diuretica præscribenda, prout principia caloris diversa sunt.

143. Quo pluribus simul symptomatis vel indicationibus satisfacimus eo melius est. Sic in pleuritide quoniam missione sanguinis sedatur dolor, minuitur calor, compescitur tussis, sublevarit difficultas respirandi, febris remittitur; e contra vero siccus extas applicatis tantummodo alterutrum ex his symptomatibus debellatur, tanto satius est sanguinem mittere, quo plarius ab hoc auxilio symptomatis medemur; in dysenteria, data ipecacuanha, saburra stomachi aufertur, vis ipsius tonica restituitur, vasa intestinorum hinc constringuntur, alvus conficitur, adeoque pluribus simul satisfaciendationibus; adeoque aliis aliis illud est anteposendum.

144. Cum duæ indicationes adimplendæ simul se offerunt, ambabus simul est satisfaciendum, nec una dimittenda, ut altera tantum impleatur, modo utrique satisfacere simul sit possibile. Sic si apoplexia a saburra pendens curanda sit, quoniam sensus & motus privato indicat stimulantia, sanguinis viscositas & lentor attenuantia, saburra ventriculi evacuantia, &c. non ea seorsim usurpanda sunt auxilia, sed simul uno emetico tribus indicationibus simul faciam satis.

145. Cum duo auxilia simul indicantur quorum unum alteri symptomati confert, nullatenus vero aliunde nocet; aliud vero unum symptoma quidem minuit, sed alterum auger, illud est anteposendum auxilium quod minime nocet. Sic in phthisi bechica calida puris expectorationem juvant, sed fervorem pectoris intendunt, bechica vero incrasstantia expectorationem tantum promoven, nec pectoris fervorem intendunt, adeoque vi illius regulæ posteriora prioribus sunt anteposenda.

146. Si auxilia sibi mutuo repugnant, inquirenda sunt alia, quæ se mutuo non destruant. Obstruendum hepar indicat incrascentia, acrimonia sanguinis indicat incrasstantia, hæc auxilia sibi mutuo repugnant: ergo se mutuo destruant; confugiendum itaque ad diluentia, quæ acrimonia simul & viscositatem minuunt.

147. Cum duæ diversæ indicationes adimpleri simul nequeant, tunc urgentiori est occurrendum: eo urgentius est symptoma, quo nobilior seu magis ad vitam æqualem necessaria est functio læsa; sic syncope magis urget quam anorexia; si itaque anorexia indicet cathartica, quæ syncope valeant inferre, & syncope car-

diaca, quæ anorexiam intendunt, præstat in hoc casu syncope curare, & anorexiam negligere. Si unum symptoma dependeat ab altero, symptomati primitivo satius est occurrere quam derivativo. Sic si quis ideo vomitu laboret, quia cibos salidit, cacostia est symptoma primitivum & urgentius.

Si vitium, quod cinchonæ cortex vel kina corrigat, originem præbeat calori febrili, ille cortex, licet exsiccat, licet palato displicet, indicatur ab hoc vitio utpote urgentiori. Si vitium sit principium continuationis symptomatis, illud est urgentius, quam si sit principium interpolatum.

148. Si morbo compositionem ex pluribus symptomatibus diversis generis, potest ille referri ad quodvis genus; sed referri debet ad illud genus, ad quod pertinet symptoma urgentissimum; urgentissimum dicitur illud symptoma, quod minori tempore solet mortem afferre, unde patet dolorem non esse semper urgentissimum symptoma, ut in phlegmone.

*Piscam. de divisione morborum.*

Optima therapie methodus ea est quæ viis simplicia, eorumque symptomata seorsim (cognoscenda &c.) medicanda exhibet, qualem sermo in aphorismis suis secutus est Boerhaave, quos itaque rite cognitis supponimus. Sic cum in febre sint frigus, calor, sitis, nausea, dolor capitis, lassitudo, pulsus relative fortior, &c. quid ea sint sigillatim symptomata, quibus principiis debeat ascribi, cuius causæ tribui, prius intelligendum est: mox quænam ex illis principiis diversis ejusdem symptomatis concurrant in febre distinguendum, ut factum viderimus *Dissertation sur la cause de la fièvre jointe à l'Hémorrhagie*. His cognitis inquirenda est horum symptomatum connexio, successio, energia; perspicuum est quodnam urgentius seu primitivum, quodnam derivativum seu ab aliis dependens, atque auxilia urgentiori & primitivo contraria sunt applicanda, quæ eo meliora & magis specifica erunt, quo propter diversas suas vires pluribus simul diversis vitiis debellandis erunt aptiora. Sic in syncho putri infusum fenæ materiem febrilem biliosam viscidam expurgando præstat, quia saburram sanguini inspissandam aptam detrahit, stomachum ex hac saburra gravem, & nauseandum liberat, fluidorum intestinalium secretionem, adeoque uberiores sanguinis depurationem promovet, hinc liberiores facit in his visceribus circuitum; vermes si adsint, enecat; viscerum excretionem adjuvat; putrefactiones & inde oriundos meteoisimos prævertit, &c.

#### *Praxis febrium generalis.*

149. *Frequentia pulsus* debet proxime illi naturæ parcimonie, quæ ad causas morificas minori virium suarum sumptum pinset, subigat, & expellat, illud sæpius intra datum tempus iteratis potius quam audacis quoad magnitudinem pulsibus exsequitur; cum enim vel pulsui majori vel

vel pulsu frequentiori possit tantum intendi. vis vitalis adversus haec materies, natura, cum vinbus pulset, atqueque adauget, ut in cursu, iracundia, febribus acutis & brevi terminandis, atque tunc brevi & cum magno virium dispendio materies morbiſica, si sit, subigitur, vel finis intentus obtrahitur: vel pulsus tantum quoad magnitudinem crescit, ut in apoplexia, minia, tuncque non tanti interest velocitatem intendere simulque viribus parcere, quam cum vasa sanguifera fluidis putredinis foſcitate, aut obstruuntur, & sic circulationi opposita est resistētia: vel denique frequentia tantum adaugetur, non adauca, immo quandoque imminuta magnitudine, atque hac opera cum eodem virium dispendio velocitas progressiva sanguini necessaria major conciliatur, quam a magnitudine tantumdem adauca. Quantitas enim motus, quo sanguis arteriam dilatat, adeoque pulsus majorem facit, vires cordis absorbit; sed oil sanguinis circulum promovet, com illius directio sit axi vasorum perpendicularis: atque si majus sit magnitudinis decrementum, quam frequentie incrementum, major velocitas ipsi sanguini conciliatur cum minor virium dispendio, quod accidit illis qui perterriti, vel exhausti sunt.

150. Auxilia frequentiae pulsus ea sunt, quae ejus occasionem remouent. Sic com ideo pulsus est frequens, quia vires sunt exhaustae, ut in convalescentibus, evacuationis, haemorrhagias palis, analeptica & reficiētia conveniunt.

151. Si ideo pulsus sit frequens quia natura subito terrere percussa fluidum nervum retinet, & non satis distribuit, auxilia moralia metum discutiētia tantum profuunt.

152. Si resistētia circulationi opposita hos conatus excitat, opera praetium est, ut haec tollatur, atque in hunc finem diversa sunt auxilia prout diversa est resistētia: nam si sanguis 1. cordi resistat mole sua, seu plethora, tunc abstinentia & phlebotomia remedia sunt. Si 2. viscositate, & ut ajunt, siccitate, peccet, nimiosque affricus ercet, diluentia & humectantia primas tenent. Si 3. propter moram & vasorum interitum sanguis concreverit, ut in patella accidit, adstringentia amara, chalybeata, atque maxime cinchona & clarea seu castorei cortex mira praestant. Si 4. ideo sanguis difficile vasa trauset quod acrimonia quavis *murianica*, ut in scorbutu; *patrici*, ut in synochis; *venerata*, ut in pestilentibus; *cadaverosa*, ut in sphacelo; *purulenta*, ut in phthisi, &c. vasa vellicet, molestet & in contractionem provocet, tunc antiscia, edulcorantia, vel cathartica, vel antispasmodica, vel diaphoretica prius nata conveniunt. 5. Si saburra primis visis suppeditat, vel frigus vel miasma sanguinem inspissaverint, nunc cathartica, nunc solvencia, nunc diaphoretica sunt in usum advocanda. 6. Si spasmus hysterico costricta sunt vasa, vel dolor crispata, tunc optima febrifuga, quae vasa laxant, & dolorem, ac sensibilitatem minuant.

153. Interest non raro maxime, ut circulo sanguinis Nosologia Methodica, Tm. I,

sanguinis solita magis acceleretur, quātes scilicet promovenda est uberior miasmata ipsi consensum secretionis, & excretionis, purulentae materiei per data cola evacuationi, quam necessitatem natura perſentit ex obſcura quadam molestia, atque ea molestia motivum est intendendae pulsus frequentiae citra ullam vel fluidorum spissitudinem, vel vasorum angustiam, atque in hoc casu subsequens perspiratio, sudor, diarrhoea, vel putularum, exanthematum eruptio febris moderat, nisi novus, ut purulentia, suppediteat continuo fomes, vel materia moleſtans.

154. Quandoque vero naturae conatus eo vergere videntur, ut novum dilatare colatorium, vel fluidi alicubi contenti dissolutio per calorem febrilem promoveatur; sic puerperis dilatanda sunt vasa mammarum galactophora, ut recens nati pabulum paratur; glandulis impictus humor est solvendus, dentes extrorsum trudendi, vasa ad incrementum corporis sunt explicanda, immutanda constitutio, atque tunc febris naturae soli committenda.

155. Ex his autem sequitur illos errare, qui vel semper saburram pro occasione febris incusant, licet & frequenter cooccurrat; vel qui sanguinis spissitudinem assiduum febris comitem esse pronunciant: in hoc autem Medici sagacitas elucet, quod di versa febris principia hic recensita ab invicem distinguat, sicque convenientia, quae sponte patent, cuique casui aptet auxilia.

#### Erigit Febrile.

156. Frigus est molestia sensatio, quae ab imminuto partium ignearum impetu in corpore nostro dependet. Illa impetus imminuit refrigeratio dicitur: est autem proportionalis, 1. quantitati partium ignearum, quae avolant, & 2. duplicata earum, quae remanent, tarditati. Sensatio vero eo intensior est, 1. quā major est refrigeratio; 2. quo minus affluat aut velocius calor succedat; 3. quo sensitiva facultas, seu sensibilitas major.

157. Quantitas partium ignearum in major e corpore nostro avolat, 1. quo corpora ambientia nobis frigidiora sunt; 2. quo densiora corpori nostro applicata frigida; 3. quo saepius antertur calida & halitosa, quae nos ambit, atmosphaera; verum ea non est refrigeratio febris origo.

158. Tarditas particularum ignearum corpori inhaerentium eo major evadit, 1. quo radix virium sanguinem & fluidum nervum propellens minor est. Si 2. fluidum nervum & sanguis quadruplo debilius promoveatur, duplo tardius moventur particulae igneae ipsi contactae, unde frigus quadruplo majus. 3. Eadem tarditas crescit in ratione subduplicata resistētia sanguini fluidoque nervo oppositae; unde si resistētia sit novies major, triplo tardius moventur igneae particulae, & frigus novies majus exurgit, atque ex his duobus principiis potissimum erueudum est frigus spontaneum.

159. t. Si morborum initio natata fluidum nerveum in arcus parcius immitatur, eo sine ut in motum organorum vitalium referretur, decrescit illius in omne actus & in cutim impetus, atque cum fluidum nerveum ipse materies electrica & ignea, quæ motu suo calorem conciliat partibus, actus & cutim refrigerari necessum est, in ratione composita ex duplicata tarditate, & simpla quantitate fluidi nervi suppressi; hinc intensissima frigoris sensatio in febribus algidis, in intermittentiis insoluta, quæ eo gravior, quo magis subitanea & insolita.

2. Si sanguis vel visciditate, vel copia, vel prava sabutæ miscela, vel obstructione, aut constrictione vasorum retardetur, eum refrigerari necessum est, atque cum major sit tarditas in minimis vasis, adeoque in illis quæ a corde remotissima sunt, ut cutanea, tam quia vis a corde impressa partim in tractu absumpta fuit, tum quia minima vasa majores afficiuntur exposita, ubi sanguis retardatur est, tum quia aeri frigidiori sunt propria, in vasibus cutaneis & in extremis arbutus, ut digitis, naso, frigus quam maxime persentiri debet.

160. Frigore contriungi partes omnes membranas ipsa docet manuum corrugatio, digitorum imminutio, annulorum laxitas hieme superveniens; nervos itaque ac lymphaticos tubos contriungi a frigore febrili necessum est, quia fluido igneo, quod dilatabantur, obli sunt, unde proprio elaterio coarctantur, verum in majore ratione decrescit transfluxus fluidorum per vasa minora quam per majora, licet proportionate constituta; quia officia minorum magis accedunt ad dimidium molecularum minimarum, quam officia majorum, nec possunt paululum decrescere, quin diametrum minorem acquirant, quam est ipsa globulorum tranaturorum diameter, unde obliatio; cum itaque nervi tubuli omnium sint exilissimi, atque textus rarissimi, transfluxum in illis præpediri, & calorem ex illis citius volare consequitur, calor enim eo facilius ex corpore quovis in vicina densiora diffunditur, quo major est densitatum differentia: *Hamburger. de frigore nervifico, §. XXX.*

161. Medulla spinalis est origo nervorum præcipuorum, qui ad corporis ambitum difseminantur; qua proportionem itaque in ipsis nervis retardatur fluidum nerveum, solidumque coarctatur, debent frigoris vibrationes, velut ab spinali medulla & dorso procedentes, persentiri, tum maxime cum loci mutatione, vel suam frigidam æger capiat, vel atmospheram calidam stragulis frigidis impertit, quia quidem sitas intra lectum mutatione ita contriungitur cutis, ut perspiratio maxime cohibeatur: *Santtor. sect. 4. aphor. 25. sect. 5. aph. 4. &c.* Ex hac nervorum constrictione stupor partium frigidarum satis intelligitur.

162. Cum cutis sit fere tota nervosa, utpote viscus organum, nervique externi maxime constringantur, totam cutim coarctari necessum est,

porisque ejusdem ratione contriungi, secretionem cutaneam suppressi, pilos erigi, excrescere, atque si sint ibi vasa sanguifera, ea ita imminui, ut vel evanescant, vel eorum non accipiant, unde pallor; vel non transmittant acceptum, unde livido labiorum, digitorum, genarum: in his vero circumstantiis accidit ut extrema vasa sudorifera obstructa ab accedente materia sudoris in papulas albas extuberent, unde cutis aspera, asperinæ similis.

163. Si voluntas interea motum muscularem artuum jubet, cum per nervos coarctatos non nisi exigua trahi queat fluidi nervi copia, idem accidit ac in illis qui summe debiles & exhausti motus instituunt; motus scilicet sine incoacinni, tremuli, semiparalytici, moruli interpolati, frequentes & debiles; aut in artibus magis, in interaneis, ut corde, minus, calore in exterioribus magis imminuto.

164. Ea omnia phenomena ex subitanea fluidi nervi suppressione intra cerebrum facta fieri possent illam resistentiam mechanicam in vasibus & nervis prævalent suadere videtur quod nobis idea quadam terribili, aut terrore subitaneo commotis accidit; a simplici cujusdam horridi facinoris narratione petteritis gelidus per ossa dimanat tremor, & horreficimus.

165. *Horror* est involuntaria, vix oculis conspicua, totius corporis succussio, sensu frigoris & constrictione stipata. *Rigor* vero dicitur eadem succussio paulo major, & oculis conspicua, cum artuum rigescencia, & motus voluntarii impedimento, atque ut plurimum maxillarum mutua collisione, & dentium crepitatione, seu tremore spasmodico.

166. Illi motus ab intenso frigoris sensu procedunt, siue artus contracti reapse frigidiores sint, ut in intermittentiis plucimarum accessu; siue calorem Medicis palpantis ratione retineant, ut in epiala videre est, dum æger se frigidum persentit; is tremor quandoque cohibetur a voluntate, si æger ab omni vel minimo motu, a loquela, siue mutatione abstinat; siue mirifice redintegratur; sapius vero nullo artificio a voluntate præpeditur, utique calor febrilis huic proportionalis ab interioribus ad exteriora diffusus fuerit.

167. Hujus erethismi vis tanta est, ut stragulis onerosis, immo hominibus ægro superimpositis, per aliquot horas cohiberi non possit subfusculus, adeoque amplexus artuum ut & maxillarum convelli nullum dubium est: sed ad hoc ut muscoli extra vi convellantur necessum est, ut vi proportionalis fluidum nerveum ad hos projiciatur, quod cum voluntas non perpetret, sola natura efficere debet.

168. Scopos naturæ in instituendo rigore, is videtur esse, ut quod elasticitatis constrictione frigori tribuenda non potest exsequi, hujus & artuum vibratorius motus perficiat, seu ut respicula circulationi opposita, fluida scilicet a cruditatibus ut plurimum inspissata, aut nimis viscida, calore adacta; & tritu repetitio fluida-

silitatem recuperent; unde fit ut motus febri-  
les in quibus nulla datur prævia sanguinis in-  
spissatio, nullo frigore nec tremore adorian-  
tales sunt ut plurimum triplex: quæ sine  
frigore exacerbantur, sic febricula, quam ira,  
vel gaudium, vel exercitium vehemens excitant,  
nullo frigore præcludit.

169. Quo intensius frigus præcedit, eo major  
proportionate sequitur calor, quia, si vires  
naturæ vigeant, frigoris, adeoque inspissationis  
vehementiæ respondere debet copatus febrilis  
vehementia, unde calor; immo quo den-  
siora sunt corpora, eo majoris caloris sunt ca-  
pacitas, docent Phisici, adeoque partes quo ma-  
gis frigore sunt densatæ, eo data sufficienti vi,  
intensiores calorem suscipiunt; verum si vires  
naturæ sint exhaustæ, tunc simulcum accidit  
æquilibrium, seu lethum, unde qui febre de-  
centi defungantur, illi ut plurimum in frigore  
accessus vel paroxysmi pereunt.

170. Auxilia frigiditatis febribus, intellectu natu-  
ræ scopo, manifesta sunt; ut enim naturæ  
opitulemur, minuenda est fluidorum præsertim  
subcutaneorum inspissatio, simulque vires vita-  
les, si minores sint, intendendæ.

171. Minuitur fluidorum inspissatio auxiliis  
externis & internis; externa auxilia sunt cor-  
pora calida cuti, pedibus, manibusque admotæ;  
lintæ hic præstant, quia cuti ætius undique  
circumvolvuntur; interna sunt potus calidi,  
diluantes, assatim bibendi, nisi oblatet nausea  
in tertianis frequens, juvanda, & non sollicitanda.

172. Vires vitales intenduntur spiritibus,  
cardiacis, aromaticis, quæ tamen non nisi ubi  
vires vitales exhaustæ sunt debent advocari, ne  
superato frigore calor ardenter exurgat; æt  
si metus sit ne æger frigori succumbat, ut ex  
pulsus exilitate & intermissione, sensumque  
imminutione judicatur, tunc ad potiones car-  
diacas & sudorificas confugiendum est.

#### Calor Febrilis.

173. Est sensatio molesta ex particulis ignea-  
rum quantitate, & impetu adactis oriunda;  
quæ quidem est proportionalis facultatis sensi-  
tivæ acuminis, & ex parte corporis, est ut fa-  
ctum ex particulis ignearum, in dato spa-  
rio, quantitate, & harum velocitate duplicata,  
modo par sit densitas corporis; cum calor non  
a calidis admotis, sed ab affricto dependet, tunc  
ille corporum sese mutuo conficiuntur velo-  
citate duplicata, & mutue compressioni, ac  
que densitati respondet, ut aorunt Phisici.

174. Caloris maxima proprietas est omnia cor-  
pora rarefacere & expandere, eaque corporum  
expansio caloris gradum indicat, nec non est  
corporum densitati & duritie reciprocæ, atque  
eorum calori directe proportionalis.

Docet autem observatio expansionem maxi-  
mam sanguinis a calore 90. graduum in Ther-  
mometro Reaumuriano vix esse centesimam par-  
tem soliti voluminis; sed calor maximus homi-  
nis vivi a causa interna vix unquam quadrage-

simum gradum attingit; ergo nec ab hoc calo-  
re sanguis una sui voluminis parte ducentesi-  
ma rarefieri potest.

175. Principia caloris sunt alimenta, potu-  
lenta, vel elculenta, partibus igneis, alkalino-  
volatilibus, aromaticis, spiritibus sæta, ut sali-  
ta, piperata: fermentari spiritus, adu calida;  
tum externa calida, ut ær æstivus, insolatio,  
hypocausta, thermæ, &c. nec non quæ mutuum  
affricum solidorum & fluidorum intendunt, ut  
vis cordis adacta, motus muscularis, curren-  
do, vociferando, irascendo, &c. intensus, ma-  
xime in plethorico & denso corpore.

176. PHENOMENA. 1. Diffunditur uni-  
formiter calor per partes in ratione densitatis,  
ita ut fluida, solidaque tum mollia, tum ossæa,  
si sint ejusdem gravitatis specificæ, æqualiter  
caleant, ne cuncte exceptæ, si ær frigidus ar-  
ceatur. 2. Laxantur & aliquatenus rarefcent  
partes omnes solidæ, fluidæque una circiter  
ducentesima parte, proindeque augmentum vo-  
luminis in singulis arteriis non potest radu di-  
lingui, potest tamen cognosci in artubus inte-  
gris rite mensuratis. 3. Glutinosus quivis hu-  
mor a gradu caloris 40. non superante fluxi-  
lior evadit, nisi successu temporis uberius fe-  
rum æqueum ayolet. 4. Si calor natiuum supe-  
ret, sensus anxietatis & molestiæ suboritur; si  
tantum adæquet, voluptas & facilitas motus  
accedunt.

177. COROLLARIA phenomeni primi. 1. Si  
alicubi sit scirrhus visceris, licet huic frigi-  
dum statuant Scholastici, tumor ille in ratione  
sue densitatis incalescit, tardius tamen orga-  
nis, in quibus velox est circulatio & magnus  
affricus, 2. Cerebrum, cerebellum & medulla  
spinalis sunt omnium viscerum minus densa,  
adeoque minus incalescunt cæteris; renes den-  
sissimi sunt, ac proinde magis incalescunt. 3.  
Tam exiguum est caloris discrimen in diversis  
partibus, ut exquisitissimis thermometris intra  
vivencia animalia immissis, hoc distingui vix  
possit, & calor ille in statu sano ad 32. gra-  
dum circiter allurgit.

178. COROLLARIA phenomeni secundi. 1. Om-  
nes fibræ, tum longitudinales, tum circulares,  
elongantur, quæ frigore & fervore decurrantur;  
adeoque omnes sectiones transversæ vasorum &  
receptaculorum cresunt proportionaliter. 2.  
Major proinde libertas circulationi & secretio-  
ni, quæ data eadem vi motrice, celeriores pau-  
lulum debent evadere; sed quanto? Hoc deter-  
minare difficillimum, sed tamen operæ pretium  
est. Si nativa orificiorum summa in ultimis  
ramis arteriæ mesentericæ sit effective 20. pars  
orificii trunci, jam vero calore evadat 19.,  
quod maximum est incrementum, velocitas in  
trunco ante calorem adactum est ad velocita-  
tem adandam, ut 19. ad 20. verum si crescant  
fibræ circulares una 20. parte sue longitu-  
dinis, vix una centesima crescant sectiones seu  
orificia; ergo & velocitates in truncis. 3. Om-  
nes pori & omnia vasorum oscula liberiora de-  
bent.



bent humores suos paulo uberius excipere; ergo perspiratio cutanea major, cutis mollior, laxior, capilli minus stricti, magis dimissi, omnes artus paulo magis turbidi. 4. Globuli rubri sanguinis, qui vasa suo diametro congrua tantum subire possunt, iam magis patula & lymphæ recipiendæ prius apta subunt, unde rubedo faciei, cutis totius; sed arteriæ sensibiles pari ratione debent intumescere, ex eo quod laxiores factæ minus resistent sanguinis pressioni, hinc pulsus paulo major. 5. Secretiones quæ fiunt in renibus & in ore, decreverunt in calore febrili, quia liquida per vim adhesionis vasculorum lateraliū fecernenda, quando vis adhesionis impetum circulationis valde remissum superat, ut patet ex Theoria Hambergeriana.

179. COROLLAR. *phenomena febrii.* Sanguis eo magis solvitur, & fluxilis evadit, quo magis recedit a frigore congelante, & a fervore coagulante, ut multiplici experimento compertum habeo: sanguis itaque calore febrili circa 33. gradum constituto maxime solvitur, adeoque ejus calor is ope materiam tenaces, viscida, quæ prius hærebant in vasis, eaque obturabant, fluxilitatem suam recuperant, unde a linteis, lateribusque calidis parti dolenti admotis dolores a frigore arti discutiuntur.

Serum sanguinis calore resolvitur in fluidum halituosum, expansibile, elasticum, ut patet ex theoria expansibilitatis *Clariss. d'Alambert dans l'Encyclopédie*; atque in eo statu vapor ille aeri ambienti eo fortius adhæret, quo major est temperaturæ differentia, demonstrant *Illustr. Hambergers de igne*; solvitur itaque vapor ille inære circumfuso, exsilurus ratione gravitatis specificæ minoris, avolat sursum hieme, quoquo versum æstate; hinc perspiratio uberior, cum aer est electricus, frigidulus & siccus: parcius, cum calidus & humidus est, minusque electricus; aer enim quo siccior est, eo majorem halitus humidi copiam in se suscipit, ut sat alkali fixum plus humidi ex ære attrahit quo siccior est; hinc liquet quanti momenti sit ad perpirationem augendam, & sudorem abstergendum succis linteis uti, & ab humidis vestimentis cavere.

Sudore in declinatione caloris febrilis oborto, auferuntur humores sanguinosi, excrementitii, sæpe fecitii; serum enim illud est limum sanguinis; cui scilicet partes salinæ maxime adhærent; si itaque ab hac salsedine molestabatur natura, ut cum febris a suppressa perpiratione ortum ducit, depurato sic sanguine morbus solvitur, & æger cum somno, ac sanitatē redit in gratiam solius naturæ auxilio.

Auxilia in calore febrili moderato, qui nec agrypniam, nec anxietates inducit, ab ipsa natura indicantur, scilicet stagulum detractio & potus frigidus. Gradus caloris, ac sustinetur cum euphoria, & sine exortu novi symptomatis, videtur utilis ad materiam morbosam resolutionem, colatoriorum renum & cutis diductio-

nem; unde sit ut eo sedato fiat urina crassior & sudoris copiosior secretio, dolorum immutatio, febris deservescens.

Verum si calor increverit usque ad ephaligiam, anxietates, aliaque symptomata molesta, dignum est, vel nimiam esse fibrarum tensionem, nimiumve sanguinis acrimoniam & viscositatem, aut demum naturæ conatus esse nimium validos, adeoque moderandos esse; auxilia vero etiam natura commoustrat, scilicet phlebotomia, ventilationem, & potum frigidulum.

Cum enim persæpe fervente febrili calore, viribus vitalibus auctis, vas excretoriis calore diductis, sanguis fluxilior factus sibi viam cudad per nares, uterum, allaque colatoria, illaque hæmorrhagiæ periculo non vacent, si profusiores fuerint, ars medica debet eas præcere, & supplere per moderatam, & si opus sit, repetitam & brachio, vel pede phlebotomiam, quæ in ipso calore febrili sole celebrari: priores phlebotomiæ e brachio, posteriores e pede institui solent, maxime si cephalalgia adtuerit.

Non raro accidit ut post phlebotomiam; si saburra in primis viis turgent, æger vel vomiturat, vel alvum ubertim deponat, adenque si saburra adsuerit, Medicus naturæ opitulari debet, & sufficienter depletis vasis, turgentem saburram leni emetico ad exitum sollicitare, & subsequenti die catharticum diluens & mitioribus sub prescrite forma præscribere, maxime si saburra biliosa calorem fovens turbanda sit; observamus enim febrilem ardorem alvo fluentē scilicet temperari.

Cum calor est siccus, & mordax, acrimonia & viscositas sicca sanguinis significatur; hule vero medentur potus copiosus frigidulus ex aqua fontana cum paulillo oleri, vel piscina ex limonibus, aut emulsionata, quæ non solum æstum sanguinis contemperant, verum sitim extinguunt, anxietates sedant, sanguinem diluendo, & edulcorando.

Ventilatio est aureæ puræ frigidolæ usus, quo nihil utilius in morbis summi calore stipatis, modo tamen sudoris reprimendi metus oco sit, & non subita nec magna sit mutatio, aut temperaturæ differentia, quæ rigores postea suscitaret; in ipsis variolis *Sydenham* nihil præstantius existimabat ad resingendum calorem febrilem, quam si æger bis in die in lecto sedaret, & sic lumbos continuo decubitu urentes hac ventilatione paulum refrigeraret, quod in febribus non eruptis, æstate, si vires vigeant, perutile censet. Calor febris intermittens initio observatus sub axillis, in ore & pectore, fuit ad grad. 90. in alio subiecto ad grad. 87. in ardore seu acme 104. in sudore non. post febrem 93. In febre remittente calor erat a 98. ad 99. cum sudore remissionis 96. In quartana initio accessus 87. in acme 100. cum celeri & parvo pulsu calor fuit infra gradum 94. thermometri Fahrenheitiani.

# CLASSIS SECUNDA.

## FEBRES.

### ORDO PRIMUS.

#### FEBRES CONTINUÆ.

Scholasticis Continentes: Græcis *Myreta synchyma*, *synchoi*; Continua Boerhaave & Practicis; Continentes Stahlio, Junckero: vide Galen. 1. Epid. com. 3. Sennert. de febr. 1. a. cap. X. Gallis *Febres continuæ*.

**CHARACTER Classis.** Concurrunt pulsus magnitudo & frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, & semper virium prostratione major quam a virium vitalium gradu foret expectandum.

**Character Ordinis.** Impetus febrilis a frigore sepius exordians sine exacerbatione partiali, & sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem ægitudinis perseverat.

Proinde continuæ sunt, licet 1. quolibet mense circiter revertantur, ut ephemera mentrua, unde aberrantia discrepant; licet 2. incrementum ab initio usque ad statum more aliorum morborum, sed semel tantum; cum exacerbantur uti intermittentium pluries, & sine causa evidenti revertatur, aut crescat in paroxysmis & accessibus partialibus febrilis impetus; factitia est divisio continuarum in homotonas, epacasticas, & paracasticas; omnibus enim febribus commune est, & in declinatione symptomata decrescant, atque in incremento & statu majora sint.

**Historia.** Incipiunt a lassitudine, capitis gravitate, frigore, horrore, sed citra tremorem & dentium crepitationem, tunc calor in dies crescens usque ad acmen cum cephalalgia, siti, virium prostratione, decubitu assiduo; nulla exacerbatio nisi a causa evidenti, demum declinante morbo mador, sudor, vel alia evacuatio.

**Symptomata in functionibus animalibus.** Tales vocant motum liberum, sensum, appetitum. *Sensus* lassitudinis in toto corpore, gravitatis vertiginose in capite; cephalalgia, gravis sapor in ore, anosmia sæpe. *Motus* localis artuum, linguæ, difficilis, vacillans, dein decubitus supinus, vel horizontalis. *Appetitus*; famis nulla vel exigua, sitis urgens, fastidium carnis, & solidorum, sitis aquarum, acidulorum, frigidorum, libido nulla, appetitus tabaci nullus.

**In functionibus vitalibus.** Tales sunt pulsus & *Respiratio* in frigore parva, frequens, coacta, in calore magna, frequens. *Pulsus* in frigore exilis, intermittens, intercadens, frequens, in calore plenus, frequens; in declinatione molles, undosus.

*Sævages Nosologia Methodica*, Tom. I.

**In excretionibus.** Saliva pauca, mucosa; mucus linguæ, gingivarum, labiorum cinereus, luteus, quandoque nigrescens; urina in decursu morbi calidior, turbida; mador cutis, ac sudor in declinatione; dejectiones alvi liquidæ, sæpe foetidæ; mucus urinarum parvus hæmorrhagiarum.

**In qualitatibus.** Insulatus febris sæpius ab extremorum frigore, faciei pallore, ut plurimum sine tremula artuum successione; dein calor assiduus, fere uniformis, nisi major in statu, mollities cutis in declinatione.

**Characteres generum.** 1. *Celesticis* traditi, sunt deceptivi. Illi siquidem essentialia febrium differentia repetebant a subiecto caloris morbo cui sedem præbebant spiritus, unde *ephemera* & partes solidæ, unde *hectica*; fluidæ, unde *humoralis* febris exurgebat. Rursus omnis humoralis oriebatur a putredine sanguinis, unde *synocha* & *synochus*; *bilis*, unde *tritæphya*, causus, & *tertiana*; *pituita*, unde causus a *pituita* falli, *epialos*, ab acida, quotidiana; & *amphimerina*, ab insipida; *melancholia*, unde quartana & *tetartophya*; *bilis* & *pituita* simul, unde *hemitritæus*, &c. *Hæc sunt de febribus*. Sed cum essentia febris foret calor, differentia ab essentia petita, seu essentialia debebant repeti a gradu caloris, non a subiecto: ergo errabant Galenici. Præterea calorem in distincta parte residere putabant, cum calor tamen sese in vicina æqualiter distendat ad æquilibrium usque, demonstrante Boerhaave (*Cibum, tom. 1. de igne*). Demum putredo insufficiens est ad calorem febrilem excitandum, & gratis illum vel illum humorem putrescere, ac putrescendo hoc vel illud genus febris inducere pronuntiabant; falsis itaque principii characteres generum innotebantur. Verum vera sint ea principia, characteres illi sub: sensus non cadunt; quis enim unquam sensibus percipit causam quatenus talem? Quænam est connexio inter pituitam & accessus quotidianos, & c. Characteres itaque generici febrium, a causis etiam veris petiti sunt deceptivi.

Non minus est erronea divisio febrium a Neotericis accepta in *essentialis* & *symptomaticas*; illas vocant, quæ sunt alterius morbi effectus; illas, quæ ab alio morbo non dependunt; verum 1. quoniam febris juxta ipsos pro causa habet vel obstructionem capillariam, vel cordis irrationem, vel nervorum distractionem, atque juxta eosdem illa vitia veri morbi sunt, seu status viciosi partium solidarum, fluidarumve, ex quo functiones læduntur, omnes febres ex his principii debent esse symptomaticæ, nullæ essentialis; 2. quia in sensus nunquam incurrit causa quatenus causa, nec proinde incurrit quidpiam

quatenus effectus alterius, nec proinde quatenus symptoma, atque mutata, ut saepe fit in febribus, causarum doctrina, mutaret generalis febrium divisio, quæ supponit v. g. ulcus pulmonis esse causam, cujus amphimerina tabida effectus est: fieri enim potest ut vel a communi causa dependeat tum ulcus, tum febris, aut ut ulcus a febre promanet, cum febris suppurationem præcedat sæpiissime: ideoque hypothetica, & proinde erronea est illa divisio fundamentis mutabilibus innixa.

Nec paucioribus erroribus obnoxia est divisio febrium in *humorales* & *non humorales*, illas vocant, quæ a fluidorum vitio ortum ducunt, istas, quæ a solo solidorum vitio oriuntur, ac foveant; verum 1. illa divisio innititur principio hypothetico & in sensu nequam incurrenti, quæ a putredine & malignitate humorum produci putantur; a spina tendinibus infixa fieri posse ostendit *Holmesius*: homini sanissimo frangatur cranium, illico sopor, bilis vomitus, dein febris, meteorismus, lingua sordida, aliaque signa febris putris aut malignæ accedunt: dentes fortis in infanti progerminant, inde febris, spasmus, vomitus, nansæ, ructus, diarrhæa, facies virides, flavæ, putres, quæ omnia erumpentibus dentibus, secta gingiva cessant. Anne a fluidis, an a solidis ex pendent? quandonam seorsum laborare solida a fluidis? Anne ex hypotheticis principiis pendere debet febrium divisio & historia? 2. Ex eo quod sit abscessus, fistula, ulcus, maxime in parte dolente, ut extremo digito, anne febris exurgens solidistantem debet tribui? num sanguis inflammatus, pus acre, ichor ulceris nihil ad febrem concurrunt? quo jure humoralem, quæ sit a bile, non humoralem, quæ a pure foveatur, non appellaveris? cum Antiqui has omnes, excepta Ephemera & Hæctica, humorales & putridas nuncuparent. Si quis ad hæc dicat, sic voluisse patres, idem est ac si diceret.

*Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas.*

Sed si alios ad consentiendum cogere velit, istytannis pejor est, observante *Galeno*, illi enim facta quidem, non vero animi sensa cogere, & auctoritate sua determinare suscipiabant; atque illis regulis regerendum est, quod parcos deliquere, hoc celare gnari debent, atque animal rationale non usq. multo minus abusu, sed ratione ducendum esse.

#### *De Principiis continuarum.*

Obices circulations oppositi, vel materies stimulant in vasis sanguiferis, febribus occasionem præbent, sive enim 1. vivo animali ligaturas injicias, sive in venas liquores sanguini inspissando, coagulando aptos infundas, hinc febris exsurgit, (*Baglivi de febribus mesentericis. VVesler. citur. aquar. pag. 52.*) 2. Si acida, alkalica, aromatica, verbo æria quævis, in sanguis ductus immittas cum *Baglivi*, sive aciem puram, spinam carnis, tendinibus vivorum

animalium infigas, observante *Holmesio*, hinc febris exurgit continua.

Verum causam febris effectricem ab occasione sumnoperè distinguendam monuimus: docet enim mechanica a resistentiis oppositis machinarum hydraulicarum motus retardari; atqui tamen machina cordis post hæc obstructions acceleratur, adeoque necessum est ut potentia motrix in ipsum agat accelerando in majori ratione, quam materia febrilis retardando. Sit dimidia pars sanguis ductuum obstructa, cordisque vis eadem remaneat, iam dimidio minor sanguinis copia ex arteriis in venas, ex venis in cor, ex corde in arterias, transfunditur, eadem etenim in extremis arteriolarum orificiis velocitas perstat, quæ semper est ut, virium motricium radix ex hydraulicis, (*D. Pitet. de Pompeis. Mem. de l'Acad. 1735. princip. 3.*) sed quantitates fluidorum tranantium sunt in ratione composita orificiorum minorum & velocitatum: ergo dato orificio duplo minore, & velocitate eadem, duplo minor est fluidi quantitas, dato tempore transfluens: quod est probandum.

Velocitas qua moveret embolus ab eadem vi applicata, eo minor est, quo minus est orificium per quod fluidum ab embolo projectum evacuari debet; verum per orificium integrum sanguine ex arteriis in venas fluente cordis contractiones erant integræ, & septuagesies intra minutum perficiebantur, ergo per dimidium consueti orificium fluente sanguine, cordis contractiones vel erant duplo minores eodem numero, vel duplo rariores vel eadem magnitudine, adeoque eadem data vi cor contrahente, nedum pulsus velocitas, aut magnitudo crescat, ambas vel alterutras imminui mechanica jubet necessitas. Sint, sub illis circumstantiis obstruendum, vires cordi applicatæ quadruplo majores solito, quoniam velocitas in sanguine orificia ultima tranante hinc duplo major evadit ex hydraulicis, quod ex orificio deficit, præcise pensat aucta velocitas, adeoque tantumdem transluet sanguis ex arteriis in venas quantum in statu sano, nec proinde pulsus vel major, vel frequentior evadet, sed tantum firmitior, aucta scilicet collisione columnarum sanguinis: adeoque cum constet, vel conceditur obstruere esse ultimos sanguis ductus, ut in malignis febribus, licet pulsus nec major, nec frequentior sit solito, vires cordis esse solito majores haud dubium est.

Si vero, iisdem positis, pulsus tantum duplo major quam in statu sano sub eadem frequentia superveniat, quoniam velocitas sanguinis pulsus magnitudini respondet, velocitas duplo major exsurgit, adeoque vis cordi applicata quadruplo major est solito, sed eam prius quadruplam evicimus, ergo sexdecuplam, seu quadruplæ quadruplam evasisse consequens est.

Qui concedunt itaque *Bonetus* & *Boerhaave* febrem ex sanguinis velocitate mensurandam esse, illi fateantur necesse est quod, datis obstru-

ctio-



tionibus, febris cum pulsu quoad magnitudinem & frequentiam sano possit consistere, atque aucta magnitudine, febris major exultat.

Verum si sub iis circumstantiis obstruendum, non solum magnitudo, sed etiam pulsuum omnium duplo majores evadant, quoniam velocitas sanguinis sub eadem pulsus magnitudine, numero pulsuum intra datum tempus, seu frequentia est proportionalis, atque est semper ut radix virium, cum velocitas ex hoc solo capite duplo major sit, vim ex hoc solo nomine quadruplam, adeoque junctim cum magnitudine sexagesies, & quater solita maiorem evasisse necessarium est. Illud autem est causa febris quod seculum importat necessario febris symptomata pathognomonica; verum vis cordis adacta in majori ratione quam vires artuum voluntati subditorum, secum importat pulsus crebros, vel magnos, vel firmos, invitis obstruentionibus; atque exinde fit ut natura virium pares, fluidum verum ab artubus libertati subditi detrahatur; atque ex hac virium vitalium vehementia, attritus, calor, sitis, aliaque symptomata febrialia sponte fluunt; ergo eam esse febrem causam nullum est dubium.

**COROLLARIUM 1.** Febris potest consistere cum pulsu quoad frequentiam tantum adaucto, modo vires musculorum libere movendorum sint imminutæ; hæc est febris frequentissima.

**COROLL. 2.** Febris potest consistere cum pulsu quoad magnitudinem tantum adaucto, modo vires musculares in minori ratione sint adauctæ, aut absolute minores confectis.

**COROLL. 3.** Febris consistere potest cum pulsu & majori & frequentiori, ut in tritæophya ardenti aliisque acutis.

**COROLL. 4.** Febris consistere potest cum vi pulsus sanam non excedente, ut cum quod ex magnitudine deficit, frequentia pensat, aut quod ex frequentia deficit, magnitudo vindicat, modo tamen vires artuum sint absolute minores.

**COROLL. 5.** Febris potest consistere cum vi pulsus infra sanam constituta, modo tamen vires artuum in majori ratione decreverint, ut accidit in tritæophya, lippia, aliisque malignis.

**COROLL. 6.** Nequaquam assentimur *Bontekus* & *Bourhaave*, qui febrem ex pulsus velocitate metiuntur, cum velocitas pulsus adaugeri non possit nisi scilicet ex frequentia & magnitudine majus sit, atque nisi vis pulsus sit absolute major.

**COROLL. 7.** Nec assentimur illis qui ex frequentia sola febrem æstimant, nulla habita virium muscularium ratione, si enim vis pulsus quoad frequentiam increseat pari passu ac vires artuum, ut in ira, & cursu veloci, febrem adesse nemo pronunciat, & si patitur vis pulsus decreseat quoad magnitudinem in eadem ratione qua decreverint vires artuum, ut in extremo mortis agone, ibi non febrem, sed tantum frequentiam a debilitate ortam novimus.

**COROLL. 8.** In omni febre debet adesse notabilis virium absumptio, seu conatus faculta-

tis vitalis hujus facultatis viribus & simul causæ uoxie intensitatē proportionalis, atque ille conatus febris essentiam & veram ideam absolvit.

Febris conatus non semper prælio sunt, verum quoties febris principia prælio sunt, etiam subito non raro invadunt, etiam si jam dudum materiam febrilem intra machinam & vasa etiam sanguifera nidulentur; verbo, a longe præparatur febris apparatus, & dein ex improviso febris quandoque exurgit, quæ norunt Practici. Non derepente morbi hominibus accidunt, sed paulatim collecti consensim apparent & *Hippocrati*. *Ballon. de virg. morb. c. 7. p. 10.*

Prælium etenim febrium sæpe videtur indicare saburras in sanguine, quæ hujus motum retardant & vasa minima infarciunt, ut patet ex capitis & corporis gravitate, hæcundione, pulso parvo, raro, inæquali; cibi & exercitii consueti fastidio; ante plures dies præcelit vel perspirationis, vel catameniorum suppressio vel crapula, &c. & tandem febris subito adoritur.

Febris deinde per unam alteramve diem increseit, & præterea in exacerbantibus sine causa evidenti febris certis horis increseit; aliis vero remittit; in intermittentibus post plenam pyrexiam febris velligia relegit, deinceps recedit.

Effectus sunt certissime suis causis proportionales (*Præf. Morb. 21.*) si itaque pro causa febris assignetur vasorum obstruendo, quæ tantum ejus principium est, tunc febris deberet adesse, cum vasa ingurgitantur, major vel minor protinus magis vel minus infarsa sunt. Verum ea esse infarsa paucis horis ante insultum maxime, post paroxysmum & accessum minus, nemo bona fide negare potest, atque tamen febris ante insultum continuatur & post accessum intermittit plures alios illatur: nulla omnino est; ergo data causa vel majori vel minori, nullus tamen effectus daretur, quod est absurdum.

His regerunt Neoterici, non quamvis fermenti, seu materiei febrilis quantitatem ad febrem sufficere, sed eam requiri quæ vasa distendat ultra diametrum consuetum; sed vanum subterfugium; vel enim dimidia hujus quantitatis ad febrem necessaria pars vasa distendit & obstruit quoad dimidium vel non; si primum, dimidium febris obstruendo proportionalis adesse debet, quæ tamen nulla est, atque quoniam materies illa sensim & per gradus cumulat, febris non illico, sed gradatim accendi deberet, quod sæpe falsum est. Si secundum, nulla quantitas materiei vasa obstruit & distendit, cum hujus dimidia nequidem dimidium producat, seu pronuntiandum est effectus suis causis non esse proportionales, seu quod eodem recidit, ex minimis causis, immo nullis, effectus maximis inferri posse, adeoque dari effectus, aut effectum partes sine causa, quod absurdum est.

Pluribus ardet opinio solo fimento innixa, dari vel ventriculo, vel in pancreate, hepate, mesenterio, &c. massam febrilis materiei quam *fomentum* vocant, quæ ex hoc receptaculo, vel continuo vel per vias interpolatas,

fermentum illud invisicans in sanguinem refundi, unde febris continua vel interpolata.

Verum quogenio, quo mechanismo nunc continuo, nunc per vices tantum hæc transfundatur materies nemo dixerit; semel autem hoc insulo fermento, cur statutis horis exhauriatur fomes suo tempore reintegrandus? quare iteratis cathartici, emetici, iusculi diluentibus, bilem, succum pancreaticum, primas vias funditus everrentibus, febres intermitteutes pertinationes evadant, docente *Sydenham*, licet fomes ille expurgatus fuerit? cur ab animi pathemate recurrant sopite febres? cur a gravi nuncio, a negotio inopinato superveniente, accessus vel retardetur, vel auferatur? cur a scopeti explosione pone aures, rusticus accessus removeant? quid inde adversus fomitem?

Verum quorsum hæc disputo; hanc theoriā invenit opinio, mechanices ignorantia sovit. Esto, sit fomes sanguinem inspissans, sanguis inspissatus necessario cordis motum retardat, pulsus minuit, ex demonstratis, atque ut in his circumstantiis velocitas & numerus pulsuum crescat, vires cordis admodum majores debent impendi. Quis in hydraulica ita rudis est qui ex resistentiis vires machinarum intendi putaverit? nugatorias hac de re fisiones confutare pudet, principia evertere satis sit.

Motus cordis non debetur mechanica partium dispositioni, & viribus semel ab ortu impressis, nec aliis causis, quas mechanicas appellant Neoterici.

Cordis contractio debetur vi fluidi nervi per nervos cardiacos immisi tantummodo, sanguis enim per venas appellens conducere tantum, adeoque contractioni obstat potest. Sanguis per arterias coronarias influit in textum cordis, sed contractio cordis, adeoque effectus est ille influxus, non vero causa contractionis.

Jam vis fluidi nervi vel ab encephali viribus dependet, vel a motore animato qui encephalo præest. Sint vires encephali mechanica quæ fluidum nerveum promoveant, illæ totum suum motum habent a vi sanguinis per arterias immisi, & a vi elastica pulpe cerebri, hoc pronunciat ipse *Borhaave*. (*Oratio de elastica*) qui ait, „ut agat cor, nervorum neget „virtute, quæ lacertos ejus excitet. Neque „nervis hæc facultas, nisi a cerebello est. Atque „huius potentia imputanda arteriarum „sanguini, per pulsus ejusdem cordis ad cerebrellum appresso. „Causa ergo hic, effectus suo prior, tamen ab hoc pendet. Et hic adeo effectus suam iterum causam facit.

Verum vires a corde sanguineis columnis impressæ sunt ut arteriarum ab aorta prohibescunt fricticia; atque cum carotidum simul & vertebrarum orificia sunt viis tertia pars orificii aortæ, vix tertia pars virium cordis sanguini impressarum superest in sanguine caput irrigante; jam cerebellum est in recens natis tantum nona pars cerebri & 57. pars totius corporis; cum itaque sanguinis influxus sermo sit, ut moles irrigandæ, sanguinis in-

fluxus in cerebellum est 9. pars illius qui in cerebrum tendit, & 57. illius qui totum corpus pervadit; verum quantitas influens est mensura virium; nam exsurgit ex velocitate & vasorum sectione conjunctim; ergo vis sanguinis cerebellum pervadentis est 57. pars virium a corde toti sanguini impressarum, jam vero pars est minor toto, adeoque vix quam fluidum nerveum cerebelli potest accipere a sanguine cerebelli est ad vim quæ cor debet exere, ut 1. ad 57. seu 57. minor. Tota illa vis fluidi nervi cerebelli influit in cor contrahendum, quoniam cor nec illa machina majorem vim potest habere, nec effectum præstare quam est vis motoris ipsi applicata. Fluidum nerveum non potest cordi impertire majorem vim quam 57. partem ejus, qua cor in antecedenti contractione indigit; ergo si a fluido nervo per arterias tantum propulso moveri debeat cor, effectus erit major sua causa, seu idem cor movebitur, quia fluido nerveo vim & motum impressit, erit itaque vis cordis ipsi vi cordis tribuenda, seu motus cordis erit causa sui ipsius, proindeque motus cordis erit effectus sine causa vel ipsius, proindeque motus cordis erit effectus sine causa, quod est absurdum. Reliquum est igitur ut cordis motus singulis pulsibus efficiatur a motore animato, quo deficiente, ut post mortem, cessat cordis contractio; a quo, ut in pathematis vividis, crescit, & oppresso, ut in timore, opprimitur cordis motus.

Idem alia via demonstrare possumus: sanguis ea velocitate fluit ex corde, ut possit quovis secundo viginti pedes horizontaliter percurrere (*Hæmaph. p. 300. n. 40.*) per orificium aortæ 97. lineas amplum; ut autem fluidum nerveum ventriculum sinistrum cordis contrahat, necessum est ut saltem eandem vim habeat, quam sanguis a corde emissi columnæ, ex principiis Hydraulicis & nominatim ex *Phoronomia prop. 31.* vires enim quæ se mutuo æquiliant in fluidis sunt ut facta ex duplicata velocitate, orificiis & densitatibus fluidorum, adeoque si supponamus eandem sanguini & fluido nervo densitatem, atque orificium simul sumptum in nervis cardiacis sinistrum ventriculum petentibus millesimam partem aortæ, velocitas fluidi nervi debet esse 31. vicibus major velocitate sanguinis in aorta, seu 620. pedum intra secundum: Verum velocitas sanguinis in ultimis arteriis ex *Kellio* est 5230. vicibus minor quam in aorta; ergo velocitas quam fluidum nerveum potest a sanguine per cerebrum circulate mutuari, est 26130. vicibus minor quam ut possit cor contrahere.

**COROLLARIUM.** Obstructiones in minimis vasculis motum cordis minuunt, ergo & motum sanguinis in cerebello; adeoque cum motus febriis supponat conatus & vires cordis adaudas, saltem in acutis, nec possit cordis motus augeri nisi aucta fluidi nervi velocitate, immutato sanguinis motu absurdum est velle fluidi nervi

motum

motum exinde adaugeri: seu febrem ex obstru-  
ctionibus per leges mechanicas oriri.

Si regerant fluidum nervum esse infinite rari-  
us & tenuius sanguine, adeoque in ipsis pres-  
sione velociorem motum ipso sanguine concipere,  
cum velocitatis impressæ ab eadem vi fluidis di-  
versæ densitatis sint inter se ut radices densita-  
tum inverſe, non refragabimur. Sic itaque densitas  
fluidi millionies minor densitate sanguinis, ve-  
locitas quidem erit decies millies major: verum  
vis fluidorum diversæ densitatis est in ratione  
composita ex duplicata velocitatis & densitatis  
simpli, eum itaque densitas fluidi nervi millioni-  
esies minor sit, licet velocitatis quadratum mil-  
lionesies majus evaserit, unum ab altero vindic-  
atur, & vis ex utroque resultans non major  
est, quam si densitates fluidi nervi & sangui-  
nis æquales supponamus: & hæc dicta suffi-  
cient adversus Neotericos, qui ignorata mathesi,  
morbos mechanice explicare suscipiunt.

Febres & plegmæ sunt duæ tertie partes  
morborum ex *Sydenhamo*. Hominum quadrage-  
sima pars febre, vel cum febre moritur. *Graunt*  
*medicæ observat. on the bills of mortality.*

**I. EPHEMERA.** Latinis *Diaria*, *Effemera* Ita-  
lis; *febris inflativa* Arabicis quibusdam; *Eph-  
mera* Gordon. Lil. p. 3. *Effimera* Gilberti An-  
glici: *L'éphémère*, *courbature*.

*Character.* Genus est febris continuæ quod citra  
dimidiam septimanam sponte cessare consuevit.

*Symptomata in functionibus animalibus:* Insul-  
tus subitaneus, sæpius ante diluculum, nulla lassitu-  
dine notabilis præcedit, illico dolet caput, ja-  
cet æger. *In functionibus vitalibus:* Pulsus plen-  
us, liber, expeditus, frequens, respiratio fre-  
quens, pulsant tempora isochrone cum arte-  
riis. *In excretionibus:* Halituosus est sudor, po-  
tissimum declinante morbo, urina vix mutata.  
*Qualitates:* Cum aliquali frigore, aut sine  
rigore & horrore invadit, unde ab insuleto ru-  
bzolæ distinguitur. Calor mollis vaporosus sequi-  
tur. Rubet totum corpus, in primis facies cum  
aliquali turgescencia, unde febris inflativa dicta.

*Ordo Symptomatum.* Prædiluculum nullum, prin-  
cipia seu occasiones procatarcticæ ut plurimum  
adfuere, ut error in ingestis, applicatis, &c.  
Insultus fere sine oscitatione, horrore, somno-  
lencia, sed subitaneus, ita ut protinus æque  
magnus sit ac in vigore, eum pulsus frequentia  
modica, calore miti vaporoso, repente, ut ait  
*Lawsonius*, totus morbus simul accedit, status  
morbi per diem circiter, aut ad summum per  
duos tresque dies viget, sine ullo gravi incom-  
modo, demum raro per hæmorrhagiam, sæpius  
per copiosos halitus aut sudores terminatur.

Principia procatarctica sunt ea quæ leviter  
motum sanguinis retardare valent, quæque la-  
bore unius alteriusque diei possunt solvi, vel  
eliminari, adeoque naturæ tam parvo incom-  
modo nequaquam opprimitur, bellum cito desit-  
tum indicit materiam morbosicæ, quam consu-  
te perferat, brevi & facile cessuram, adeoque

eam sine magno apparatu aggreditur, & sine  
curba, sine mora profligat.

Diariam omnem sola fere natura curat, ra-  
ro accersitur Medicus, illam crasse quam no-  
visse facilius est, quia tempus deficit ad dislin-  
guendum utrum futura sit synocha, vel syno-  
chus. Abstinencia a cibo, potus calidus aqueus,  
eum quiete sufficiunt.

1. *Ephemera plethorica*; *Ephemera ex opilatione*,  
*ex vino*, *ex suppressa perspiratione*, *ex cibis*  
*calidis*, *Avicenna*, T. II. pag. 16. *Diaria in-*  
*flativa* *Anthoni*.

*Principia.* Plethora est in ratione composita ex  
directa ingestorum & inversa excretorum; adeo-  
que eo major est 1. quo ingestorum quantitas ma-  
jor intra datum tempus, 2. quo vires coctrices  
sunt majores, 3. quo qualitas ingestorum est  
succulentior. Ingesta sunt, vel esculenta vel  
potulenta: illa vero fere tota in sanguinem tran-  
seunt, & cum grata ac fermentata ea copio-  
sius, jucundius ingeruntur, unde frequentiores  
sunt excessus in potu quam in cibo, esculenta  
tamen delicatius parata, scerula lauta, in puer-  
iscopædæ, cibi conditi ita ut gulam iritent,  
plethoræ pariter favent, quia copiosius assu-  
mantur, & facilius digeruntur: hæc sunt in-  
gesta quæ per se non inducent plethoram nisi  
sint ad egesta in solito majori ratione.

Verum egesta vel absolute vel relative immi-  
nuta pariter concurrunt; egesta vel egerenda  
alia sunt assueta, ut via perspirationis, urinæ,  
sudoris, alvi, seminis: vel insueta, ut per hæ-  
morrhagiam narium, podicis, uteri; puris;  
ichoris, ex fontanelis, ulceribus, fistulis escu-  
læ, phlebotomiæ consuetæ. Plethora crescit 1.  
in ratione quantitatis materie egesti solite, quæ  
retinetur; sic quoniam perspiratur plus mate-  
rie quindicies quam per alvum ejicitur in dato  
tempore, (observante *Sanctorio aphor. 10. sect. III.*)  
plethora a cohibita perspiratione cutanea toties  
est major quam quæ a consipatione alvi potest  
exurgere; 2. in ratione facilitatis qua materies  
suppressa sanguini remiscetur; sic a suppressis  
catameniosis plethora multo citius incrementum  
quam ab urina suppressa, quia aliquot dies re-  
quiruntur ut urina suppressa ita velicam & ure-  
terem repleat ut in sanguinem regurgitet, statim  
vero sanguis menstruus fluit in venas hypogastri-  
cas; 3. in ratione durationis hujus suppressio-  
nis; sic si per biduum suppressum sit ulcus, dup-  
lo plus retinetur ichoris vel puris in massa  
sanguinea quam si per diem stetisset effluxus.

Moles fluidorum, adeoque pondus corporis,  
potissimum hieme, crescit citra sanitatis derri-  
mentum, tribus libris ex *Sanctorio*, æque quo  
robustior est homo, eo majus pondus fluidorum  
citra noxam gestare valet: interea tamen pul-  
sus & major & frequentior est post partum, quam  
ante partum, & frequentia illa post majorem  
partum major est, minor post minorem  
ex observatis *Robinsonii*. Pulsuum jejuni esse  
ad pulsuum præstii numerum ut 70. ad  
76, supponamus, verisimile est magnitudinem  
in ea-

in eadem ratione crescere, adeoque cum ea citra morbum crescat per aliquot horas, vis cordis increfcens una sexta parte per aliquot horas morbum non infert; pondus itaque fupersuum quod anſam præbet Ephemera eſt in robuſtis majus trihus libris, ſi de perſpiratione retenta quæſtio ſit. Quoniam tamen intra noctem, & a fortiori intra nycthemerum poteſt major quantitas perſpirationis evacuari (*Sanctor. ſeſt. III. Aph. 1. 20. 69. &c.*) non mitum ſi Ephemera, quæ copioſos halitus excitat, ſponte ſanetur.

Homo jejunus intra noctis ſpatium uncias octodecim circiter perſpirat, (*Sanctor. aphor. 2. ſeſt. III.* cibo vero reſectus ſi concoquat, quadraginta uncias perſpirat; ergo perſpiratio jejunus eſt ad perſpirationem paſti ut 9. ad 20. Homo ſanus quolibet mane revertitur ad idem pondus quod pridie habuerat, ſi cibis utatur; ergo ſi altera die cibis abſtineat, non ſolum minus ponderabit quam pridie tota quantitate, quam aſſumere conſueverat, ut verbi gratia, 109. uncis; verum tota ea quam hacce ſecunda die perſpirabit, ac per alias vias amittet, quæ ſere eſt 49. unciam; ergo ſi 109. uncias aſſumere conſuevit; jam jejunus per integrum diem ſi erit ſere 10. libris levior, quam fuerat pridie poſt paſtum, quod de illis quiſſemet in die manducant intelligendum eſt.

Qui exercentur ad uſque ſudorem ambulando, amittunt intra ſemi-horam octo vel novem uncias, ſeu octies magis, quam ſi æſtate quieviſſent, & homo pinguiſ ſimili exercitio trigieſis magis perſpirabit quam ſi æſtate quieviſſet. Verum, Ephemera augeat calorem & ſudorem, non minus ac celer ambulation, atque his proportionalis eſt perſpiratio, adeoque veriſimile eſt ab Ephemera pondus decies ſaltem magis minui quam in ſauiate ſaſtum eſſet.

Æſtate perſpiratio eſt ad urinam ut 2. ad 1. Ab ambulatione vel equitatione perſpiratio eſt ad urinam ut 4. vel 5. ad 1. ergo a calore & ſudore perſpiratio creſcit in majori ratione quam decreſcit urina; ergo licet ab Ephemera minuatur urinae quantitas, pondus totius corporis ratione perſpirationis maxime minuitur, atque ſic perſpiratio unius diei plures venæſectiones compenſat.

Die 14. Septembris 1752. hora quinta matutina correptus ſum Ephemera plethorica; febris erat magna & ſine præluſio, præter inſomnium, calor acer, deglutitio difficilis, cephalalgia gravatva magna, febris poſt duas plethoromias nocte ſequente reſceſcit.

In inſomniæ cogitationes importunas de obſecto quodam injucundo experiebar, quoties ſomno indulgebam, & penes me erat ſomnum abigere ſimulque inſomnium, ſed quamdiu ſomno indulgebam, hoc phantaſma a mente depellere minime poteram.

Numerus palſationum mihi ſano eſt 730. in minuto primo, & in hac febre mane erat 94. reſpere 98. Calor aeris 17. grad., calor vero

pedum meorum erat 35. gr. thermom. Reaumurii, & paulo ultra; e vulſuſculo venæ vix uncia tres ſanguinis quovis minuto effluſebant.

Numerus reſpirationum durante febre erat 27. intra duo minuta, ita ut cum cor pulſabat 196. vicibus; reſpirabam 270. vicibus; numerus reſpirationum erat 7. pars numeri palſationum cordis.

2. *Ephemera nauſeatiua* Avicennæ, tom. II. p. 3. *Ephemera ex crapula*, ex ſatiæte, ex cacochylia, a cruditate Sennetti; *Ephemere d'indigeſtion*. B. Dyſpeſia ſeu difficultas digerendi alimenta eſt in ratione compoſita ex debilitate ſtomachi, quantitate & reſiſtentia ingeſtorum.

*Debilitas* ſtomachi eo major eſt, quo minus in contractionem nititur, tum ob remolitionem ab oleoſis, aqueis tepidis diu uſurpatis; tum ob anætheſiam, ſeu ſenſus imminutionem propter vicia nervorum, cerebri, ſtudium, mœrorem, pathemata, fluidum nerveum alio derivantia; tum ob rigiditatem & phlogiſmum ventriculi.

*Quantitas* ingeſtorum eſt ut pondus ciborum quovis paſtu aſumptorum, ſimulque paſtum numerus intra datum tempus, adeoque ut volumen & gravitas ſpecifica eorum conjunctim.

*Reſiſtentia* digerendi eſt ut tæacitas & viſcoſitas ciborum, nec non cacochylia, ſeu ſucci gaſtrici obducantis ventriculum, ut eorum durities, cruditas, adiapeuſia; nec non ut ſenſibilitas ſtomachi, qui ſi doleat, phlogiſi tentetur, irritetur nimis, ex cibis mollioribus eandem reſiſtentiam experitur, ac ſanus ex duriſſimis.

Ingeſta ſunt vel ad putrefactionem prona; ſcilicet fermentefcent vegetabilia cruda, acida, ut fructus horæi, acetaria, cremores ex ſarinoſis, panis male fermentatus, placentæ, vina recentia; hinc ptaliſſimus, ructus acidi, morbus ventriculi, colicæ, flatulentia, pondus in epigaſtro, nauſea, &c. Facile putrefcunt eſculenta ex carnisbus diu coctis, diu maceratis animalium carnivororum, avium, rapacium, piſcium ejuſdem indolis, ex horum ovium, ſuſculis, gelatinis: item vegetabilia acra ex claſſe craciſformium, umbelliferarum; aromata condimenta aliis permixta; hinc ructus odorofi, foetidi, horror, oris amaror, ſætor, nauſea, vomitus biliſi, cardialgia, pondus ventriculi diuturnum, capitis gravitas. *Succi crudi*, ſubacidi, copioſi ſanguinem inſpiſſant, vaſa inſarciunt; inde reſiſtentia cordi & vaſis oppoſita, quam Ephemera repetitis vaſorum iſtibus ſuperat, ſanatur.

Succi acres, putres, injucundi moleſtiant vaſa ſanguifera, unde ſenſu coſuſo natara excitata febre ephemera eos per diaſmum, ſudorem, urinas, diarrhœam exterminat.

3. *Ephemera a frigore*; *Diaria VIII.* Foreſti quam ipſe paſſus eſt ex itinere cum vento frigido. *Diaria ex balneo frigido, pluvia frigida; Diaria ex mare, terebre, &c. B.*

Refrigeratio corporis non ſolum perſpirationem cohibet, unde plethora; verum & humores ſigitt, denſat, unde cordis opponitur reſiſtentia, quam

molestiam tollit natura conata & attrita febrili, qui diariam illam constituit: moror & metus eandem inducunt in corpore mutationem; nam molestia & timor impediunt perspirationem; *Sænter. fest. VIII. apb. 8, 9, & 16.* & perspiratio impedita a quacunque causa molestiam & timorem facit, *apler. 8.*

4. *Ephamera a calore, Ephamera ab insolatione, hyperæsthesi, thermis, amœchæsi, haluæ, &c.: ab ira, furore, exercitio violento, labore immodico, pervigilio, a sudorificis, cardiacis, liguoribus ardentibus. B.*

Calor est in ratione composita ex simpla quantitate partium ignearum & alkalinarum, simpla densitatis fluidorum ac tensionis solidorum, & duplicata velocitatis, qua invicem ambo colliduntur.

Quantitas partium ignearum crescit ab insolatione, thermis, potu servido, spirituoso, cibis aromaticis, piperatis, salicis, alkalescentibus, condimentis, cardiacis, sudorificis, acerbis.

Tensio solidorum respondet viribus contractivis cordis, simulque resistentiæ sanguini transfluxu per vasa minima adauctæ, tono fibrarum vel per laborem affectum, animi pathemata, &c. adaucto.

Velocitas est ut radix virium, quæ cor, musculorum contrahunt in febribus, laboribus, pathematibus, cursu, equitatione, vociferatione, &c. impensatur.

Huic ansam præbent principia caloris extrinsecæ, ut insolatio, haluæ fervidus. Calor directus solis est duplex caloris reflexi, seu illius quæ ex thermometro metimur; sed calor ille æstat ad 60. gradum thermometri ascendit, adeoque tunc est duplex caloris sanguinis sani, eumque coagulat, ac lympham inspissare valet in confinis cutis, simulque fibras nervæ ingrate vellicare, & phlogosi afficere; nunc effectus illius caloris sunt fluidioris avolutio, residui viscositas, irritatio cutis, ac proinde occasio Ephemeræ.

Ab insolentione cephalalgia, coryzæ quotidie, hieme præsertim, superveniunt, quoties frigus insolationi succedens materiem perspirabilem a calore agitatam cohibet.

5. *Ephamera lactea Rivetii; Ephamera puerperarum, nutrimentum a lactis refluxu, a lacte superfluo; la fibre de lait, le lait, vulgo arcussol. B.*

Tertia circiter a parto die accedit aliquale frigus, vel a minima sitis in læto mutatione, totum corpus pervadens, identidem revertens com; gravitate, mammae simul dolent, tument, dein serum lactis effunditur; effluxus lactis ab axilla hinc & inde videtur procedere, deinde velut corpus mammae stringi videtur; mox ex papilla, maxime si has emulget alumnus, serum illud subsultim exilit, hunc lactis impetum nomine vernaculo *epheuse* indignant mulieres: interim lochia adhuc eruenta fluere pergunt, sed moderatius: interdum grana, vel acini papillarum rubent, tenduntur, nigricant, acute

dolent: hos tumores, vulgo *cangres* nuncupant nostrates; non raro moles mammae in tumores tactu, non visu, dignoscendos, paululum a pressione dolentes, subdivisa videntur; atque ea symptomata intra duas, tresve dies uberiorilactis proveniunt, ac sudore copioso, valde baluoso, sæpe oligo, lactis coagulum referente, terminantur; & identidem nutrices frigore suscepto, infestant; sunt quibus papillæ rhagades patiuntur, quod primiparis tantum fit, has *tendentes & gersures* Galli nuncupant.

Mammarum tumor, tensio, dolor, lactis dein uberior proveniunt, ceteraque symptomata suadere videntur, lac uteri destinatum ad alimentum foetus, jam restricto utero in sanguine redundare, atque eo sine fuscitati Ephemeram, ut impetu sanguinis vasa lactifera mammarum ampliantur, sicque chylom viam præbeant in lac mutando: ideo vero lac in mammarum glandulis seceruitur, quod e cruore ab illorum osculis sagatur, ob affinitatem gravitatum specificarum lactis & chylis: antea vero chylus in mammis non secernebatur, tubis arterio-lymphaticis nondum satis diductis, atque Ephamera viam lactis succo præparat, utili, sed non semper vivo & imperioso molimine.

6. *Ephamera a phlogosi, a dolore Frid. Hoffman. cap. 14. Ephamera a vulnere, fractura, luxatione, casu ex alto, contusione, &c. Ephamera vulneraria Frid. Hoffman. cap. 14. pag. 186. B.*

In parte vulnerata, contusa, valide distracta sanguis hæret, vel effunditur, vel ejus liber fluxus præpeditur; ad eum autem discentendum, resolvendum, promovendum, maxime si grave pathema, quod concurrit, hujus moræ & inspissationi ansam dederit, vires cordis ex sympathiæ legibus excitantur, totaque resolutio intra paucos dies obinetur, maxime si phlebotomia, ut fieri solet, in usum vocetur, cum potu calido, diluente, & auxiliis parti vulneratæ, contusæ propriis.

7. *Ephamera sudatoria, hydropretum quibusdam, sudoriferus morbus Batavis; Hydronusius Foresti; Sudor Anglicus Sennerti; Ephamera Anglica ptilens R. Fortis; Ephamera maligna Junckeri p. 463. the sweating sickness, Anglis; vulgo la fièvre vel fièvre, A.*

Symptomata. Summa virium prostratio, animi deliquia, anxietas, cardialgia, capitis dolor. Pulsus frequens, celer, inæqualis, palpitatio cordis maxima, pertinax, aliquot quandoque annos a febre superstes. Sudor perpetuus, copiosus, utilis, cum morbo terminandus. Calor molestus.

Historia. Primum cepit ab Anglia anno 1486. quam per quadraginta annos depopulata est; interea Germaniam, Belgium, Flandriam, Brabantiam, Flandriam, Daniam, Norvegiam, Galliam ab anno 1525. ad 1530. peragravit; autumnum maxime sæviebat, hieme indiciis affente, vere revertebatur; initio urbem occupans; quingentos aut sexcentos singulis diebus adoriebatur, ex quibus vix centessimis evadobat; aut adhibitis cardiacis, & vitato frigore, icr.

servata quiete, sudoribus prolicitis morbi facies deferbuit. Vide febri sudatoria historiam in historia Regni Henrici VII. a Verulamio. Quatenus hic morbus discrepet a miliari sudatoria, videtur in tertia classe.

8. *Ephemera maffrua* Ramazzini, *Ephemera medica*: Vide Valsæ. de Taranta Philonium, & Hiltor. medic. Freind pag. 163.

Puellæ, quæ catamenia pati incipiunt, si vivida, sanguinea, simulque fibra tensa, elastica donata sit, quovis mense, quando scilicet catamenia ingruunt, febris ephemera corripitur cum levi & brevi frigore; hystericalgicis, cephalalgicis, aliisque affectibus, sanguinem undique pressum, & reagentem indicantibus; ea vero omnia intra unam aut alteram diem mensuræ erumpentibus evanescunt. Vidit *Walsæus de Taranta*, Moosfel. Professor, quem trigesimo quoque die febris per 30. annos continuos adoriatur.

9. *Ephemera avariæ* Et Müller. Seidel. de morbis incurabilib. p. 14. *Ephemera natalitia*. B.P.

Antipater Sidoulus Poeta febrem diariam quolibet anno, ipsa qua natus erat die, revertentem patiebatur, a qua tandem seors obijt, ut refertur *Valerius Maximus*, l. xi cap. 3. & *Plinius*, lib. 7. *hister. nat.* cap. 61.

10. *Ephemera hamatyratica*, Georg. Agri-colæ; *fadæ sanguinos stipata*, Lycosthen. de prodigiis, Scheock. obs. p. 766. A.

Epidemica & trauceuta fuit.

11. *Ephemera dichomena*, Deidier observ. Coosult. 14. tom. 2. *Febri dichomena*, seu *menstrua duplex*. B. P.

Ephemera est, quæ decimo quinto quovis dies revertitur; hanc observavit *Hilfr. D. Gilbert*, *Doff. Med. Monsp.* in casu *D. Deidier* dyspnœa, motus coarctati, sitis, urinae, pruritus, frequenter pulsus, & hypochondrii dextri intumescencia quavis decima quinta die per tres menses revertentur. Ephemera dichomena & syphiliticam vidit *Cl. André Obs.* pag. 128.

*Praxis Ephemera*. Quoniam Ephemera intra unum diem vulgo sudore terminari consuevit, indicium est materiem morbosam in illis potissimum vas sanguineis residere, ex quibus intra tam breve temporis spatium expurgari per sudores potest; circulator sanguinis est quinque millies velocior in magnis arteriis quam in ultimis vasculis ex estimatione *Kestlii*, qui ramificationes arteriarum quadraginta ordinum numerat; quoniam vero docet anatomæ & hydraulica circulationem eo tardiorē esse in vasculis, quo magis ea a corde recedunt, cum numerus ordinum ramificationum exprimens ipsam a corde distantiam sepe exprimat, verosimile est materiem morbosam in ramis decimi ordinis esse decies a corde distantiorē, quam quæ est in aorta, adeoque decies tardius, si cetera paria sint, a sanguine expurgari posse, cum ad hoc ut expurgetur necessum sit ut in fluentem vena cavæ & aortæ revertatur, quod ex hypo-

thesi decies tardius exsequetur, quam quæ per arteriolas recto tramite venis sanguineis terminatas circulat.

Supponamus morbos acutos, quorum materiem morbosam in arterioso systemate potissimum latent, esse omnium longissimos, qui quadragesima circiter die terminantur, dum chronici sedent in lymphaticis, vel sanguiferis vasis, pronum erit concludere omnium tardissimos materiam ipsam in quadragesima arteriarum divisione obtinere, & brevissimos in prima, siquæ numerum dierum quos durare consueverunt morbi, respoodere numero divisionum vel ramificationum ordinem exprimentis: quæ hypothesi non magnum fidem meretur, usquequæ res medicæ in majori luce constitutæ cum confirmant; si hoc ita foret, materia morbosica Ephemera inducens residere in majoribus vasculis, seu in crasso ejus moro aliquantulum retardaret, atque ejus moleculæ ejus forent voluminis: quo vasa secundi, ac fortiori tertii ordinis oequaquam subire possent, usquequæ sabbata & attenuata forent: talis est coactionis sanguis copia tantum peccans, seu globi purpurei copiosiores; illi etenim, quia molem majorem, movendam cordi offerunt, ipsi resistunt, adeoque munis vitæ obstant, & ex lege sympathiæ debent attenuari in lympham, serumve resolvī, ut sanitas restituatur; hoc autem Ephemera præstat.

Ut ergo naturæ ductum sequatur Medicus, is debet in Ephemera plethorica, i. e. agrum omni cibo & jalsculo interdicerē, ut uberior fiat perspiratio, siquæ moles sanguinis minuat, nec pari passu aditus particulis refarciatur: verum potu a quo non frigido, quantum sitis exigit, sanguinis viscositas a calore intendenda debet præcaveri; immo si non satis procedat perspiratio, potus theiformis calidi, diaphoretici ex infusis theæ, veronicæ, adianthi, &c. sunt interponendi; atque ut intestinalis perspiratio juvetur, clystima emollientia, ooi; sudante corpore, est injiciendum.

2. Nihil est ad perspirationem minuendam aptius, quam se nudum aeri frigido, ventove exponere, vel se intra lectum jectigare, adeoque æger more solito vestitus in conclavi quiescat, vel in lectulo tranquillius jaceat, ne simul vires motu musculari inutili detrahatur, & ut eas multis vitalibus reservet.

3. Si dolor capitis, arcuæque notabilis sit, pulsusque vigor debito major, quod expertus tantum judicat, maxime vero si febrem in alteram, tertiamve diem prorogadam fore conjectamus, tum phlebotomia e brachio institueda est, ut febris impetus, & cum eo symptoma dolorifica minuantur; in adultis vero semibram vel uncias decem detraxisse sufficere absente sudore.

4. Præmissa phlebotomia, admissa dietæ & gymnastica coogruis, febris intra diem vel intra quadriduum vulgissimum terminatur sudore, vel hæmorrhagia quod rarius: & subsequenti die adde-

detergendas primas vias, aut etiam secunda die, si Ephemera extensa fuerit, horis maturinis catharticum lenē est propinandum, atque deinceps paulatim cibis eperis, mollibus, assuetis restituendus est æger.

5. Quo æger infantie propior, febris prolixior, fames voracior, eo facilius a jejuniis levitate recedendum, & dulcūla sunt indulgenda.

6. Quo æger vigori ætatis propior, fervidior, magis sanguineus, floridus, phlebotomiæ aut hæmorrhagiæ calvis assuetus, eo largius sanguis est ipsi mittendus vel una vel binis phlebotomiis.

In *Ephemera nascentia* præter auxilia jam assignata requiritur, 1. ut potu tepido, copioso, vomitus proritetur, quem nausea videtur indicare; immo si hoc non sufficiat, sique epigastrii gravitas, cardialgia, oris amaror, caput plenium, cum modico pulvis vigore, aqua levissime emetica, dissolutis in ejus libra duobus, tribus, vel quatuor tartari sibiati granis, vomitus est juvandus; die vero subsequenti catharticum lenē, diluens, non calefaciens, horis maturinis, est præscribendum; quod felicius succedet, si pridie horis pomeridianis, aut cum febrilis calor major fuerit, phlebotomia instituta fuerit, signis allatis indicata; demum febre terminata æger more solito repurgandus est.

In *Ephemera lactea* 1. caveadumne puerpera quæ puerulus quatuor quasvis hora per septimanam circiter est nutrienda, primis etiam diebus, ut mos est, ossis infarciatur, nec ante partum liquidis spirituosius incendantur; 2. accedente febre, frigus est cautissime arcendum, quod seculis horroris a levi suscepto aere inaderit; 3. ut via lactis mammarum teroso præparetur, atque utut paucum tum ab alumno, ut rusticis solemne est, tum a mulierculis, tum a catellis, tum ope syphonis exsugatur bis in die; sique secretionis liberata augeatur; 4. ut ex parte mammarum omnis alia tollatur resistentia, linteis tepidis regendo, oleo amygdalarum liniendo, molli gossypio obvolvendo; 5. absente febre alumnus est a matre lactandus, quo lacte teroso & diluente meconium & facilius & felicius expurgatur; atque lactans mater citius a febre & a lochiorum incommodo immunis evadit; 6. nona creiter die puerpera leniter est purganda, dein ossis & carnisbus paulatim uti facienda.

In *Ephemera sudatoria* præter cautelas assignatas ægri cardialgiæ cardiacis sunt debellandæ, ut aqua storium aurantium, cinnamomi hordeati, vino mero, cum confusione hyacinthina, alkermes, theriaca, atque sudor tum caute sustinendus, tum, si langueat, his cardiacis atque sudorificis promovendus.

II. *SYNOCHA*, *Synochus imputris* Galeni liber 2. de diff. febr.; *Synocha* Gordon. Lil. cap. 5. de febre sanguinea; Gilberti Auglicii fol. 28. *Septimanaria* F. Plateri Class. Dolores; *Synochus simplex* River. cap. 2. *Continens non putrida* Lommii pag. 2. *Febris continens* seu *Synocha* Stahl Casnale minus, cas. 87. *Synocha febris*, continens *ætherochæ* dida, Juncker. Tab. 37. *Ægri Septimani* vocantur. *La Synoque*.

Genus est febris continuæ, quæ ad septimanam ut plurimum extenditur, Galen. de diff. febr. p. 272. Tom. II.

Symptomata eadem quæ in ephemera, eo discrimine quod febris non illico tota accedat, sed in dies major ac major evadat usque ad tertiam, quartam vel quintam diem, tuncque in eodem vigore perseveret usque ad declinationem; lassitudo, capitis dolor, virium muscularium prostratio, seculum pari passu crescent usque ad acmen præterea in me omnia vehementiora sunt, ut cephalalgia, carebæria, faciei rubor, calor corporis, velocitas pulsus ex plenitudine & frequentia repetenda, somnus altior occupat, pulsant tempora.

Terminatur septima die vel hæmorrhagia naturalium, si plethoricus, sanguineus sit æger, vel perspiratione insensibili, ut accidit Professori VVedelio; vel somno, ut accidit Professori Stahlia, (class. de febr. pag. 1.) vel sudore.

Synocha jugem habet æstus nihil remittentem, & quamvis per horam nonnunquam remittat, hoc accidentale est, non vero statum, nec de ejus essentia, & vix inde levamen sentiunt ægrotantes; Stahlia. Hujus principium seu occasio est, sanguis purus ut plurimum, sed vel copiosus vel sero perspirabili onustus, vel igneis particulis sectus, vel leviter inspissatus per moram: in primo casu eum resolvit natura in serum perspirabile, motu febrili excitato; in altero continuam seri secretionem tantum molitur; in tertio potu per sitim imperato ipsius fervore extinguit, & dilatatur urina & sudoris viis igneas particulas exhalat; in quarto ope caloris aucti viscositatem minuit.

Synocha periculosior est ephemera quantum est vehementior & diuturnior simul; cum enim malo physico seu periculo proportionales sint naturæ conatus, quoties ordinati sunt, ut in hoc morbo; quo febris vehementior est & peritina, eo majori molimine atque longiori opus est, ut materies morbifica muretur, adeoque eo magis nocere æconomiz animalis ea materies censenda est.

Quo plura simul vitia concurrant, ut sanguinis spissitudo & plethora, eo periculosior est morbus; quia eo majora molimina exigat, ut tollatur & si vires deficiant in hoc molimine, vita deficit.

1. *Synocha plethorica*; *Febris sanguinis* Avicenn. Tom. 2. pagin. 43. *Synocha inflata* Housni de febr.; *Synocha sanguinea* Sennerti de febr.



febr. 1.2. c. 10. *Synocha* 7. die soluta Fr. Hoffmanni Obs. 4. *Synocha simplex* Fr. Hoffmanni de febr. pag. 110. 111. D.

Differt ab ephamera plethorica 1. duratione ultra quartum diem, 2. quod non est sudor constans versus finem morbi; 3. quod symptomata in statu sint graviora, potissimum respiratio celer, frequens, pulsus velox, plenus, somnolentia.

Differt a synocha putri, quod nulla notabilia sint signa putredinis, ut linguae flavedo, foridities, oris fetor, nausea, vomitus, &c. quod brevius terminetur; quod facies, oculique magis rubeant, venae magis tumeant, pulsus temporis, quodque sine notabili rigore adoriatur.

Principium hujus febris est plethora commota, seu copiosior sanguis, isque simul servidus, & pathemata vividam, exercitia immodica, esculentia, calefacientia exagitat; unde quid egerendum, ut haemorrhoidum, catameniorum, perspirationis, phlebotomiae alliciat, &c. suppressio; quid ingeliorum copia adauda conferant, in hujus productione, satis liquet. Licet autem sub finem morbi signa saburrae putris accedant, ea sunt effectus, non vero principia morbi.

2. *Synocha ardens*; *Synochus canisoides* Gilberti Angelici fol. 56. *Synocha biliosa* Sennerti lib. 2. cap. 10. *Synocha canisoides* Mangeti Biblioth. Med. *Cholera febris* Frid. Hoffmanni de febr. 1. 4. cap. 2. obl. 5. A.

Ea corripit graciles, biliosos, sanguine copiosos, ac carne non ita abundantes, qui viram laboribus deditam agunt, corpusque multum exercent. & pathemata vividis exagitantur; qui in sole & aestu diutius versantur, aut cibis & medicamentis calidis sunt usi. Calor est acrior, vehementiorque, ac sitis magis divexat quam in plethorica; urinae sunt tenuiores acque acriores. Differt a tritæophya ardente quod non sponte periodice remittat.

3. *Synocha putrida* Sennerti. A.

Licet calor in synocha putri, si cum aliis putridis conferatur, sit mitior; tamen si cum synocha plethorica comparetur, calor est acrior. Deinde in putrida urina est rubra, crassa ac turbida, sine sedimento, cruda, aut saltem leviter cocta in principio, pulsus praeterea ut in aliis putridis. Tandem symptomata omnia, ut dolor, inquietudo, vigilae, &c. majora sunt quam in plethorica.

Pulsus ut in aliis non solum est magnus, sed & vehemens, celer, frequens, inaequalis & inordinatus.

4. *Synocha tragada* Ramazzini, consist. Epid. p. 184. A.

„ Narrationem oppido curiosam apud Lucianum de consensu. Hist. habemus de febre quadam tragada (sic enim illam appellare liceat) quae Aberitas temporis fere momento invasit. Egerat Archelaus Poeta tragicus, media aestate, multoque aestu, apud Aberitas, Euripidis Andromedam, ex quo factum ut multi ex theatro fabricitantes exierint, ac universa postmodum febre gravissima fuerint

correpti, quae die septima plurimo sudore erumpente, nec non sanguine et naribus profuente, solvebatur, superflue tamen rideant la quadam mentis perturbatione; nam ut refert Auctor, omnes quasi ad tragodias agendas impellebantur, & jamba personabant, multumque quosque ferabatur, maxime autem Euripidis Andromedam causticis resorbant, splenaeque adeo citius erat pallida, ac macilentis illis tragodis se permittant. Haud aliter apud nos immodicus mitus, plebem urbanam, inter angustias edicularum conclam, in febres agebat, adipem. Quis quidem terribiles, nec sine mentis emotione, sed quae postea die septima, oborto sudore, post celebratam liberali manu phlebotomiam, solverentur; ubi vici angustiae & anfractuosis solis ardorem eludebant, minus a febribus populares exercebantur, atque id bene fecit ex hac febre secutum est, ut reseratis a calore & sudore poris cutaneis, exterminata radicitus scabies, plebs mitior ac vegetior apparuerit. Ramazzini. 16.

5. *Synocha catarrhalis* Frid. Hoffmanni de febrib. sed. 4. cap. 1. observ. 5. *Catarrhus cum febre epidemica* Georg. Henrich. Comm. in Aetæum pag. 315. *Febris epidemica* ann. 1580. Riverii, observat. X. pag. 137. A.

Illâ spacio sex septimanarum anno 1580. omnes fere Europae gentes affligebat, vix vigesimus hujus morbi expers erat praeterquam in Saxonia. In invasione omnes vires languebant, praecordia gravitatem sentiebant, cor pressionem, & palpitabat; pulsus parvi, celeres & inaequales erant; caput erat grave, & ingravescente morbo ita aegroti languebant ut tremere & conciderent; quidam vigilabant, alii profundior somnum habebant; ex capite fluxit acrior & subsalsus humor ad thoracem, qui tussim movebat, in extremis partibus dolores vagos & pungitivos excitabat; initio horror & calor totum corpus & caput occupabat, & ad tactum non erat mordax, concinnus tamen cum rubore oculorum & tumore; urina primum tenuis, mox crassa; aliis sanguis et naribus fluebat; plerisque sudor copiosus prorumperebat, quo & febris hniebatur, quarto ut plurimum die; interdum, sed raro, longius protrahabatur ad septimum vel nonum diem. Henrichius. 16.

6. *Synocha scorbutica*, Lind. de Scorbuto 1796. Sydenham pag. 39. A.

Vidi in puero, cuius pater & mater scorbutici erant, febrem continuam acutam cum stomachace ita putrida, ut vix ullos cameram in qua jacebat arger ingredi posset, ex qua intra septimanam obiit. In hac convenit limonata mineralis, seu ex spiritu vitrioli in aqua ad gratam aciditatem, cathartici lenis, vinum rubrum, &c. Conveniunt etiam tartarum vitriolatum, cremor tartari, acetum cum sale tartari mixtum; sumatur bis vel ter in die ad uncias quatuor, necnon spiritus Mindereri adhibetur.

7. *Synocha dolorum*; *febris symptomatice a doloribus orta* Frid. Hoffmanni, de febr. symptomat. pag. 187. T. 2. A.

Non:





Non solum febris synocha, vel ephemera comitatur dolores & phlogoses, quæ suæ in venteribus, ambustionibus, cumoribus phlegmonoidis, bubonibus veneris dum suppurauntur, cendunt puncturis, sed etiam morbis dolorificis inuentibus assidet, ut paroxysmis arthriticis, rheumaticis, nephralgiæ, proctalgia & mariscis, similibusque.

Contra erigit phlebotomiam repetitam, vitæ tenuem, diluere & demulcere aptum; syrupos ex aqua liliorum, floribus nymphae, papaveris rhæados, papaveris albi, laudanum; extus vero admoventur fomenta emollientia, leniter resolventia, cataplasmata anodyna ex mica panis, lacte, croco: cavendum cathartica, quæ non nisi sedato dolore, si sabura prima vias infestet, advocanda sunt, & eaque minorativa, antiphlogistica.

3. *Synocha cephalalgica*, obs. D. Razoux, Med. Nemausensis, Journal de Medecine Novembre 1738. pag. 415. *Cephalalgia vermiculosa*. A.

Febris ardens, continua, pulsu pleno, vehementi; cutis arida, urens, facies rubra, oculi inflammati, dolor capitis, seu frontis assiduus, continuo crescens a morbi initio; lingua nictida, nulla læsio stomachi, nulla saburra indicia; post sex largas phlebotomias, cathartes, anodyna, narcotica, prisanas nitratis morbus perseverabat; tandem ex præjudicata suspitione saburra præscribitur emeticum, & ægra septuaginta duos vermiculos sternutando, & vomendo eiecit ex naribus, qui in sinibus frontis latitabant, & illico ab omni febre & cephalalgia liberata est.

Vermiculi erant septem, vel octo lineas longi; albi, tres lineas lati, annulis distincti, omnino iidem qui in sinibus frontis vervecum reperiuntur, descripti a D. de Rœnnur, *Hist. des insectes tom. 4. pag. 335*. Hæc autem mulier pedis hujus morbi biberat aquam rivuli, ex quo pecus ovile paulo antea sitim extinxerat; hi vermiculi spinis rubris, uncis & corniculis hispidi, irrequiriti, & agiles sunt, ac oves in phrenitidem agunt, quæ exiliunt, & arbores obvias capite impetant.

9. *Synocha miliaris*, Sueo. D. Coyer Mem. de l'Acad. des Sc. 1753. Ludvvig Comment. T. 3. Vide *Miliarium Sudatorium*.

III. SYNOCHUS. Galeni; *Continuus putrida* Lommii lib. 1. cap. 2. *Febris putrida* Riverii; *Synochus putris*, febris continens dicta Pitcar-ni de febr. 24. *Febris continua putrida* Boerhaave aphor. 730. *Febris continua*.

Est genus febris continue, quæ ad duas, tresve septimanas extendi consuevit, cum pulsu robore sanum, in morbi statu, saltem, nobiliter superante.

Differt ab ephemera & a synocha, 1. quod rigore sæpius, majorique frigore invadat, atque 2. quod diutius crescat, 3. quod secunda tertiva huius septimana terminetur. A typho vix initio distinguitur, differt tamen odore proprio,

debilitate arquam minori, robore pulsus, quoad frequentiam, plenitudinemque, multo majori & sanum superante; calore sanum excedente, cum in cyto calor, urina, pulsus sano similes, ac pulsus sæpe debili; lingua fordida quidem, sed non nigrescente, nisi in paucis speciebus; Ab hæctica differt motu velociori, symptomatum vehementia, debilitate, initio etiam majori lingæ forditie, &c.

Rarior est amphimerina putrida, quacum vulgo confunditur; nunquam est homotona, nec peracmaistica, nec epacmaistica, sed initio & sine semper debili, in augmento & statu fortior, unde illæ divisiones Veterum inanes videntur.

*Symptomata in functionibus animalibus*. In vigore sæpius adsunt vel somnolentia, vel leve delirium, in tractu fastidium & tædium, motus muscularis difficilis; virium prostratio, ita ut fere semper jaceant, immo sæpe in situ horizontali supino, minus tamen quam in typho. Adde dolores lumborum, capitis, ventriculi gravamen, immo cardialgia, vertiginosam titubationem. *In functionibus vitalibus*. Respiratio frequens, & amplior solito, seu in eadem ratione qua pulsus, difficilis, suspiciosa. *In functionibus naturalibus*. Solidiorum ciborum, & præsertim animalium, fastidium, jussulorum aversio, frigidiorum & subacidorum sitis intensa, si sopor adsit, aut delirium; tabaci assueti, vini aversio. *In excretionibus*. Halitus oris & totius foetens, in coalescentibus quandoque moschatus, vel figularis; saliva viscida, pauca; urina rubra, turbida, sedimentum in declinatione albescente, dejectiones biliosæ, flavescentes. *In qualitatibus*. Facies non ita rubens ac in ephemerâ, nec ita plumbea ac in typho; calor faciei, mordacior quam in ephemerâ, intensior quam in typho per tractum morbi; initio frigus & horripilatio, sine tremore tamen, sed a levi situs mutatione revertens.

Dolendum est quod nullus Auctor, ut observat Stahlus, febrium species distinxerit, nisi ex præconcepta putredinis & malignitatis opinione, ita ut individuas observatione compertas ad suam speciem, immo ad genus referre difficillimum sit: hoc exinde factum est, quod nullus Auctor historiam morbi seponat ab ejus theoria philosophica, & semper causam cogitam supponat, atque exinde signa characteristica derivare conentat, quo errore nihil potius in re medica.

Galenicis omnes febres humores potredini adscripserunt, ephemera scilicet & hæctica tantum exceptis, quia illam spiritibus, istam solidis excandescentibus tribuebant, unde juxta ipsos febris putrida erat classis febrium quæ continebat omnes exacerbantes, omnes intermittentes; & omnes ab duabus exceptis "continuas". Neoterici ex Veterum elasse genus unicum coniecere, quod febrem putridam vocant, seu synochum, unde Veterum pyretologia evanescit.

Nos seponimus quod excogitavit circa causas opinio, ab eo quod observatio docet, & species

cies a causis nequaquam distinguendas censimus, sed tantum a symptomatis; verum putredo latens febres omnes fovet, nihil ad historiam febrium pertinet, sed tantum ad earum philosophicam cognitionem, sine qua tradi debet historia. Eam interim sibi arrogat Neoterici licentiam, quam nemo facile Botanico concesserit, a quo in describenda plantarum historia sensum requirimus testimonium, non rationis commentationem.

„Febrium quidem species omnes juxta phæ-  
„nomenorum suorum varietatem in genera re-  
„digere, ac characteres cujusque idiopathicos  
„enucleare res est multi otii, ac summe ar-  
„dua, ad quam unius Medici ætas non suffe-  
„cerit; at vero hic labor, ut sit improbus,  
„prius est exantlandus, quam nos aliquid me-  
„moratu dignum in extricanda tanta multitu-  
„dine horum morborum serie præstiterit jure  
„possimus gloriarī:“ *Sydenham cap. 11. p. 28.*  
*Galenus* duas *Synochi* species admittebat;  
sanguineam scilicet & biliosam; *Sydenham* vero  
nulli hypothesei addidit plures multo observa-  
vit, nec facile determinandum hunc nume-  
rum esse putat.

*Synochus* patris, ait *Riverius*, nullis paro-  
xysmis distinguitur, unde discrepat a remittentium generibus, ut amphimeris; nec enim paro-  
xysmis describi debent calores vel fugaces a-  
jusculo, motu oriundi, vel similes mutationes,  
quæ Gallis *Bænfer* nominantur; multo minus  
illa acceleratio pulsus, quæ sanis etiam omni-  
bus accidit, quæque febricula vespertina voca-  
tur, quod si ita esset, ut volunt Neoterici,  
nulla febris continens daretur, omnes essent  
remittentes, vel exacerbantes.

1. *Synochus sanguinea* *Galen.* 2. method. cap. V. *River.* pag. 304. *Febris continua annuum* 1661. ad 1664. *Londini*, *Sydenham* cap. 4. pag. 29. *Febris depuratoria* ejusdem.

Distinguitur hæc species 1. vomitione initio, & diarrhæa versus finem, nisi Medicus principio obsistat, unde putris cognominatur; 2. lingua sicca & nigra; 3. ingenti ac subitanea artuum debilitate; 4. partium externarum siccitate, si declinationem leni madore stipatam excipias; 5. ad decimum quartum vel vigesimum primum diem extenditur. Discrepat a typho, quod licet summa sit artuum prostratio, tamen pulsus in vigore morbi plenior & frequentior est, adeoque fortior quam in sanis, simulque calor intensior, nec ulla in hac specie purpura apparet.

Symptomata quidem a prava medendi methode diversa exsurgunt, quæ diagnosim speciei confundere possunt, sed ea tantum, quæ sibi relicta febris producit, recensenda sunt. De cætero ea species conceptam semel effervescentiam, sine ulla exacerbatione eodemque semper tenore, (nisi acmen excipias,) perficit; urina ubique vel tenuis vel crassa, utraque ex æquo crudioris indicium.

Cum diarrhæa in morbi declinatione acce-

debat, morbus inde factus perniciosior diutius affligebat.

*Processus Curatorius.* Si æger junior vel senior aut ab aliis morbis convalescens fuerit, phlebotomia aut parca, aut nulla præmittenda est. Si vegetus sanguineusque sit, illa initio instituenda, & pro viribus ægri habitualibus, ac morbi intensitate reperenda bis vel ter; visus sit ex juxtilis quarta quavis hora sumendis, ita tamen ut interponi possint cremores fluidissimi, horum loco sumendi. Si æstus & febrem juxta intendant, ut in biliosis accidit, potus sit decoctum hordei vel quid simile.

Præmissis phlebotomiis felicius succedit emeticum ex epigastri gravitate, nausea, cardialgiis indicatum, quod adultis sit ex drachmis sex vini emetici, cum oxymelitibus scilicet & syrupi de scabiosa, ana, dracmis quatuor; sumat jejuno stomacho, atque uno vel altero præparato cyatho diluatur, neque post quamlibet vomitionem copiosius præparati pulli vel aquæ tepidæ cyathus hauriatur: vel tartari sibiarii grana tria aut quatuor in aquæ tepidæ cyatho uno aut altero intra horæ quadrantem propinentur. In nostris regionibus minor dosis emetici sufficit, nisi tamen ægri sint crassi, robusti, milites, bajuli, atque in hoc casu jancia una & semis, vel uncie duæ vini emetici in tribus aquæ tepidæ cyathis mixti, interposito horæ quadrante, successive hauriuntur, unde plenaria succedit vomitio.

Sequentibus diebus alternis catharsis infuso seorsum in decocto tamarindorum addita manna celebratur; vespere vero jupilium vel emulsiō cum syrupo papaveris albi turbam excitatam compescit; dicitur intermediiis elymata laxantia repetenda, aut versus decimam diem observandum, quiescendum. Imminuitur ut plurimum febris, urinæ colæ apparent, sudores salubres accedunt; & decima quarta febris recedit; curam vero catharsis absolvit.

2. *Synochus sudatoria. Febris continua epidemica* ann. 1665. ad 1667. *Londini*, *Sydenham* pag. 63. A. Dolor capitis intensior quam in prima specie, & vomitiones adhuc immanes, in plerisque diarrhæa, quæ in prima specie ope emetici potest præcaveri, in ista provocabatur, nec tamen cessabat vomituro; siccitas externarum partium; aut præmixta phlebotomia sudor facile superveniens symptomata sublebat, quocumque morbi tempore, quod in prima specie non ante decimam quartam diem accideret; sanguis sæpe pleuritico, & rheumatismaliborantium sanguinem colore referebat.

3. *Synochus variolosa. Febris (variolosa) continua* ann. 1667. ad 1669. *Sydenham* pag. 99. *Synochus variolosa* *Huxham* de ære pag. 33. A. Hæc species, cum variolis epidemicis ingressa, stetit cum iidem, ceciditque. In hac febre & hac variola scrobiculus cordis a levi pressione doluit, capitis dolor, calor corporis, petechiæ satis manifesto indicio se probebant; sitis interim non urgebat. Lingua sanorum similis, quandoque albidæ; sicca rarissime, sudores effusissimi ab initio morbi sine levamine. ▲ sudorificis & cali-

validis delirium phreniticum accedebat, petechiarum crescebat numerus, & symptomatum aliorum intensitas, urina laedabilis, sed sine levamine. Minus recte tractata species ad septimam sex vel octo perdurat, nisi mors intercesserit. Pyatistinus satis ubi quandoque sub finem accedebat, maxime si parum evacuat, multumque diluisset & refrigerasset æger, ifque salutaris. Eæceptis variolosis eruptionibus, cætera symptomata variolæ congruebant. Caput, stomachus & lumbi laborabant quasi ab ingruente variola, cum magna pectoris oppressione, & asthma; talis forte affectus nomen dedit *Febris variolosa* Sydenhami: hæc *Huxham* pag. 33. ubi vide curatorem.

*Cura.* Facillima methodus hujus speciei sanandæ est, phlebotomias repetere, ut in morbo inflammatorio, etiam si addit diarrhoea, enema refrigerans vel singulis vel alternis diebus injicere, iulapium ex aquis lactucæ, portulacæ, syrupo de limonibus, quater vel quinque in die propinare, serum lactis aut aquam hordei pro potu ordinario offerre; pulcibus hordeaceis, panatellis, pomis ægrum nutrire, detestisque sudoribus quovis die ægrum et lecto eximere, ut calor contemperetur, cum in hoc morbo nulla alia sit materies morbifica præter æstivum sanguinem.

4. *Synochus dysenterica*; *Febris dysenterica* continua an. 1669. ad 1672. Sydenham pag. 119. A. Synochum dysentericam a dysenteria distinguo ex eo quod in dysenteria sint omnia phenomena, præter alvi fluxum cruentum & torminum, quæ dysenteriam autem regnantem combatantur, idem ordo symptomatum, idem exitus, &c. in Syncho vero dysenteria ipse alvi fluxus cruentus, & torminosus sit symptoma morbi; quod tamen minus est notabile quam symptomata mere febrilis.

Illia species cum alvi torminibus raro inibat, sudores etiam pauci, verum cephalalgia immanis, lingua alba, humida, aphthæ in exitu a regimine calidiori, & in ægritudine contumaciori.

*Cura* eo debet vergere ut materia acris quæ dysenteriam excitasset, per alvi colatoria educatur, edulcoretur; sed cum vires nonita infringantur ac in dysenteria, paregoricis minus est indulgens, ne retineatur materies morbifica: pulces avenacæ, hordeacæ, panatellæ sint procibo; pro potu vero cerevisia tenuis tepida. Ast celebrata semel aut bis catharsis, poliorum carnis ægros interdicere nil jubet: tertia purgatio, interposita die, morbum absolvit ne plurimum; si dein vires forent languidæ, ut apud hystericas, laudando & auræ liberioris usus, febre depulsa, conveniant. Hæc methodo morbus nullo negotio victus recedebat. *Carus* his febribus superveniens, ob medicamenta sudorifica inopertune præscripta, lethalis.

5. *Synochus pleuritica*; *Febris pleuritica* Sydenham an. 1673. A.

Hinc species ædum scribo Monspeliæ pan-  
Bawogus *Historia Methodica*, Tom. I.

demica est. Incepit æquinoctio verno, & initio Maii etiamnum perseverat; incipit a frigore notabili cum horrore, lassitudine, altera die dolor pectoris pungitivus, sed mitis, sub mamma scapulis dextra, qui pressione non mutatur, cum calore, tussis humida, pauca exspitione sanguinis, sudatiunculis; lingua est alba; in fervidiori ætate & temperamento delirium accedit, secus miime; symptomata pleuritica post aliquot phlebotomias intra octo circiter dies recedunt, & febris remane, in qua quidem calor quandoque crescit, sed nulli sunt paroxysmi veri a frigore incipientes. Febris ad 14. sæpius ad 21. diem extenditur.

*Cura.* *Æger* iussulis quarta quaque hora vescetur. Potus erit vel decoctum cichorii, vel infusum capillorum veneris. Phlebotomia una vel altera prima die instituitur; sæpius adultia quatuor vel sex necessariae sunt, post secundam tertianæ, id est, circa tertium morbi diem purgabitur æger cum manna uncis duabus vel tribus, & grano uno, alterove tartari sibiati, in cyathis infusionis florum violæ vel in foliorum cichorii decocto, vel duo cyathi purgantes una hora interposita propinabuntur cum grano tartari sibiati, & manna uncis duabus in quolibet hoc remedio quandoque vomitus excitatur & lumbici rejiciuntur, etiam in adultis, deorum materies copiosæ, fluxiles excernuntur, die sequenti phlebotomia, si utilis sit, collocatur, aut alternis diebus usque ad duodecimum & ultra diem cathartica repetuntur, & licet tussis ac sputum sanguinolentum, atque cruor crusta alba rectus dissolvendi videntur, in primis & multo magis & ultimis cathartici drachma una aut altera folliculorum aut foliorum sennæ addicte infundenda, cujus infusio manna uncis aliquot addita scopum optime attingit.

Qualibet nocte iulapium paregoricum præscribitur, denique sudores critici erumpunt aut spurci crassa, copiosa exeunt, & sic morbus terminatur.

Quomodo differat a pleuritide videbis in inflammationis.

6. *Synochus ardens* Riverii prax. lib. 17. sect. 2. cap. 1. pag. 304. *Synochus biliosa* Galeni 2. de differ. febrium cap. 2. & 2. de crisiibus. *Fifera* continet 1. speciem, van Svieten Maladies des armées.

Fit juxta Galenum a bile putrescente in majoribus vasis, & est de familia ardentium. „ Si enim tenuior sanguinis pars & calidior, quæ „ hæret hilis ludolem æmulatur, reliquas par- „ tes superet, & patredinem concipiat, Syno- „ chus biliosa exoritur, ait Riverius. Una fe- „ bris ardens, pergit ille pag. 306. a principio „ ad finem, unicam accessionem habet, quæ „ Synochus biliosa & etiam Synochus ardens „ nominatur, quæ licet enim bilis putrescens va- „ sa omnia cordi proxima occupat.

Discrepat maxime a trisophya causa seu ardente periodica Riverii, in qua scilicet sunt paroxysmi tertianarii.

Hæc adolescentes biliosos valde exercitatos ætate potissimum aggreditur, calore fervido, continuo, ad 33. thermometri Reaumurii gradum, & siti assiduâ ac pervigilio ægrum divexans.

*Curatio* eadem quæ triæmphyæ caulonis, verfabitur in contemperando fervore sanguinis per repetitas phlebotomias intra primos dies, per potum emulsionatum vel acidulum nitrosum, aut limonatam cum vegetabilem cum minerali, qualem præscribit Sydenham ex spiritu vitrioli, aut salis in magna aquæ copia diluti, ita ut vix aciditas linguam feriat. Cathartica non, nisi sedata febre, conveniunt, eaque antiphlogistica ex tamarindis, cassia, floribus violarum, cum manna, sale polychrello, &c.

Maxime vero necessarium est ut æger auram liberiores respiret, immo ut quavis die aliquandiu, si vires sinant, & lecto furgat, saltem supra lectum cubet velibus indutus, capite paululum elatiore, ut servos sanguinis temperetur, ejusque ad caput impetus retrundatur. Clysmata refrigerantia quotidie repetita, nec non julepia ex aquis lactucæ, portulacæ, syrupo nymphaeæ, violarum pluries in die hauriantur; noctu vero emulsionibus syrups de nymphaeæ aut de papavere addatur.

Sanguis initio extractus in hoc morbo crusta coriacea alba tectus est, adeoque vere inflammatorius; hæc corruptum vocabant Veteres, & inde putredinem hujusce generis febrium deducebant. *Riverius* ipse hæc specie correptus *obs. 96. pag. 97.* hæc vocat *continuum putridum*, eamque duabus phlebotomiis & clysmate superavit intra triduum, nulla catharsi adhibita; errant ergo illi qui putridas cum mesentericis confundunt, & omnes indiscriminatim solis repetitis catharticis curari volunt. Mesentericæ, quæ a multo putridæ faburræ apparatu in primis vis foventur, cathartica quidem multa exigant, sed ad amphimerinas pertinent; putridæ vero dictæ Veteribus magis inflammatoriz sunt; unde juxta *Sennertum de febr. l. 2. cap. 3.* signa febris putridæ sunt calor urens, sitis magna & intolerabilis, lingua arida aut nigra, delirium, aut quid simile. In hac specie suadet *Ill. van Swieten de morbis des ardores*, phlebotomiam initio repetitam, largam, decoctum hordei pro potu, addita cuicque libræ oxymellis uncia; dein quovis biborio sumat æger decoctum tamarindorum cum paucis nitræ & mellis, ac bis in die clysmata laxans. Desinente morbo infusum febrifugum sic potus ordinarius.

Species aliæ synochi, quæ singularem attentionem merentur, sunt sequentes.

1. *Synochus rheumatica* Sydenhami *an. 1675. A.*

Illæ est quæ dolores artuum in diversis partibus excitat, sanguinemque phlogisticum suppeditat. Curatur eodem modo quo tætaxæ inflammatoriz, ut pleuritides, variolodes, ardens. Hujus historiam & curam omittit Sydenham.

2. *Synochus hiemalis* Sydenham pollicripiunt in tractatu de hydrope, pag. 305. *Synochus catarrhalis* rectius dicenda, A.

Duobus primis diebus æger aune friger, nunc incalcescit, de dolore capitis & artuum, cum in quiete sine conquiritur; lingua alba, pulsus quidem est sanctorum pulsui similis verum non est ea virium prostratio quæ typhum designat; tussis serme adest, sed non adunt alia peripneumoniam hiemalis signa, ut dolor capitis vividus, thoracis cordatio, dyspnœa gravis; sanguis tamen est pleuriticus.

Hæc febris, si regimen calidum accedat, in typhum degenerat; accedunt enim delirium, sopor, pulsus languidus, inordinatus, lingua arida, maculæ rubentes & lividæ.

*Cura* vorgit ad evacuandam pituitæ colluviem congestam & repetita catharsi subduendum. Fiat phlebotomia ad uncias decem; die sequenti blande purgetur æger ex manna & syrupo rosarum solutivi ana uncia una, infuso tohorum sennæ & rhei in decocto tamarindorum; alterius diebus ad tertiam vicem repetatur catharsis: syrupsus de papavere dein singulis noctibus adhibeatur ad unciam unam; diebus a catharsi vacans decoctum pectorale & julepium bechicum usurpentur, eclegma, vel emulsi interponantur & lecto interdum furgat, & a carnis esu abstineat, jusculis tantum utatur.

3. *Synochus anisotomica* Boerhaavi apud Seidelium de morbis incurabilibus, pag. 12. B.

Quidam Joannes Architectus lingulis annis nato die quo natus fuerat febre implicabatur; quæ ex putrescente bile genita suum circensium servans quartam & decimam non transgrediebatur diem, donec senio confectus, & ex more eadem implicitus febre, natali suo die vi morbi prostratus occubuit.

4. *Synochus spermatica* Sinibaldi. B.

Castis, religiosisque castibus hæc accidit ob spermatis retentionem, unde meror, pervigilium.

5. *Synochus Tarantana*. Vide Hist. de l'Acad. de Sc. 1707. & 1708. A.

Non solum Mulicos synochodiusius protraxit affectos sublevavit sonus fidium, atque curationem absolvit, sed etiam vidi quem in alio febris genere immanis dolor capitis alterius diebus cum febre vexabar, & quem mire sublevavit. iteratus quotidie per aliquod tempus tympani bellici sonus, cui spectaculo mortuus intereram, atque cum ludicrum exteris visum esset; agebatur quippe de cognato, qui hujus & aliorum auxiliorum ope convaluit.

6. *Synochus soporosa* Guarini. conf. 302. Riverii *obl. p. 324.* Sydenham febr. contin. ann. 1670. pag. 319.

Incipit sopor a delirio obscuro, accedit stupor, dein somnolentia, quæ a regime calidiori excitata non potuit a Sydenhamo sublevari nisi auxilium, dum de Cataphora febrilis recensendis. Vide Sydenham febribus amentis pag. 317. & febr. contin. pag. 323. & 324. Largum epispasticum capiti raso impostum profecit.

7. *Synochus scorbutica* Sennert de Scorbuto. A. Si in secundo scorbuti gradu sint ægri, curantur acidi, lenibus catharticis, non neglecto

usu vini albi; si interea periodo accedunt colligatio, purpureæ maculæ, dissolutio putris, mors, teste D. Lued.

14. *Synochus miliaris*, a Carouge en Normandie; Jaovier 1734. Journ. de Med. Avril 1756. Gerard. D. M. A.

Febris initio mediocris, horribilibus, lassitudinem, dein calore prævis; pulsus parvus; debilis, irregularis, lingua initio sana, in fine sicca, cum sit ardens; nausæ, dolores vagi, ægriphia, magis asthenia; Dejectiones frequentes, serosæ, scetidæ, verminosæ; urinæ pallidæ sedimento viscoso. Crur in patella nunc dissolutus, tunc insulset in copioso sero; cutis maculis rubris papulis vel albis, vel utriusque. Terminus intra 15. vel 20. dies per lym, raro ad 30. Mortis signa in quibusdam erant, quæ valeudinis in aliis, ut stridura laryngis stragulaos.

*Cura.* Remedia quæ profunt sunt tartarum stibiatum in tamarindorum decocto; quædam doses salis sedativi, serum lactis, vel aqua panis cum nitro pro potu; cum dissolutio non imminabat, phlebotomia, vesicatoria tibialis admoda, & sal sedativum in decocto bardanæ pro potu. Hieme & æstate perniciosior fuit.

Illam Synochum excitabat virus miliare latens, ut excitat alios bene multos morbos sæculo elapso ignotos. An eadem species ac febris nova Sydenhami?

15. *Synochus a scabie*. A.

Est vehemens Synochus ardens, intra septem dies cum scabiei eruptione terminandus, qui a viro scabioso, per vulnus brachii inoculato, exurgit. Vide hujus inoculationis mirum succellum in *Anaphora* 4.

IV. TYPHUS Hippocratis 1. & 2. de internis affect. Fossii, 333. Typhoides Pr. Alpini; *Febris mali moris*, *febris nervosa* Anglis; *Fèvre nerveuse*, *la fièvre continue maligne*.

Genus est febris continuæ quæ ultra duas septimanas, sæpius tres, extendi consuevit cum calore & urina sanorum similibus, pulsuque quoad frequentiam sano fere simili, & quoad robur non majori, artubus interea maxime prostratis. Pulsus saao rariorem in typhis observavit de Borden *Recherches sur le pouls* p. 309. & alii, adhibito etiam meo polyslogio.

Diferepat a synocha, quæcum magnam assiduitatem habet, ex eo quod pulsus velæque rarus, vel si frequens, saltem tantumdem minor sit quam in sanitate; in hoc autem male morata, seu maligna dicitur quod sub bona quoad calorem, pulsam & urinam specie clam ægro insidietur, & symptomata gravissima, ut soporem, delirium, cardiacas, exanthemata, convulsionem inducat subito, cum initio micis & sine periculo visa fuit; Novicerte vulgo in Galia potissimum toties malignis febribus accesserit quæ inasuetæ & gravis secum ferunt symptomata; cum alii clament illud nomen aptius illis convenire, quæ a miserrimis contagiosis aut

venenatis procedunt, verum ne nomen æquivocatio fiat, istud genus Typhi nomine iudicare liceat, malignarum epitheron illis speciebus relinquatur.

Difert a morbis exanthematicis ex eo quod exanthemata in Typho, vel a regimeine calidiori inducantur, vel non nisi in morbi fluxu superveniant, eaque ut plurimum sint maculæ, non vero tumores, etiam si parotides quandoque subnascantur; in exanthematis vero eruptiones miliares, variolæ, rubellæ, bubonæ &c. ante morbi statum etiam prorumpunt.

Demum pulsam fere naturalem frequentia tenuis & summam ætatem prostrationem in aliis febrium generibus reperi novimus; unde species ab invicem distinguuntur; verum nihilominus Typhus generis distinctum facit, cujus species omnium a pluribus observatoribus possunt distinde recenser. Huic morbum a febrium classe eliminandum excolet *Vifono in Libello dell' uso dello bastimento*, ex eo quod frequentiam pulsus absolutam in febris essentia seu arbitraria sua definitione reponendam censuit. Nomen *cæcophes* febribus hujusce generis ab Hippocrate fuit inditum passim in *Choacr*.

Malignus dicitur morbus qui 1. invadit cum spontanea viam prostratione, 2. cujus symptomata non respondent stadiis morbi, 3. nec respondent signis externis, ut calori urinæ, pulsui. Dantur febres malignæ contioux, ut Typhi; alix remittentes, eaque frequentiores, ut amphimerina & tritæpophya.

1. *Typhus carcerum* D. Pringle; *Febris carcerum*; *Maladie des prison* ou d' *hospital*; Huxham de aere pag. 82. *Maladie de geole*; *saif distemper*. A.

*Initium.* Horror & calor febrilis alternantes, anorexia; nocte recrudescit sine horrore, calor corporis, somnus interruptus non reficiens; labor & confusio in cerebro, in syncope, sitis parva vel nulla, pulsus frequens; ægri tamen procedunt & vagantur: situnc fiat phlebotomia, pulsus immittitur & delirium accedit; unde distinguitur a synochis, maxime si adhuc tremor manuum.

*Augmentum.* Accedunt lassitudo summa, nausæ, dolor dorsi, dolor & confusio idearum in capite, summa virium & animi defectio, pulsus velox & plenus; si tamen phlebotomia una larga instituitur, pulsus frequentior & simul minimus evadit; sequente delirio; crur spissus totius & in progressu. Urinæ variæ, nunc turbidæ, nunc limpide, pallidæ, sed in fine, si bene vertat morbus, ut plurimum crassæ & sedimentosæ evadunt. Si æger frigori exponatur, accedit diarrhæa non critica in pessimo casu, scæces colligativæ, ichorosæ, putres. Calor cutis acer & mordax, seu reliquit in digitis Medici sensationem per aliquot minuta; cutis sicca; nisi sudor adsit; sudor scetidus, sopor pravus in ore; pravis odor ab ipso ægro perceptus antequam deliret; lingua sicca profunda siccata; deinde flavescens, viridescens.

Febris carcerum vel nosocomiorum, est morbus



putridus, pessimus, sæpe contagiosus; incipit a frigore & horrore, quem levis calor sequitur; amobus per intervalla redeuntibus; anorexia absoluta, somnus inquietus, non suble-vans, dolor fyncipitis obfcurus; pulsus fere sanorum fimilis, aliquis cutis ficitas; fic lan-guent ægri aliquot dies negotiis inepti, fed lecto non additi: lingua raro arida, sæpius mol-lis & crulla flavescente obdusa: æger somno-lentus est, at parum dormit, dum altis som-niis immerfus videtur.

Progrediente morbo manus tremolæ, auditus obfcurus, vox debilis, pulsus debilitatur: æger cupit roborantia, ut vinum; noctis symptoma iagravefcunt, demum in diverfis morbi stadiis maculæ purpureæ irregulares efflorefcunt.

Lethalis omnis funt fubita virium prostratio, vifus debilitas, decubitus fupinus genubus re-tractis, conatus ad exiliendum e lecto, aphæ-nigræ, petechiæ lividæ, vibices lividi per corpus diffusi, diarrhœa violenta, cum materiæ plum-beis vel fubnigris & crefcente virium debilitate.

Cophosus vero ominofa non est, immo conva-lefcences fæpius obfufcunt, ac quandoque otalgia parulenta laborant. Utiles funt biliofa diarrhœa, urina cralla, maxime fi vires perfe-verent. Pultulæ parvæ, rubræ, numeroſæ, immo miliales albæ tyridæ boni funt omiois, modo fimul expeditorio facilis, & urinæ hy-poftasis cralla fit. Prodeft etiam fudor mitis, fublevans, parotidum tumor aphææ albæ.

Occafio hujus febris est haufus miasmatum putridorum quæ ex numeroſis in angufto & clauſo loco hominibus, ut in nave, carcere, noſocomio, exhalant.

*Curatio.* Putredo corrigenda, aer renovan-dus, mundities fervanda; phlebotomia raro pro-deſt, etiam in robuſtis repetita nocet, vires de-jicit, delirium accerſit.

Si adint naufæa, pondus epigaſtrii, lingua mucoſa, flavescens, vomitio pulvere ipecacuan-hæ cienda, ſubſequentelargo potu tepidæ: ejus-dem diei vespere bolus ex drachma theriacæ, & ſalis cornu cervi gran. 10. ſumendo ſuper-bibendo feri lactis haufum. Paratur hoc ſerum coquendo lactis recentis libras duas cum vini albi uncis quatuor, ſeparetur cololrum & co-latura ſumatur; hujus defectu ſumatur deco-ctum febrifugum; cujus libræ canthar addan-tur vini uncie duæ, & oxymelitis ſimplicis ſemunciâ; hoc ſero lactis vinoſo, vel hoc de-cocto utatur æger pro potu ordinario.

Sexta quaque hora æger ſumat pulverem ex radicis ſerpentariæ Virginianæ, radicis contra-ryvæ, ana, gran. x, corticis Peruviani deach-ſemiffe, camphoræ gran. 1v. ſuperbibendo po-tum ordinarium.

Si languet extremus, maculæ petechiales eva-neſcant, vel miliaſes retrocedant, sæpe mors extrema anxietatibus & convulſionibus cito ſu-perveniat, tunc camphore drachma una tetatur in mortario vitreo cum guttis xx. ſpiritus vini reſtificati, addens ſacchari puri ſicci unc. duas,

denique aceti vini fragrantis, unc. decem; de-tur hujus mixturæ, in vaſe vitreo bene clauſo ſervatæ, cochlear quavis hora, ſuperbibendo potus ordinarii uncietres; continuando ſique-quo æger levamen ſentiat, & pultulæ vel ma-culæ revertantur; & tunc quarta quavis hora tantum remedia illa repetantur: ſi his ſuccedat lenis ſudor univerſalis, levamen ſubſequetur. Si in decurſu morbi alvus adſtricta ſit, clyſmata injicienda. Æger ſtatim atque reveleſcet in aerem purum dimittendus eſt. Hæſtenus *III.* *van Swieten des maladies des armées.* In hac ſpecie morbus ad gr. xvj. plures ex oſci fau-cibus eripit. *Reid. Tranſ. Philoſ. N. 372.*

Cadaverum plurimorum diſſectio a *Pringle* in-ſtituta docuit typhum circiter a cephalitide, & cerebri vel cerebelli ſupputatione ſeroſa ſæ-pius ſoveri; alii in cephalitide vulgari pyrexia eſt fortis, in typho debilis. *Pringle Obſerv. ſur les maladies des Armées Tom. II. Chap. VI. §. 4.*

2. Typhus nervoſus; & nervus-fever, Huxham eſſai upon the fevers 1753. *Febris nervoſa*, Huxham de acre, pag. 147. *Heſtica maligna nervoſa*, V. Villiſi; *Febris nervoſa*, A.

*Intinum.* Faſtidium omnium rerum, leves phri-cæſes, flammæ fugaces faciei, laſſitudo univerſaſſa ut a magno exercitio, ſopor & animi ab-ſectio, capitis dolor gravativus, vertiginofus.

*Augmentum.* Accedit anorexia, frequens nauſea, vomitio viſcoſa, inſipida, identidem mor-bi vehementia remittit; ac dein maxime circa vespem recrudescit, calor, cephalalgia verti-ginofa crefcunt, pulsus frequentior, fed debilior, reſpiration minus libera, dolor capitis in vertice ſecundum futuram coronalem, vel obſ-cuſus, vel vividus, ſimulque frigoris & ſtopor-is ſentus in occipite: hos dolores typhi com-ites frequentiffimos ſequitur delirium; æger 3. vel 6. dies in hoc ſtatu permanet, pallidus, ſomnolentus, fed inquietudo & agitatio ſom-num tantum querere aut ſimulare permittunt. Pulsus ſæpex frequens, debilis, inæqualis; alias undofus, nunc intermittens, alias celer frigide auriſus, urina ſero lactis ſimilis, ſine ſedimento, niſi ſurſuraceo, ſi adû; mucus al-bus, deinceps aridus, rimofus linguam tegit; ſitis nulla.

*Statur.* Septima vel oſtava die vertigo, cephalalgia gravativa, tinnitus ereſcunt; delirium accedit cum oppreſſione, languore, anxietate; ſi furgat æger, in ſyncopem cadit cum ſudore frigido manuum, & frontis; fed ſurgit, dum palmar manus & genæ calent. Si ſtarim ſimp-li-dæ evadant, cito apparet delirium cum tendi-cum ſubſule, delirium autem mixtæ & mæ-idearum confuſio.

Lingua in medio ſicca, margine flavo, tre-mula, ſi in ſtatu morbi hamida evadat cum multa ſaliva, prævum ſignum. Dyſphagia & ſin-gultus mali omnis ſunt. Nona decimave die ſudores generales copioſi frigidi, viſcoſi in ex-tremis, cum deſectioibus alvi fluidis, unde vires exhauriuntur, alii a diarrhœa moderata delinunt.

& ſo.

& sopor evanescunt. Si sensim exhauriatur æger, pulsus frequentissimus & undosus evadit, delirium terminatur sopore alto lethifero: urina, lachrymæ, sæces inficior effluunt; mortem accelerant tremores & convulsiones. Duratio morbi a 24. ad 20. dies; versus finem omnibus auditus & cognitio perit; plures immodece metuunt, quidam a somno ablinent, ne mors somni specie obrepat. Surditas cum pulsus ados, cum parotidibus suppurantibus, boni ominis.

*Curatio.* Quoniam hujus morbi principia sunt nervorum debilitas, sanguis caeochymicus, evacuationes immodicæ, ætumnæ, vigilæ, yfus immodicus catharticum & veneris, psyllismus, &c. curandus est refocillantibus & cardiacis, alimentis scilicet lenibus, diluentibus; abstinendum a phlebotomia, & ab opiatibus; clysmata tertia quavis die inicienda, a leni emetico ordinanda curatio; jussula pulli, pristinæ de cornu cervi, panatellæ, vinum rubrum, succus aurantium vires optime rescitunt, quæ nullis sudoribus minuendæ, sed jalapiis, cardiacis temperatis ter in die sustinendæ: apud Anglos vesicatoria tibis, cruribusque admoventur, quæ, si sopor, deliriumve adsint, conveniunt.

A septimo ad nonum eruptio miliaris supervenit juvena cardiacis, diluentibus, vino rubro, quod sudorem moderatur, nec eruptionem impedit: ubi psyllismus sine aphthis utilis est, sudores effusi noxii.

3. *Typhus comatosus.* Febris maligna cum sopore River. obs. comm. 4. pag. 134. *Fever of spirits* Quincy Essai 2. A.

In hac specie pulsus est mollis, inæqualis, non frequens; æger interrogatus bene se habere respondet, inter dormiendum continuo, sed obscure, delirat, pallet, calorem nativo similem aut minorem habet; raro apud nos petechias, rarius miliaris pustulas patitur; dolor capitis, initio gravativus, cum virium prostratione summa; lingua & labia crassius nigris teguntur; æger sæpius lupinus jacet, naribus & lingua siccis; morbus certâ septimana ut plurimum terminatur; fœtor oris, & balitus hinc morbo proprius est.

*Curatio* hujus morbi difficilissima est: *Ni. van Swieten & Huxham*, magni artis antistites, præmissis emetico, sere a cathartici abstinere, ut ex typho carcerum patet. Monspelienses vero, præmissis phlebotomiis & brachio & pede initio morbi indicatis, præmissisque emetico, alternis diebus pristinæ regis seu catharticas præscribunt; sunt qui cathartica singulis primis diebus repetunt, sed mea & aliena experientia compertum habeo ægros multo rarius, & leniter purgatos, apozematibus & lactuca, cichorio, endivia ulos, decocto prunorum, prunis & pomis coctis, cremoribus oryzae, initio limonata, in fine vino aquato ulos, interpositis clysmatibus, optime resaluisse post tertiam quartamve septimanam.

Atque video puellam, quæ a 3. die ad 20. suo more vixit, cathartica, clysmata recusavit, sed multum bibit ex aqua frigida, vino paucò

*Sauvages Nosologia Methodica*, Tom. I.

mixta, limonata, decocto prunorum, pruna cocta, oryzam ingestis, vix ulla jussula; 15. die nigredo linguæ & labiorum abiit, delirium & sopor recessit, pulsus frequens & minus debilis evasit, fames accessit, virium summa prostratio sensim abiit, demum sola fere natura duce convaleuit; initio ter phlebotomiam & largam narium hæmorrhagiam passa est & purgata.

Mulier adolescens plethorica post vigilatas noctes, inediâ, caram liberorum & mariti ægri, incidit in typhum, quæ sexaginta dies uno eodemque fervore citra aliquâ intermissione eam veluti stupidam detinuit, nec intermit per totum morbi decursum ulla crisis se prodidit usque ad diem sexagesimum, in quo tantum sputum album & spumolus sine tussi rejecit, ita n. hujus sputi libras duodecim emisit, quo facto convaleuit, afferens se nihil incommodi, nihil doloris in toto hoc morbo percepisse. *Riverius*.

4. *Typhus hyssericus-urminosus.* A.

Virgo adulta ægrotabat, pulsus sex primis diebus erat sano similis, dolebat capite, mortem sibi certo instare credebatur, cor palpitabat, pectoris erant oppressiones fugaces, sumptis mannæ uncis duabus cholera fuit excitata, dein lumbricum ore rejecit; pulsus septima die parvus, inæqualis evasit; frigus & calor vagus; adhibita sunt vermifuga cum cardiacis; die duodecima, ob contumeliam ab ipsâ proximo hæreditatis causa acceptam, incidit in lethargum oculis semipertis, facie cadaverosa, angulo interno oculorum lipso, lachrymolo, lingua fusca, & sic facta functa est 15. morbi die.

5. *Typhus Castrensis* Boerhaav. consult. p. 209. de febre Castrensi Hungarica. A.

Aliud est genus hujusmodi epidemice febris longe pejus atque lethalius, quod vix centesimo observatur Medico. In eo quidem febricula est, vires illico prosteruens, absque apparentibus malis signis; calor longe mitior, sæpe vix percipiendus, cum frigore sæpe extremorum, respiratione impedita, angustia, anxia; pulsus celerissimus, debilis, vix observandus, tenuis; maxime inæqualis sæpe quasi evanescens, urina non rubra, sed plerumque lactea, corbida, absque sedimento, aut varia penitus; sitis sæpe minor, secitas oris, linguæ, faucium; inquietudo, deliria, anxietates leviores. Febris hæc sola sæpe virum jactura se prodit, adeo lætare solet & fallere: *to theich Hippocratis* in hac agnosce.

*Curatio.* Simul ac febris hæc adest, surgat æger illico de lecto, sedet in sedili, moderatissimo calore fruatur, caveat ab æstu; capiti, manibus, epigastrio applicantur fomenta ex aquæ & aceti partibus æqualibus; pedibus & nuchæ nodos dieſque applicantur epispastica ex fermento acri panis cum sale & aceto subactis; bibat decoctum hordei cum succo citrei, aurantii, cum rob ribesiorum, cerasorum nigrorum, sambuci, & similibus larga copia. Ubi largo talium usu permaduit si tæpe sudat,

L. 3

conti-

continuetur sudor ille lenissimus sine ulla violentia. Cibus esse ex pane cum vino panxillo & similibus, medicamenta tunc dentur omnia, quae putredinem arcant, humorumque nimiam dissolutionem prohibent: qualia haec:

Recipe: *foliorum ruta, scordii, ana, m. ii: corticis citri, unc. ii: succicitri, unc. iii, aut aceti vini, unc. semiss. aqua communis, lib. iv. tunc liquori flosato misce rob. sambuci, unc. iv. aqua stillantia cinnamomi, unc. i. Bibat de hoc liquore ager unc. i. omni hora de die & noctu, nisi somnus impediverit.*

Quid est ea febris, nisi typhi species, licet pulsus cellerimus dicatur? Signa pathognomonica seorsim nulla sunt ita certa, quin syndrome sit multo certior in designandis speciebus.

6. *Typhus Aegyptiaca* Prosp. Alpini; *Febris maligna Aegyptiorum*. A.

Haec autumnio viget; incipit a vomitu bilioso, cardialgia, anxietatibus, succedunt dejectiones foetidae, variae in variis aegris; cacoficia, adipis cum lingua aspera, sicca, nigra, pulsus, urina, calor, sanis similes; subiecta sunt advenae potius quam indigenae: principium est vel potus aquae cœnosae in cisternis putrefactae, vel halitus lacuum.

*Terapeja Typhi Haecquetiana.* Si in febre, in qua per primos dies aeger vix febricitare videtur, cum urina, pulsu, lingua, cute vix a sanitate mutatis, sed cum aethena, pervigilio; deinde vero post levem cephalalgiam accedentibus cardialgiis, hypochondriis tamen mollibus, ex improvise superveniunt subfultus tendinum in carpo, tunc inter dormiendum, tunc in explorando pulsu; tremor laborum, linguae balbuties, somni inquieti, delirium, somnia, corporis subfultus, vel similia, ea insignem malignitatem indicant.

Præmissa phlebotomia ex brachio & pede, ad venæ jugularis sectionem deveniendum est. Utatur aeger ferro lactis, inde deveniat ad pituitam ex decocto aquoso-Kinckinæ, in cujus libris duabus dissolve vini emetici unciam, & salis Epsomienfis drachmas aliquot, sumat pro potu. Adhibeanturetiam levia hypnotica, necnon clysmata ex aqua, & sic evanescet febris maligna.

7. *Typhus Illorodæ; Fièvre jaune d'Amrique* Lining Vandermonde Ma. 1768. *Le Siam* Halleri. 1. *Periodus.* Initium. Saepius triduo ante febrem cephalalgia, lumbago, dolor arthriticus, maxime in genibus, & suris, anorexia, lassitudo, asthma; dein febris incipit ab horripilatione, pulsus plenus, frequens, saepe durus, pulsant carotides. Calor ad 102. gr. therm. Fahrenheitii, non ultra, qui per biduum utplurimum sine remissione perseverat, cum epidrosi quæ tertia die evanescere. Respiratio minima quæ a minimo motu, vel a deglutitione acceleratur; lingua humida, aspera, alba, in medio brunnea circa secundum diem, sitis moderata. Tertia die calore, epidrosi, pulsus remissis, superveniunt nausea, vomitus. Hypochondria

nec tensa, nec dura. Prima die somnolentia, dolores antiqui renovati, animi prostratio, debilitas, vultus ruber, oculi rubri, lucis intolerantia, raro delirium, faeces nondum nigrae, cruor in patella floridus, nullum serum dimittens. Secunda die inquietudo continua, jactatio, dolores nulli, faeces duræ, nigrae, constipata alvus, pervigilium pertinax, urinae copiosae, pallidae cum hypostasi copiosa prima die, sed secunda die turbidae cum hypostasi brunnea, tertia die sanguinolentæ. Intra 72. horas ad summum pulsus rarus evaderebat, calor evanescebat sine evacuatione critica; si tamen diaphoreticis blandis & diluentibus sudor productus fuerat per triduum, cum febre periculum evanescebat; ceteri cum magna aethena & oculorum flavedine, alteram morbi periodam ingrediebantur.

2. *Periodus.* Pulsus tardior & mollior quam sanis præ molitie evanescebat saepius, & tunc aurigo, vomitus delirium, jactatio crescebant. Calor anuus; pulsus debilitato frigus, facies, peccus, extrema sublivida. Cutis in frigore aeris viscosa, & humida, dum calebat aer; respiratio lenta, lingua nitida, apice & angulis rubra; frigidam aquam sine multa siti appetebant. Vomitus vel nausea crescebat; ita ut vix quidquam retinebant; aliis cruor, aliis atra bilis picea rejiciebantur cum vomitu, somnus nullus, vel continuo interruptus, cum summa debilitate; vix lecto præ inquietudine contineri poterant; interrogati tamen quomodo valerent, optime, respondebant. Vix e pulvinari removebatur caput, quin pulsus evanesceret cum frigore, sudore viscoso, labiis, extremis, facie, immo unguis livescitibus; tanta erat eorum debilitas. Delirium recurrebat & crescebat, maxime ubi pulsus parvus & depressus. Ophthalmia crescebat, sed sine dolore. Aurigo, nisi in initio secundæ periodi accessisset, tunc in oculis apparebat, mox totum corpus flavescerebat, paucis aurigo in oculis concentrata, accedente morte, illico peccus & collum tingeat. Collum & peccus maculis rubro-lividis, rarius extrema erant variegata. Mulieribus catamenia copiosa & præterventia. Cruor tunc ita dissolutus, ut non solum vomitu & mictu, sed etiam naribus, ore, auribus, oculis, vesicatoriis, rarius poris cutaneis viam sibi faceret. Quidam aegri constipati, alii frequenter faeces deiciebant; ex quibus alii nigras liquidas cum dysphoria, alii piceas, seu nigras & tenaces, quibus moderate fluentibus levabantur. Urinae copiosae, crocae in auriginosis, aliis pallidae, semper cum multa hypostasi; aliis turbidae, aut languinolentæ. Haec periodus septem, vel octo dies utplurimum percurrat.

3. *Periodus.* Tunc spes salutis erat, si symptomata omnia remittebant, pulsus plenior, viribus redeuntibus; sed secus omnia symptomata intendebantur, novaque accedebant, scilicet pulsus minor adhuc & inaequalis, extrema frigida & livida, raro facies livida, aliis plumbeas;



bes; maculæ ita crescebant, ut collum, pectusque omnino nigrescerent; palpitatio cordis vehementer, calor in regione cordis, respiratio difficilis, suspiriosa, æger inquietus, agitatus, sudor faciei, colli, pectoris, fluens; cruor e naribus, ore, auribus simul, dysphagia, singultus, subultus tendinum, dein cataphora, delirium continuum, per duodecim horas ante mortem aphonus æger & asphyctus; in acutioribus convulsio tragœdiæ finem imponebat, post mortem crescebant maculæ, & putredo cito perficiebatur.

Cum aer summe calebat, illæ tres periodi intra biduum, vel triduum percurrerebant. Epidemia & contagio calore aeris crescebat, frigore remittebant in Carolina meridionali, ita & symptomata, ac periculum. Ægritudo pejor, si aer clausus non renovatus, si robur nativum majus, apud peregrinos, meticulosos, exercitatos, aut morbis prægressis debilitatos. Qui ad ultimam periodum deveniunt, omnes moriuntur.

In prima periodo cephalalgia, lumbago, ophthalmia, lucis intolerantia, faciei rubor, quo intensiores, eo morbus vehementior & acutior; quo prima periodus brevior, eo brevior, etiam secunda: si enim pulsus vehementia cessaret ante tertiam diem, mors circa quintam accedebat. Pulsus depressus tertia die symptomata profissa præsentabat; quo gravior debilitas initio, eo periculum majus. Hypostasis urinæ primis diebus quo ærior, eo pejoris ominis.

In secunda periodo: si secunda ægritudinis die oculi fovelebant, mors quarta accedebat; si sub finem tertiæ diei morbus, vel scilicet, vel tardius terminabatur, ut decima tertia, vel decima quarta: quo stansendo intensior, & velocius extensa, eo pejor: rubedo oculorum, & circum vesicatoria cresces ominosa. Vomitus nigra ut plurimum lethalis; lividitas macularum, labiorum, unguium, necnon faciei rubor, aut pallor mortem instantem designabant. Dejectio frequens, maxima, nigra sine levamine; mortifera; omnis hæmorrhagia, excepta nasali & catameniali, ominosa: ab ichthura mors in promptu.

Typhus icterodes contagiosus est. Albos tantum, maxime peregrinos ex regione frigidis advenas, Indos, Hybridos, Mulatros omnes, exceptis infantibus; non tantum vice afficit; Nigri vero ab eo morbo nunquam afficiuntur.

Definitur febris in qua pulsus vehementia biduum, aut triduum tantum durat, ut in ephemera, sine evacuatione critica desinit, & superest maxima debilitas cum pulsu parvo, qui levi corporis motu, aut situ erecto evanescit, accedente cito aurgine universali, pulsu minime frequenti, & sine calore; epidemica fuit in Carolina ab exente Augusto ann. 1748, ad Octobris dimidium.

8. Typhus exanthematicus D. Dellon, D. M. Voyage aux Indes Or. Ægri Lusitanici vocantur *Esfaldados*. Apud Indos frequens est morbus eorum qui venæ exhausti sunt; febris scilicet continua, in qua pulsus nunc effortis & plenus, nunc vero &

illico debilis, & fere inconspicuus. Urina valde rubra, sed pellucidæ; cutis secca, calida; sitis magna, pervigilium, nausea. *Terapeia* ex analeptics, cibis euchymis & eupeptis petenda, ut ovis, panatellis, jure carniū; potus sit vinum paululum aquatum; nec timendum est ne febris & calor incrementum, cum nihil ad illam curandum sit apertus.

#### 9. Typhus a manipnera.

Manipnera est succus jatrophæ manihot, seu mandihoce Pisonis, cujus radix siccata est panis Americanorum; succo illo Intus sumpto, corpus inflatur maxime: ventriculus dolet cum ructu, nausea, tenesmo; hinc mox oculi obfucantur; vergetines, perpetuo dolores capitis accedunt; tandemque extremorum frigus, animi deliquium, & ipsa mors succedit.

Antidota sunt Bos alhami, an baccharidis? & grana Bixæ urucu, vulgo *Roucou*. Incipiendum ab emeticis, & deinde piper reticulatum, mox succus limonum, ananæ adhibeantur. *Guill. Piso Hist. natur. lib. 5. cap. 17.*

#### V. HECTICA; la Fièvre Héctique, Fièvre lente.

Genus est febris continuæ, quæ chronicorum morborum more senescit, & sine viriam notabili prostratione, atque exigua pulsus frequentia, ad plures septimanas, immo menses, extendi consuevit cum pulsu post pulsam frequentiori.

Confundi solet cum Amphimerina tabida & lenta, quæ singulis diebus, vespere potissimum, sine causa evidenti exacerbatur; sed differt ab ea, ut ab exacerbantibus continuæ differant. Hanc Hecticam vocantur Græci, seu habitualem, cujus calorem constantem, & ideo solidis quasi inherenter dixerunt.

Distinguitur a tabe & a phthisi, ex eo quod nulla pars in hectica ulcere, vel abscessu sit vitata; ut in tale & phthisi vitantur viscera; Adde quod tabes & phthisis febricula amphimerina stipentur.

*Hectica Galeni*, & omnium ejus sequacium. *Sydenhami pag. 524. Lenta Febris Junker. tab. 63. Fridr. Hoffmann. Tom. v. pag. 176;* qui tam ab amphimerina distinguunt.

Hecticam duplicem statuit *Galenus* (*de diff. febrium, lib. 1. p. 266.*) primam qualis est a nobis definita; alteram quæ juxta ipsum vera tabes est, aut tabis comes assidua, nobis amphimerina.

*Hippocrates* nomen proprium hujus generis non adhibuit, sed nomine classico usus non diuturnam & lentam cognominavit; verum nomina generica distincta cuique morbo competant. Cum autem *Hectica* sit nomen hujus morbi antiquissimum; vacuum; *Febris lenta*, nomen ordinis, non generis, prius posteriori est anteponendum in hoc genere designando.

Differt a typho symptomatum gradu minori, duratione longiori multo, orthostadia; ægri enim vix lecto assignantur.

1. *Hectica infantilis* Sydenhami p. 524. *lenta Febris infantum*, Frid. Hoffmann. p. 177. T. 2. L.

Infantes sine insigni calore laequent cum apæpticus.

petitus dejectione; tam artus quam corporis truncus ubique emaciantur.

*Curatio.* Rhei electi uncias duas in tenuis cerevisiæ libris duabus infunde, bene obtura lagenam; hinc bibat propæu ordinario cum & sine cibo. His assumptis ad tertiam vicem, iterum aquæ alias duas libras subtiliæ, eidem rheo superaffundendas; si vero metus sit ne prima vice alvus nimis moveatur, uncia una rhei statim sufficiet. *Sydenhamus Schedula monitor. p. 324.*

2. *Hælica vespertina*, seu febricula vespertina, Morgan. animal economy. propos. 13.

Constat iterata observatione pulsuum apud omnes homines, cætera sanos, frequentiore evadere post partum, ut ita ut si pulser horis matutinis ante jentaculum arteria 66. vicibus in minuto, et 84. vicibus pulsatura sit post prandium, hoc est in ratione 100. ad 129. fere ut 10. ad 13.

Illæ vero frequentia perseverant usque ad noctem mediam, sed sensim decrefendo, ita ut numerus pulsationum una hora post prandium sit ad numerum hora undecima nocturna, ut 84. ad 78. circiter.

Ex principiis Morgani, cum in summa frequentia pulsus vespertina sit ad matutinam, ut 8. ad 7. vis pulsus vespertina est ad matutinam, ut 64. ad 49. velocitas sanguinis & diameter arteriarum vespere sunt etiam majores quam mane. Cum autem vis artuum potius decrefcat vespere, evidens est ex definitione febris, illum statum febrilem fore, si notabilis foret mutatio; non minus hic status, licet omnibus sanis communis, vocatur *febricula vespertina*, quacumque propterea omnes ad hædicam senectutis, seu ad mortem.

Ex his sequitur, nunquam pulsus esse rariorem, quam summo mane inter dormiendum, & quod jejuni stomacho pulsus est minus frequens quam durante digestionem. Digestio itaque est opus, quod ut absolvetur indiget aliquali febricula, quasi quod transit in maiorem sanguinis indigat tritu iterato, ut elaboreretur, & in cruorem mutetur. Si arteria pulset mane 60. vicibus in minuto, illa consonabit cum pendulo simplici 400. lineas longo: vespere autem ea pulsatura est 68. vicibus in minuto, & longitudo penduli vespertinis horis cum illa consona erit ad longitudinem matutini ut 45. ad 64. seu 329. linearum.

3. *Hælica Chlorotica, febris alia* Horstii Part. 2. lib. 1. Moroni Dir. febris virginea Sennert. de morbo virg. febris amateria etiam dicitur.

Est febris vel pere intensior, alia continua, non exacerbans, pallore faciei, altitudine, difficultate respirandi in scalarum ascensu, capitis dolore, phlegmacia, pica, palpitatione lipari solita. Vide *Chlorosim*. Ea vero optime curatur syrupo martiali, aut limatura ferri, quæ lympham crassam, incertemque vasa onerantur, cum catamenia deficiunt, attenuant; unde hoc opere liberata natura, a febricula illa quiescit.

4. *Hælica Syphilitica* Raim. Fortis: Mercurialis, T. 3. fol. 22. *Lenta febris*: Astruc de morbo vener. lib. 4. cap. 3. C.

Est febricula noctu crescens, chronica, vix potissimum infansans, cum doloribus nocturnis, sudatiunculis matutinis, quæ ab ipsis doloribus nocturnis, aut nodis, gummatique inveterat; si vero supputationes graves in ossibus accesserint, etiam amphimerina evadit.

*Curatur* balneis, lacticiis, similibusque, modo specifica syphilidis adhibeantur; secus ægrum absorbet, exsiccat, exhaurit.

5. *Hælica scrophulosa* Bonet. in Sepulchret. Tom. 5. p. 146. 153. Vide Febrem hædicam scrophulosam. Ruffel de tabe glandulari hist. 23. C.

Non differt a phthisi scrophulosa Morgani. Si suppuratio jam addit, erit amphimerina horribilis paroxysmos suos inducens; si suppuratio nulla, usus aquæ marinæ conducit.

6. *Hælica a calculis* Bonet. Sepulchret. lib. IV. pag. 321. Tom. 3. obser. 23.

Franc. Figueros Medicus Hispalensis febre lenta cum dysuria, urinis fuliginosis, tenefmo, siti, linguæ scabritie, argularum mitione assumptua est; calculi vesicæ erant hujus morbi principium, ante aperturam cadaveris igoatum.

Simile quid accidit sexagenario, qui sine dysuria mingeat, sed aperiæ, virium languore, & febre lenta assumptus est; calculum igitur 14. uncias ponderantem gerebat in vesica.

Causa hælicæ a calculis renalibus Bonet Sepulch. lib. 4. sess. 1. obs. 21.

7. *Hælica hydropum* Bonet, Sepulchret. lib. 4. sect. 1. C.

Ea est quæ fovetur ab aquarum effusione in diversis partibus, in qua tamen signa hydrothoracis vel ascitis deficiunt, secus enim morbus esset hydrothorax vel ascites.

Ab hydrothorace Sepulchret. observ. 14. 4. 13. 6.

Ab hydrothorace pericardii, Ibid. observ. 12. 6. In his speciebus inventa est aqua nigrescens, & purrida in alterutra thoracis cavo pulmonibus illæsis, Coiter: vel vesicæ aquam flavam continentes in pulmonibus copiosæ, vel pericardium falso liquore turgidum cum cordis aneurysmate, pulmonesque indurati visi sunt.

8. *Hælica Nephalgica*, Synochus Nephalgica, de Meyzeroy Tom. 3. num. 226. C.

In orphanotrophis hæc species frequentissima: Pupilli scilicet vel patria vel parentibus orbi morient, languent, debilitantur; anorexia, morore confecti lente febricitant, sensum absumuntur; nullumque huic malo remedium est, nisi reversio ad parentes, ad patriam, medicamina evacuantia, quæ anorexiæ aut diarrhææ gratia prescribuntur, inutilia, sæpe noxia sunt. Plures gestant in erubilis vel tibia maculam brunneam vel livescentem; in lectulo immobiles, taciturni, omnia fastidientes jacent.

SCHOLIUM. Hælica nervosa Willisi. Hælica pestilens Sennert. Hælica a syncho degenerat seu lenta Junkeri ad typhos attinere videntur.

Hælicæ quæ apoplemate, fistula, ulcere alijus visceris aut partis foventur, ad tabem vel phthisim spectant.

Hælica a scirrholignis, hepatis, pancreatis, uteri,

uteri, ad splenalgiam, hepatalgiam, hepatirrhœam, leucorrhœam, &c. spectant, cum in illis sint alia symptomata febre magis notabilia.

Signa generica hæc sunt 1. febricula tam mitis, ut si ægri febricitent id non sentiant nisi in ultimo gradu, 2. cutis siccitas cum calore sicco, acri, non tamen ad thermometer notabili, 3. una aut altera post cibum hora, calor & frequentia pulsus augentur, 4. interea pulsus est minor quam in statu sano.

9. *Hælica verminosa* Hoffman. T. 2. p. 137. C.

Febres verminosæ puerulis ablatis familiaribus sunt diversi generis, æque multum anomaliæ, sæpius tamen amphimerinæ vel hæcicæ; talis est amphimerina tussiculosa, nec non ea quæ dentitionem sæpe comitatur.

Hæcica verminosa in hoc ab aliis differt quod post cibum & vespere non constanter ingravescat, quod sæpe alvi fluxum comitem habeat, in quo cinetæ vel griscæ excrementa succedunt, urina turbida cum sedimento limoso mingitur, quæ in aliis hæcicis non observantur. Præterea sator oris singularis, quem acidum dicitur mulierculæ, lumbricorum excretio, pruritus narium, volaticæ aliterius generis rubor, dolores punctorii vagi in abdomine: ætas infantilis signa præbent, ab hac febre tamen non immunes sunt adulti. Præcelsi usus dulcium saccharatorum.

Cura absolvitur cathartici & anthelmintici. Optime purgant, & vermes abigunt sibiata parva dosi, inter quæ syrupus Glauberi ad guttas aliquot, infusa solorum vel folliculorum sennæ cum manna, syrupo florum persicæ; aqua novem infusionum, syrupus rosatus solutivus; etenim cum de infantibus agitur, mellitis illa improvida ætas ludificanda est, secus medicamina recusat: unde sæpe deveniendum est ad grana pauca tartari sibiati in aqua multa dissoluti, aut ad aquilæ albæ grana aliquot pulicula involuta. Si febris vigeat, abstinendum ab anthelminticis, immo a purgantibus validioribus juxta Hoffmannum & utendum acidis cum amaris, immo in hoc casu aquas Selteranas spiritu vietricoli correctas laudat Auctor, quod tantum adultis convenire videtur; inter amara vermisuga excellunt semen fantonicum, tanacetum &c.

10. *Hælica cachectarum*: a scabis Baglivi, pag. 215. C.

Est hæcica feve lenta symptomata, urajunt, quæ cachectas bene multos afficit, citra purulentiam; unde differt a phthisi & tabe; talis est febricula lenta convalescentium a febribus acutis, a phlegmasiis, a fluxibus, nec non chlorasiam, scorbuticorum, syphiliticorum, hydropticum &c. Hæc vero febris non plurimum sequitur prognosim & medelam morbi principalis, cui adhæret.

11. *Hælica fluxuum*: a vomitu, River. Cent. IV. obs. 1.: a leucorrhœa, Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 27. C.

12. *Hælica lymphatica* Baglivi pag. 434.

Exacerbatur vespere cum calore acri, anore-

zia, capitis gravitate veluti soporosa; mansapor linguae est depravatus cum visciditate & dentium spurcitie, orisque fœtore; accedunt hypochondriorum tensio, calor, lassitudo. Frequentissima est, & abusu refrigerantium aliis febribus supervenit.

13. *Hæcica nervosa*, febris lenta nervosa Gl. Lorry de Melancholia pag. 176. *Febris lenta nervosa* G.

Non est acuta, ut typhus, sed chronica, diu obscura, melancholiæ nervosæ in veteratæ sensim accedens; ea abit, nisi curetur, in phthisim aut tabem nervosam.

## ORDO SECUNDUS.

### FEBRES REMITTENTES.

*Synches & Pyreta Epanadida* Hippocrati; *Paroxysmali* Avicennæ; *Continuæ periodica* Sennerii; *Continentes* Mortonii Pyretol. pag. 120. *Proportionata* Tozzi; *Remittentes* Huxham; Pringle &c. *Exacerbantur* Pathol. Meth. Seasoning Anglis.

ILLÆ sunt quæ ab initio ægritudinis ad finem usque ægrum non dimittunt, sed determinatis temporibus in quocumque stadio, adeoque pluries cum horrore, vel oscitatione, frigore, aut simili quodam spasmodico conatu recedunt, subseque caloris, vel aliorum symptomatum augmento, citra ullam causam evidentem, vel absque principio procacitudo.

Illæ spontaneæ, sine principio evidenti repetens, symptomatum redintegratio, proprie *paroxysmus*, Latinis *exacerbatio* vocatur, & est in remittentibus quod accessio in intermittentibus, adeoque discrepat ab augmento accidentali, quod in continuis vel continuentibus observatur ob animi pathemata, cibum assumptum, motum corporis, aut febriculam vespertinam, de qua egimus in hæcica.

Intervalla inter paroxysmos vocantur *Remissiones*, quia febris non omnino recedit, ut patet vel ex pulsus frequentia sanam superante, aut ex virium prostratione adhuc notabili, quæ in intermittentiis apyrexia, seu intermissione non datur. *Periodus* est pars morbi constans uno paroxysmo vel accessu, & una remissione vel intermissione.

Continuæ primi ordinis unicum habent augmentum, scilicet in secundo ægritudinis stadio; aut remittentes in quovis suo stadio, scilicet initio, augmento, statu, & declinatione suos paroxysmos patiuntur, ut sui sunt in singulis intermittentiis stadiis accessus.

Qui cognoverit causam accessionum in intermittentiis, & causam febris continuæ, ambæque conjunxerit, in causam exacerbantium capiet; principium vero nullum aliud est quam natura, quæ confusa percipit periculum ab intermissis suis conatibus oriundum, & adeque identidem conatus suos renovat, quæ tamen viribus suis propiciens eos conatus alternatim remittit.

ric; hinc enim periculum est ut materies morbifica, diutius immorans & stagnans, putredinem majorem, aut sphacelofam acrimoniam adipiscatur, adeoque eam iteratis cordis conatibus corrigere, vel expellere nititur, aut omnis torpidum sanguinis motum exsuscitat, ut debita ei, velocitas concilietur; aliunde vero pro consuetudine in actibus etiam liberis recepta, in eodem tenore conatus suos continuat, sed gradatim augeat usque ad acmen; dein successive illos imminuit, ut in omni opere consuevimus. Sic cantores, cum ad tonum sensim altiores devenire, si diu cantare pergant, in tonum successive magis depressum delabuntur, & identidem chori magister, tonum lapsum, seu vocem, altius tollere cogitur; sic foetores initio vegetius ac vegetius urisqur, deinde sensim a vigore remittunt, usquequo inertia suae confecti conatus iterum intendunt.

Qui sinitur somitem materiz morbosiz instar fontis periodici, qui per intervalla majorem fluidi copiam suppediat, illi mechanice sibi videtur ratiocinari, atque de hypobesi nova, sibi plaudunt; sed demonstratum puto ab hujus materiei morbosiz periodico, appulsu, quem nemo explicuit, sanguinem tantummodo inspissari, adeoque motum cordis, ut accedat conatus oaturz, ita minui, nedum intendi; ergo ad oaturz conatus in hac ipsa hypothesi semper confugiendum est.

Observant omnes Prædici, quod intermittens accessus quidam tamdiu durat & repetunt, quamdiu cathartica, aliaque evacuantia repetuntur, & ideo cum semel ad kinkinam deventum est, ab omni evacuatione esse abstinendum docent, teste Sydenham; atqui ubiqueque sit fomes ille materiem morbosicam suppedians, is evacuationum ope debet successive imminui, & diæta severa concurrente eundem permanere impossibile est; ergo cum effusus suis causis sint proportionales, & reditus accessum crescat cum fomes decreverit, huic fomiti non tribuendus est accessus reditus. Si vero fomes ille adit, quod in certis casibus verum est, illud non est causa, sed principium accessus, vel paroxysmorum.

Laborem febrilem naturæ ordiri consuevit ab spasmodica cutis contractione, quæ frigus quidem & horrorem excitat, sed quæ materiem morbosicam commovet, ex minimis vasis exprimit, exagitat, & ad elaborationem ulteriorem in calore febrili fuissepiendam disponit; calor vero febrilis physice, atque pulsus valorem mechanice hanc salubrem fluidorum alterationem, cõtionemve molitur, ut fufe in theoria februm exposuimus.

In actuali Medicinæ statu parvi refert ad praxim non solum species, sed etiam diversa genera februm ab invicem accurate distinguere, quippe si ve exacerbantes, si ve continuas, si ve intermittentes acutas, ut quotidianam, tertianamque duplicem eodem ferme modo curant: phlebotomia, cathartica in omnibus primas tenent, & tantum in exacerbantibus & intermit-

teoribus quæ his remediis resistunt, nec purulento principio debentur, kinkinam opponunt; iuterea ut Astronomi stellas, Botanici plantas, quarum distictio cognito vix utilis videtur, ita & Nosologi diversas febrium species distinguere debent, ut perfectior evadat scieotia medica, & in usus futuros paratior.

VI. AMPHIMERINA; *Amphimerina* Græcis; *Cathemerina* & *Merimerina* receptotum Græcorum juxta Galen. in Epid. 364. num. 11. *Quotidiana continua* Latiosis, Sennerto; *Phlegmatica* Avicennæ; *Latica* Barthariz; *Syneches* Gorraei Def., Mortoni; *Hemimerica* Brendelil; *Fidra* quotidianæ consuetus, putride, maligne; *Hemimerica*.

Ab *amphi*, circa, & *emera* dies, quod singulis diebus paroxysmus revertatur. Differt a *quotidiana* ex eo quod in remissione ad plenam integritatem, seu apyrexiam non deveniat; a *tritætophysa*, quod a rigore incipiant plures paroxysmi.

Geous est febris remittentis, cujus paroxysmi singulis diebus sibi similes sunt, sed raro regularis observatur.

Differt a *synescho* & *hæstia* ejus acutiem habet, ex eo quod sensibiles sunt sine causa evidenti exacerbationes, horrore, frigoreque aliquali iucentes; a *quotidiana*, quod non intermitat & in remissione æger debilis admodum ac febricitans remaneat, aut quod obscuras intermissiones habeat, deindeque remittentem se prodatur; proteiformis enim sapiens est, maxime cum medicamentis ejus typus turbatur.

*Amphimerina* vel est morbus, ut ajuat, essentialis, vel *accidens*, seu symptoma minus præcipuum alterius, ut tabis, phthisiqur; ista vero chronica est, cum essentialis sit semper acuta, de qua hic agimus; si quis hoc geous hemitritæum vocet, non repugnabo.

1. *Amphimerina latica*, *Phlegmatica periodica* Avicenn. Lib. IV. Pen. 1. *Quotidiana continua exquisita* fontoni Idea Univ. Med.; *Febris lymphatica continua*. Etmuller Colleg. Casual. 21. A.

Illa est quæ paroxysmos prælongos obdinet, ad horas octodecim protrahos; exacerbatur quotidie circa vespæram, cum levi partium extremarum refrigeratione ut plurimum, calore in paroxysmo miti, sed tenaci. Ita contumax est ut duos menses sibi relicta excurrat. *Latica* dicitur a calore latente. Vide *River, observ. 67. centur. 12.*

Vide curam distinctè traditam apud *Etmullerum loco citato pag. 609.* curam vero sequentium apud *Torri*. Sequentes species sunt malignæ, typo confuso, gravibusque symptomatis stipatæ, a *Mercato Tertiana perniciofa* dictæ, vulgo *febrim malignarum* nomine cognitæ, aut si minus periculosa sit, putrida dictæ.

2. *Amphimerina Catarrhalis* Jünckeri Tabul. 67. Nenter cap. 9. tab. 136. *febris catarrhalis*. Auctorum; *siftur de rhinno* ut *catarrhalis*. D.

Differt a *latica* per coryzam, dolorem dorsitullum.

tussim, rancedinem, dysphœam, anginam; incipit a refrigeratione & vagis longique horribilibus.

Ægri vespere pejus habent, horrent, tussunt, febricitant, dolores catarrhales majores experiuntur. Is vero morbus, præmissa phlebotomia & potu theiformi, diluente, calido, narcoticoque horis nocturnis assumpto, sua sine periculo percurrit tempora, ac blanda diaphoresi terminatur. Ea vero quam Germani vocant catarrhalem malignam, sæpius sine symptomatis catarrhosis observatur, monente *Ill. Brandelio*.

### 3. *Amphimerina Epistola Galeni. A.*

Est febris maligna intermittenti similis, in cuius remissionibus ægri prostrati habent pulsum frequentem, & fortiores; in paroxysmis vero tremorem spasmodicum quasi epilepticum, ut vocem præcludat, pulsum rariorem & inæqualem, & interea dum calidior ab adstantibus percipitur, æger horrore frigoris maximo percussitur. Paroxysmi vel semel velbis in die recurrunt, anticipantes vel retardantes, necnim legem in his expectare debemus, sed intra paucos paroxysmos æger e medio tollitur; illi aggreditur homines senes & cachecticos fabarra quadam infarctos.

Rarissimus in Gallia morbus: frequens, ut ferunt, apud Italos. *D. Baux pater* ter eum morbum viderat, sed toties lethalem. Memini me ter hunc morbum observasse: bis in nosocomio generali. Æger, utcumque calidius perciperetur ab adstantibus, de summo frigore in invasione febrili conquerebatur; ille evasit: de secundo eventu memoria nil suppetit. Tertius in paroxysmo conquassabatur tam vehementer, ut ne potum cardiacum haurire posset; post sex circiter minuta quiescens pulsum habebat debiliorem, & calorem minorem quam in epistemia, len dum frigus sentiebat, & cardiacis indigebat; post tertium paroxysmum obiit. Ille senex ob immanem dysuriam balnea domestica subire coactus non satis purgatus erat; & illico atroci dysurie dolore sedato omnino accessit epistola; præcesserat somnus vetustus per noctem.

In hoc morbo quantocius purgandum cum emetico & dein apozematâ ex foliis tichorii, dentis leonis præscribenda, interpolata cathartica, antequam ad kinkina deveniamus; bezoartica, theriaca cum illis cardiacis in ipso paroxysmo indicantur.

Immerito culpatur *Avicenna* quasi fixisset morbum in quo externa calent, interiora frigent; cum enim Medicus externa calida percipiat, & æger horrore frigido concutitur, facile est concludere eum in interioribus frigere, dum calent exteriora. Quod ceteri dicunt ad illud phenomenon explicandum supponentes esse puncta calida frigidis intermixta, est comœotum scholasticum; non est necessarium frigus thermometerum ad sensationem frigoris percipiendam; cum ultima urinæ gutta mingitur, cum nefas horrendum audimus, frigidus per ossa tremor currit sine prævio frigore atmosphærico, ut vulnus nobis sensum ulionis imprimit sine

calore thermometrico; ab spasmo cutaneo frigus illud ededucendum, non a frigore pituitæ vitæ, ut putabant Veteres.

In virgine juveni actu epialam multo leniorem, in qua ægra quotidie lecto surgit, paroxysmos per decem vel duodecim horas patitur, initio cum summo tremore, frigoreque, quod ab adstantibus non percipiebatur; deinde vero tremor nullus fuit; lingua humida quidem, sed brunnea, subnigra evasit, & invictis cathartichis per alternos dies repetitis ægra ultra mentem singulis diebus paroxysmorum expectata est. In paroxysmorum intervallis pulsus minime frequens est, verum debilitas artuum docet ægram non esse apyretam.

2. *Amphimerina syncopealis* Jonstoni idea univ. med. Sennerti de febrib. *Febris syncopealis* Avicennæ lib. 4. f. 1. Foresti observ. 61. lib. 2. Torti pag. 192. A. P.

Virgo hexagenaria, post nauseas, cardialgias, adhibita cathartâ, quotidie febris paroxysmum experiebatur, sed alternis diebus paroxysmus erat fortior; sumpto cathartico & iterato etiam cum kinkina, febris syncopealis apparuit, quippe pulsus evasit exiguus, rarus, ut in statu sano; pedes frigeant, syncope imminerebat & continuo sopore detinebatur; mane melius se habebat, pulsus resurgebat, sed quovis vespere frigus, anxietas, nausea & vomitus biliosus viridescens revertuntur; purgata est statim cum emetico & nerrime evacuata, alternis diebus iterata catharsis, adhibita cardiaca, limonata, aqua pulli.

Mirum febris genus, cujus paroxysmi decem aut duodecim horas durant, & in quo pulsus rarior est in paroxysmo, quam in sanitate; paroxysmi non amplius sudore terminantur.

3. *Amphimerina cardialgia, cardialgia febris* Torti pag. 183. *Febris syncopealis humerosa* Avicennæ lib. 4. fen. 1. cap. 53. A. P.

Febris est acuta, maligna, quotidie circiter exacerbans, cum leipthymia & syncope in paroxysmo, nec non vomitione bilis prasine & æruginosæ: inde crescente debilitate extrema frigerent, sudor frigidus dimanat, & circa quartam diem ut plurimum e medio tolluntur ægri. Differt per dolores cardialgicos a syncopeali.

Aggreditur juvenes biliosos, siccos, cacochymicos, differtque ab amphimerina repletionali seu syncopeali humerosa Avicennæ, quæ non ita acuta est; minuta scilicet a bile æruginosa, humoralis vero a pituita vitæ, ut ajunt, producitur.

Quantocius vomitorium est præscribendum, cardiacis maritatum & lenæ. *Serapis* solam aquam calidam vel syrupum acetorum suadet; verum nostris temporibus tartarum vel vinum sibiâtum magna aquæ copia dilutum & cum aqua naphæ, theriacali vel simili jundum præstare videntur in remissione; in paroxysmo vero fortiora cardiaca indicantur, Juseula sint succo limonum aromatizata. Kinkina laudatur a Torti.

6. *Amphimerina humorosa* Avicennæ lib. 4. fen. 1. cap. 53. Paul. Æginet. lib. 22. cap. 37. *febris syncopalis repletionalis* Foresti obs. 61. & obs. 29. pag. 89. T. 1. Vide *febrim syncopalem* ejusque curam apud Torti, pag. 192. A. P.

Differt a syncopali proprie dicta five minuta 1. ex eo quod multo minus acuta sit: 2. quod plurimi paroxysmi quotidianæ typum sequantur, & contra in syncopali minuta plures paroxysmi tertianæ typum sequuntur ex *Avicennæ*: 3. magis est nauseativa & cardialgica quam syncopalis: 4. cacochylia copiosa crassa camfovet; syncopalem vero paululum materiæ acris & venenatæ.

Hos ægros *Paulus* curari vult sine phlebotomia & sine catharsi; phlebotomia quidem contra indicatur a pallore aut lividitate faciei, a pulsu debili & raro in ipso paroxysmo, quæ raritas in paroxysmo mihi videtur signum syncopalibus & epialis proprium; catharsim vero illi ægri non tolerant & animo inquantur, ait *Paulus* & *Avicenna*; licet enim vehementer ea indigeant, robur ita est exhaustum, ut eam ferre nequeant. Hinc *Paulus* repetitas frictions coctus corporis, per dies integros continuatas, potissimum præscribit & nullam pro potu; ad summum clysmata, & pro cibo panem in julo-culo solum vel vino tinctum suadet.

Observatio 29. lib. 3. *Foresti* ejus speciei historiam optime tradit, ac curationem per frictions assiduas more *Galenii* & *Pauli*; vis kinkina tunc erat ignota.

7. *Amphimerina perniciosa* *Galenii* Isagog. Marc. Douart Hist. Mirab. Lib. V. cap. 5. *febris horrida, algida, horridica* Latini; *febris maligna* River. Cent. IV. Obs. 56. *febris querquera* Car. Pisonis; *febris algida* Torti pag. 193. ubi sex hujus historie existant. A. P.

Vulgo dicitur ea in qua horror continuus est seu frigus intensus, tum ad sensum ægri, tum ad palpum Medici, cum tremore spasmodico, quæ simul est exacerbans amphimerina.

Differt ab hemitritæo quod quotidie rigores longi paroxysmum comitentur; alternis vero diebus in hemitritæo. Vide *Sonn. de febrib. lib. 3. cap. 21. & River. cent. 4. observ. 66.*

Sexagenaria febre maligna laborabat hemitritæo affini. Paroxysmi quotidiani erant cum refrigeratione totius corporis per horas duodecim vel quindecim perseverante & maximo virium languore, quem fovebat diarrhœa grisea senilemica. Huic in fine profuit bezoardicum sive Riverii, & undecima die sanata est.

*Etmuller, Helmontius & Sylvius* appellant algidas febres, quæ ab initio ad finem algorem habent comitem. Vulgaris initio ludit sub effigie tertianæ duplicis, dein subito æger frigidus, asphyctos videtur, paroxysmi confunduntur, & nisi ingeratur kinkina, observante *Torti*, & medio æger tollitur. Vide *Cardialgiam febricosam*.

8. *Amphimerina hemitritæa*, *Semertiana* Latini; *Hemitritæus legitimus* *Auctorom*, River. observ. comm. 23. pag. 139. *Hemitritæus*, A. P.

Quoniam docet observatio quod inconstans est in febribus hujusce ordinis paroxysmorum typus, & quod in eodem subiecto nullas paroxysmorum ordo sit constans, hemitritæus ratio- ne typi non debet differre ab amphimerina, monente *Brendelio* & dudum *Foreſto*; adeoque ambæ sub eodem genere militare debent.

Hemitritæus est illa species amphimerinæ in qua singulis diebus est paroxysmus, aut alternis diebus paroxysmus a summo frigore incipit quasi tertiana cum quotidiana continua simul concurreret. Differt legitimus hemitritæus a notho ex eo quod sit acutus, & intra septem dies ut plurimum terminetur, nothus vero sit chronicus; nam *Stahlus* vidit nothum ad menses extensum (*de febribus observ. 43. pag. 121.*) atque solis viribus naturæ sanatum.

Accidit præcipue autumnus gulosis & catil-lonibus.

Ex pulsus frequentia sola non judicari debet utrum febris intermittat vel remittat; si enim post paroxysmos vires prostratæ remaneant, si sint gravis symptomata, ut vigilæ, lipothymia, licet pulsus non sit frequens in remissione, febris minime intermittens habenda est. Vide *observ. 23. Riverii de hemitritæo, pag. 139.*

Legatur observatio hujus Hemitritæi apud *Ballonium consil. 115. lib. 1. de febre semertiana* ubi erat sopor, delirium & dolor obscurus lateris cum summo ardore; altera in *consil. 29. lib. 2.*

9. *Amphimerina pseudohemitritæa*, *Hemitritæus* nothus *Galenii*; *Liptria* *Avicennæ*, non Græcorum; *Hemitritæus minor* *Schenckii*; *Tertiana continua duplex* *VVierhof. p. 62. Faux hemitritæe*, River. Cent. I. Obs. 54. A. P.

Differt a priori morbi longitudine majori, adeoque intensitate minori; vide *obs. 39. Cent. 4. Riverii de Episcopo Uzariensi.*

Diagnosim etiam hujus speciei vide apud *Riverinum observ. commun. 23. pag. 139.* differt siquidem a tertiana notha duplici, quod lipothymias, vigilas, aliaque symptomata accersat, viresque in remissione non refurgant.

Huc spectat etiam *rara species hemitritæi Riverii obs. 23. cent. 3.* Mense Februario, ait, Gerardus febre continua pituitosa cum paroxysmi tertianæ laborabat. Illi a rigore insigni insipientes bis in die recurrebant, & febre intensa ad multas horas perseverante, leni sudore terminabantur, ita ut hæc species ipsi videatur quotidiana continua cum tertiana quaduplici. Alias notavit *Riverius* triplicem tertianam, seu quæ intra duos dies ter recurrebat.

Pseudo-hemitritæum epidemicum anno 1700. grassantem vide descriptum in *consultatione 200. Frid Hoffmanni pag. 422.* ejusque epicrisim, licet auctor hunc morbum pro intermittente habeat.

10. *Amphimerina Hungarica*, *Hemitritæus pestilens* *Schenckii 1574. Vermis Cerebri* *Schenckii*; *febris Hungarica seu Castrensis* *Juockeri* Tabul. 73. *febris Catarrhalis maligna* *Frid. Hoffmanni* Sect. I. cap. X. cum descriptione & curatione; *fièvre d' Hongrie* de *Meyserer*. A. P.

Febris

Febris est acota, maligna, epidemica ut plurimum, castrensis, milite militibus, potissimum plethoricis, familiaris, quæ orditur ab horripilatione & cephalalgia, quibus accedit sitis & ætus maximus, ardor circa feribulum cordis, lingue siccitas & tumor, frequenter angina, quarto, septimove die delirium cum oculis fulgidis, venis capitis tomidis, & vespere paroxysmus; his adde pulsus fortiorum, quamvis ceteris malignis, narium hæmorrhagiis (supervenientibus, agrypniam continuam cum anorexia, quibus comites se addat pro diversitate temperamenti & principiorum vomitus, dysenteria, petechiæ, parotides, paralytici, hæmiplegiæ.

Ad curationem Amphimerinæ Hungaricæ, quæ summo ardori & putredini simul debetur, duæ sunt indicationes adimplendæ, i. scilicet advertenda inflammatio cerebri & stomachi, quæ vulgo accidit in hoc morbo; 2. everrendæordes primarum viarum putres & non raro verminosæ. In hunc finem uberes phlebotomiæ præmittendæ sunt, ut infarctus inflammatorius præcaveatur; potus diluentes, ecoprotici, refrigerantes, insula pulli vel carois vitulinæ, clysmata emollientia, & dein ecoprotica, eo usque præscribenda quo dolor stomachi evanescit, ardorque contemperatus sit, ita ut ad cathartica properandum sit; cum itaque pulsus mollis evasit, epigastrium a pressione non dolet, cathartica præscribenda sunt, non irritantia, v. g. in decocto tamarindorum, prunorum, duo pogilli folliculorum fenæ cum floribus malvæ, violæ sunt infundendi pro duabus dosibus, cuilibet addenda est manna; his addi possunt antihelmintica, acida; & primis visis sufficenter purgatis inquirendum est quo natura vergat.

Illa species raro catarrhalibus symptomatibus stipatur, ut ut catarrhalis vocetur: sæpius purpuram symptomatice adducit aut parotides; convalescentes sunt, obnoxii phrenitidi, inanitionum.

11. *Amphimerina miliaris* Vide Sydenham p. 350. Journ. de Med. 1758. pag. 275. A.

Hæc a veneno miliaris latente excitata, quavis nocte paroxysmus excitat quotidianæ intermittentis æmulum. Hæc vero kinkina resistit; hæc febris per octo primos dies benigna, dein caput impetebat & sanæ hæmorrhagiam accerbat, obsequo demum miliaria exanthemata alba a D. Morton observata hujus morbigenium declarare.

12. *Amphimerina angiosa* Huxham de ære; *Angina Epidemica* Foresti lib. 6. *Febris petechialis* Nenneri; *Febris Catarrhalis maligna seu petechialis* Junckeri Tab. 71. Gallis gripe, *febris* *influenza* Huxham de ære pag. 104. A.

Illa species est eadem omnino quam describit Riverius obs. 9. comm. pag. 136. morbus epidemicus, *coqueluche* vulgo; certantum discrimine quod apud Nostros nullæ erant petechiæ, cum apud Germanos & Anglos frequenter febribus malignis se adiungant comites. Eadem observata est epidemica Condomi apud Vascones anno 1730. *Journal de Med.*

Is morbus *coqueluche* dictus anno 1557. plurimos e medio tollebat 4. ad 7, vel 14. diem. Tussis erat cum angina, dolore capitis, pervigilio, lambagine, coryza. Qui post phlebotomiam & bechica sudorem fortidum effundebant, liberabantur; plurimi inedia consumebantur.

Condomi ulcerosa erat angina cum typhismo & petechiis; diarrhæa vel spontanea vel artificialis & nitrum profuere. Affinis erat cyanocephæ malignæ *Straussii* seu laqueo *Asii*. Differt hæc species a purpura, quod maculæ cutis in amphimerina sint accidentales, regioni calidiori tribuendæ. Vide *Purpuram*.

Germani catarrhalem sæpe nominant amphimerinam malignam in qua ne minimum est catarrhi symptoma, obstante *Brandelio*; saltem stillicidium, epiphora, horror a principio diverso dependens.

Amphimering malignæ necnon tritaphyæ sunt morbi apud nos minime rari, sed qui nomine generico febrium putidarum, aut malignarum confunduntur; Ille liquidum quæ alternis tantum diebus exacerbantur cum exiguo aut nullo frigore præter initium morbi sunt tritaphyæ; quæ vero singulis diebus exacerbantur paroxysmis subsimilibus sunt amphimerinæ, & paroxysmis alternis frigore majori stipatis sunt hemitritæ. Legi meretur quod scripsit de hemitritæ & tritaphyis *Baglivi*, lib. 1. pag. 69.

13. *Amphimerina tussiculosa*, *febris vomituse*, & *catarrhale des estomac*, *coqueluche des Français* A. B.

Anno 1757. mens Junii de anno 1760. mense Majo, viguit epidemice inter infantes hæc febris quotidie exacerbans cum spūto sanguinis, tussis serena, in qua fere suffocantur, alumbrius rejiciunt.

Curatione cathartica vermifugis per alternas dies repetitis. Vide *Tussen clausen*.

14. *Amphimerina singultuosa*, *febris continua* & *maligna* Riverii cent. 2. observ. 47. idem observ. 78. cent. 3. *Singultus*, *Febris lyngades* V Valschmidii; *Febris maligne avec hoquet* A. P.

Episcopus Nemausensis anno 1629. quinquagenarius febre illa maligna cum singultu & nausea affectus fuit; exacerbationes mane quovis adveniebant & septem horas durabant; urinæ erant rubræ & turbidæ, siccæ liquidæ, billosæ, vigilie perpetuæ; sanguis extractus quasi pleuriticus; febris quinta die inivit duabus phlebotomiis crescebat cum anxietate, sudoribus non criticis; septimo sudor criticus copiosus accessit. In altero ægro febre eadem singultuosa laborante post plures phlebotomias & duas cathartices, varique remedia, die morbi duodecima, laudani grana duo; cum emulsionem in qua oocia salis prunellæ, assumpta sunt, & intra horam morbus cessavit.

15. *Amphimerina peripneumonica* s. *Morbus epidemicus* Telonei in Gallo-Provincia an. 1757. Journ. de Med. A.

Vere invadit hic morbus; exordium a tussi importuna & febre amphimerina acuta, bis quovis die exacerbante, cum frigore & calore altes.



alternatis, Accedebat oppressio pectoris, spiritum cruentum, dolor lateris; ut plurimum superveniebat vomitus vehemens per duas treves dies, viscosus, amarus, necnon in multis ludus copiosus, pertinax; pulsus constanter plenus, frequens, submissus, lingua subalbida, humida, pallacea; dolor capitis & dorsi inter omoplatas. Finis, cum lethaliserat, quinta vel septima die; sed morbus feliciter cedebat sequenti methodo.

*Cura.* Præmittantur duæ phlebotomiæ circiter, cum pitana non inviscante, sed diluente ex infuso capillurum veneris & glycyrrhizæ; deinceps tartari stibiatæ grana pauca in decocto cassiæ & tamarindorum, quæ uberem viscosæ materie ano & cæco evacuationem eiant; sequentibus diebus cathartica minorativa præscribantur. Ab emeticis omnia symptomata etiam inflammatoria remittantur.

Epidemia illa, ab alternatis per mensem sero & mane frigoris acuti, calorisque suavis vicibus accessit, mulieres non attigit.

16. *Amphimerina spasmodica.* Vide Vandermonde Journal Août 1757. A. P.

Fervor & delirium in paroxysmo, in remissione penis rigescientia sine mole adacta (quod in dysuria calculosa etiam accidit) abdomen planum, rigidum; oculi obtutus fixus, loquela monosyllabica, urinae difficultas, os siccum, lingua convellebatur, nullus calor, spasmi universales, tendinum subsistens.

Hæc febris usu Kinkins sublata est, successerat quartana.

17. *Amphimerina mimosa, Febris exacerbatæ Tymoræsis*, in Indiis peculiaris; Bontii de medic. Indorum, cap. 15.

Qui navigant in Insula Solor & Tymor, cædendarum fantali arborum gratia, conspiciunt febri quadam putrida, quæ exacerbationes per quatuor horas patitur, quæ durante exacerbatione ridiculas admodum actiones agredunt, imitantes ea officia, quæ sani exercere, & omnia effusientes temere quævis vita tacenda, loquendave pergerunt cum maximo astantium risu: adest præterea bulimus, ita ut, dum in delirio sunt, omnia etiam dissidiosa devorent, quæ ipsi præbentur. Tribuitur maxime odori visoso fantalorum, acri nebulofo, frigori ipsi fructibus immaturis. Hæc Insula sita est 10. gradibus latitudinis meridionalis, ibi

*Cum modo frigidius, valido modo stringimur assu  
Temperè non certo, corpora languor habet.*

*Cura.* Leni catharsi & clystere præmissis vena tundatur usque ad animi defectum in plethoricis; cucurbitulae applicentur cervici, scapulis, capiti raso. Incolæ temporalem arteriam lamina candenti, vel fune sclopentario accenso urunt cum lupendo fructu, quod etiam in cephalæ faciunt: tum vomitoria antimonialia aur ex gilla vitricoli usurpantur. Adversus vigilias egestum croci opponitur. Dein ad sudorificos &

diurotica, ut Bezoar, rasura coram Rhinocerotia, deveniendum; calor refrigerantibus syrapi emendatur.

18. *Amphimerina phrenitica* Bontii de medic. Indor. cap. 14. epistola est Mercat. de tertiana. A.

Adest febris quotidie exacerbans, sed sine typo certo; delirio phrenitico continuo; pervigilio, vomito æruginoso, exteriorum partium algore, interiorum ardore & siti intensa stipata.

*Cura.* Purgatio ex tamarindis & pulpa cassiæ, præmissis clysmate emolliente; deinde phlebotomiæ largæ instituantur: ægritorum corpus unguento regitur: somnus narcoticis conciliatur.

19. *Amphimerina paludosa, Amphimerina febris* Bartholini de medicina Danorum; *Fièvre bilieuse en putride des Pais bas & marécageux*, Pringle mal. des armées. Tom. 1. pag. 260. & 314. A. P.

Sunt illæ quæ in regionibus non solum humidis, sed etiam ob tempestatem calidis, ut mense Julio, Augusto, oriuntur ex halitibus putridis a plantarum, pisciumve corruptione.

Hæc febris sæpius initio est remittens, at versus finem abit in tertianam intermittemtem, cum scilicet hieme accedente putredo decreverit; invadit raro cum frigore, sæpius cum cephalalgia, calore urenti, siti excedente, oleo copio, lumbagine, magna lassitudine & anxietate, frequenti cardialgia, gastrodynia, sæpe cum vomitione bilis viridis, flavæ, odoris ingrati. Pulsus vulgo exiguus, sed a phlebotomia crescens; aliquando cephalalgia ita subitanea & vehemens, ut ægri tanquam maniaci per agros excurrerent; sed remittente febre cum sudore dolens periodice cessabat: aliis delirium in paroxysmo, unde milites ex curra in flumen se præcipites agebant, ut natando nosocomium attingerent. Plures bilem ano & cæco, necnon alii lumbicos rejecerunt. Sudores magni, scatebant ægri, & vibicibus ac petechiis cadavera scatebant. Pulsus etiam in agone regularis fuit; si sudor nono die accedebat, febris tertiana succedebat; si diarrhæa critica post tres septimanas apparerebat, febris in quotidianam abibat.

*Curatio.* Dissert parum a curatione amphimerinæ biliosa, scilicet 1. Phlebotomizæ parciores sint, licet febris ad continuum ut synochum magis vergat, rarius ad intermitteutes; ea si quidem magis est putris quam phlogistica, & nisi delirium aut aliud phenomenon inflammationem topicam suadeat, minus est repetenda vena sectio, quam in biliosa, secus malignitas morbi crescit. 2. Vomitoria & cathartica magis conveniunt, vomitoria sæpe tollunt morbum; sed tartarum stibiatum præstat, quia non adstringit. 3. Præmissis generalibus ad kinkins confugiendum est, statim atque datur aliquoties intermissio; & ne recidiva fiat, quovis die una kinkinæ drachma sumenda est per aurumum, secus frequentes recidivæ viscera obstruunt. 4. Antisepticus visus necessarius est, scilicet moderate nutritur & parcius utatur illis quæ ad putrefactionem vergunt, seu quæ relaxant, ut



ut herba, fructus, statulenta, cerevisia tenuis &c recens, multo praestantius est uti roborantibus, quidquid enim roborat est antisepticum, ut liquores spirituosi moderate sumpti.

20. *Amphimerina variolosa*, *Febris variolosa* Mortoni de variolis; *Febris putrida variolosa* confluentia *superveniens* Sydenhami pag. 393. *Secunda febris variolarum confluentium* Mead. Epist. de purgantibus; *Febris secundaria*. A. P.

In variolis confluentibus undecima die pustulae faciei exsiccantur, incrustantur, & cum minime sibi quidquam metuendum existimant eger, non raro, ob puris cum sanguine miscelam, ita subito corripitur febre putrida, quolibet vespere recrudescente, cum summa dyspnoea, anxietate, quandoque sopore, ut nisi promptissime succurratur, ipsa die mortis periculum incurrat; quod si effugerit, inde ad usque decimum septimum, raro vigesimum, a periculo immunis non est.

In his rerum angustiis tum Arabum, tum Neotericorum experientia docuit nihil praestantius esse, apud adultos praesertim, quam sanguinem statim ad uncias decem, vel plures mittere: si coma simul addit, capiti derales amplum vesicatorium applicare: si vero nullus sit sopor, sed anxietas & agrypnia, paregorico tranquillitatem conciliare, & circa decimum tertium diem, immo ex usatu Meadii, maturius, si casus ferat, leni cathartico praescribere ex infuso senne cum manna; quam phlebotomiam, quodque catharticum etiam sequentibus diebus repetere quandoque necessarium est: nec enim pustularum retrocessus timendus est, cum pustulae jam incrustatae sint in facie. De his videtur historice decem a Meadio enarrare.

21. *Amphimerina arthritica*. Vide Mémoires des Etrangers, Tom. 3. pag. 457. A. P.

Cognoscitur ex suppressis doloribus arthriticis; quorum loco accedunt paroxysmi febriles singulis diebus, cum vehementi frigore, dein calore, & urinis turbidis, lateritiosis, sine sedimento.

22. *Amphimerina biliosa*, *Febris biliosa* D. Tissot an. 1739. *Febris biliosa* des camps, Pringle Maladie des armées Tom. 1. Chap. 3. pag. 37. *rectius putrida cognominanda*; An tritaphya biliosa? A. P.

Accedit circa medium mensis Augusti, & epidemia in dies intenditur, quamdiu milites castra habent.

Febris est remittens, paroxysmis quotidianis vespertinis, summo calore, siti ardenti, vehementi cephalalgia, saepe & delirio stipata; quae symptomata noctu durant, mane evanescent, post epidemiam, haemorrhagiam, vel diarrhoeam, initio morbi frequens nausea, vomitus biliosus, puris, oppressio in sine; nisi evacuationes fuissent sufficiens, febris continua & ardens accedebat. Accedente hieme, & frigore acuto, febrem comitabantur rursus, rheumatismus, sanguis viscosus. His incommodis pedites milites, minus duces & equites, frigore minus exposti-

ratione pallii, obnoxii sunt. Haec esse contagiosam probat observatio Pringle, ex 23. factoribus, qui tentoriorum horum militum relaxandis incubere, septemdecim hac febre correpti periere Gandavi. Primus paroxysmus incipit a lassitudine, frigore; ceteri a calore. Pulsus in paroxysmo plenus, velox; in remissione minus frequens; sanguis coctivus, firmus; thrombus sero immersus; accedente hieme pleuriticus evadit, & putredo iniquitur.

*Cursus*. Cum aestiva & autumnales febres castrenses a putredine sanguinis incipientiorum ducant, quippe cadavera citissime gangraenascunt, & moribundi cadaverosum odorem spargunt, respicienda est humorum putredo, & solidorum laxitas, adeoque indicantur medicamina, quae 1. primas vias, seu sanguinis emporium expediant, 2. quaerimoniam putrem cortigant, 3. quae eam eliminant, 4. quae fibras roborent. Hinc mire conducunt vomitoria, cathartica, cardiaca, acida & kiunkina; magna siquidem pars harum febrium in intermittentes feliciter degenerabat.

Phlebotomia in paroxysmo instigatur, & repetatur vomitorium a remissione usurpandum; si nausea sit, & febris vehemens, ipecacuanha; si remissio longior, febris mitior, vinum emeticum, tartarumve autepomatur; saepius miscetur duo grana tartari stibiatum cum scrupulo ipecacuanhae; sed praemisso clysmate, si alvus constipata sit, ut solemne est in hac febre.

Salsa neutra optime reducut febrem anomalam ad remissiones regulares, seu typicas; hoc praestat sal abinthii cum succo limonum; vel

Rec. Salis abinthii drach. r. & semissim, solve in aqua uncias decem, infilla spiritus viridi q. s. ad saturitatem, adde aqua cinnamonomi, syrups cortice aurantiarum, ana drachmas duodecim, capiat quartam, vel sextam quaque hora cochlearia quatuor.

Praestat in hoc casu spiritus Mindereri uncia una in duas tresve doses sub xilium finem propinatus, ut sudor simul excutitur sine caloris augmento; sic ille spiritus ex sale volatili ammoniac ad saturitatem aceto affuso, vel sal cornu cervi ad scrupulos duos affundatur tribus aceti cochlearibus pro dosi. Ad fervorem febris temperandum nitri grana decem quater in die sumantur. Si in intermittentem mutetur febris, kiunkina, purgatis primis viis, est usurpandum. Si cephalalgia sit, aut delirium, phlebotomia indicatur; aut si pulsus non vigeat, septem circiter hirudines temporibus admoveantur, & salina neutra usurpentur. Sudor nunquam theriacalis, similibusve calidis excitandus, nisi pulsus debilis sit, aut petechiae accedant.

23. *Amphimerina semiquartana*. A. P. Est ea quae quarto quoque die paroxysmum notabile, frigore stipatum gerit; aliis vero intermediis diebus paroxysmo sine frigore notatur, ita ut sit Amphimerina quartana veluti

con-

conjuncta. Observata est in vetula a D. Cusson, & postquam ope kinkinae paroxysmus quartanarius fuisset inhibitus, residui sponte abierunt.

24. *Amphimerina semiquintana*, A. P.

Ea est quæ quinto quoque die paroxysmum horrore notabili insignitum gerit, quasi quinta intermitteas Amphimeripam simplicem comitaretur; hæc in matre sua observavit, & multo kinkinae usu debellavit D. M. M. meritisissimus, fugavitque primo paroxysmum quintanarium affectu soporoso & periculoso notatum.

VII. TRITÆOPHYA; *Tritæophyes pyreter*

Hippocratis Lib. I. Epid. Galeni Comm. in eund. libr. & lib. 2. de differentiis febrium, *Tritæos synoches* Galeni de diff. febrium; *Febris continua tertio quoque die exacerbans, intermedium vero diebus aliquatenus remittens*, Gorræi Definit. *Tertiana perniciofa* Torti. *Tierce continua*, *Tierce maligna*.

Differt a tertiana ex eo quod in apyrexiam non desinat alternis diebus: ab amphimerina & hemitritæo, quod singulis diebus non patitur paroxysmum, sed tantum alternis, aut si singulis sint paroxysmi tertianarii; sæpius vero, excepta invasione paroxysmi, a frigore non exordiantur.

Tritæophyæ & amphimerinæ hemitritæi nominis etiam temporibus minime rari sunt morbi, observante *Brendelio*; sed vulgo febres malignæ indiscriminatim vocantur.

Differt a morbis exanthematicis, ut purpura, non per defectum petechiarum, sed ex eo quod in Tritæophyæ & amphimerina petechiæ accidentales sint, inconstantes, a regime calido, aut aliis principiis extrinsecis præcedentes; unde Germani illas *petechiantes* vocant, ut a petechiali febre, seu purpura eas distinguant. Idem dictum esto de peste, cujus character est bubonum, anthracumve eruptio constans, cum parotides in tritæophyæ & amphimerina inconstanter sub finem tantum superveniant.

1. *Tritæophya synopalis* Burlet de variis Hispanorum morbis differt. anno 1714. Riverii obs. 36. centur. 4. P. A.

Intermittentes, ait *Burlet*, sunt gravissimi moris, maxime cum in synopales abeunt, rarum febris alibi genus, Castellanis & Matritensibus non infuetum: illa rigore in principio, in declinatione persufus sudoribus tertianæ morem utcumque imitatur, in hoc tamen multo difficilius, quod cardialgia, enormi vomitu, summa virium prostratione, contractione pulsus, extremorum refrigeratione, nisi prompte succurratur, secunda aut tertia accessione tollit. *Rivierus* cum morbum nomine febris tertianæ malignæ memorat obs. 36. cent. 4. In singulis iusculis bezoardicum minerale & joviale addebat; singulis diebus et paroxysmus, sed qui alternis diebus sibi respondent, aut similes sunt, scilicet primus tertio, secundus quarto, &c.

2. *Tritæophya causus* Hippocratis. 3. Epidem.

*Causus*, live febris ardens periodica. River. de febrib. putrid. cap. 1. *Filure ardente*, etiam mal. P. A.

Est febris tritæophyæ species, quæ paroxysmis tertio quoque die sine frigore sedentibus cum siti clamorosa, ardore corporis, sine diarrhœa & sudore essentialibus, nam aut alteram ad summum septimanam excurrit.

Differt a tritæophyâ biliosa, quæ vomitu bilis, & dein diarrhœa biliosa in augmento, vel statu stipatur, cum in causo alvus hîste flatibus sit adstricta, & diarrhœa non nisi in declinatione, adeoque critica stipetur. Præterea biliosa est tritæophyâ duplex, seu singulis diebus exacerbatur. Causus est tritæophyâ simplex quoad paroxysmos.

Adolescentibus biliosis, robustis, valde exercitiis, æstivo tempore, ab itinere (sub sole, à laboribus immo dicis, regime calefaciente potissimum accidit, causus intra duas septimanas ad salutem, vel ad mortem terminari consuevit. Lingua arida, quandoque nigra, urinæ flammæ, rubræ, dolor capitis, anxietas, quandoque graviora in paroxysmis accedunt symptomata.

*Curatio*. Eger nutriatur cremoribus oryzae, hordei, vel iusculis pulli, vituli tenuioribus, quarta quoque hora sumendis; bibat pristinam frigidulam ex emulsionibus, aqua pulli, limonata, vel aquam nictatam vel spiritu sulphuris, aut vitrioli acidulatam, aut infusum acetosæ. Phlebotomia iteretur pro ægritudine, temperamento, morbi gravitate, pulsus vehementia. Clysmata ex emulsionibus, decocto refrigerante, emolliente quavis die injiciantur; foci refrigerantes ex decocto foliorum malvæ, lactis abdomini applicentur; quovis vespere julepia, vel emulsiones anodynæ exhibeantur; sedato febris impetu catharsi lenis ea decocto tamariodorum, cassiæ, cum manna, & si cardialgiæ, nausæ exigant, nulliusque sit dolor acutus, sed tantum pondus in epigastrio, lenissimum vomitorium, ut granum unum, vel alterum tartari sibiati primo cyathoadatur. Cathartica lenia deinceps usurpentur ad bilem evacuandam, usquequo febris desierit.

3. *Tritæophya Præsidavienis* D. de Hahn. Journ. de Medec. Decembr. 1757. P. A.

Morbus epidemicus incepit februario post famem qua pauperes morticiora putrida vorabant, post credes belli, ære cadaveribus infectis infecto, post animi pathemata ex fratrata messe, aliisque ærumnis, adde quod nullo vento expurgata fuerat dudum atmosphæra.

Febris acuta, lipyria, asthenia generalis, dolor capitis & præcordiorum, diarrhœa serosa, agrypnia, delirium in quibusdam rabidum & aerophobicum; secunda die sitis importuna, vomitus & diarrhœa biliosa, sputa viscosa, syncope, ignis viscera depascens, lingua arida, & quasi adusta ferro candenti, vox nulla, anxietas, apnor universalis, cita mortem convulsionibus in aliquibus febribus lipyria,

ria, summo & algido extremorum frigore adorsa, ardorem intolerabilem viscerum mox excitabat, cum sudoribus symptomaticis; diarrhoea vehementer; supervenit erupcio miliaris maxime pruriginosa; quarta die sudores & dejectiones copiosae, dein (passus maxillae, nausae, enuresis involuntaria, leve delirium, ichoris e naribus fluxus, imputa viscidissima, morte epileptica.

Ipse Professor *Mahn* sequencia passus est. 1. die accessit febris vehemens sine rigore dolor vividus occipitis, mox inflammatorius totius capitis, pedes frigidissimi, extremi spasmus rigidi, dolor ita crescebat in dies, ut contactus aeris intolerabilis foret; animi languor, & debilitas, incredibilis, noctes inquietae cum sudore continuo, oculi dolentes, graves, & sensus rheumatici universales in corpore. Die 3. dolores sedabantur; nox pessima. Die 4. omnia pejus habuere, pedes congelati, manus rubrae omnino & convulsionibus agitatae; imago mortis terrestriaciens, vomitus identidem; hac die spongiae aqua frigida madida toti corpori applicatur, frigidaque propinatur. Die 5. pulsus convulsivus, dolores ad clamorem continuum usque. Die 9. delirium, gramulos sanguis vomitu rejectus. 11. Sudor, pulsus pacatus, kinikine decoctum adhibetur, vox intercisit, loquelae impedita, stridor dentium. 12. Maxilla convulsa, risus sardonicus, surditas; dein paroxysmi tardius & noctu tantum revertebantur. 14. Frigus glaciale in toto corpore, sudor frigidus, lotiones frequentes sunt, omnia sedari incipiunt. 18. Delirium vividum, alii scyope ex lecto derelicto, fames, dein sudores copiosi, forma profundus; strepitus versatio, omnia nova apparebant & extraordinaria. 36. Cholera. 48. Desquamatio cutis: ungum lapsus.

Profluere in hac epidemia lotiones corporis ex aqua, illis frigida, illis tepida, clysmata aquae, potus aqueus copiosus, cathartica; critica fuerunt exanthemata, rubellae, erysipelati, efferae similia, & cutis desquamatio circa declinationem.

Triam illia hominum Uratislaviae abstulit haec epidemia; quo obscurior est morbi cognitio, eius indoles eo dirior est.

4. *Trytaophya typhodes*; *Diaphoretica Torti* 187. A. P.

Species est tritæophyae cujus praecipuum symptoma est sudor colligativus, quo fere semper madent agrotantes, cum paroxysmis tertio quoque die revertentibus.

Hanc speciem bis observavi, & r. quidem in praedogmo nosocomii generalis viro quadragenario melancholico. Illi erat tritæophya simplex, seu alternis noctibus ita ubertim sudabat, ut novies indusia mutare cogeretur, diebus vacuis utcumque staret, in non erat omnino appyretus, sed debilis & diaphoresi humidus. Praemissi generatibus seu phlebotomia & cathartica sanatus fuit usu kinikine cum decocto sistorum chamæmeli, nec non granis aliquot cascariillae, quarta quoque hora; paroxysmi a levi frigore incipiebant.

*Sauvages Nosologia Methodica. Tom. I.*

Alter erat Rallet, qui vicilibus vestibus indutus erat tamen semina, ut post obitum deteximus. Illa summa debilitate, anxietate, & simul boulimia laborabat; singulis diebus paroxysmus accedebat a levi frigore, dein per octo horas sudabat: simili modo etiam ab hoc morbo evasit, vino etiam concessio.

*Riverius obs. 23. communis.* memorat febrem eodem qua, sudore per novem dies continuato nullis remediis cedente, aeger abreptus est; nec stragulorum refectione, nec ventilatione, nec cataplasmatibus potuit hic sudor immitti; utrum paroxysmos pateretur dubium est.

Idem Episcopum Agathensem tritæophya duplici laborantem vidit, qui etiam extra paroxysmos diffuebat sudoribus multis, ut vix per horam dimidiam dormire posset, quin mutanda essent indusia; urinae rubrae & crudae apparebant; hic morbus phlebotomia, dein cathartica & febrifuga intra 24. dies feliciter fuit terminatus, nisi quod recidivam passus est levem.

5. *Tritæophya elodes* Ill. D. Boyer Archiat. D. M. M. & Par. Méthode de traiter les maladies Epidémiques, Paris 1762. *Suette des Picards. A.*

Est febris inflammatoria quae 14. vel 21. die terminari consuevit, epidemica, non contagiosa, in qua ab initio morbi aegri sudoribus diffuunt; ex se aegris quinque evadunt si perire curentur, cum in ephemera sudatoria vix centesimus evaderet, & morbus ut plurimum intra 25. horas terminaretur. Haemorrhagia narium, eruptiones miliares ac purpureae in ephemera Anglica raro, in tritæophya elode frequenter accidunt; alii eruptiones miliares, quae in miliaria sudatoria ab initio morbi prorumpunt, in hac tritæophya, si mature ac ubertim sanguis mittatur, nec essentiales sunt, nec ab initio accedunt, ut in miliaria sudatoria.

Aegros noctu adoritur morbus, abrupto somno, cum althonia universali; evigilant cum sudore & calore maximis, caute & vultu flammis, oculis scintillantibus, lingua alba & arida, pulsu duro, tenso, turgido; accedit serpius paraphrosyne phrenitica circa 3. diem, cum febris paroxysmo, miliaris eruptionis universalis prodromo, vel quod pejus, cum maculis purpureis ita densis ut erysipelas universale referant.

Multo tardius, praeter has eruptiones, prodeunt & maculae purpureae, majoribus pulicum moribus similes, & phlyctenae albae, margaritis minutis similes, sero acri turgidae, quae *purpura alba* vulgo vocantur, quaeque collum, axillas, & truncum antice posticeque afficiunt, omnium eruptionum periculosissimae; istae vero maturis phlebotomiis saepe pervertebantur, maxime si dictam calidam vitassent aegri.

Datur hujus morbi varietas *humoralis* dicta; cu prior sit inflammatoria in humoralis pulsus molli, debilis, althonia major, spor frequenter, oculi languidi; lingua albidissima, non sicca; ver-

M

mum

mium proventus supervenit; cum in inflammatoria, phrenitica, pleuritica symptomata & hæmorrhagiæ frequentius superveniant in morbi statu.

*Curatio.* In specie inflammatoria, nedum sudores calidis, antidois, gravibus stragulis fovendi sunt, ut solent iussici; summus ille calor & sudor aere frigidissimo superveniente & phlebotomiis quantocius iteratis prima die reprimendus est; abstinendum a vino, cardiacis, tanquam a perniciosius venenis.

In humoralis rarius phlebotomia, eaque tantum una, potest adhiberi; est in utraque abaltera die vomitorium esse præscribendum, sed valde mitigatum, scilicet tartari sibiati gr. IV. in aquæ calidæ lib. ij, cum salis vegetabilis drachmis iij, dissolvantur: sumat omni quadrante horæ cyathum usque quo vomitus accedat, tunc tepida affatim propinetur; sequenti de mane & sero clysmata emollientia injiciantur; pitæna ex decocto radicum fragaræ, graminis canini & glycyrrhizæ offeratur, vel serum lactis affatim bibatur, vel apozema ex foliis cichorii, scolopendrii, borraginis, cui diebus a catharsis liberis gran. j tartari sibiati adderur; dein alternis diebus æger purgabitur ex infuso lennæ cum lenitivi uncia, & salis vegetabilis drachma j: in paroxysmis pitænae libra quævis recipiet nistri scrupulum vel oxymellis simplicis cochlearia duo.

In humoralis varietate, si lumbriçi adfuerint, apozematis herbæ amaræ, ut folia absinthii, Chamædryos, tanacetii, centaurei minoris, incoquantur; si sopor accedat, ad vesicatoria nucæ vel suris applicanda recurrendum, quæ in miliari sudatoria nocent; tartaro sibiati, ut pote summo vermitugo, sæpius accutur apozemata vel cathartica.

Si parotides supervenerint circa 15. vel 20. diem, quæ criticæ sunt, illæ, si duriusculæ sint, emolliendæ cataplasmate ex bulbo lili colli sub cineribus, & æquali tum theriacæ tum fermenti quantitate, addito diachilo & aceti pauillo; hoc cataplasma bis in die renovandum. Si post tres vel quatuor dies non suppuretur parotis, ea lapidibus causticis admotis est inurenda; eschara dein incisa pus promovebitur cataplasmate & unguento dealbæ & pulpa liliorum: suppuratione instituta balsamus Arcei admovebitur, & æger identidem purgabitur.

Juscula in vigore morbi fexta quavis hora offerantur, fenestræ sub ferebo cælo pateant identidem; suffusio ex bacis juniperi ex aceto infiltantur, mundities servetur.

Terminatur scilicet morbus squamulis cutis delabentibus; infelicitèr ascite, si in longum procedat.

6. *Tritaphya affadens* vide Lancisium de noxiis paludum effluviis lib. 2. cap. 3. Bailonii conf. 8. lib. 1. Huxham de aere lib. 1. pag. 97. A. P. Febris epidemica inexpectabili angore quodam intra 5. vel 6. dies perinens.

„Febres continuæ, vulgo malignæ pestilenciales

„les, raro singulis diebus pluriæ eaque periculosisimæ alternis diebus remittebant; præuldebat is rigor, quem magni æstus, inquietudo, membrorum jactationes, horrendæ lipothymizæ, sitis tommodica, lingue ariditas, deliria, tandemque agrypnia seu immanes vigilizæ excipiebant; vigilizæ tamen minoris erant periculi quam vertigines & soporosi affectus, quæ ad apoplexias vel convulsiones iter brevissime aperiebant.

In hac specie quæ a saburra & ab aquis canabæ macerata intestis oriebatur, phlebotomia vix profuit nisi in gravidis; ab initio lenis vomitio aut blanda catharsis profuerunt, & in incremento acida nitrosa, sed parce & caute usurpata utilia fuerunt: a diaphoreticis metallis in caput accelerabatur. In febre, cujus symptomata præciperat anxietas continua cum pervigilio, *Vassalva* invenit ventriculi fundum atro colore infectum; *Morgagni* *Epist.* XLIX. 14.

7. *Tritaphya cariosa* Boneti Sepulcr. pag. 210. *Tritaphya comatosa* live parapoplexia C. Pisonis pag. 74. *Febris epidemica urbeveta* Lancisii de nox. palud. *ess.* lib. 2. c. 3. *Tertiania letargica* Torti pag. 207. *Tertiania soporosa* V Verhoef. *Obs.* de febrib. pag. 17. *Febres malignæ avec assoupissement.* A. P.

Ea est species, vel singularis vel alternis diebus exacerbens vespere, quæ pro præcipuo symptomate affert soporem gravem, quem præcessit gravis cephalaugia, deinde delirium, & sequuntur quandoque convulsiones; lingua nigra est, sitis nulla ex quo tempore delirium accessit; in mortiferis accedunt subsultus tendinum, carphologia, aliaque gravia symptomata.

Ex tertianarum genere fuerunt omnes febres soporosz; quas enim *Galenus* quotidie recrudescentes comatosas observavit, forte fuerunt tritaphyæ duplices. Tempus quo sopor contingit, est dies vel quarta vel quinta seu tertio paroxysmo; pulsus aliis frequens, aliis rarus, tardissimus, in multis durus, & intermittens, sopor est ore hiant sine stertore initio, ægri immobiles, post paroxysmum soporis, tantum stupidi manent, delirantes, motibus anxii jactati, & sere latere dextro hemiplegici, assidue miduantes; Altero paroxysmo sopor profundior, & sæpe lethalis corripit. De febre illa soporosa *Morton.* *Pyretologia* *hist.* 25. 26. *Ramanazzinus* de tertianis malignis *Mutinesiensis* cum *aphenia* & *sejoro* pag. 228. *Sylvius* de febre epidemica *Lugdunensi*; Vide historiam, signa & curam exatam apud *Verhoef* & *Torti* in libris speciatim de hac febre conscriptis; cura vero potissimum a kinkina repetenda est. *Riccius* *obs.* 26. *contur.* 2. observavit hunc morbum quem hystericum suspicatus est; & laudano sanavit, seu prævertit paroxysmum. Laudanum prævertendis intermittentium accessibus est optimum; in hoc vero casu pertimescendum. Vide *Carrum* *fabrilium*.

8. *Tritaphya laissa* febri laissa *Ettmuller.* *Colleg.* *cal.* 25. pag. 612. A. A.

Saturni die, a partu nono, mulier corripitur

media nocte æstu intenso cum siti, cephalalgia & anxietate; mamma immensus turgens, erigens, dolens, induratur; apparente aurora, symptomata per leudem sudorem evanescent, superflite mammarum tumore, impotentia & debilitate. Die salis pomeridie, nec non die martia, & jovis ipsa meridie rigor & æstus reliquaque symptomata cedunt cum eodem fervore; mamma, quæ hac in intervallo fuderant, iterum intumescit, & toties paroxysmus horas duodecim perseverabat. Cum adesset in intervallo virum prostratus notabilis, verosimile est hanc febrem non fuisse intermittentem, sed remittentem, adeoque tritæophyæ. Curatio fusæ & distincte tradita videatur loco citato.

9. *Tritæophya leipyria* Galeni, Gorræi Desini; *Leipyria* Aetii lib. 3, cap. 39. *Febris leipyria* Forrelli Libi. 2. Obs. 36. *fièvre leipryenne* A. P.

Est varietas tritæophyæ causæ seu ardentis, in qua extrema frigit, dum calor interiora occupat. Summus hic calor internus ex ægri relatu, ea sit horrenda, linguæ quandoque licitate, analectatibus, cognoscitur; non solum extrema frigent, sed tota cutis exanguis, frigida, cadaverosa videtur, exceptis axillis, & præcordiis, quæ calent; add. peraccidens dolores pleuriticos, & ventris, ut in casu *Ferafi*. De cetero excretiones omnes deficiunt, pulsus est caulis, & fere deficiens, & æger intra triduum quandoque perimitur.

*Leipyria Avicanna lib. 2, cap. 31. taburus* Arabibus dicta, videtur hemitritæos spurius, diversa omnino a leipyria Græcorum.

Inter malignas ratione vehementissimæ inflammationis ventriculi memoratur leipyria febris. In illa lingua arida est, ingens sitis, pulsus celer, inæqualis, & parvus, ac vix perceptibilis; homines sunt amarulenti, mæsti, fatidico & contumacia insolentissimi, anxietudine miserabiles, omnis figuræ & loci impatientissimi, somni capertes, cum voce in faucibus elisa; nonnunquam labrum inferius cietur, unaque manibus contremiscunt. Incuratur bilis acerrima in hepate retenta, erysipelas ventriculi. *Hippocrates & Hallerius* consent eam non solvi nisi per diarrhæam biliosam, sed vix possibile est propter summam viscerum inflammationem hanc diarrhæam cathartica excitare.

*Baglivi* suadet, ut loco purgantis curatio inchoetur a clysmatis emollientibus quotidie injiciendis, fomentis emollientibus bis in die ventri adhibitis, & fero lactis tamarindato, vel cocto cum duabus uncias fonschi singulo mane usurpando; per diem vero gelatinam cornu cervi cum aqua violarum & cardui, & post septimum diem tantummodo ad cathartica lenia deveniendum.

Vidi ego sæpius & hemitritæos inflammatorios *Spigelii*, & cephalalgicos, nec non tritæophyas dilentericas, pleuriticæ, verminosæ &c. verum tanta est Auditorum obscuritas & confusio, ut ad species cognitæ eas amandare non valeam, vel non ausu Medicorum vulgo omnia

ea suscipere habenti contradicere. Interea me felicem exillimarem, si cuiusvis speciei morbi, qui mihi tractandus occurrit, alicubi fidam historiam reperire daretur, & omnes Medici in hoc curte mecum consentirent, diffidenties tamen in eo quod omnes morbos individuos esse dissimiles omnino contendunt, & quod ab animis biliteria ad cognitionem alterius nulla detur consequentia. Fateor equidem non tot esse species quot sunt symptomata inconstantia, diversaque, quibus quandoque stipantur, ob errorem ægri, vel Medici supervenientia; verum plures morbos individuos ratione ordinis, typi, exitus & symptomatum constantium sibi similes esse in quovis genere non dubito, adeoque eorum species describi inter magna artis medicæ desiderata reponam.

10. *Tritæophya dæcepiva, subcontinua malignans*; Torti p. 209. ad 239. Sydenham de morb. epidem. pag. 24. & epit. 1. pag. 191. A. P.

Est intermittens tertiana duplex vel simplex, quæ ante aurumnum, seu ætate adoriens sub remittentis facie aliquandiu ludit & decipit. Illæ, ait Sydenham, non statim genuinum typum induunt; sed continuas febres ita per omnia imitantur, ut usi caligatissimo utrasque examine trutinaveris, ab invicem discerni non possint; ac retuso constitutionis impetu, & frenata vi, jam in typum regnalem migrant, æque exeunte aurumno, larva abjecta, intermittentes se esse quales ab initio ceaspe fuerunt palam fateatur, five tertianæ five quartanæ, quod si diligenter non animadvertimus, cum magno ægrorum nostrorum malo medicantes alucinamur, dum intermittentes pro continuis veris & genuinis habemus.

In hac specie ad kinkinam confugiendum est, modo continuus læsi calor & cardiacorum usus huic animum non dederint, in quo casu inutilis est kinkinæ usus. Vinum autem cum kinkina datum minime nocet. Torti hac de observationes legi merentur p. 243. & alibi. Cognoscitur hæc species 1. ex eo quod in frigore paroxysmi æger ceaspe caleat ad tactum Medici; 2. quod paroxysmus secundæ diei est mitior paroxysmo primæ; 3. quod vel subito vel gradatim intermissio obiteretur, seu apyrexia dubia evadat inter paroxysmos, quo tempore superest calor inordinatus, sitis, linguæ siccitas; 4. urina parca & rubra vel crocea; 5. angina aphthosa; 6. grave quodcumque symptoma superveniens, excepto leve delirio.

11. *Tritæophya typhodes* Mangetti; *fièvre nerveuse remittente* a *fever of spirits* Quincy Essay. 2. of fevers, p. 320. A. P.

Hæc species differt a typho per exacerbationes, ab aliis tritæophyis ex eo quod sit chronica cum pulsu vix frequenti, immo quandoque tardo, æger a prima invasione pallidus, debilis, somnolentus est, pulsus parvus, brevis, calor nativo minor, exigua aut nulla sitis. Remittunt, Immo initio intermittunt hæc sym-

ptomata per aliquot horas; atque vigere ac reviviscere videtur æger; verum denique cum rigore aliquo aut spasmo cutaneo intermittentem febrem sere mentiente revertuntur; & post aliquot similes lusus æger lecto assiguitur, stupidus evadit, periculum suum non curat, nec circumstantias sentit, manibus obvia sine ratione palpat, contrectat; lingua balbutit, vel obmutescit; semivivus videtur, exceptis quibusdam intercurrentibus spasmodis potissimum stomachi, ensis insulsi, & si his malis resistat, non convalescent, sed exhumati mori. Versus hanc papulæ quandoque efflorescunt, vel floridæ, quod melius, vel lividæ quod pejus, diarrhoea accedit, fæces sunt nigrae, foetidae, urinae similes. Sensus obscurantur, vitus vix luce afficitur, auditus obtusissimus est, quod ultimum symptoma salutare est ac præcedit fluxum ex auribus criticum; interea sunt qui sine crisi sensum restituuntur post menses duos vel tres, sed raro vim mentis & sensuum aciem recuperant nisi post longum tempus.

Occasiones huius morbi sunt, morbi potissimum evacuatorii prægressi, victus paucior, vita laboriosior, veneris abusus, sollicitudines, debilitas senilis; epidemica constitutio, humida, iners seu inelectric.

Curatio eadem ac typhi nervosi, Muxhamii; scilicet phlebotomia, & cathartica omnino fugienda sunt, cum virium restorationi potissimum invigilandum sit; hoc præstat vinum, cardiaca volatilia, amba grisea; & potissimum ut pulsus vigor redeat, stupor discutiatur, humiditas superficialis eliminetur, nihil est præstantius emplastris vesicatoriis; diæta vero medicis esto, nec enim solis iusculis saltem senes sustentare sufficit.

12. *Tritætophya Americana*, Desperieres Journal de Med. Oct. 1762, *Fievre de S. Domingue*. A.

Ea est ardens febris quæ Europæos recens in Americam advenientes corripere consuevit, & horum dimidiam partem sæpius eripit; huius duæ sunt varietates, una peracuta, altera acuta.

(a) *Peracuta* ante septimum diem definit; incipit paucis ab adventu diebus, post anorexiæ, dyspnœæ, suspiriosæ, ab æsthenia, cephalalgia, lassitudine, lumbagine; pyrexia accedit cum polydipsia, ephidrosi, ardore; crescit ægritudo; accedit nausea, vomitio biliosa; porracea, lingua aspera, brunnea; exoritur sæpe frigus; pervigilium, paraphrosyne, sætor, mors sæpe tertia die; sudores copiosi, hæmorrhagia narium, sed copiosa, quinto die, non citius, superveniens utilis; diarrhoea biliosa est crisis omnium optima.

Prævertitur morbus ut plurimum si Europæus, antequam proficiatur, sibi venam cuncti sagæ & purgetur; si durante itinere os oxycrato colluat, parce se nutriat, utatur acidis, ut clemente tartari, limonibus, aceto; si aere libero & moderato exercitio utatur; Americam appellans venerem, potus spirituosos, insola-

tionem fugiat, balneis frigidis utatur. Curatur febris una aut altera phlebotomia, nec obitare debet sudor aut vomitus, ablineat tamen si diarrhoea biliosa accesserit, caveat ab emeticis, catharticis, narcoticis, sudoriferis, utatur cremoribus, quæ pulli nitrata, limonata, clysmatis emollientibus, somentis & levi sui finem cathartico.

(b) *Tritætophya Americana acuta*, sæpius nona, rarius ultra decimam quintam diem terminatur, a quarta ad septimam mors sæpius accidit: incipit œcephalalgia, lumbagine, quandoque horrore; lassitudo magna, dyspnœa, sitis, pyrexia ardens tertia die exacerbat, meteorismus, gastrodyniam ad xiphoidiam cartilagineam, nausea, vomitio biliosa, status morbi intra 24. horas: oculi rubri, lacrymosi, urinae pellucidæ, paraphrosyne obscura, anxietas continua, lingua sicca, rubra, raro nigra quod pejus; pulsus antea fortis, plenus, quarta die minuitur, tensus, spasmodicus evadit; si cras tunc accedit, æger quinta vel sexta die moritur, si vero pulsus vigeat nec cras accedat, crisis quarta die expedita per sudorem, hæmorrhagiam narium copiosam, & tunc per diarrhoeam biliosam, quæ nunquam salubris, si ante quintam diem accedat.

Curatur phlebotomia brachio repetita, potu diluente, & catharticis opportune præfcriptis; phlebotomia intra primos duos dies quinque sexiesve repetatur, neglecto sudore & vomitu; evadendum ab emeticis & sudorificis; æger pro cibo utatur aqua pulli emulsionata, cum nicti gran. ss. camphoræ gran. ij., quæ quater in die potui addantur, dein expectetur crisis. Pyrexia vero recedente æger leniter purgeor ex sale Epsamensi in decocto kinkina: si cras accedat, quod pulsus convulsivus præfigit, duo ampla vesicatoria suris applicentur, sed mature, secus ad cardiaca deveniendum.

## VIII. TETARTOPHYA, quartæ continuæ.

Genus est febris remittentis, cuius paroxysmi similes sibi mutuo quarta quavis die respondent, seu quartanæ typum imitantur.

Rarissimum est febris genus, quæ producit a causis synochi, & quartanæ conjunctis & ut plurimum lethalis est.

1. *Tetartophya simplex* Francisc. Joel. Oper. med. Tom. 3. C. P.

Ea est quæ nullius visceris speciatim signa præbet. Huic calor obtusus, sed acer, pulsus parvus & tardus initio paroxysmi, dein plenior, velocior quam in quartana, expulso irequens, temperamentum melancholicum; extenditur ad sex septimanas, nisi æstiva sit. Paroxysmi sunt typici citra frigus & sudorem; curatur aperientibus, incidentiis, antiscorbuticis, præmissis generalibus.

2. *Tetartophya splenalgica*; vide Plantii vitam Fernelii. *Febris Ferneliana* Raim. Fortis, quod ea mortuus est Fernelius. C. P.



Differt a precedenti quod lienis obstructione stipetur.

3. *Tetartophya Hepatalgia* Carol. Pisonis C. P. Pendet ab scirrho aut suppuracione hepatis.  
4. *Tetartophya carotica*, VVerlhof. obs. de febrib. pag. 17. A. P.

*Erept. lib. 3. obs. 36. Bianchi hist. pag. 731.* tetartophiam comatosam observarunt, & ego anno 1737. in nosocomio Alesiensis catalepticam in senec militie. *Sebelhamm de natura pag. 275.* *Stahlus* somnolentiam in quartana paroxysmis innoxiam neque cohibendam esse uocat *problema de febrium theoria*. Vid. *Carum febrilem*.

5. *Tetartophya semitertiana* Hemitritana major Schenckii obs. 12. lib. 3. schol. p. 140. A. P.

Illa est species quartana continuæ quæ tertianam interpositam habet, symptomata severissima inducit, rarius evenit & fere semper lethalis est. *Schenckius* & præceptor ejus *Benedictus*.

7. *Tetartophya maligna*. *Quartana* Marcelli Donati lib. 3. c. 14. lib. 7. cap. 6. *Horsii* lib. 1. observ. 12. A. P.

*Comatosam* observavit *Carol. Piso de morbis a colliculis ferosa*, obs. 166. Ea hepatalgiam duxit & intra quartum mensem ægrum consecit. Pulsus initio paroxysmi parvus & admodum rarus, ut quandoque plures horas penitus lateret; aderat cõma grave nisi quando delirius interturbaretur; paroxysmus ad horas quindecim extendebatur. Vide etiam ejus *observat.* 169. 170. 172. legatur *Torti de febre lethargica a pag. 207. ad 219.*

## ORDO TERTIUS.

### FEBRES INTERMITTENTES,

Græcis *pyrexia dialytica* Gall. *accès de fièvre* Anglicis *The agues*.

**P**yrexia, Latini *fabricatio*, dicitur tempus hujus ægritudinis quo febris viget, id est, in quo frequentior est pulsus, vel notabilis saltem virium prostratio, in hoc ordine *accessus*, in priori *paroxysmus* dicitur, sed propria pyrexia calorem æstivæ febrilem significat.

*Agrexia*, Latini *quies*, *infabricatio*, *intervallum lucidum*, est tempus quo febris omnino deficit, & inter utrumque accessum vocatur *intermissio*: differt a *remissione* ex totali & plena febris absentiâ, cum in remissione sit tantum febris imminutio, non interlocutio.

*Typus* est ordo accessionum aut paroxysmorum: ut typus quotidianus, tertianus, quartanus, cum se quotidie, tertia quavis die; &c. consequuntur accessus vel paroxysmi. Typus in quartana est maxime regularis seu facie detestabilis, minus in tertianis, aut non ita in remittentibus, quæ multo minus typica sunt.

Ex typo repetuntur characteres generici intermittentiæ est remittentiæ, ita tamen ut data species referatur ad genus ejus typum illa proximitas imitatur.

*Sanctus Nosologia Methodica*, Tom. I.

Febris intermittentes sunt illæ, quæ per intervalla semimenses minora pluries accedunt & recedunt, plena inter utrumque accessum apyrexia.

Sæpius remittentes cum intermittentibus confunduntur, quando malignæ sunt; quia in intervallis paroxysmorum pulsus non modo sano similis est, sed etiam quandoque rarior, ut in hemitritæis, tritæophyis, epialis, aliisque; verum non ex sola pulsus frequentia debet estimari febris, cum in typho, utcumque gravissimo morbo, pulsus sit vel sano similis, vel rarior, utcumque magna febris sit.

Pyrexia seu accessus duplici sæpissime tempore absolvitur, scilicet tempore *frigoris* seu horroris, & tempore *æstus* seu caloris, atque ut plurimum *sudore* terminatur; *intermissio* est tempus quod inter sudorem ultimi accessus, & horrorem proxime sequentis intercedit.

Nullas admittimus intermittentes malignas, quia quæ intermittentes videntur & malignæ sunt, nullum lucidum intervallum habent in quo vis pulsus respectu ad vires artuum sit ut in sanitate, seu in quo pulsus sano similis sit quoad frequentiam, si non sit artuum prostratio seu debilitas multo major quam in verè intermittentiæ intervallis. Malignas itaque intermittentiæ facile indentes ad amphimeras, tritæophyas, vel tetartophyas amandamus.

*Malignitas* in morbis est summa nocendi facultas a principiis physicis, minime vero mechanicis, dependens; sumitur etiam pro materie maligna, deleteria, venenata, seu quæ sub exigua mole magnas & noxias motiones inducere valet in œconomia animali per vires suas physicas sæpius obscurissimas.

*Illust. Chirac & Sylva* omnem in febribus malignitatem rejecerunt, & quæ vulgo miasmatis venenatis tribuuntur phænomena, ea ingeniosissime ex corticalium cerebri vasorum obstructione, & impedita proinde fluidi nervi secretione deduxerunt; verum licet ea theoria mechanica optima sit, & in morbis cerebri inflammationis & soporis apprise locum inveniant, non minus certum est quod a corporum putredorâ, venenatorum, mephitidum ægotantium contagis, effluviis, seu miasmatis in corpus humanum immixtis, aut in eo generis, multæ, & quæ lethiferæ mutationes inducantur, ex principiis mechanicis minime intelligibiles, ut videmus in epidemicis, castrænsibus, pestilentialibus morbis, potissimum in amphimeris & tritæophyis.

Fortè illa miasmata vim electricam fluidi nervi distrunt, ut eam a mephiticis & carbonum fumo extingui notum est, unde virium lapsus substantens; forte etiam illa miasmata vi arsenicali nervas fibras irritant; & crethismos funestos excitant. Quis aconiti, cantharidum, ovorum lucii vim deleteriam ex principiis mechanicis explicavit? quis opii vim narcoticam.

In febribus duo sunt principia; quæ moti vehementiam constituunt, vis scilicet naturæ, quæ, quo major est, eo majorem æstum febrilem concitat, ex pulsus frequentia & magnitudine æstimandam; & vis malignitatis materiæ morbificæ, quæ ex artuum & pulsus debilitate, conatus anomaliam, turbæ, & præcipiti ac inconstanti serie iudicatur; scilicet ex cardiægiis, syncope, deliriis, convulsionibus, sopore, &c.

Ex eo quod malignitatem adnotamus, minime concludendum est materiem deleteriam cardiægiis, alexiteriis, bezoardiis esse semper, & sine summis cautelis evitandam, quæ certe consequentia; ut advertit *Sydenham*; plus nocet humano generi, quam pulveris inventio; sed sequitur eam esse vel corrigendam, vel eliminandam, prout alterutrum permiserint circumstantiæ, & suaserit rerum magistra experientia.

In plurimis morbis est materies morbifica, adeoque noxia; non idem omnes maligni dicendi sunt, sed id tantum in quibus symptomata venenatæ materiæ, & triumphatæ, aut turbatæ naturæ tribuenda prædominium tenent, ut in typho, pluribusque remittentibus. Intermitteutes, ait *Hippocrates*, periculo carent; id est, si comparantur cum remittentibus & multis continuis, multum abest quin adeo periculose sint; cum enim natura ab omni molimine cesset in intervallis, nec oppressa sit, sed minime libet, ut patet ex animæ & corporis functionibus restitutis, nullum interea grave damnum immineere consequens est, seu minus est timendum damnum ab hujus materiæ noxiâ, quam quod ex continuo naturæ conatu exsurgeret.

Natura in regime aëtionum omnium vitalium, & a libertate non pendendum, alteroam labori quietem sedatur, & periodice labores suos exsequitur; patet ex pulsû cordis qui singulis secundis, ex motu respirationis qui vigetis in minuto, ex sæcæ expulsiõe, ex somno qui semel in nycthemero, ex missione quæ his vel ter, ex seminis ejec-tione, ex catemeniorum expulsiõe, &c. quæ periodica naturæ molimina evidenter ostendunt. Quid itaque mirum sit, ubi materies morbifica latet in vasibus sanguiferis, morulis interpositis vires suas resciat natura medicatrix.

Omnes theoretici hoc sibi muneri imponunt, ut mechanice explicent diversis periodicis morborum insultus; aut prius inquiritur an omnes pacatæ artificum omnium aëctiones sint periodice; aut sutores, lapidæ, fabri ferrarii, aratores, remiges, cum nullo periculo turbantur, suis manuum, pedum, trunci moris alternis, periodis brevioribus, vel longioribus absolvant, datis intervallis cibum, somnum capeffant, & eodem modo quo harum aëtionum periodos explicaverint, naturales fieri intelligunt; nam eodem modo agimus, sive inscii, sive conscii, cum potentia motrix a facultate percipiente diversa sit.

Curatio intermitteutium alia est *palliativa*, quæ naturæ conatus tollit, suspendit, alia vero *radicalis*;

quæ materiem morbificam, quæ illi determinatur conatus febriles, auferit, vel corrigit; ista tutior est, altera vero sola raro est adhibenda, nisi radicalis præcesserit. Interea tamen si urgeat necessitas, palliativa cura adhibenda est prior, quod præstant narcotica kinkinnæ mixta.

Curatio radicalis diversa est, prout diversa est materies morbifica, & principium intermitteutis procata radicum, ac progumenum; ab animi pathemate, ut vehementi epidætie, terrore, &c. sine ullo alio in corpore vicio, quandoque excitati intermitteutes doctæ observatio, in illis vel quies animi somno, tempore concilianda sufficit, vel alterum pathema excitare sæpe satis est; ut apud rusticus sobrios succedere videmus, & ut in singulis hæmorrhagiæ levi sæpe sufficit. Verum si frigore concitatus fuerit accessus, quoniam æstus febrilis subsequens resolvit sanguinem a frigore inspissatum, & perspirabile retentum, fudor expellit, natura sola huic morbo medetur.

Cum vero sunt materies morbificæ peregrinæ in corpore, illæ vel primas vias solum notabiliter, vel & etiam secundas, tertiasque infestant, a quæ in hoc casu, ars medica naturæ suppetias ferre debet. Itaque si primas vias prævi succi inficiant, quod ex nausea, linguæ lorditie, anhelitus sæore, præcordiorum pondere, anorexia & prægressis cognosci potest, primæ viæ emeticis, catharticis, clystmatibus, potu diluente, & abstinencia tibi evacuantur; quod præmissa phlebotomia apud juvenes & plerhoricos feliciter succedit: plurimæ sunt intermitteutes, potissimum tertianæ, quæ hæc insula methodo feliciter tolluntur: biliosæ præterea refrigerantibus, acidis, acriminiam alkalescentem corrigentibus, ut limonatis, emulsionibus apud picrocholos, ardentes, æstæ præsertim optime sanantur, quidquid Sylviani ougerant, quod acida omnia sanguini coagulando, & intermittenti excitandæ apta continentur.

Si vern in vasibus sanguiferis prævalvatur error æstuosus, fallus, viscidus, biliosus, quoncumque modo naturæ infestus; licet ex eo principio solo non raro continuæ febres suscitentur, tunc continuarum remedia, & uberioris phlebotomiæ, & diætæ severior convenient, præter remedia his vitis sanguinis corrigendis apta.

Intermitteutes vero chronicæ fovendi videntur a materiæ morbificæ, non ita facile putrescibili, viscidioris, & simul viæ acri, quæ in ultimis arteriarum, venarumque reticulis nidulatur, ubi valde est retardata sanguinis circulatio, & ex paulo majori retardatione non nisi post longum tempus impendit aliquale vitæ periculum.

Simile quidem vitium in omnibus etiam acutis intermitteutibus agnosco, sed vel multo levius, vel gravioribus vitis combinatum, ut in remittentibus. Ex his autem sæpe patet eas ab spasmodica membranarum & cutis potissimum strictura febris conatus ordiatur; cum enim in illis ultimis membranarum & viscerum vasculis, vis tridua exigua sit, nec possit mul-



tum intendi, quin præcesserit hujus resolutio, & acerrimus, necessum videtur ut hac spasmodica constrictione materies morbosæ attenuetur, prematur, & in vasa continua exprimitur, adeoque prælo cordis & arteriarum oblata majori energia subigi, & liquefieri possit: non potest autem illa strictura excitari sine summorum impendio, fluido scilicet nervo-ubercim in omnes membranas, musculosque cutaneos immisso, vires cordis hoc defraudati minuantur necesse est: hinc pulsus exilis, quandoque torbidas, in frigore febrili dum convulsæ conquantur partes externæ, & sanguis a peripheria corporis ad venas, & inde ad cor exprimitur: ab spasmodica membrarum constrictione frigori oriri quædam sensum ægri multis experimentis confirmatur; calculi biliari per canalem cholechocum transiunt, catheteris in vesicam immisso, ultima urinæ urethram in dysuria velli- cantis guttula, sæpe frigus intensum excitant, licet partes quas æger frigidus percipit adstantibus nativum calorem servasse videantur, quod in epiale paroxysmi vidi.

Verosimile autem est longa mora sanguinis ferofi, vappid, effecti in his vasis ultimis, potissimum apud cæchædicos, oppilatis vrgines, obstruatis, aquis luteolentis utentes, &c. elatissimi horumque minimorum vasorum imminui. Hinc sequitur principium progredientum febris illis suppeditari quod natura viribus & conatus febrilibus non potest eradicari, atque in hoc casu Medicus duplei potissimum modo has intermittentes debellat.

Primo etenim præmilis generalibus tonum hinc vasis reddere conatur per martialia, amara, stomatica, adstringentia vi prædita, quod præstant kinkina, cascarilla, nuges gallarum, gentiana, centaurium minus, aquæ thermæles, ferruginea, &c. Secundo vero vitium quoddam fluidi illis stagnantibus inhaerens corrigunt iisdem medicaminibus, siue illud vitium sit simplex, ut visciditas, crassities, quod bene multi cogitant; siue sit combinatum ex quadam tendentia ad putredinem atque remota, unde forte sic quod optima antiseptica, ut chamæmelum, kinkina sunt febrifuga, ut utem febrifuga, alia antiseptica salina, velut cremor tartari, sal ammoniac addantur.

Phlebotomia in æstu febrili potissimum, & cathartica immediato post accessum, tutius collocantur, usus vero kinkina in intermissionis spatio locum habet. Diæta eo severior sit, quo accessus longiores & frequentiores simul, quoque recens magis morbus, viresque ægri vegetiores quotidianæ & tertiana duplex diætam febrium acutarum expostulant, saltem primis diebus. Terciana simplex & a fortiori quartana diætam medicorem exigunt, & post aliquot ab invasione dies ciborum solidiorum, vinique usum respuunt, æst accessus tempore vacuus debet esse stomachus, ne naturæ digestionis & febris simul opere defatigetur.

Semina pastinacæ ad drachmam; testæ ovorum calcinatæ & pulveratæ ad semi-drachmam; bis,

vel ter in die, ut expertus sum, febres fugant.

*Recipe: salis polycresti, scrupul. duos & salis ammoniaci & scrupul. i. m. sumas bis, vel ter in die, superbibendo infusum vel chamæmeli forum, vel centaurii minoris, vel trifolii fibrini, vel sumæ confusæ nasturtii aquatici, aut alterius antiscorbaticæ plantæ unc. quantor.*

Hæc sunt febrifuga Vindobonæ usitata.

IX. QUOTIDIANA, Græcis *Cathemerina* pyretos, *Petura quotidiana*. Nomen adjectivum quotidianæ ineptum est; multo rectius *Cathemerina* vocari deberet hæc febris, ut tertiana *Tritana*.

Est genus intermittens febris, cujus accessus similes singulis diebus revertuntur.

Differt a tertiana duplici in quo pariter quotidianæ accessus alternis, non vero singulis diebus sibi mutuo respondent.

Quotidiana rara est; & multo frequentior est duplex tertiana.

Quotidiana subintrans, seu cuius accessus ad viginti quatuor horas ferme extenduntur, jam pro intermittenti haberi non potest, & amphimeria censenda est; quæ vero duplicata est, ita ut singulis diebus duo accessus dentur, fore ad remittentes pertinet, cum non sensibiliter accessus decur apyrexia; a fortiori triplex, quam *Primorossii* recenset, & quas quartanis, tertianisve complicari contendit. Galenicæ a pituita hoc genus pendere arbitrati hujus historiam ex sua hypothesis concinnabant.

*Quotidiana simplex. Quotidiana legitima Brendelii, Sennerti, cap. 13. de febr. P.*

Est pueris, debilibusque subjeçtis familiaris est, verno potissimum tempore. Primæ accessiones, ut plurimum horis matutinis, quibus æger sentare assueverat, revertuntur; horror & calor mediocres sunt; duratio accessus octodecim horas non excedit; duratio morbi ante kinkina inventum ad menses plures extendebatur.

Differt ab amphimeria catarrhali per integram apyrexiam, & ex eo quod mæne, non vespere, ut in catarrhali, accessus aggrediantur, quodque corporæ & tussis immunit sit. Veras & plures luitio veris anni 1750 observavit in pueris *Brendelii*. Vidi & ego quædam; adeoque non audiendi sunt, qui Quotidianæ existentiam negant.

*Quotidiana atropiva. Febris subintrans Torti pag. 199. Febris subintrans Audoum.*

Est vera amphimeria putrida, quæ aliquandiu ægram & Medicum deludat sub quotidiana larva, ut monuit *Sydenham*, & sæpius observatur. Illa nec horas matutinas sororat, & lastudino, necnon liuque fordide sese prodit, dum æger se frigere asserit, is non raro solito calidior a Medico deprehenditur; intermissio & typus observatur; maximi momenti est ab illa non decipi, sed eam per eadem medicamina im-

pugnare, quibus synochus & amphimeria impugnantur, & a kinkina diu abstinere, sed phlebotomis & cathartici iteratis potissimum uti. Vide *Tertianam spuriam Sydnhami*.

3. *Quotidiana hysterica* Benjam. Scharffii Miscell. Cor. P.

Vidi ipse pluries hanc speciem in hystericis mulieribus, quæ quotidie hinc vespertinis, non nocturnis, levi refrigeratione cum oscidine & pandiculatione aggrediebatur, subsequente leni calore, nulloque, aut vix notabili sudore. Pulsus in hac stridus, urinae copiosæ, limpida.

4. *Quotidiana epileptica*, Essais d'Edimbourg, Tom. VI. art. 49. pag. 138. P.

Ea est quæ quolibet accessu paroxysmum epilepsiae accersit. Joannes Rhenish a sex mensibus intermittenti laborans, post grave infomnium in quo serpentem accedentem sibi videre visus erat, incidit singulis diebus in paroxysmo epilepsiae eadem hora accedentem, quia febris antea cum invadere solita erat; quilibet epilepsiae accessus incipit a pedum convulsione, quæ ad solum pedibus percutiendum cogit. His convulsionibus sensim ad caput delatis illico loquelæ usu orbatu æger; sed ululatus horrendos edit, ventre & pectore alternatim mirum in modum dilatatis & contrictis.

Durante hoc accessu pulsus elatior & frequentior, facies inflammata, oculi exorbitantes; finito paroxysmo dolor in interaneis, lingua humida, urinae suppressæ.

Curatio & sanationem, vide *lococitato*.

5. *Quotidiana ischiadica*, Essais d'Edimbourg, Tom. VI. pag. 143. P.

Puerpera dolores in ischio experiebat, intermittentibus dudum obnoxia; palindefæ regionis incola, singulis diebus paroxysmum hujus doloris circa vultum externum mulculum eadem hora patiebat, cum magno æstus febrili in sudorem terminando, quo peracto bene se habebat ad omnes functiones expedita.

Curatio. Sumpto emetico & cathartici kinkinam adhibuit, addito elixirio vietrioli cum antispasmodicis; demum admotæ parti afflatae amplo vesicatorio convaleuit.

6. *Quotidiana cephalalgica* M. Donati lib. 5. p. Differt a cephalalgia febrili per signa febris conspicua, ut rigorem & calorem quotidie revertentes, eodem tamen modo curanda. Vide *Mortem de Febre hemimerania simulant*. c. 9.

7. *Quotidiana nephralgica* Morton. Pyretol. cap. 9. histor. 28. A. P.

Ea est quæ quotidie paroxysmum nephralgiæ inducit, cujus curam vide apud *Austrorem citatum*.

8. *Quotidiana sepiosa* Mocha, consil. 48. fol. 71. an Morton. Pyretol. cap. 9. histor. 26. an Tertianæ carotica duplex? A. P.

Bis observavit Carol. Piso; singulis diebus a meridie accessus invadebat cum gravi veterino, urina utrique ægro vitrum solum ferebat, obs. 174. de morbis a colluvie ferosa.

9. *Quotidiana catarrhalis* Trincavelli lib. 3. consil. 28. 21. Zecchi consil. 20.

Incipit quolibet vespere a refrigeratione, ast inquirendum sit maneat integritas, seu appressa?

200. *Quotidiana partialis* Cnoffellii, Collect. Academicæ. tom. 3. pag. 166. P.

Ea est quæ unam tantum corporis partem afficit.

Martinus Genger Mariemburgensis singulis diebus per septem septimanas frigatebatur toto brachio hora septima vespertina, hora octava huic frigori addebatur tremor manus & digitorum, post triduum calor succedebat, & brachium calore urenti flagrabat, residuum corpore bene se habente, exceptio quod præludebat vomito & dolores ad hypochondrium, & mammam ejusdem lateris.

Hæc febris sana est solitis remediis. Vide *Acad. Nat. Cur. ann. 1673. obs. 205*.

11. *Quotidiana strangulosa* Hug. Gouraigues D. M. M. P.

Is observavit febrem in qua quilibet accessus quotidianus afferebat urinae suppressionem cum inani fere mœjendi conatu; elapso accessu, urina libere profluebat; laxantia emollientia præmissis generalibus profuere.

**X. TERTIANA**, Græcis *Τριησις*; *Billia* Galenicis; *Intermittens* *Pilura tertia*; *Egri Tertianarii*.

Est illud genus intermittētis febris, cujus accessus similes æternis diebus sibi mutuo respondent, vel est series accessuum, quorum qui similes sunt, illi tertia quaque die circiter repetunt.

Distinguitur tertiana duplex a quotidiana, quod tertianæ accessus non singulis, sed æternis diebus quoad horam, modumque invasionis sibi respondeant; a quartana triplici; quod in quartana accessus diei Lunæ similis sit accessui diei Jovis, diei Dominicæ, & sic deinceps: præterea tertiana multo frequentius occurrit quam quotidiana.

Urinae lateritiæ sunt optimum intermittētium latentium signum.

1. *Tertiana legitima* Sennert. de febris. cap. 17. lib. 2. Nenter. tab. 133. P.

Ea dicitur, cujus accessus ultra duodecim horas non extenditur, invadit inter horam matutinam nonam & undecimam, quotidiana vero citra septimam; hemitritæus a *Celso* vocatur.

Ætiæ & verna tempestate frequentior est, spuria vero autumnali. Frigus est in tertiana intensum cum tremore & trismo, strepitusque dentium, quod sequitur calor multus acer & mordax, unde frequens respiratio, frigidi potus sitis, vigilie, cephalalgia, & quandoque delirium: urinae sunt saburrae, & post accessum intensius citrinæ; hæc febres subjeclis juvenibus, biliosis temperamenti, exercitatis frequentius accidunt; septem circuitibus ex *Hippocrate* terminantur, si naturæ commisit fuerint; *Sydenham* vero existimat summam omnium accessuum quatuordecim dies adæquare, si autumnales fuerint; sæpe horror semi-horam transgreditur, & vomitione stipatur, accessus a 6. horis ad 24. extendi solet; declinatio accessus sudorem accersit; declinatio vero morbi sæpe diarrhæam.

Curatio. *Æges* per aliquot dies solis jussulis & aqua

aqua panata refectur; phlebotomia, nisi æger sit senex, infans, vel convalescens, instituitur, immo pro necessitate repetatur in accessu; sequenti die post accessum purgatio communis usurpetur; quæ interposito altero accessu repetatur: cum vero febris per naturæ conatus & digitam paululum attrita, seu contemperata fuerit, tunc ad corticem peruvianum quarta quavis hora extra accessum ad drachmam unam in substantia sumat æger, & in hoc perseverare noctu & interdiu, usquequo febris desierit, tunc per septem dies bis tantum in die, aliis vero frequentibus diebus prem, semel alternis diebus usurpetur kinkina.

Varietates hujus febris a *Bullosio de Ramazzini* observatae sunt; quotidiana *gossica*; & quotidiana *venosa*. *Gastricas* vocat *Ballonius* lib. 2. *Epidem. an.* 1773. quæ a saburra primarum viarum foveatur, quod ex linguae sorditie, fectore oris, aliisque signis cognoscet, & ille repetitis catharticis curari debent; non phlebotomiis. *Venosa* sunt juxta illum quæ generis venosi phlogosum sequuntur, quod ex signis plethoræ commotæ dilinguitur; illas phlebotomia sanat.

2. *Tertiana spuria* Sennert. lib. 2. cap. 17. Nenter. Tab. 133. cap. 23. *Tertiana subcutanea* Funcker. Tab. 79. *Tertiana extensa* quibuldam; P.

Vitiosa speciei denominatio, & vere illegitima, quam ægre retinemus; ea autem sic vocatur, quæ brevi, levique frigore adoriens, calore dein intenso & longissimo stipatur, ita ut 12. immo 20. horas perseveret cum siccitate linguae, capitis dolore, nullis, vel paucis, & non levantibus sudoribus; in hac etiam accessus typum facile mutant. Duratio morbi ultra septem accessus extenditur, & mensis Julii sæpius accedit, atque post quatuor, vel quinque accessus omnino remittens, seu tritæophya evadit, quod præsumimus, si apyrexia sit brevis; imperfecta, si post accessum nullus sudor, vel nullum levamen addit, ita ut æger lecto suo delectetur.

Hæc species tribuenda est, vel saburra primarum viarum copiosiori, quæ ideo catharticis est expurganda; vel assiduo calori lectuali, & calidiori regimini, ut sudorificis: in priori casu post sufficientem catharticonum usum ad kinkinam deveniendum est: in posteriori kinkina nullius usus est. Vide *tritæophyam descriptam*.

3. *Tertiana prothialis* Marcelli Donati; an *Tertiana scorbutica* VVedelii?

Videtur varietas spurie in qua ob nimium sanguinis ardorem, regime- & medicamentis calefacientibus excitatur, superveniunt periclitæ, ut observat *Funcker* & judicent vero autoptæ nam ad tritæophyam potius attineat. In nostris regionibus raro hæc observatur, apud Germanos frequentius.

Dolores nocturni, maculae lividae, gingivarum furor scorbuticam designant, in qua succus naltæti aquatici cum kinkina præbetur.

4. *Tertiana pleuritica* Valesii in *Epidem.* lib. 2. sect. 3. pag. 30. *Pleuritis intermittens*. A. P. Quia etiam mihi contigit videre pleuritidem,

verissimam quidem, & omnia pathognomonica signa habentem; intermittentem tamen, ita ut homo alternis diebus pleuritide, alternis nullo morbo teneri videretur. Hodie regnat *Monipellii* Majo mense 1760. tertiana, quæ post tertium accessum pleuritidem imitatur, dolore lateris & dyspnoea accedentibus, ac febris ex intermittente evadit remittens; sanguis pleuriticus est in patella; & phlebotomiis iteratis cum interpositis catharticis lenibus sanatur morbus.

5. *Tertiana arthritica* Raim. Fortis. P. Hanc speciem hæmorrhoids suppressa excitabat. Rheumatismalem tertianam descripsit *Mortoni Pyreol.* cap. 9. *hstor.* 23.

6. *Tertiana asthmatica* Bonet. Polyalth. P. Illa est cujus singuli accessus difficultatem magnam respirandi stipant; & astmaticos invadunt; febris nec est acuta, nec continua, ut in peripneumonia; cura exigit febrifuga bechicis & diureticis juncta.

7. *Tertiana emetica*. Vid. VVillif. observ. de febre Tertiana, cap. 4. *Morton. Synthesi vomitum simulans*, &c. P.

Juvenis quidam nobilis, bilioso temperamento præditus, febre tertiana corripiebatur, ingruente paroxysmo plurimum bilis flavæ & viridis evomebat; dein cum insigni carpalgia, calore & siti intensissimis per plures horas graviter decumbebat. Hæc species in quovis paroxysmo atrocem vomitum excitat, vel biliosum, ut in hac casu VVillif, vel pituitosum, ut in aliis quos vidi.

VVillifus præscripsit viduum ex hordeatis, phlebotomias duas in accessu, quavis nocte conservam rosarum cum scrupulo diazordii, manna sal abstrichum cum succo aurantii, & cum æger ille a vomitorii læderetur, ad cathartica exinfuso sennæ, rhei, fantali citrini cum sale abstinii confugit, nec non epithema febrifugum carpiis admovit; ubi vero vomitus pituitosus, viscosus tertia quaque die cum febre recurrit, post adhibita omni genera medicamina, ad aquas Bellilucanas confugiendum est die intermissionis epotandas.

Falsum est in tertiana emetico necessarium esse; emetica & cathartica cautela gratia assumpta non raro tertianam excitant, observante VVillif; illis etiam insistere non tutum est, cum videntur indicata.

Tertianam emeticam & sudore stipatam epidemicam anno 1657. memorat *Mangelius Bibliotheca practica*. Tertianam iliacam, seu vomitum pertinaci, colica & alvi constipatione notatam, refert *Forsberg observat.* Tertiana cholericæ, seu cholera quovis accessu excitans ejusdem est speciei, *Morton Pyreol.* cap. 4. pag. 33. Succus limonium saccharatus aqua dilutus, seu limonata vulgaris, cocta, bis sumpta in accessu laudatur a *Guill. Pison* in his tertianis; ea enim vomitum compellit, accessum minuit, & sudores.

8. *Tertiana hysterica* VVedelii *Ephem. Nat. Cur.* ann. 2. ejusdem tertiana hypocondriacæ. P. Ea est quæ tertio quoque die paroxysmum hyde-

rit accersit, potissimum frigus: oscitationes, cardialgiae, nauseam, terrorem & animi depressionem.

Curatur aperientibus lenibus. & antihystericiis kinkinae mixtis.

9. *Tertianae febribus* Ettmuller. de febr. p. 194. Balthasar Timaei cas. 15. lib. 8. *Tertianae Danicae* Bartholini, *Erratica* Auctorum. P.

Cognoscitur 1. ex anomalia; periodi ejus mire variant, nunc anticipando, nunc retardando; 2. Contumacissima est, & nisi fuerit sublati fomes scorbuticus, vel septies recidat; 3. Dolores lancinantes, aut in frigore aut in calore, liique vagi adhaerent; 4. Arenulae rubrae, sed friabiles patietibus maculae adhaerent; 5. vel haeret in urinis crassum, copiosum, quasi forfaraceum sedimentum, subrubundum sanguineo colore non nihil tinctum.

Curatur itaque antiscorbuticis remediis, ut jussulis amaris, dein ad kinkinam deveniendum, praemissis lenibus catharticis. In hoc casu laudantur abstinendum, marrubium, carduus benedictus, centaurium minus, tormentilla, tertianaria, ulmaria, taraxacum, fumaria, nallurcum aquaticum, sedum minus, &c. Vide Ettmullerum pag. 198.

10. *Tertianae Carotica* VVerlhof. observ. de febr. Ramazzini Const. Epid. pag. 228. *Apoplectica* Mortoni cap. 9. bist. 25; *Febbris lethargica* Torti. l. 3. P.

Est ea species de qua integrum & eximium tractatum scripsit illustri VVerlhofus, quae quinta die, id est tertio accessu, zgram in Carum vel Apoplexiam saepius lethalem conjicit, cujus signa dedimus in tritaeophya apoplectica, eoram vero trademus, dum de *Cara febrili* agemus. Vide *Morbo pyret.* pag. 99. de *Tertianae apoplectica*, quam; ut VVerlhofus; kinkina impugnat.

11. *Tertianae carotica duplex* visa est a Riverio, *obs.* 2. pag. 79. Diversae speciei videtur ac prior. Vide *observ.* Carol. Pisenis de febr. pag. 468. Difficillimum est quandoque tritaeophyam duplicem soporosam cum tertiana duplici soporosa non confundere.

12. *Tertianae ab febris* Juncker. tab. 79. pag. 249. Fr. Hoffmanni II. 12. P.

Ea est quae scabiei repulsam sequitur, quaeque resumpta scabie sanatur. Datur etiam quartana ab eodem principio. *Nemur. de quartana.*

13. *Tertianae accidentalis*. Vide Sydenham. cap. 5. pag. 53. P.

Ea est quae a levi aliqua offensa in sex praesidiorem sanitatis usu oritur, ut a cibo, potu, aere, &c. Illae febres itatum quendam seu fixum habitum non nanciscuntur, & illis correpti saepe subito convalescunt.

Tertianae duplex distinguitur a quotidiana & a quartana triplici, ex eo quod accessus sibi mutuo quoad horam, modum, durationem, exitum, symptomata propria non singulis, sed alternis diebus respondeant, ita ut primus tertio, secundus quarto, &c., similis sit. Differunt a tritaeophya & amphimerina per plenariam in-

termissionem & apyrexiam, quae non solum ex pulsu sano simili, sed potissimum ex eo quod zeger a lecto surgat, suavis vires relictas ferme sentiat, quod in remittentibus non accidit si tamen brevis aut obscura sit apyrexia, curantur ut remittentes. Triplices & quadruplices tertianae *Primerosi* videntur, a remittentibus non differunt, excepta triplici tertiana *Brendelii*. 13. *Tertianae duplex* Sennarti, River. Cent. III. *Obs.* 10. 11. Cent. IV. *Obs.* 79. A. P. Ea est quae omnium familiarissima est, quaeque a multis pro quotidiana habetur. Verum paroxysmis alternis aequalibus cognoscitur. Differat a complicatis frequentibus quod nullum grave vel constans symptoma secum afferat, praeter horrorem cum nausea, tremore, cephalalgia, sive, quem sequitur calor, deinde sudor, ut omnibus febribus solemne est.

14. *Tertianae duplicata* Pienis, Riverii Cent. IV. *obs.* 16. Amat. Lusitan. cent. 2. pag. 6. A. P.

Illae accessus binos habet alternis diebus, ut prima & tertia, nullum vero die secunda, quarta &c.

15. *Tertianae triplex* Brendelii, m. l. Illa est quae prima, tertiaque die duos, secunda & quarta unicuique accessum inducit, &c. *Schenkii* lib. 5. *obs.* 12.

16. *Tertianae apoplectica* Bonet. in Sepulchreto, tom. 3. pag. 161. A. P.

Ex Caldeae ea quovis accessu convulsionem cum sensum seriatione inducit, unde differat a spasmodica in qua sensus non obsecuratur. Puella decennis quavis die hora decima patiebatur accessum febris, simulque epilepsiam, a quibus liberata fuit per remedia generalia, ut videre est loco citato.

17. *Tertianae syphilitica* D. Deidier *obs.* 4. de morb. veneris, Cardani &c. P.

Ea est quae ita a virus syphilitico fovetur, ut hydrargyrosi, aut aquila alba similibus medicamentis tantum sanetur, uti quartana syphilitica D. Monro *Essai d'Edimbourg* 2. D. Deidier licu mercuriali utebatur, & tertio lito sanabatur febris. Monro aquila alba singulis diebus repetita, ad grana sex pyralisum gratia hanc aggrediebatur.

18. *Tertianae verminosa* Stillerii in Ad. Helmsk. A. P.

Ea species symptomatis sombricos in primis viis latentes designantibus stipatur, de lombriorum rejectione, acidis vomitionibus, &c. yeorum quas vidi, remittentes fuere species, non intermittentes.

19. *Tertianae subemissa* Torti de febr. p. 131. *subemissa maligna* ejusd. Hist. p. 199. A. P. ad tritaeophyam recte pertinet.

Ea incipit ut tertiana, scilicet habet initio accessiones distinctas, sed est ex perniciosarum numero, atque ab aliis distinguitur ex successu periodotam obscurazione, & paulatim acquisita continuitate; illi non raro adjuvantur quaedam ex symptomatis quae perniciosas designant, ut cardialgia, cholera, syncope, &c. fed in multo remissiori gradu, ea cum paucis, vel nullis, gressu solet invadere, sed potius cum sensu caloris, cum

tum tertiana duplex est, ea primum accessum habet leviozem, secundum graviorem, & sic progrediendo motum servat graviorem per dies pares; quod si ex duplici in simplicem statim mutetur, non desinit esse suspecta, cum accessiōnem validam præcedit altera debilis. Prænotificatur etiam illa tertianæ in continuam mutatio, si intermissionis die mordax ad tactum calor percipitur cum aliquali pulsus perturbatione, siti, lingue siccitate, quæ omnia incendium universale jamjam disponent prænotificant: urina quoque pauca simul & rubra vel crocea periculum continuæ portendit. Signum etiam est putris quædam inflammatio ulceroſa vel aphthosa initio morbi cum dysphagia apparens, nec non quodvis perniciōis Symptoma prioribus accessibus superveniens, excepto tamen delirio, quod accessum in calore comitatur, quodque facile evanescit; secus si in febricula mitiori contingat, & ea declinante perseveret.

Jam febris facta remittens perniciōis facile cognoscitur ex defectu appetitus, & quamvis ab origine intermittens fuerit non caret periculo, nam trahit secum quoddam sævum symptoma, ut cæteræ malignæ ab initio remittentes vel continuæ, potissimum vero parotides, delirium perpetuum, convulsiones, anorexia, hydrophobia, seu cujusvis potus aversiones, & similia.

Ea vero tertiana subcontinua seu hemitritæus tam frequens est ut *Mercatus* in plures species eam subdivideret. Videtur meretur hic auctor de tertiana perniciōis tom. 2. pag. 396.

20. *Tertiana Erumpens* V. Verhofs. de febr. A. P. Monialis hac cœteræ alternis diebus patiebatur accessum; horum duo primi fopore erant stipati cum resolutione artuum unius lateris, balbutie, oris in oppositum latas distortionem, purgata in decoctione kinkinæ passa est intertio accessu artuum tantum formationem, stuporem; finito quolibet accessu intra sex, vel septem horas, ea sana omnino videbatur observante Ill. D. Chapsal.

21. *Tertiana cardialgica* notavit lib. 3. cap. 1. vide cardialgiam quartam, tertianam diaphoreticam, ibid. vide Tritoxophyam elodem; notat etiam tertianam cholericam in qua cholera accessum cum paroxysmis advenit, vide cholera sextam; tertianam dysentericam etiam memorat lib. 3. cap. 1. de qua vide dysenteriam 17. illas liquidem febres sæpius ita latent ut symptoma quo stipatur accessus pro ipso morbo essentiali sæpius habendum sit.

22. *Tertiana miliaris*. Vide miliarum 90.

23. *Tertiana urtica* D. Planchon Journ. de Med. Juill. 1665. p. 73. A. P.

In accessu erumpant phlyctænæ urticarum puncturis similes, pruriginosæ, præmissis phlebotomis, emetico & cathartico, kinkina morbum sustulit.

24. *Tertiana lippia* D. Comitæ Pauli de Valcarlos Medicina Professoris Ticinensis inclutissim. A.

Constat ex illius dissertatione ad nos data an-

no 1765. vigere in Cremonensi & Mantuano tractu endemica tertiana, nunc simplicem, nunc duplicem, cæteris regionibus & Auctoribus vix cognita, quæ, licet initio vere intermittens sit, circa tertiam quartamve accessiōnem remittens evadit, accessibus subintrantibus, & simul perniciōissimæ lippix formam induit, cui obviam eundem est ope kinkinæ cum vinodactæ, etiam cum lippix symptomata se produunt, nisi mature functam illam mutationem præverterit Medicus: quantum vero differat hæc tertiana lippia a tritoxophya lippia docet utriusque character genericus: in utraque calor interiora uric dam exteriora algent, aut in tritoxophya febris est remittens ab initio ad finem, in tertiana vero aliquot primis diebus omnino intermittens, quod quidem in primis ejus morbi descriptionibus, olim a Celebri Professore editis, non ita clarum erat. Græcias itaque ipsi rependo quod hanc speciem tertianæ cognoscendam & curandam mihi humanissime præbuerit.

XI. *QUARTANA*, Græcis *Tetraktis*; febriſ quartana Auctorum, flure quartæ ou quartaine. *Quartanaria*.

Genus est febris intermittens, cujus accessus similes quarta quavis die revertuntur, vel series accessuum febrilium quarta quavis die similia.

1. *Quartana legitima* Sydenhami, febr. intermitt. pag. 50. L. P.

Ea est quæ autumnii soboles est, quæ simplex seu secundam & tertiam diem libera ab accessu relinquit, quæ contumax, nisi prius æger eam diu expertus fuerit, cum enim secunda vico aggreditur, ut plurimum post aliquot accessus sponte sua solvitur, si fides Sydenhami.

Hora invasionis est circiter quarta pomeridiana, frigus non ita vehemens ac in tertiana, sed diuturnius, ad horas duas extensum, sine vomitione ac dejectione alvi: calor horas 5. vel 6. attingit cum gravitate capitis, & terminatur sine evacuatione sensibili.

Huic obnoxii sunt raro Infantes ac pueri, sæpius annosi, melancholici. In omni quartanario flexis ejus genubus explorandum est abdomen & videndum num lien tumeat, quod alteram speciem constituit non infrequenter. Quo ægri sunt magis famelici & fami satisfaciunt, quo magis ad frigidam tempestatem accedit morbus, eo sanatus difficilior est.

Curatio exigit phlebotomiam in accessu, nisi plures jam febris accessus expertus æger sit debilis aut senex. Cathartica die sequenti præstibenda, & si nihil obstat, emeticum admiscendum est, post alterum accessum iterum purgandum est, atque diebus vacuis iusculum vel apozema amarum exhibendum, ut fluiditas sanguinis concilietur: hisa potematia aperiencia martialia etiam addantur, maxime si febris plures redivivas passa sit: superaris tribus vel quatuor accessibus, ope kinkinæ, chamæmeli, cæsarillæ quarta quaque hora sumptæ, accessus suppressi sunt, & cum summum frigus aderit in iuvatione,



fiore, æger senex est vel pituitosus, kinkinae addantur guttæ aliquot elixirii proprietatis vel grana pauca salis ammoniaci, vel theriacæ recentis: suppressis accessibus, non nisi per gradus intra quindecim dies est dimittendus kinkinae & aperientium usus.

Si morbus pertinax fuerit, capite doleat æger, vena pedis initio tundenda: si viscosa saburra sit in ventriculo, aquæ Bellilucanæ per tres dies a febre vacuus sunt ad libras sex epotandæ quavis die intra trihorium; sic expurgatis primis viis ad aperientia amara & febrifuga recurrendum est.

Æger die accessus utatur iusculis, & potu calido, diebus vero a febre vacuis, exceptis primis morbi diebus, ofis, panis & vini; srigus cautissime vitet.

2. *Quartana splenetica* Sennert. de febr. C. P.

Ea est quæ a lienis sæpissime, aliorumve viscerum abdominis obstruptione aut scirrho fovetur, omnium contumacissima, facile recidiva, maxime si autumno incipiat: ea enim hieme vix sanatur, & ad veris accessum perseverat, sæpe suppressa maturius, antequam per aperientia martialia obstruções referat: sint, phlegmasiam inducit, inde ascitem; facies est lurida, mæror, macies accedunt.

Ea itaque cautela adhibenda est ut probe expurgentur primæ viæ per cathartica aut aquas Bellilucanas; dein singulis diebus apozemata amara, stomachica, aperientia adhibeantur, quæ sunt ex foliis cicchorii, absinthii, fummitatibus centaurei minoris, radicibus enulæ, rhei conusi, additis limaturæ ferri drachmis duabus, casearillæ scrupulo, syrupo de quinque radicibus, auripis radicibus brucei, asparagii, quod præstat. Quibus apozematis aut iusculis finitis, iterum purgatio repetatur, aut kinkina purgans cum rheo, fenana, agarico adhibeatur, vel kinkina tantum ad drachmam unam quarta quavis hora constanter extra accessum repetatur, nec omnino per semimensem dimittatur ex quo suppressa fuerit quartana, imò deinde opiæ martialis cum rheo & casearilla diu usurpentur. Semel veto inceptus kinkingus, nec per cathartica nec per diluétia multa interurbetur, inde enim febris recurrere consuevit, & non nisi elapso mense ad cathartica deveniendum est, quod de tertiana etiam didum sit.

3. *Quartana duplex* Sennert. P.

Ea est in qua datur accessus prima, secunda, quarta & quinta die, nullus tertia, accessus vero primus tertio, secundus quarto respondet.

4. *Quartana duplicata* Boneti Polyath. de febr. P.

Ea est quæ quarto quoque die duos accessus importat, nullos veto secunda & tertia: si vero altera ex his seriebus anticipet, vel retardet, tunc in prima periodo tertia die recurrit accessus solitarius, alter quarta, & sicut combinationes metæ curiosæ a *Primivesso* enarratæ, quas Audores vocant quartanæ tertianæ aut quarannæ quotidianæ complicatam, & quoniam defectu attentionis non præfagiri possunt, aut respicuntur illi typi, hæc species erraticis accensent plures Audores: nulla vero intermittens typum

certainem sequitur quam ipsa quartana. Certe vero illæ species eodem modo quo tertianæ.

5. *Quartana triplex* Bonet. Sepulchret. Sebent. lib. 5. observ. 12. A. P.

Est ea quæ quotidiane instar singulis diebus accessum docet, aut primus quarto, secundus quinto, tertioque sexto respondent. Eodem modo curatur, quo tertiana duplex & quotidiana. Quartana vero sextuplex *Capivaccii* ab amphimerina duplici non est distinguenda, cum intervalla nulla dentur lucida & a sistu summa inter utrumque accessum superfluis evincat non veram esse appyxiæm. Quartanæ vero duplices & triplices hypochondiaci sipari consueverunt. Vide *Sebentium*, qui ex tribus quartanis duas facile sustulit; tertia ad ver subsequens permanfit.

6. *Quartana syphilitica* Alex. Mouru, Ed. d'Edimbourg, tom. VI. artic. 47. obs. 9. Ballon. Epid. I. 2. p. 131. P.

Est ea species quæ a viru syphilitico fovetur, nec sanari potest nisi mercurialibus, aut aliis syphilitidis antidotis. Istam, ope mercurii dulcis quotidie repetiti ad pyalismum usque, sanavit *Mouru*, simul & syphylidem doloribus nocturnis, & ulcere faucium sipatam. Dosis mercurii dulcis grana quinque.

7. *Quartana cataleptica* Boneti Polath. P.

Anno 1729. dum nosocomii Alesiensis ægros curabam, observavi senem militem quartana laborantem, qui diebus a febre vacuis stupidus & amens erat: die vero febrilis accessus catalepticus erat, sed imperfecto; jacebat quidem immobilis, & omni sensu, motuque orbatus; excepto pulsu, & respiratione tardis & obscuris, sed non omnes artus posituram inditam retinebant, quod solum in brachiis observabam; immo suspensum brachium sensum tandem deladebatur. Emetici ope a dubus primis accessibus evasit, aut tertio noctu accedente obiit. Catalepticam quartanæ combinatam narrant *Bonetus*, *Montanus* &c.

8. *Quartana Epileptica* Moroni director. Scolzii Consil. 380. & 379. P.

9. *Quartana Nephralgica* Lemerii Journ. des Sav. Apparebat sub specie vomitus urinosi & nephralgicæ quarta quavis die recurrentium.

10. *Quartana Hysterica* Morton. Pyretolog. cap. 9. histor. X. p. 22. P.

Est ea species quartanæ quæ male curata abit in continuam cum lyncope, aggritudine, sudore colliquativo, spuratione, inactione, inquietudine, inappetentia, suffocatione hysterica, &c. Frustra tentatis antihystericis, narcoticis, cordialibus, necessum fuit repetitis levibus purgantibus quartanam revocare; quo facto ope kinkinae tota aggritudo sublata est, quod non sine recidiva accessuum evenit.

11. *Quartana arthritica* Morgagni de arthritide de regul. cap. 9. histor. 4., & 3. Cr. P.

Est species quæ in arthritidem mota est, ut probant duæ historię a *Morgagni* enarratæ. Vide *Eberhard Dissert. Halle 1761*; hæc periculi plena est.

12. *Quartana Amens* Sydenham. de febr. intermitt. p. 60.

Est peculiaris, ait Sydenham, mania, intermittente diuturniores, potissimum quartanam excipiens, quæ communi medicatione aspernatur, & post evacuationes fortiores adhibitas in miseram stultitiam degenerans, non nisi cum ægrotum vita terminatur, miratissime sæpe sum nullam hujus rei mentionem ab Auditoribus factam fuisse, cum non raro accidit viderim; cum reliquæ species amentia copiosis evacuationibus & venæ sectione & cathari utplurimum persanentur, hæc neutram potest ferre, immo ab ipsis vires acquirit. De hujus curatione, vide *Aueniensem febrem*.

13. *Quartana Infantum* Sydenhami, pag. 50. de febribus intermitt. P. L.

Sæpe non sine stupore sum intuitus, ait Sydenham, infantes tenellos cum quartana per totos menses sex commissos, nec oppressos tamen, sed de eo, Hercules instat, pueri incuninis triumphantes, cum anossi & adulti aliquando ex ea moriantur, aut in morbos lethales, ut ascitent, deducantur.

14. *Quartana scorbutica* C. Pisonis, Balch. Tlmei cas. 18. Bartholinæ de medic. Danorum. P. Commendatur potio ex seminibus heliotropii & hyperici in aqua cardui benedicti vel sambuci.

15. *Quartana comatosa* Carol. Pison. obs. 163. 164. 165. de morbis a collovie serosa, pag. 447. in quibus tamen observationibus non ita liquet ut agatur de tetartophya, an de quartana? & in obs. 164. quartana erat typhomania, seq. comate vigili stipata in quovis accessu; chronicus est morbus & sæpe lethalis.

16. *Quartana triplicata* P.

Est species quæ prima die tres accessus, totidem quarta, totidem septima, decima, &c. nullum in intermediis diebus adducit, accessibus invicem dissimilibus, ita ut accessus primus primæ diei accessui primo dierum sequentium, secundus secundo &c. respondeat.

D. Fern. D. M. M. hanc speciem per sex menses passus sanatus est sumpta opiata sequenti in sex bolos divisa.

Recipe: *Kinina pulverata, drachmas duodecim, salis abstinibii, ammoniaci, & tamarisci, ana drachmas duas, cum s. q. syrupi de capillis veneris; sumat bolum mane, alterum vespere.*

Curatio quartana ex Hequet. Adulto quartanario initio sanguis mittatur semel vel bis; sequenti die sumat vini emetici & syrupi de althæa ana unciam unam in aquæ cyathos.

Resecto emetico sequenti hora sumat salis Epiphanensis drachmas sex vel octo, & syrupi de pomis compositi unc. unam; quolibet vespere diebus a febre vacuis & isto sumat æger theriacæ scrupulum; post 2. vel 3. accessum sumat quater in die kinæ pulveratæ drachmam semissem ex pauxillo de rosas siccis, devorata prius ossa, vel hausto aquæ saccharatæ cyathos; repetantur ex per septem vel octa dies, quibus elapsis levis catharsis instituitur, sumat v. g. salis Epiphanensis drachmas sex, mane unciam in infuso drachmæ novius kinæ, & unius senæ mandatæ. Si opus sit ob calorem iterabitur phlebotomia in usu kinæ; si nodos infomes sint, pillularum de cyrioglossa grana 12. cum kina vespere exhibeantur. Pergat æger in usu kinæ 12. vel 13. dies, & sopita febre iterum sumat kinam per dies quindecim. Si revertatur accessus, iterata phlebotomia iteretur usque ad addita theriacæ semidrachma bolo matutino & vespertino. Pro pueris infunde kinæ semiunciam per diem in vini albi libra 1. adde syrupi de tunica unc. 2. aquæ cinnamomi hordeari drachmas tres; sumat cochlear unum aut duo omni bishorio.

17. *Quartana metastatica* P.

Adolescens a duobus annis in insula Minores, dein Monspelii, erat quartanæ obnoxius, quæ accedente ophthalmia evanescebat, hæc evanescente redibat, quod toties iteratum est ut de metastasi nil superesset dubii.

## XII. ERRATICA; *Esque Erratique*.

Geus est febris quæ accessus similes ab invicem magis distantes obtinet quam quartana, nec proinde ad priora genera revocari potest.

Si erraticas vocarem, quæ typum obscurum habent aut nullum ordinem sequuntur, nullum genus esset quod ad erraticam non pertineret; exceptæ quartana; sed ut quintana, sextana, aliaque uno genere comprehendam, eas tamquam erraticæ species habeo. Geus autem iterarum est, ut nullas ejus species Galenus observaverit.

1. *Erratica quintana* Tulpil; Avicennæ canon. l. 4. sen. 1. L. P.

Tulpil simplicem, Christophor. Ebelius duplicem quintanam memorat. Hippocrati pejorem eam censet quam septana, octana, &c. ac cum tabe conjunctam vidit Forestus obs. 43. lib. 3. Scholio.

2. *Erratica septana* Ettmulleri; Hebdomadria Schenckii pag. 826. L.

Eam longam, sed non lethalem dicit Hippocrates. Sextanam memorant Andores; uemlium tamen, qui eam observaverit, invenio.

3. *Erratica octana* Amati Lusitani p. 785. Salii c. 12. Octimana P. Vallesii Coutrov. lib. 5. P.

Hanc in judæo per totam hiemem duranti observavit Amatus & sanavit; horror horam unam, calor quindecim perseverat; quovis mane sabbati adoriebatur ante lucem. Sponte sanata vidit Zacutus.

4. *Erratica nonana* Zacuti Lusitani obs. 34. lib. 3. P.

Novit quinquagenarium qui biennio nonana febris laborans usu sibi & apertis hirudinum ope mariscis convalescit.

5. *Erratica decimana* Zacuti, prax. obs. 34. lib. 3. P.

Decimanam notavit in sexagenario qui duobus annis hoc typo vexatus, vacuata sæpius Picuta & variis aperientium ope referatis, convalescit.

6. *Erratica vaga* Ettmulleri, River. observ. 32. centur. 3. P.

Febris intermittens sine typo cum hypochondriaci; illa nunc post decem, alias post duodecim dies recurrerebat. Incipiebat a levi borrore, calor ingens sequebatur, cum atrocibus crurum doloribus; accessus 15. 20. 25. horas perdurabat, & copioso urinæ vel sudoris affluxu sedabatur; per triennium morbus perseverabat. Hujus curam vide apud *Riverium loco citato*.

*Therapeja Februm Cluttoniana.* F. Cluttonus Medicus Anglus anno 1751. novam, tutamque, ut ait, methodum ad curandas febres tum continuas, tum remittentes edidit, quæ in usu sequentis julepii consistit, quem *febrifugum* vocat.

*Recipe olei seu spiritus concentrati sulphuris, vitrioli, & salis, ana partes æquales Spiritus vini rectificati triplicum horum omnium, digera per mensem ad siccitatem, distilla 2. hujus spiritus libris duobus adde radicem angelicam, serpentariam virginianam, seminum cardamomi, ana drachmas sex; fiat tinctura.*

Hujus tincturæ tantum aquæ puræ infusitur, quantum ad gratam aciditatem conciliandam requiritur, julepusque resultans saccharo ad gustum ægri edulcoretur, illique sitienti quantum desiderat (circiter sex libræ intra 24. horas) ad bibendum exhibeatur; his assumptis æger ut plurimum in sudorem incidit, urinæ excretionis indicia dat, & febris plane cessat vel remittit. Si vero intra diem non penitus sublata sit, per alteram diem eodem remedio, sed minori dosi, utendum est, quæ methodo millenosi se sanasse proficitur *Auctor*.

Si quinque morhi dies effluxerint, bezoarticum minerale sexta quavis hora bibe julepo ad grana virgini addendum est, quo secretiones omnes promoventur; si vero pulsus plenus sit, hujus loco tartari vitrioli scrupulus quater in die est substituendus, ut æstus magis temperetur. Si Medicus nono tantum die morbi sit accersitus, aut si initio nausea adfoerit, abemetico antimoniali ordiendum est; cum vero julepus febrifugus inflammationi generali tantum medeatur, huic varia remedia addenda sunt pro diversis symptomatibus.

Si diarrhœa, sudor, hæmorrhagia vexent ægrum, flores rosarum, radix tormentillæ, decoctum cornu cervi nîli, julepo sunt addenda; si hæc non sufficiant, ex balsami Lucatelli drachma semisse, corallorum gr. xii. opii gr. r. diacodii quantum satis fiat bolus.

Si pulmo inflammatus sit; cum julepo nitrum & pectoralia conjungenda; si febris ad intermissionem inclinet, quod urina laticeria, frequentes nausæ indicat, drachma dimidia salis abstinethii, in oñia una succi citri detur.

Si lingua nigra, sicca, tremores, subultus tendimus, stupor, animi dejectio, suspiria, pulsus celer, debilis, tremulus, inæqualis, urina pallida, cruda, nulla aut parva sitis, tunc febris est putrida, aut maligna, *Cluttonus* omnia emollientia & fibras laxantia, nec non salia nentra; canc pejus & angue fugit & cardiacis infusit.

Ad febrem in his febribus quater, aut quinque purgantia adhibet: aut in ipsis acutis inflammationis phlebotomia inotilem censet.

*Therapeja Februm Lobbianna.* *Thœophil. Lobbi.* Med. Anglus ann. 1732. in libro cui titulus, *tractatus practicus de cura Februm*, docet se sanasse febres cujusvis generis sine phlebotomia, catharticis, emeticis, & sine kinkina. Sine phlebotomia ipsos morbos inflammatorios, ut pleuritidem; sine catharticis ipsas synochos putridas; sine kinkina ipsas tum remittentes, tum intermitcentes.

Omnes febres ab acrimonia singulari in quoque genere diversa foveri putat, hanc vero acrimoniam a quibusdam salibus specificè corrigi. Calefacientia refrigerantibus maritata debita temperaturam sanguinis in febribus servant; in ardentibus morbi dosi refrigerantium est addenda calefacientibus; si vires pulsus languent, calefacientia puriora, vel majori dosi conveniunt; acida & nitrofa refrigerant, diluunt, calorem temperant, sanguini fluxilitatem conciliant, corrigunt acrimoniam alkaliam dissolventem quæ synochos & typhos excitat. Alkalina, ut sal tartari, absorbthii, sal cornu cervi, corrigunt acrimoniam acidam, cui insantes sunt obnoxii.

Neutra, ex acidis & alkalinis mixtis, ut acriemeticum Riverii, corrigunt acrimoniâ specialem quæ vomitum & febres intermitcentes creat.

Febres a spissitudine productæ sunt intermitcentes, morbi inflammatorii, exanthematici.

Febres a dissolutione ortæ sunt typhi, synochi, hætica. Febres vero mixtæ, quarana; quotidiana, pleuritidis putrida.

Is vero *Auctor* ab anno 1711. ad annum 1732. se cum magno successu praxim Londini exercuisse testatur.

*Therapeja Februm Sylviana.* *Jac. Sylvius* cum schola *Bonschæi* omnium febrium essentiam in sanguinis coagulatione reperiit, unde phlebotomiam & refrigerantia omnia proscripsit; & cum existimaret pulsam celerem esse signum tarditatis circulationis, is stabilivir attenuantia, dissolventiaque esse sola quæ in omnibus febribus quovis tempore indicantur remedia. Calidum itaque regimen in ipsis ardentibus & inflammationis, remediaque sudorifica cardiaca ad venenum quoddam coagulans expellendum præscribenda censuit.

Talem theoricam & therapiam secuti sunt *Helmontius, Serret, Cartesiani*que Medici, quam *Sydenham, Harris, Hoffmannus* maxime damnarunt.

*Therapeja Februm Sydenhamiana & vulgaris.* *Hippocrates Anglus Tom. Sydenham* existimat febres esse conatus naturæ ad expurgandas materias noxias quibus sanguis inficitur; ipsum calorem, si moderatus sit, ad materiam morbosam coctionem, & correctionem prodesse; pulsus veloces, frequentes ad illius maturationem & deinde coctæ excretionem facere; adeoque Medici munus esse ut febres vebementiam, si excedat, per phlebotomias, dietam diluentem, recti-



refrigerantem, auræ liberioris usum temperet; ut materæ morbificæ partem & primis viis per emetica & cathartica eliminet; & deinde vero evacuationem criticam expellet, conatus naturæ, si moderati sint, non temere turbet; si vero debiliores sint & languidi, quod juvenibus rarum est, per calidius regimen, & cardiaca refocillet; atque his scopis attingendis remedia diætetica, vegetabilia & simplicissima chemicis, mineralibusq; anteponeat.

In intermittentibus chronicis, præmissis generalibus, ipsum corticem Peruvianum adhibemus, acida cum *sylvio* non horrescimus, nec cum *Lobbio* salia pro omnibus morbis curandis adhibemus.

Pro intermittentibus & remittentibus præmissis præmittendis.

*Recipe kinkina partes octo, florum chamæmeli partes tres, extracti centaurei minoris & juniperi, ana, partem unam, nitri, partem unam & semissem, syrupi de limonibus q. s. fiat opuscula, dosis drachma una vel dua.*

Si maligna sit febris, adde contrayervæ partem unam & semissem, camphoræ grana aliquot; crescente calore, delirio, angæ dosim nitri; crescente pervigilio, adde discordium.

*Therapia Hucquetiana.* Ex innocua quartana quandoque periculosus nascitur hemitritæus, quia ipsa solida exardescunt, tunc inutiles est kina, confusendum ad phlebotomias iteratas, diluenda aquea assatim propinanda; ut decoctum ex radicibus nymphaeæ, fragariæ, hordei, glycyrrhizæ pro potu: identidem sumat æger parvas doses pulveris scidi ex duabus oculorum cancerum & una nitri partibus superaffuso succo citrorum: Vespere quovis ex seminibus frigidis & aqua hordei fiant emulsiones, quibus addatur syrupus de nymphaeæ & papaveris ad semiunciam pro duabus dosibus.

Deservescente febre, dentur apozemata ex foliis cithorii sylvestris, & kinae pauxillo; hauriat cyathum sexies in die, additis syrupi de diacodio duabus vel tribus drachmis, si doleat æger, & noctes anxias ducat.

Quo accessus frequentiores sunt, ut in duplici tertiana, triplici quartana, eo fervor major est, eo magis est remperandus ante kinæ usum. Hoc præstant phlebotomizæ, apozemata ex cibiorum, nitro, absorbentia terrea, quæ kinæ actionem moderantur.

Cum ad kinam devenum est, si catharsis opus sit, utendum est uncia una vel uncia & semisse salis Epsomienfis, & uncia syrupi de pomis compositi in pigra decocti kinæ pro quinque vel sex dosibus. Vespere hujus catharsis, æger sumet vel diacodii unciam unam, vel opii granum unum: alias vero expediet pintæ decocti kinæ addere syrupi de kagabæ semiunciam.

Opiata febrifuga sit ex unica pulveris kinæ, uncia syrupi de papaveris rhodæ & sufficienti quantitate conservæ rosarum: dosis drachmæ unus vel duarum tertia vel quarta quavis hora. Cascarella etiam optime præstat a gr. vi. ad x. pro quavis dosi.

Quamdiu obscuræ sunt remissiones, aut dubiæ intermissiones in febre singulis diebus revertente, vel typi ambigua, ægritudo illa mali moris censetur & hemitritæus est, in qua initio, phlebotomia, dein diluentia, cardiaca, diaphoretica, leviter sedantia, potus calidus copiosus conveniunt, cavendo ab irritantibus, catharticis, emeticisve, aut sudorificis nimis volatilibus. Utatur potu ex decocto scorzonæræ, cardui benedicti, scabiosæ, papaveris rhodæ, oxytriphilli cum pulvere oculorum cancerorum cornu cervi sine igne parati, antimoni diaphoretici, nitro, syrupo de tunica, de limonibus, diacodio, usquequo febris typum suum induerit. *Hæquet Medic. pauperum.*

Cura febrium ope laudanti liquidi in infuso centaurei minoris a *D. Bryet* laudata, convenit tantum ubi adest dolor hystericus, vel hypochondriacus quoddam symptoma, secus stuporem inducit monente *D. Stork.*

Cura *Christi Jacobi* mediante arsenico multa aqua & spiritu vini edulcorato, ardorem interno, tussim siccam, anorexiam, alopeciam, polydipsiam, & hæmicam inducit, quæ febre multo pejora sunt.

*Febrisæ* morbos appello cum, *Ill. Vvrihss*, illos qui a vi febris intermittens vel remittens vel conjunctæ vel latentis foveantur, ut carus febriculus, pleuritis febricosa, typhomania febricosa; morbi illi dissilim intermittunt vel remittunt more febris latentis & symptomata subito ægum invadunt; cedente febre recedunt cum urinislateritiis; hos primus cognovit *Ludovicus Mercatur*, fuscè explicavit *Torti*, necnon *Ill. S. \*.* *De abscondita febrium natura*; illos vero tollit kinkina, magna dosi ante tertium accessum ingesta; hoc antem incommodi enatum a tanta dosi, quod scilicet urinæ erasæ, kinkinæ colore tinctæ, difficulter ejiciantur, quodque aurigo etiam superveniat; verum hæc symptomata facile debellantur cum vita ægri in tuto est collocata.

Cetera febrifuga a Neotericis laudata sunt primo pulvis ex nitri gr. vii. camphoræ gr. iij. qui ante accessum quarta quavis hora sumendus, imminuenda dosis cum febris sopita est. *Huxham* veronicea tueruili folio in tertiana etiam kinkinæ loco adhibet; syrupi diacodii semi-uncia, aquæ florum papaveris rhodæ dosi uncie duæ, spiritus sulphuris semi-dramma; Millec, sumat hora ante accessum, *Sterckius*.

## CLASSIS TERTIÆ SYNOPSIS.

## P H L E G M A S I Æ.

SYNDROMES Pyrexia cum inflammatione interna, vel typhi aut remittentis febris cum exanthematis.

- I. PESTIS, *Peste*, eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.
- II. VARIOLA, *Petite-verole*, eruptio pustularum phlegmonodearum.
- III. PEMPHIGUS, *Ficure vésiculaire*, eruptio phlyctænarum avellanis similibus, aut majorum in artubus.
- IV. RUBEOLA, *Rougeole*, eruptio papularum, prælium catarrhosum.
- V. MILIARIS, *Miliaire*, eruptio phlyctænarum milii semine non majorum.
- VI. PURPURA, *Pourpre*, eruptio maculosa, atra, indolens cum typho, vel remittente febre.
- VII. ERYSIPELAS, *Ficure érysipélateuse*, eruptio erythematis cum synocha febre.
- VIII. SCARLATINA, *Ficure scarlatine*, eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa.
- IX. ESSERA, *Percolaine*, eruptio apyreta, suberysipelatosa, subito accedens per vices & recedens.
- X. APHTHA, *Aphthe*, eruptio pustulosa, phlyctænoides, & ulcerosa in ore aut pudendis.

ORDO II. MEMBRANACEÆ. *Pyrexia magna type synocha, vel synochi cum dolore, calore.*

- XI. PHRENITIS, *Phrénésie*, dolor capitis, delirium audax, visartuum, pulsusque major, pyrexia acuta.
- XII. PARAPHRENESIS, *Paraphrénésie*, symptomata phrenitidis & peripneumoniarum.
- XIII. PLEURITIS, *Pléurésie*, dolor lateris, respiratio & pulsus frequens, tussis.
- XIV. GASTRITIS, *Gastrite*, dolor epigastrii, nausea, febris typhodes vel remittens maligna.
- XV. ENTERITIS, *Inflammation d'entrailles*, dolor circa umbilicum vehemens, cum meteorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria.
- XVI. EPILOITIS, *Inflammation de l'omentum*, dolor circa hypogastrium, & umbilicum juxta epiploï extensionem.
- XVII. METRITIS, *Inflammation de matrice*, dolor & tumor in regione & extensione uteri ac lumbis & inguinibus cum febre.
- XVIII. CYSTITIS, *Inflammation de vessie*, dolor, tumor, tensio hypogastrii cum dysuria vel ischuria.

ORDO III. PARENCHYMATOSÆ. *In visceribus fissis, non cavis, non sacciformibus.*

- XIX. CEPHALITIS, *Inflammation du cerveau*, febris acuta cum delirio somnolento & carphologia.
- XX. CYNANCHE, *Équinancie*, dolor gutturis cum dyspnœa strangulante, dysphagia & pyrexia acuta.
- XXI. CARDITIS, dolor sub sternum, pulsus inæqualis, frequens, palpitatio, & cardialgia, cordis anxietas.
- XXII. PERIPNEUMONIA, *Peripneumonie*, pyrexia acuta, dyspnœa gravis, sensus oppressio nis gravitatis in sternum, tussis cruenta, pulsus mollis.
- XXIII. HEPATITIS, *Hépatite*, dolor, tensio, calor in regione hepatis cum pondere, tussis sicca, respiratione difficili.
- XXIV. SPLENITIS, *Inflammation de la rate*, dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans cum febre remittente.
- XXV. NEPHRITIS, *Néphrétique*, dolor acutus in regione renum juxta ureteres in vesicam directus cum febre acuta, dysuria; ischuria, &c.

## CLASSIS TERTIÆ THEORIA

## MORBI INFLAMMATORII

S E U

## PHLEGMASIÆ GALENI.

1. *Phlegmasiæ Galeni in aphorism. Hippocrat. aphor. 7. lib. 1. Gallii Maladies inflammatoires, fièvres inflammatoires.*

Morbi acuti febriles, *Boerhaave aphorism. 770.* qui febre stipati acuta, tamen singularem inflammationem inducunt huic illive organo, unde toti morbo imponitur nomen, ut phrenitis, peripneumonia, &c. minime vero inter febres recensentur ab Antiquis, ut testatur *Galenus Commentario in aphorism. 66. lib. 4.*

Inflammationes *L. Heisteri compendium Medicinæ pag. 116. cap. 7.* ut phrenitis, pleuritis, &c. nec non inflammationes *G. Ludovig Institut. Medic. Clinica cap. 2.* qui his addit Hepatitidem, Nephritidem, Gastritidem, &c.

Febres acutæ inflammatoriæ *Frid. Hoffmanni tom. 2. sect. 2.* qui hos morbos vocat febres stomachicas, febres phreneticas, pneumonicas, hepaticas, nephriticas; & his intermiscet hæclicas. *Junckeri Tab. 69. Nenter. Tab. 36.*

Dolores *Felice Platorii*, qui ad hanc classem refert pleuritidem, peripneumoniam, hepatitidem, gastritidem, &c. & ad mentis alienationem refert phrenitidem, paraphrenitidem. Morbi Phlogistici *Ill. Linnæi.*

*Phlegmainon* apud *Hippocratem* idem est acuti, incendi, ardere, inflammari, unde *phlegmainon* a *nosmata* dicuntur morbi inflammatorii, nec non *phlegmones* seu inflammationes, quo nomine Græci quidam intellexerunt omnem ardorem circa tumorem, ut docet *Gorranus in definitionibus*. Alii verò, ut *Neoterici*, *phlogosum* cum ardorem nuncupant; quo vocabulo Græci quidam ardorem cum dolore & tumore conjunctum significabant, ut *Erasistratai*, cum *Hippocrates* voce composita hos affectus appellaret *Dura & dolorifica edemata*, ut docet *Galenus Comment. in 1. & 2. Prognostic.*

2. Etymologia itaque horum nominum a flammæ calore seu molesto ardoris sensu deducitur, verum vix ulla in morborum definitionibus habenda est etymii ratio, & Græci ipsimet, licet a fervore febres; aut ab igne pyreta, denominarent, non secus ac morbos *phlegmainones* seu *phlogisticas*, namquam peripneumoniam, phrenitidem, hepatitidem, inter febres annoverarunt, ut docet *Galenus* sed febrium nomine morbos a topica inflammatione immunes determinaverunt, quibus *Neoterici* quidam pestem, variolam, rubellamque appendicis instat subjunxerunt.

3. Character, febriß acuta, cum dolore, calore molesto ejusdem partis, & sanguinis in vâella extrahi crassa coriacea.

Febriß acuta dicitur quæ intra duas circiter septimanas sua percurrit stadia cum mortis periculo.

Dolor inflammatæ partis est vel pulsatilis, ut in externa phlegmone; vel punctorius ut in erysipelate, in membranarum plurimum inflammatione; vel gravativus, ut in peripneumonia, hepatitide.

Calor est solito major; cum autem in adultis sanis gradus caloris axillarum, oris interni, sit circiter 28. gradus in thermometro *Reaumurii*, ille, qui morbos inflammatorios, durante vigore, comitatur, ad 33. circiter ascendit gradum.

Corium sanguinis (vulgo *cænis*) est crassa cruorem tegens subalba, quandoque luteo sero tincta, cruore specificè levior, sed firma, tenax, ex qua concretiones polyposæ in cordis ventriculis post obitum efformatæ censentur.

4. Præter hæc symptomata quæ in omni febre inflammatorio morbo observantur, dantur alia quæ, ubi externas partes tentat inflammatio, possunt observari, scilicet tumor phlegmonodeus, erysipelatosus, pustulosus, anthrax, bubo, &c. *Rubedo* rosea, atra, livida, in parte tumefcente, qui color accedente suppuratione abit in album. *Tensio* partis inflammatæ cum sensibilitate magna, & renixu elastico, quæ crescit cum morbo & dein mutatur in *mellinem*, si tumor suppuretur; in *sphacelosam flacciditatem*, si gangrenascatur; in *crustam*, si pus exsicceat, ut in variola; in *squamas*, si epidermis decidat, ut in erysipelate, rubecula, &c.

5. Ex symptomatibus illis primitivis plurima alia vel subsiquantur tanquam derivativa, ut ex febre lassitudo, situs, linguæ siccitas, anorexia, urinæ color intensus, sudor; ex dolore agrypnia, anxietas, querelæ; ex calore iterum sitis, anxietas, venarum & cutis levis intumescencia, glabrities; adde omnia symptomata febrium *Class. 2. a n. 6. ad 11.*

6. In exitu morbi nova oriuntur symptomata, prout phlegmone terminatur resolutione, suppuratione, induratione aut spæculo; atque hunc temporis morbus alter suboritur, nisi sanitas vel mors accedant, atque ille morbus ad classes alias actinet, ut tabes, phthisis, &c.

## Inflammatoriorum Morborum Theoria.

7. Illi morbi dividuntur in *puros & impuros*, seu in *simplices & complicatos*. *Puri* inflammatorii simplicesque dicuntur qui præter vitia a febre & calore oriunda, nulla alia in crassi sanguinis admixtione, atque in illis crassa coriacea cruorem ut plurimum tegit. *Impuri* vero sunt, quos comitatur crasis sanguinis putrida, maligna, pefilens, dissoluta, gangrenosa, ita ut summa cacochyliâ, aut corruptio humorum symptomata superius memorata mutet, novaque sup-

pediunt, ut in variola maligna, peste, cynanche gangrenosa, aliisque epidemicis & causticibus morbis observare est.

8. Inflammationis principia sunt mechanica, psychologica & physica; verum puræ magis mechanica sunt, ut impuræ magis physica, adeoque ordinis gratia agemus de illis successivè initium ducendo a mechanicis, inflammationis principii.

9. Febris causa (ex *usu. 90. class. 2.*), est distributio virium ad nervos cordis in majori ratione, quam ad nervos artuum; ergo in morbis inflammatoriis puris cum sit febris, vires cordis contrahendo impensè majores sunt quam ex proportionem ad vires musculares artuum, solent impendi.

10. Febris acuta inflammatoria velocitatem sanguinis quandoque duplo majorem secum inducit; velocitas enim sanguinis, ea sola frequentia dupla duplo major est (*class. 2. n. 36.*), cum itaque doceat observatio pulsus esse in febre acuta duplo frequentioris solito, quod pluries ipse observavi, & in valido cursu novavit *B. Robinsson*, minime dubium est, quin in febre inflammatoria quandoque velocitas sanguinis duplo major evadat.

11. Velocitas sanguinis sub eadem pulsus frequentia, est magnitudini pulsus proportionalis quam proxime: etenim cum orificium arteriosum cordis sit semper idem, non potest constanter duplo major evadere arteriarum pulsatio, nisi a duplo majori sanguinis in eas immisi quantitate; verum ut duplo major intra idem tempus immittatur sanguinis quantitas e ventriculo cordis in aortam, necessum est sub eodem pulsationum numero, ut fluidum transeat duplo velocius per idem orificium cordis; nam quantitas effluxus per idem orificium est ejus velocitas (docente hydraulica), ergo necessum est ut in hoc casu velocitas sanguinis e corde emissi duplo major evadat, seu sit pulsus magnitudinis proportionalis.

12. Firmitas cruoris in febribus inflammatoriis est quadruplo major quam in statu sano (*Class. 2. n. 97.*), sed ut fluidum viscosum, seu firmius solito promoveatur eadem velocitate ac minus resistens, requiritur vis huicque resistentiæ proportionalis (ex Physicis); etenim viscidum dicitur fluidum, cujus guttulæ suæ separationi, & moles suæ divisioni resistunt; verum sanguis viscidus qui ut subeat vascula minora in columellas exiles dividendus est, si suæ divisioni duplo, triplo magis resistat, non nisi viduplo, triplove majori solitam velocitatem adipiscatur; ergo in morbis inflammatoriis, ut consueta velocitas concilietur sanguini, vis ejus fluidi velocitati proportionalis est adhibenda.

13. Vires requiritur ad fluidum velocius movendum intra tubos sunt ut quadrata velocitatem quæ ipsis imprimuntur (ex hydraulica); cum itaque fluidum duplo, triplove velocius solito movendum est, vires quadruplo, noncuplo majores adhibendæ sunt.

14. Verum si diversa sit viscositas fluidi, ei-

que impertienda sit diversa velocitas, vis requisita est in ratione simplici viscositatis & duplicata velocitatis conjunctim: ergo si sanguis quadruplo viscidior duplo velocius solito movendus sit, vires cordis requirantur sexdecies majores quam antea.

15. Ex dictis sequitur magnam virium vitium quantitatem impendi in labore febrili, qui morbos inflammatorios comitatur, etiam si nulla hæcenus habita sit ratio obstruccionum, quæ his morbis frequentissime occurrunt præbens, in quo casu virium impensæ absolute necessaria multo major est.

16. Cum summa foraminum effectivorum per quæ sanguis ex arteriis in venas trajicitur sit 20. pars orificii aortæ (*Hemast. cap. 9.*) obstrucla dimidia parte horum vasorum, sanguis ab eadem vi propulsus non nisi dimidiam solitæ velocitatis partem servabit in truncis arteriosis (ut norunt aquilegales) & ut conservetur velocitatem acquirat, necessum est ut per orificia illa minima libera duplo velocius moveatur; ergo (13) ut quadruplo majori vi urgeatur. Si itaque obstruantur quoad dimidiam partem vas sanguifera a sanguine quadruplo viscosiori, & tamen necessum sit, ut sanguis duplo velocius circuletur quam in statu sano, debent vires impendi 64. vicibus majores.

17. Vires quæ cordi movendo impendi solent in sanitate, sunt ad totas vires corporis humani circiter ut 1. ad 40. sic æstimante *Alustisimo Dan. Bernallii*; verum cum robur hominis sit limitatum, non potest majori copia constanter impendi magna pars virium in corde movendo, quin pari passu deficiat vis libera artuum, ita ut si ex summa 40 virium, deharantur 16. pro corde movendo, jam ratio virium: vitalium cordis sit ad vires liberas artuum ut 16: ad 24. fere ut 2. ad 3. adeoque vires liberas artuum proportionaliter imminui necessum est. Unde patet ratio cur in morbis inflammatoriis ægriaceant, a solitis liberis actionibus abhincant, & in dies debiliores evadant, ut diximus de febribus (*Class. II. 73. ad 78.*)

18. Vires requiritur ad eandem fluidi copiam in diversas altitudines projiciendam sunt ut illæ altitudines. Altitudo ultimorum vasorum capitis, dum stamus, est triplo circiter altior supra cor quam cum jacemus, adeoque eadem vis majorem sanguinis copiam impellit in caput, cum jacet ægri, quam cum stant sani, seu quod eodem recidit, sanguis in jacentibus majori impetu caput impetit quam in stantibus; unde vasorum capitis distensio, oppletio, dispositio ad somnum, ad capitis gravitatem, dolorem, quæ omnia in hisce morbis obduntur.

19. Delirium non raro accidit ex fibrarum medullarum cerebri commotione, cum quædam partes hujus organi præ aliis impetuntur, aut ejus vasa infarciuntur; verum ex aucto sanguinis impetu in cerebrum tum ratione positæ horizontalis, tum ratione vis cordis adactæ & directionis carotidum cum aortæ trunco commu-

nis, sanguinis impetus in caput majore est, adeoque posita dispositione inaequali partium cerebri, facile est intellectu tur plures in morbo acuto inflammatorio, cephalalgia, calore frontis, somnolentia, & demum delirio afficiantur.

20. Ex nova theoria afflictiuum in vasis exilissimis, prælongis & a mediocri viscidum propulsum accipientibus, quam mecum communicavi pro' los humanitate *Illustrissimus* *Dns. Bernoulli*, quantitates fluidorum quæ effluunt ex tubulis capillaribus intra idem tempus, sunt ut cubi diametrorum horum tubulorum, reciproce ut eorum longitudines, & directe ut vires fluidum propellentes; licet in tubis amplioribus non habita afflictiuum ratione illæ quantitates sint in ratione composita ex subduplicata varum & duplicata diametrorum.

21. Ex hac vero theoria quam multis experimentis confirmavi, sequitur quod si arteria exigua, v. g. bronchialis, cujus diameter est diametri aortæ pars 20., quæque proinde non nisi 400. sanguinis partem accipit, duplo majorem adificatur diametrum, ea non solum quadruplo majorem prioris, sed etiam octuplo majorem acceptura sit quam proximè sanguinis copiam.

22. Quæ cum ita sint, non mirerit si mutata quarundam arteriarum diametro, ita ut altera amplior, ceteræ paululum angustiores evadant, eadem vi cordis remanente, sanguis in unum viscus majori ruat impetu quam antea, & minori in cetera vasa ejusdem, quæ prius, capacitatis: aut quod impetus in determinatum viscus crescat in majori ratione quam in alia viscera. Notum autem est fibras circulares arteriarum musculari motu quandoque gaudere & haberi nervis ab *Illustr. Hallero* accuratius notatis circumdari, quarum iocerventu fibræ illæ contrahant laxari valeant, adeoque harum arteriarum capacitas aliquantulum minui, vel augeri, unde facile explicari potest cur absque eo quod cordis actio fortior evadat, tamen sanguis majori impetu ruat in certas partes præ aliis, ut in corpora cavernosa penis io libidinoso pathemate, in genas dum verecundia afficimur, & sic de aliis partibus.

23. Tam diversæ in Medicorum Lycæis circumferuntur inflammationis theoriæ, ut utram in partem se vertant Philatri plures ambigant; nullamque amplectantur ii qui minus auctoritati serviuot, suamque iudicandi facultatem aliquid habent in numero; oec mirum: cum enim inde veteres Medicinæ patres sanguinis raptum & fluxionem, hinc vero antistes per celebres sanguinis statum & congectionem incusant, viz licet debita antiquis reverentia ut contrariam proflus opinionem sedemur, nec novitatis amor ut antiquitas & exoletas sententias admittamus; anne his opinionibus anteponenda est quæ inflammationem a putrefactione deducit? verum pari jure fermentationem tribuendam reclamant Chymici; quantum itaque motus a quiete, raptus ab hærentia, Humoristæ a Chemicis, & illi a Mechanicis

discrepant, tantum inter se dissentiant inflammacionis ætiologiæ.

At nec sibi coherent etiam nuperorum hypothese quæ stagnationi & hærentiæ sanguinis ejus inflammatorium tumultum adscribunt; ab enim ex sola ista & legibus, quas mechanicas vocant, totum opus expeditur; alii vero motum in vicinis inflammatae partis adaugent, statim atque magicæ & præpotentes simul ac sympathia voces profuderunt, nullus est qui motum majorem sanguinis a mortice quadam potentia derivare dignetur, cum Mechanicum, ut putant, dedecet, non omnia phaenomena æmra partim dispositione deducere.

24. Inde profluerunt stupidae & inaudite prius motuum causæ, aut, ut ipsi vocant, mechanicæ & hydraulice leges, quarum potissimæ duæ sunt ad omnes fere morbos explicandos ipsis perneccellariæ; prima scilicet, membranas elasticas semel inflexas eo velocius ad pristinam statum respicere, quo magis inflexa fuerunt; etiam si vis premens & inflexioni eadem perseveret; altera vero est fluidorum ex emissariis diversæ amplitudinis fluentium velocitates absolutas, quæcumque sit motrix potentia, esse trifidis reciprocæ, seu et majores esse, quo angustiora et adnata emissaria & minores, quo majora. Acque sic supposita minimorum vasorum angustia, aut obstruccione, advocata in opem sympathia, vel prolatis hisce novis legibus sanguis coercitus majori impetu vasa atterit, dissendit, rubefacit, atque inflammationem producit.

25. Cum suo hac in re geoio indulgere, & a receptis opinionibus, nostrorum antistitem exemplo, recedere licitum sit, viginti enim ab hinc annis tantum fermentationem a solo deiectione ille mechaolismus, neminem ægre lacurum puto si alteram in medium proferam opinionem.

Semper ego auditor tantum, nunquamne responam. Mechanismus merum crepant Neoterici; mechanicas itaque leges a Præfata, Londinensium Scientiarum Academiis probatas, experimentis Nevvtonianis, Bernoullianis confirmatas sequi liceat: in his per celebres hujus Academiæ patres iter oobis præmonstrant: unum compello *Illustriff. Cibracium*, qui non solum Mathefeseos dogmata Medicis rebus applicuit (*Tibello de motu cordis*), verum & Medico Chirurgos, quos instituerat, Geometricis disciplinis prius imbuti jussit quam Medicinæ darent operam, & opus Mathematicum de animalium motu ab *Illustriff. Alphonso Borello* conscriptum publice in his Scholis doceri voluit: is enim summus Archiater, longa edoctus experientia, & acri quo pallebat iudicio, persuasus erat non feliciori methodo promoveri posse ærem medicam quam ea, quæ mechanicam, hydraulicam, astronomiam ad summum veritatis & simplicitatis fastigium evehit.

26. Novimus equidem multos esse quibus non accidit in physica Geometrarum scrupulosa sagacitas & rigor mathematicus; verum quo geoio ducti in problematis valde intricatis veri-

tatem sine mathematicis adjumento possint assequi non concipimus. Non acutus sentire & promptius intelligere datum est Geometris; sed composita phenomena sensum extricare, dividere, & parito examini subicere norunt, ita ut quæ conjunctim erant abstrusissima, foris facillima & simplicissima videantur.

27. Hoc iterum vulgares Philosophi vertunt vitio, quod Geometria in minutis & elementis timidius hæreant, nec statim ad nubes iter sibi faciant, sublimique volatu altissimas difficultates percurrant; verum ipsi caveant Syllogistici ne quo altius cereis innixi penus elati sunt, mox lapsu graviore ruant: sunt enim plurimi qui cum juvenili imaginationis impetu vagas & incertas opinionis regiones diu lustraverunt, jam sedato ingenii orgasmo spem veritatis assequenda profus abiciunt, & miseram Pyrrhonorum sectam, velut sacram anachoram, amplectuntur.

28. Tales sunt qui veritatem limis tantum oculis perspectam non audent prosequi; & cæcæ studio rimari, nec erronea principia;

*Qua juvenes didicerat, senes perdenda fatent:* adeoque unicuique ipsis est periculum quod vulpi fabulæ, quæ cum syrmae delicta foret, aliis in inutile pondus abjicerent in vulpino consilio suadebat. Hos si audias, omnes inanes sunt disquisitiones Philosophicæ; in theoria medica ultra certos limites producta omnes equaliter excipiunt, nec inter se contentium ipsi acerrimi veritatis indagatores Mathematici; porro unum est necessarium, veritatis inquisitioni valadicendum & praxi incumbendum est.

29. Verum qui praxim medicam sufficienti theoria non imbutus ageretur; is de corio humano ludere non erubescit; qui vero observationes, experimenta, cadaverum inspectiones, animalium vivisectiones theoriæ suæ adjungit, is & medicaminum vires & morborum causas clarius perspicit, finitivam ingenii sagacitatem Geometrica doctrina exacuat, quam si imaginationem tantum ducem sequatur. Plures sunt qui alio de nomine Geometrarum scripta fastidiunt, quod scilicet veritates nudas & abstrusas proponant, cum multo magis arideant fucata; & eloquentiæ ornamentis decoratæ etiam fabulæ: fateor paucos esse qui adinstra *Illustr. Astrucii* rigorem Geometricum purioris sermonis suavitare deliniant; alii cordatis scribunt, non quibusvis etiam stolidis placere fatagunt.

Omnia enim stolidi magis admixtantur amantque

Veraque constituunt quæ belle tangere possunt

Aures, & lepido quæ sunt fucata sonore. *Incert.*

30. Hoc unum addo, eos, qui mathematicas disciplinas despicunt & ignorant, nec certum in physicis comparare, nec præstantissima optimorum Medicorum, ut *Bellini, Poteatii, Keil-*

*lii, Furini, Michelotti, Hamburgeri, Schreibersi, Sylva, Morgagni, &c.* scripta intelligere possent, quo certe auxilio nullus delitui velit, qui semel vel primoribus labijs veritatem degustaverit.

„ Geometriæ & Arithmetices cognitioni suam diem adhibere, mi fili, neque solum vitam tuam gloriosam & ad multa in rebus humanis utilem, verum etiam mentem acutiorum & longe splendidiorem, ad fructum eorum omnium, quæ in arte medica usus fuit, consequendum reddet. „ *Hippocrates Theofilo filio suo.*

#### *Inflammationis Theoria.*

31. Quæcumque hominis pars calore intenso, molesto & dolorifico afficiatur, maxime si tensio, ruber & tumor simul adsint, ea *inflammata* dicitur, ejusque status Græcis *phlegma* a *phlegma* uro, *inflammatio* Latinis a sensu flammei caloris nuncupatur.

32. Si in eadem parte concurrant calor, rubor, tensio, dolor, sitque tumor sphaeroides, ac dolor pulsatilis; hæc symptomatum syndromæ *phlegmonæ* (a *phlegma* incendi) vocatur. Huc *phlyctæna*, *epiphyctis*, *furunculus*, &c.

33. Si vero calor, rubor, tensio, dolor & tumor absint, aut rubedo sit diluta & rosea a pressione evanescentes, mox reditura, dolor pungitivus, acer, deurens, & tumor superne planus, vix unam aut alteram lineam altus, hæc symptomatum syndromæ *Erysipelas* (ab *erythros* ruber) denominatur: huc herpes, ambustio, intererigo, &c.

34. Horum symptomatum nullum est, si *calorem intensum* excipias, quod in omni inflammatorum morbo, etiam in statu & vigore, possit vel ab ægro, vel a Medico observari. Si enim phlegmone sit in theca cranii, claustris pectoris, ossium medullis, nullum (excepto calore & febre comite, & modo delirium non addit aut sopor, dolore) potest sensu percipi. Quorsum ergo hæc syndromæ definiretur per tumorem, cum a potiori & constantiori symptomate peti debeat definitio.

35. Inflammatio quæ nec intensitate, nec extensione, nec numero notabilis est, inter *affectus* & *vitia* tantum numeratur, ut *furunculus*, *varus*, *termenthus*, *phlyctæna*. Aut si eorum symptomatum syndromæ sit intensitate, extensione, numero aut aliorum effectuum comitatus notabilis, hæc *morbus inflammatorius* vocatur.

36. Qui afficit internas partes vel externas; si internæ partes affectæ sint membranaceæ, oriuntur in necrobiosis *Phrenitis*; in pleura, pericardio, mediastino, *Pleuritis*; in ventriculo *Gastritis*; & sic deinceps; si vero afficiantur viscera, Græcis *parenchymata* dicta, oriuntur *Gnæche*, *Pneumonitis*, *Hepatitis* & *Nephritis*, &c.

37. Si demum externæ partes affectæ fuerint, datur *Pessis*, *Varicela*, *Rubeola*, aliique similes morbi.

38. Quanti itaque momenti sit inflammationis thesaurum verum nosse & perspicuum habere docent horum morborum numerus, *acutior*, gravitas, frequentia. Non itaque in tam serio & gravi negotio hypotheseos & ludicris signentis indulgendum, quibus otiosus nimis delectatur animus; aut anatomia, experimento & mathesi faciem præferentibus, in abditis horum morborum causas, difficile quidem, sed tutum iter quovis labore contandum est.

39. LEMMA. Si per sectiones transversas ductus vel alvei cujuscumque, sive flexibilis, sive inflexibilis, sive angusti, sive amplii, similis intra datum tempus fluat liquidi copia, velocitates huius fluidi erunt utique in sectionibus alvei reciproce: *Newton. Princ. 1. 2. prop. 36.*

40. Arteriosum alveum iuxta cor esse angustiorum quam in primis aortæ ramis, & angustiorum in illis quam in secundis, & in secundis quam in tertiis, & sic deinceps, probat mensura Anatomica. De venoso alveo idem didimus elio: *Vide Fig. 1.*

41. Eandem sensibilitate fluidi quantitatem quovis pulsi cordis transire per omnes alvei arteriosi & venosi sectiones B, CC, DD, EEE, &c. in statu permanenti circulationis vel velociori, vel tardiori, nemo negat qui circulationem admittit.

42. COROLLARIUM. Velocitas sanguinis, quo nomine & crassem & lympham intelligimus, est in diversis alvei arteriosi & venosi sectionibus eo minor, quo major est alveus, seu amplitudinem vasorum summa; eo major, quo summa minor est.

43. Docet experientia quod si sint duo tubuli inaequalibus orificiis præditi, idem fluidum eodem vi propulsam transmissuri, minor ab utroque transmittatur copia propter attritum, seu adhesionem fluidi cum parietibus, quam quæ ex orificio & velocitate deberet expectari; si nulla attritus haberetur ratio: *Mem. de l'Acad. des Sc. 1705. M. Gassé, p. 26. 275.*

44. Veram attritus quantitas æteris paribus est superficiei attritus proportionalis, adeoque effluxus diminutio major est, ubi major superficies.

45. Superficies vasorum, cylindricorum ejusdem longitudinis est in ratione composita diametrorum simul & numeri vasorum; docent Geometricæ.

46. COROLLARIUM. Diminutio transfluxus sanguinis per truncum est minor diminutione transfluxus per ramos, in ratione composita numeri truncorum ad ramorum numeros, & peripheriæ vel diametri truncorum ad peripheriam vel diametrum summam sumptam omnium ramorum.

47. COROLLARIUM. Diminutio transfluxus in truncis est minor respectu diminutionis in ramis tertii ordinis quam in ramis secundi, & in ramis secundi quam in ramis primi ordinis; quia, ut docet Anatomia, crescit numerus ramorum, quæ proportionem arteria prolongatur, in majori ratione quam crescit eorum capacitas. Sic mesenterica superioris ramus primi sit 21, ramus quartus

ei, qui intestina jam amplexantur, sunt 1200. seu 37 vicibus numerosiores, & tamen eorum alveus primorum sectione transversa non est quadruplo major, ut observarunt *Keil & Hales.*

48. Eadem tranat per truncum ac ramos sanguinis quantitas, (41) verum in ramis multo major est attritus, quam in truncis (46), & ratione attritus decrevit transfluxus quantitas (44); ergo necessum est ut transfluxus in truncis retardatur a resistentia in ramis oborta, magis quam a propria truncorum resistentia; adeoque si sanguis per truncos tantum apertos exiliet, is multo velocius efflueret, quam de facto fluit in ipsis non vulneratis.

49. Necessum est pariter & truncis transversim secto majorem dato tempore sanguinis copiam effluere, quam quæ ex ramis ejus omnibus simul apertis transiret, licet ante sectionem æqualis tranaret utrobique copia.

50. EXPERIMENTUM. Sint duo canes quantum fieri potest tobore & ætate æquales, secindatur secundum longitudinem alteri intestinalis tuba, ligata prius vel pressa mesenterica inferiori, & accipiat sanguis intra minutum ex arterioli omnibus sectis effluens; alteri vero secetur transversim arteria mesenterica superior, & exiciatur sanguis eodem tempore spatio emissus; vicequod major erit prior illa sanguinis quantitas.

51. EXPERIMENTUM. Canis vivi aortæ inferiori aptetur tubus aqua tepida continuo plenus ope amplissimi infundibuli, videbis intra breve tempus ita elui sanguine omnia vasa arteriosa & venosa, ut mesenterium niveum candorem acquirat; jam secindatur intestina tenuia, & ex pendulo ac pensata quænam transfluxus aque copia perspicio; dein secto truncis, vel prius sedis ramis ejus primi vel secundi ordinis, habebis quantitatem eodem tempore transluentem, & invenies eam minorem esse transfluxum ex arteriarum ramis simul omnibus, quæ ex truncis, triplo minorem, si primi, & sexdecies minorem, si ramis limbo mesenterii intestini consequtur secetur, & vigefies, si ultimi & minimi, qui in aversa intestinorum parte reptant, fuerint aperti.

52. Similibus experimentis evincitur nullam esse arteriam in animalibus, si pulmonariam excipias, de qua non sufficientia epta sunt experimenta, quam sanguis, aut saltem aqua tepida cruenta facilius tranat mesentericæ. Nil enim arterias, v. g. renales, perparum musculares, parum carotides tranat in experimentis insignitur.

53. Velocitas cujuscumque fluidi potest concipi velut requisa ex lapsum fluidi a quadam altitudine. Idem enim est quoad velocitatem, sive ea debeatur emboli prementis viribus, vel lapsui ex altitudine debita, unde omnes hydraulici velocitatem æstimant ex altitudine ad quam motu sursum verso aqua eadem posset assurgere, & ea altitudo eadem protius est ac *altitudo generis velocitatis: Mem. de l'Acad. parisi.*

54. Constet autem velocitates ejusdem fluidi di-



versus altitudinibus delapsis, aut diversis viribus propulsi, esse ut radices harum altitudinum vel virium. *Mém. dell' Acad. 1736. M. Pissot, Mém. des Pempes.*

55. Quiddam corpora movet vocatur vis, & corpora nulla moventur nisi a viribus obices superantibus, & non velocis eadem corpora moventur, nisi a majoribus viribus; fluidorum itaque velocitates omnes debentur viribus, & majores majoribus viribus. Errant itaque illi, qui, non adausa vi peliente, velocitates fluidorum intendi putant in emissario, eo tantum immixto, id est, audis etiam obicibus, quo errore non est in theoria medica cassior.

56. COROLLARIUM. I. Obstrucla alvei sanguiferi parte quacumque in extremis arteriis cussulsi ordinis, eadem prorsus remanebit in superfluo orificio, quæ prius erat, velocitas, nihil mutetur cordis vis; a corde autem totam, saltem in statu permanente, sanguinis velocitatem pendere demonstravit D. Michelotti *Prænat. 1. de separatione fluidorum.*

57. COROLLARIUM. II. Imminuto sanguinis alveo, vel aucto ex arteriis in venis emissario, minuitur ratio sectionis emissarii ad sectionem alvei in trunco aut ramis anterioribus; ergo (ex 39.) debet imminui ratio velocitatis in truncis ad velocitatem in emissariis, seu tanto minor evadet velocitas in trunco, quam in emissariis, quo sedio, seu apertura emissarii minor est apertura trunci.

58. COROLL. III. Obstruclis, v.g. ex 1200. ramculis arteriæ mesentericæ, 600. seu dimidia parte obturata, docet experientia etiam in vivis animalibus facta, & evincit ratio, quod dimidio minor est solito transfluxus quantitas, adeoque eadem quæ prius in his emissariis remanet velocitas; alii totus qui in ramis & truncis superioribus est sanguis per hæc tantum emissaria potest effluere, adeoque (ex 56.) duplo tardius transfluere debet. Negligimus hic augmentum velocitatis, de quo agemus infra.

59. COROLL. IV. Quantitas sanguinis per mesentericam arteriam in statu sano tranantis sit decima sexta pars ejus, quæ eodem tempore e corde in aortam transmittitur; hoc posito truncus mesentericæ potest haberi pro decima sexta parte emissarii aortæ; obturata itaque arteria mesenterica, velejus ramis omnibus, ratio trunci aortæ ad ejus emissaria adaugetur, sive major est una decima sexta parte ratio sectionis aortæ ad sectionem ramorum ejus; ergo (ex lemm. 39.), velocitas sanguinis in aorta respectu velocitatis in ramis liberis est decima sexta parte minor.

60. Nulla est arteria cussulsi ultimi rami omnes simul sumpti propter attritus, possint transmittere quævis vigesimam partem sanguinis quem transmittere posset truncus, si & rami & truncus seorsum aperti fuerint. (Experim. 50.)

61. COROLLARIUM. Orificia vel emissaria officina testantur majora vel minor pro quantitate fluidi ea tranantis intra datum tempus, modo vis fluidum premens eadem sit. Nulla et-

iam alia ratione variare potest effluxus quantitas, cum ergo idem tempus, eademque vis premens adhibetur, quantitas fluens est ut emissarium.

62. COROLL. Ergo res eodem recideret quoad quantitatem sanguinis vasa tranantem, si vasa simul sumpti ampliores sint truncis, sed attritus obnoxii, sive rami, ultimi patenter in venas orificio seu emissario, quod truncorum amplitudine vigesies minus foret, & attritus expers.

63. Embolus est corpus quod in vasa fluida vehendo destinata ejusdem prorsus figure ac diametri interioris, propulsam, fluidum in vasis contentum ulterius pellit, & promovet, cum sufficienti vi ipse promovetur.

64. Sit (Fig. I.) A, B, C, D, aquosa ramosa fluida plena intra quam ex A in B. immittatur embolus E: 1. Evidens est massam fluidi cylindro A B, vel spatio ab embolo occupato æqualem necessarium tranaturum esse, sive embolus ille sit durus, sive columna ipsiusmet fluidi emboli vices gerat. 2. Patet etiam quod columna fluidi prius in A B posita eadem prorsus præcedat velocitate, quæ basis emboli subsequitur. 3. Liquet etiam columnam fluidi e trunco expulsi, eo minore in ramis ejus B C longitundinem occupaturam fore, quo rami illi bini simul sumpti trunco suo capaciore fuerint. 4. Quod idem obtinet in ramis secundi ordinis C D, respectu trunci sui B C, & sic deinceps. 5. Quod eadem prorsus ex emissariis E E omnibus simul effluet fluidi copia, quæ ab embolo A B fuit propulsa, quæque volumine æqualis est volumini ipsius emboli. 6. Si pari passu crescit emboli volumen & basis, qua dilatatur vas, non mutantur prius assignata phenomena, quandoquidem diametrum vasorum indeterminatam assumptum, & illas majores ut in diaetole, vel minores ut in systole supponere potuissimus. Unde vanum est perfunctum eorum qui diametros vasorum utpote varias computo se subducere clamant.

65. His positis evidens est quod sanguinis columna in quolibet vase contenta, (velut in CD) sit embolus respectu fluidi in ramis ejus (D E) transmittendi, quod cætenus procedit, & truncum subit, quatenus locum ipsi facit fluidum ramulos pasulos ingreditur: si itaque ramulorum alteruter sic obturatus, vel sit nullus; tunc impossibile est hunc embolum progredi, nisi totus liquor in eo contentus per residuum tubum (D E) trajiciatur, & in hoc casu velocitas fluidi trajecti erit ad velocitatem emboli sequentis, ut basis emboli ad basin columnæ fluidi, seu orificii emissarii; ut autem vas sensibilibus lateat, requiritur vis fluidi adausa.

66. Obex dicitur corpus quod velocitatem in se recipit, & partim vel ex corpore destruitur; unde evidens est quod columnam sanguinis in vasis præexistens obex est sanguini de novo immisso. At si columna sanguinis in vase præexistens ita vasis parietibus adhæreat, ut nequeat ulterius promoveri quin vas secum trahat, tunc temporis obex est non solum ut moles hujus columnæ & vasis, sed ut moles requisita ad solvendum & trahendum.



Fig. 1.




Fig. 2.






Fig. 3.





trahendum vas. Sit v. g. pondus quod requiritur ad lacerandam arteriolam æquale viginti libris, grumus sanguinis huic vasi adherens, ut hoc possit avelli quin laceretur vas, æque resistit ac moles viginti libris æqualis. Si itaque vis sanguinis datum vas subeuntis major non sit hoc pondere, datur obex huic vi insuperabilis, res eodem recidit, si arteria sit ligata, vel quoquo modo conficta.

67. Cum omnis obex in quoque constitutus sit, veluti moles movenda, & resistit vi suæ tantum inertiae, si columella sanguinis quovis pulsu cordis eum impetat vi viva, utur exigua, debet moles resistens eam velocitatem expicere, quæ sit quotus quantitatis motus in columella contenti per massarum summam divisæ: sit v. g. velocitas columellæ sanguinis unius pollicis intra secundum, lamella ejus prima æqualis uni grano, moles vero movenda æqualis quoad resistentiam decem libris, velocitas post impulsam a corde sicutum erit in obice æqualis  $\frac{1}{10}$ , parti pollicis intra secundum ex legis motus. Et quoniam vis cordis intermitte in vasorum systole, tunc temporis elastica vis vasis distracti, & aliquatenus elongati resurgit, & obicem 760. parte lineæ remotum pristino loco restituet.

68. Ex hoc ita & reditu vasis, cordis ictibus distracti, & elatere restituti, sit attritus vasis & sanguinis contenti, qui eo majorem calorem excitat, cæteris paribus, quo densius & spissius est fluidum inibi contentum; nam calor ex attritu corporum diversæ densitatis est eorum densitas, docente Hermannii Phoron.

69. Velocitas contractionum cordis est in ratione composita ex subduplicata virum illud momentum, & simpla amplitudinis emissariorum sanguinem ex arteriis in venas transmittentium.

1. Vires corporum inter se sunt ut effectus ab illis præstiti, seu ut moles quæ moventur, & velocitates simul; adeoque vis cordis æstimari potest ex sanguinis ejectionis mole, ac velocitate, verum fluidum datum orificium tranans moles crescit & decrescit in eadem ratione qua velocitas; vis ergo qua cor contrahitur, & expellit sanguinem, est in ratione duplicata velocitatis sanguinis, adeoque velocitas sanguinis e corde ejectionis est in ratione subduplicata virum cordis. Verum crescit aut decrescit hæc velocitas, qua proportionem solidi cordis parietes locum a sanguine occupatum subeunt; & quo velocius subeunt, seu contrahuntur, eo velocius sanguis loco cedit, & in arteriis projicitur; ergo velocitas etiam contractionum cordis, cum sit in eadem ratione, qua velocitas sanguinis e corde ejectionis, est etiam in ratione subduplicata virum cor contrahentium.

2. Velocitas columnarum sanguinis pro diversis arteriarum orificiis, seu emissariis, diversa est; nam velocitas embolorum est emissariis reciproca, quoties orificia effectiva emissariorum minora sunt quam bases embolorum. Si dubitas consule aquilages, vel tenta experimentum sequens.

70. Sit syringa cum embolo suo, qui optela-

teris, vel proprii ponderis aquam, aut fluidum quod vis ex tota syringis cavitate intra datum tempus expellat per orificium cognovit jam vero fiat orificium duplo minus, attendendo ad attritus, ratione quorum orificia majora magis transmittunt, quam in ratione amplitudinis, & videbis quod eadem vis adhibita non nisi intra duplum tempus eadem syringem fluido exhaurire valeat.

71. His positis, quanto minora fuerint minorum vasorum emissaria simul sumpta, tanto minor erit in truncis sanguinis velocitas; verum velocitas contractionum cordis, si isdem orgeatur viribus, est ut velocitas sanguinis in truncis præexistens; ergo quo minora sunt sanguiferorum emissaria effectiva, eo minor, & quo majora, eo major est contractionum cordis velocitas: quod erat probandum.

72. COROLLARIUM. Si eadem sit vis contractionis cordis, & diversa sit emissariorum summa in alvei sanguiferi parte angustiori quaerenda, erit velocitas cordis folio minor, vel folio major, pro ut minor vel major erit hæc emissariorum summa; adeoque obstructa dimidia ramorum aortæ parte, dimidio tardior erit cordis contractio, vel dimidio minor intra idem tempus erit ejectionis in aorta sanguinis quantitas. Quod qui negant, illi in hydraulicis cunctis errant.

73. Errant itaque illi qui contendunt vires cordis & arteriarum dari obstructionibus, non vigere solum, quin etiam ex resistentia in arteriis sanguineis, lymphaticis, obstructis, plurimumque tensis suborta, intendi.

74. COROLLARIUM II. Si laxa otibus, diutiusque fluxior, seu minus viscosæ vadat sanguis, nec tamen ab his defereat vis cordis contractiva, tunc minor, erit attritus ubique; sed res eodem recidet ac si orificia effectiva omnium vasorum ac præsertim minimorum paulo magis accederent ad truncorum amplitudinem, adeoque idem est ac si nativæ solverentur obstructiones: unde crescit sanguinis in truncis, & cordis ipsius velocitas.

75. COROLLARIUM III. Si immutatis quavis de causa arteriarum emissariis, velocitas contractionum cordis & sanguinis in truncis eadem remaneat, quæ ante obstructiones, necessum est ut vires cordis audeat fuerint, & vires cordis adaggeri tunc debent ut ratione duplicata inversa emissariorum: obstructa dimidia orificiorum parte, dimidio minor erit ex arteriis in venas transfusus sanguis, ac proinde velocitas emboli cujusvis (64. n. 5.) jam vero nisi duplo major evadat velocitas in emissariis, non poterit eadem sanguinis quantitas venas transire, quæ prius eodem tranavit tempore, nec potest duplo major esse in emissariis velocitas, nisi vis quadrupla pellat embolum. (Vide demonstrationem in Mem. de l'Acad. 1735. Mem. sur les Pompes.) Et si velocitas in emissario duplo major sit, duplo major eodem tempore tranabit fluidi quantitas; sed velocitas in embolis est ut quantitas ex emissariis fluens, adeoque si duplo major evadat quantitas fluens ex emis-

fieri, (seu æqualis evadat quantitati per omnia simul) vasa libera fluenti, ) duplo major evadet sanguinis in truncis velocitas, quod sine vi quadrupla fieri non potest; interea tamen eadem erit, quæ in statu sano pulsum velocitas.

76. COROLLARIUM. Ratum itaque & si-  
rum hoc maorat, quod positis obstruccionibus,  
& eadem sanguinis densitate ac consistetia, im-  
possibile est non imminui cordis & pulsum ve-  
locitatem; & si tunc temporis eadem persistet  
cordis & pulsum velocitas, impossibile est vires  
cordis non adauctas fuisse in ratione dupli-  
cata directa obstruccionis, seu inversa duplica-  
ta emissarii superfluitis.

77. Velocitas cordis ab obstruccionibus minuitur  
magis vel minus, prout major vel minor retine-  
tur sanguinis transfluxui quantitas. Sic si  
decima sexta pars sanguinis a corde ejedi in  
quavis sytote tranet arteriam mesentericam su-  
perioiorem, cum, ejus obstruccionis truncus una de-  
cima sexta parte, minuatut sanguinis in cor-  
de, in carotidibus, subclavis, aortæque descen-  
denti, velocitas, tantumdem decrevit cordis  
velocitas. Ali eadem sanguinis quantitas trans-  
ire debet ultimos ramos, sive rubros, sive lym-  
phaticos & serofos simul sumptos, ut docet Ana-  
tomicæ, ergo obturatis omnibus simul arteriæ  
ramis, idem accidit ac obturato truncu.

78. COROLLARIUM. Si arteria mesente-  
rica det viginti ramos primi ordinis, & quilibet  
ramulus viginti vascula lymphatica, obstruccioni  
viginti hinc lymphaticis, non magis obstruitur  
arteriæ alveus, quam si unicus ramus tertii or-  
dinis obstrueretur, qui in hypothesi est  $\frac{1}{1000}$   
pars totius trunci; adeoque si sint glandulæ ex  
lymphaticis potissimum constata, fieri potest  
obstruccionis molis notabilis, quæ tamen non sen-  
sibilem velocitatis partem cordi & pulsi ad-  
imat, utpote quæ non centesimam sanguinis per  
alveum arteriosum transfluxuri partem sistat.

79. Cum notabilis datur alvei sanguiferi obstru-  
ccio, non raro numerus pulsum intra datum  
tempus adaugetur, doceat tantum experientia.

80. Ubi datur pulsum intra datum tempus ma-  
jor solito numerus, ibi datur frequentia pulsu,  
quæ eadem est in corde ac arteriis, quæque sup-  
ponit repetitas cordis contractions: raro au-  
tem accidit in febribus acutissimis, ut numerus  
pulsum duplo major evadat quam in statu sano.

81. Si officina cordis arteriosa immutabilia  
sint, velocitas sanguinis in aortam ejedi intra  
minutum est in ratione composita ex ratione  
velocitatis, & ex ratione frequentie pulsus;  
nam velocitas sanguinis a corde ejedi est pro-  
portionalis velocitati qua parietes cordis ad se  
invicem accedunt, ita ut quo altius contrahun-  
tur, & quo minus tempus ad hanc singulam  
contractionem adhibent, eo citius evacuantur  
ventriculi, eo velocius sanguis in arterias eji-  
citur; verum sub pari contractions ejusvis al-  
titudine, & duratione, seu velocitate, si intra  
minutam temporis sunt duplo plures similes con-

tractiones cordis, ut si pulset cor 140. vicibus  
quod prius 70. pulsabat, evidens est toties, seu  
duplo majorem fore sanguinis aortam subeuntis  
velocitatem. Quod erat probandum.

82. COROLLARIUM. Velocitates sangui-  
nis in aorta erunt quadruplo, noncuplo ma-  
jore solito, si frequentia simul & velocitas du-  
plo vel triplo major evadat: alii erunt sextuplo  
maiores, si alterutra duplo, & altera triplo  
major evadat: & erunt constricti æquales, si  
tantumdem decrescat velocitas pulsus, seu ejus  
altitudo, quantum crescit frequentia; ac de-  
mum velocitas sanguinis erit in arteriis solito  
minor, si crescat frequentia pulsum cordis in  
minori ratione, quam decrevit ejus pulsum  
altitudo; ergo ex pulsus frequentia sola, non  
habita ratione altitudinis, non potest æstimari  
velocitas sanguinis in arteriis.

83. COROLLARIUM. Vis cordis est ut sangui-  
nis ejedi duplicata velocitas; adeoque in  
ratione composita ex duplicata frequentia &  
velocitatis pulsum.

84. Labor potentie motricis æstimatur ex vi-  
ribus quas exerit, & ex duratione operationis;  
*Hydrodyn. sect. 9.*

85. COROLLARIUM. Labor potentie mo-  
ventis est in ratione composita ex duplicata ve-  
locitatis, duplicata frequentia pulsum, & ex  
laboris duratione.

86. Non debet confiteri impensa virium po-  
tentie cor moventis inter durationem morbi,  
& durationem vite sanæ, quia in vita sana,  
non autem in morbo, vires a corde expensis  
quotidie & pluries in die integre reparantur;  
virium impensa quæ pluries intra breve tempus  
restituitur, vocatur *Exercitium*; ad quæ pari pas-  
su non reparatur, & ex qua proinde actu de-  
bilitatur animal, vel potentia motrix, *Labor*  
vocatur. Hinc intelligimus eum qui febre af-  
ficatur, non metaphorice, sed proprie *labore la-  
borare*, ut antiqui Medici recte sentiant.

87. Vita in animalibus supponit vim motri-  
cem superfluentem, & huic proportionem respon-  
det vigor functionum.

88. In animalibus potentiam motricem, tum  
actuaalem, tum habituaalem, esse certis terminis  
circumscripam docet lassitudo, quæ ex labori-  
bus quotidianis paululum intestinis supervenit,  
& demonstrat mors senilis, quæ vires omnes  
motrices exhaustas evincit; jam si tantumdem  
virium accederet corpori, quantum labore tum  
cordis, tum musculorum, quotidie absumitur,  
potentia motrix eadem semper foret & peten-  
nis; cum autem & virium gradu & duratione  
finita sit, quo majus erit dato tempore ejus dis-  
pendium, eo major debilitas.

89. Quo major est labor tum vitalis, tum vo-  
luntarius, eo majus est virium dispendium; la-  
bore enim plus absumitur quam reparatur, po-  
tissimum vero a labore vitali, seu ab adaucto cor-  
dis & vasorum motu; quia virium vitalium im-  
pensa solito major, cum nodu interduque fiat,  
nec corpora quiete ac somno reparantur actu-

rae, ea multo major est quam impensa virium quae sit a laboribus voluntariis, cibo, potu, quiete, somno, intermissis.

90. Eatenus vivit animal, quatenus ejus potentia motrix sit est vegeta ad diversas, quae circulationi opponantur, resistentias superandas, seu ut in medio resistentiae circulum sanguinis sustineat; verum cum illae resistentiae constantes sint, immo vivendo augeantur a fluidorum spissitudine, & solidorum rigescencia; requiritur ad vitam sustinendam determinata potentia, & exigua quaecumque non sufficit. Quo majores itaque sunt resistentiae, ac in sanguiferorum obstruccionibus, eo majus & praecipitiosius est mortis periculum.

91. Quo major itaque est labor vitalis, seu vita magis actiosa, functiones vitales magis vividae & laboriosae, eo citius decrevit potentia motrix, & ad illum accedit gradum, qui resistentiae circulationi oppositis superandis impar est, quo facto mors est; hinc causam mortis validis & diuturnis febribus supervenientis, necnon lethi fenilis quisque potest intelligere.

92. Quo labor est major, eo magis vires deterit; quo labor est diuturnior, eo magis vires exsolvit; adeoque febris, quae (ut alibi demonstratum est) labor est, periculum vitae portendit in ratione magnitudinis suae ac diuturnitatis. Est tamen in hoc casu terminus maximus, quem diuturnitas cum deto vigore transgredi non valet, Geometris determinandus.

93. Hinc intelligitur quare quo minori motu donantur eruae in nymphas conversae, locis scilicet frigidis detentae, eo diutius vitam suam protrahunt; quae papilionum latram induta, quo vividiori motu exagitantur, seu vitam magis actiosam vivunt, eo citius fato funguntur. Nymphae enim ad plures annos, aut papilioes vix ad aliquot dies, vitam protrahunt. Vide *D. de Ranaum de insectis*, *D. Rivet de longevitate*.

94. Sequitur etiam eo majorem esse, vel minorem vitam, quo majores vel minores exerunt vires motrices, ut in febribus inflammatoriis, est tanto majus fieri virium detrimentum, unde ceteris paribus majus periculum.

95. Adeoque si potentia motrix cordis sit intelligens, & conservationi corporis intenta, ea debet tunc tantum vires cordis majores exercere, cum hujus conatus ope potest materiam morbificam circulationi oppositam destruere, vel debellare; & cum nulla urget causa morbifica, debet esse vires vitales quam minimae, modo ad resistentias confectas valorum & fluidorum superandas satis sint.

96. In statu sano potentia motrix minimam suarum virium partem expendit, & est maxima; in statu vero morbofo maximam, & evadit (in agone) minima.

97. Pulsus enim in sanis, de continet observatione, nec aequae frequens, nec aequae durus, nec aequae magnus est, ac in febris augmento & statu, ubi potentia motrix nondum multum est commota; sed in sanis potentia motrix est in-

tegra; quaeque multo majores exercere possit vires, quam quas actu in sanis exercit ergo in statu sano potentia motrix minimam suarum virium partem expendit, & est maxima.

98. Quo diutius procedit febris, vel morbus acutus inflammatorius, & quo fortior est, eo minor evadit potentia motrix, usquequo in agone, seu ultima lucta deficiat; verum si confertur pulsus febricitantium cum pulsu sanorum, prior est, pro statu potentiae motricis, multo fortior, plenior scilicet aut frequentior, vel durior, adeoque potentia motricis superfluit est pars tanto major, quo potentia minor est; ergo in statu morbofo potentia motrix, atqueque solito minor, & demum in agone minima, majorem suarum virium partem, ac deinde maximam expendit: quod erat probandum.

99. Data obstruccione notabili alvei sanguiferi, notabile imminet periculum, cum necessario multum retardatur in omnibus majoribus vasibus circulatio, adeoque languent omnes functiones a circulatione dependentes, ut videre est in summo senio, in animalibus frigore congelatis.

100. Verum quoniam sanguis quadrupedum & hominis non potest nobiliter retardari in corpore, quo, defectu expurgationis, putrefactio, ad quam praeus est, intendatur, & putrefactione nil est pejus, nil conservatori magis contrarium, ut docet spheacelus: ergo obstruccioni alvei sanguiferi data, imminet summum vitae periculum, quod viperis, serpentibus, testudinibus, nymphis erucarum non accidit, quia pingui quodam moco conduntur, & a putredine diutius servantur eorum humores, ut docet experientia.

101. Pater inde obstrui posse magna valorum lymphaticorum, & adiposorum glomeramina; sine notabili periculo, quia 1. quam minima exinde alvei sanguiferi pars obstruitur, (ex 39.) 2. quia diutissime sine putredine servantur ea fluida, ut patet ex adipe culinario, qui sine condimento ad annos servatur, & ex tumoribus scirrhosis, steatomatosis, quos vix putrefactionem exspiratos observavi: *Consulatur Boerhaave, Chem. tom. 2. & Stahl. Dissert. &c.*

#### De Symptomatis Inflammationis.

102. Ea sunt quadruplicis generis; vel in functionibus animalibus, ut dolor, agrypnia, anxietas; vel in functionibus vitalibus, ut febris, dyspnœa; vel in exercitiis, ut puris fluxus, si ad augeatur inflammatio vulneris, ulceris; vel demum in qualitatibus vitiatas, ut calor, rubedo, tumor, tensio, &c. paucissima ex his expendemus.

#### De Calore.

103. A particularum ignearum vi & impetu in fibras nervas calorem pendere norunt nuperi Physici *Gravesande, Muschenbroek, Humberger* & adeoque calor ceteris paribus est, ut ignearum particularum quantitas in corpore, & ut earum duplicata velocitas; exhalato vapore calidissimo ex mixturis plurimis, licet hæc mix-

vorae vehementius agitentur, frigent tamen, ut docent experimenta *Boerhaaviana*. *Florentina*, *Hamburgii*, *Gessfey*. (2)

104. Sanguis humanus particulis igneis scaturit. Globuli purpurei exsiccati ad ignem flammam concipiunt, lymphatici non item; homini funibus fericeis iugulento & electrica vi imbuto, si alterius manus admota fuerit, scintillae ignem cum crepitu & dolore utriusque, & contactus pascito vibrantur in experimentis *D. Gray*, *Dufay*. Affricus faciei, indusiorum succulsi, scintillae etiam exstantur.

105. Quo frigidiora sunt corpora calidis admota, & quo densiora, eo maiorem ignearum particularum copiam abripiunt, docet *Hamburgii* in *Physic*. adeoque calor in diversas ejusdem corporis partes continuo ex calidioribus diffunditur usque ad aequilibrium: immo ea ratione se diffundit aliquantulum in ambientem aerem unde atmosphaera calida animalium.

106. Calor hominis duplici de causa crescit, aucta ignearum particularum copia: quod praestat ignis focarius, solaris, catoptricus admodum, vel corpora actu igoica, calida applicata, vel ingestis alimenta, medicamenta, venena igoica particulis scatentia, ut spiritus ardentres, salia alkalina fixa, acida igne retortae oppressa, olea empyreumatica, aromatica acrida, lapides caustici: huc ammosphaera, thermas, caldaria, insolatior.

107. Altera causa caloris spontanei, seu intus oriendi, est particularium ignearum motus adauctus, qui debetur viribus mechanicis, seu ipsius sanguinis & solidorum attritu, maiorem his velocitatem concilianti, adeoque vim caloris intendenti, ut patet ex manuum confricatione; vel etiam caloris augmentum ex eo fit, quod nancitur in contactum vel in se mutuo liberius tendant ignem particulis alijs causis extrinsecis, & expeditius ruant in se mutuo ut inter duorum ellychniorum flammam fieri vident *Physici*. Crescit enim ille impetus in eadem lege qua corporum gravium celeritas.

108. Calor ex secunda causa (107.) crescit in ratione velocitatis duplicata, in corporibus diversis velocitate attritis, demonstrante *Hermanus* in *Ehrenomias*; nec non sub diversis eorum densitatibus, si par sit ignis copia, crescit in densitatem ratione: adeoque in corpore ubi major celeritas, densitas, & humorum acrimonia, ibi maximus calor; ubi densitas & humorum acrimonia sunt celeritatem reciprocas, ibi aequalis forte calor.

109. Labore excitari homogeneum, validum & constantiorum homini calorem apprimere norunt operarii, quia sanguini major velocitas, major solidorum attritus conciliatur; aut ubi major simul compressio, & renixus fluidorum & solidorum,

ibi calor intensior, ut in natibus equitatum, pedibus viatorum, manibus operariorum; qui calor quandoque inflammatorius evadit; & agitationem vivam animi pathematica inferno, ut ira, gaudium, furore, calor pariter intenditur.

110. Si qua proportione crescit velocitas, eadem decrescit partium densitas & fluidorum cohesio, calor crescit in minori ratione quam duplicata velocitas, quod in homine accidit; nam solida, fluidaque calore rarefcunt, & simul intra certos caloris gradus tunc vasa ampliantur, tum fluida fluxiora evadunt, quod experimento sequenti fluxus tentato didici.

111. EXPERIM. Orificio receptaculi aquae continuo pleni apertur intestinum vel arteria quae aquae copiam dato tempore transmittat; si aquae sit temperies ad gradum 4. thermom. *Reaumuriani*, id est, congelationi proxima, vel si sit ad gradum 80. id est, ebullitioni proxima, minor multo copia tranabit quam si sit ad gradum circiter 32. vel 33. Sic eadem copia effundebatur frigida intra 246. secundae ac calidae ad 33. gradum intra 186. secunda. In vasis vero ferreis & aeneis quo calidior est aqua, eo velocius fluit, & uberius, aut in corpore humano non ita, propter fibrarum crispationem a calore quadragesimum gradum superante factam.

112. GOROLL. Molestus est quidem qui in morbis inflammatoriis oritur calor, aut cum gradum 40. nunquam, ni fallor, superet & 28. major sit, sanguinis fluxilitate, morbosaeque materiae resolutionem, & vasorum dilationem simul adaucta, transfluxum javat admodum.

113. Determinatio gradu caloris incubatae germinant tum ova animalium, tum ova plantarum; norunt *Physici*. Aut alia vel majori caloris gradu indigent, alia calore diutius applicato, ut gummi, resinae ferius, octus in illo, vel hoc caloris gradu solvantur. Lympha ovuli humani fecundati, velut accepto suo menstruo, liquefit applicato per novem menses humano calore qui ad 28. vel 30. gradum accedit. Ova gallinae per 21. dies calore gallinae paulo majori, vel calidiori ad 37. gradum incubantur. Ova crucurum intra septimanam, si humano calore foveantur, aut ferius, si atmosphaerae calore ad 18. gradum sint incubata.

114. Numquid materies philophtica vasis impleta pro diverso morbo diversimodum habet idoleum, ita ut variolosa intra quingecim dies, morbillosa intra quinque circiter, sufficientem fluxilitatem adipiscatur: furunculi una aut altera die maturantur, bubones pestiferi citius quam syphilitici, tardissime & vix intra pueritiae limites schrophulosi, nisi dissolvens aptum, ut syphiliticis hydragryum, apponatur.

212. Ex dictis haecenus liquet caloris gradum

ex

(1) Si aerem destillatum sibi volatili sanguinis miscetur, miscele ebullit insigniter & refrigerat. *Stare Transfusi* aceti distillati sequipartito salis mercurii sublimati corrosivi, & salis ammoniaci libras, mixtura agitata fuit, & tamen ad gradum usque friguit. Osmia salia alkalina volatilis ex animalibus mixta cum aqua in solutionibus multa frigoris producant. Osmia olea plantarum essentia idem cum spiritu vini faciunt. Ecce phenomena in quibus caloris intensio motu decrevit calor; ergo causa caloris non est motus incessans, si desint igne particulae.

ex attritu oriundum crescere, ut labor, vel ut actio sanguinis in vasa; actio vero corporum, aut ut aptius dicam, collisio crescit ut velocitatis respectu quadratum, ut silius dicemus, adeoque quo velocius sanguis impingit, aut fortius nitetur in vasa, quoque simul velocius vel fortius vasa in sanguinem reantentur, eo calor erit intensior; nam velocitas respectiva, cum corpora in se mutuo feruntur, est ut summa velocitatum utriusque corporis.

116. Si lymphæ ex hominis sani crure secedens calori aquæ ebullientis vel minimo tempore sit exposita, ea cito coagulatur & albescit ut albumen ovi, inde plurimum in mentem venit lympham a pleuriticorum sanguine secedentem, & similiter coagulatam, a simili caloris actione suam coagulationem accepisse; interea tamen hoc est discriminis quod certe multum abest, ut calor pleuriticus ad eum gradum deveniat unquam, qui albumini ovi coagulo necessarius est, nunquam enim calor in pleuriticis crure ad 40. pertingit, cum ad ovum coagulandum requiratur gradus 87. vel saltem 66.

117. Lympham hominis sani diversis experimentis subjeci, & inveni quod quo diutius calori 40. gradum superanti fuit exposita, eo minori gradu caloris, sed 50. superante, deinceps statim coagulatur; forte experimenta licet adhuc rudia apponerent inutile non erit.

6. Die tertia Martii 1740. lymphæ hodie extracti sanguinis ex viro septuagenario, febre & dolore lateris affecto, coagulata est affusa aqua calida pari copia ad gradum 65. Therm. Reaumur.

7. Aqua calens ad gradum 53. affusa pari quantitati lymphæ ad gradum 6. mixtura incaluit ad gradum 25. sine coagulo. Nota quod debebat mixtura incallescere ad gradum 29. juxta regulas communicationis motus hic congruas; verum pars caloris tum in aëre ascendendo, tum in vasis parietes densiores abiit.

8. Jam eidem mixturæ ad gradum 22. calidæ affundo aquæ bullientis, seu ad gradum 87. unam tertiam partem; mixtura incalescit ad gradum 33. sine coagulo.

9. Jam simili mixturæ ad gradum 30. calidæ affundo partem aquæ bullientis copiam, mixtura incaluit ad gradum 49. sine coagulo.

10. Similem mixturam ad gradum 49. calidam infundo pari copię aquæ bullientis, totum albescit & descendit ad grad. 71.

11. Quicquæ partes mixturæ, quarum una lymphæ, altera aquæ, ollæ immixta, igni suppositæ sunt per gradus vividiori, & cum ad gradum 75. pervenit aqua, albescit, cum ad 65. thrombus lymphæ coagulatus efformatus est.

12. Martii lymphæ sani hominis tubo vitreo excepta, aquæ ad gradum 64. deinceps exposita, concrevit.

13. Aquæ partes trigiota & una feri sanguinis a quatuor diebus educti frigebant ad grad. 10. & igni expositæ ad grad. 40. spumam albam

ejecerunt, sed non albescere cepit mixtura nisi ad 55.

14. Lympham rubellam in tubum vitreum infundi ad pedis altitudinem, tubus inferne erat hermetice clausus qua parte in ollam aqua plenam immisus est, tuacdemum albescere cepit cum ad grad. fuit 75. nullas vero bullæ in lymphæ superficie elevatæ sunt, & volumen illius quadragesima parte crevit. In hoc experimento compertam lympham igne concretam rariorem & leviorē aqua feri; quæ dum liquida, aquæ fundum constantem petebat.

118. Miror certe quod in corpore pleuriticæ lymphæ ad gradum 40. coagulatur, quæ in experimentis nunquam infra 55. albescere visa est. Suspicio in morbis quibusdam inflammatoris quoddam in corpore enatum singulare miasma, vel quid simile, cujus ratione, potius quam caloris gradu, lymphæ coagulatur. Sic spiritui vini frigidi coagulatur illico; sic in rheumatismo, licet calor confectus vix major sit, multo altius est sanguinis coagulum quam in peripneumonia fortissima, mollius tamen; sic a viperæ caudiforæ morfu sanguinis lymphæ mire coagulatur, ut testes oculati scripserunt; sal volatilis parum sanguinem coagulat; sal volatilis oleosus in grumos vertit ex *Borhaavio* cruror coagulatur etiam, teste *Piscarnio*, a succo cicutæ, atropæ, sale fixo roris marini, pulgii, niellori &c.

119. Cum sanguis ad certum putredinis gradum vergit, ut in morbis malignis, in erysipela, non raro sanguis, utcumque calori intente expositus per septimanas, non coagulatur, immo qui morto accedente coagulatus est, putrefactione, post aliquot dies superveniente, liquefit; pars enim mucilaginosa putrefactionis motu nimium fuit dissoluta.

Verum existimandum non est illum in pleuriticis vasis grumam similem ei eruisse coriaceam, quæ oblevat sanguinem in patella positum; certe circulatio cito sufflaminaretur; vivunt autem & coalescunt e pleuritide, rheumatismo, plurimi quorum sanguis in vasis superflus est ad coagulationem densissimam dispositus, & e quibus hanc pravum crurem qui vellet exhaurire ægrum jugularet.

120. Calore expanduntur omnia corpora in ratione suæ densitatis reciproca, & in directa gradus caloris suscepti. Maximus gradus caloris qui ab aqua & ab ipso sanguine retineri queat est gradus 87.; interea tamen vix ejus volumen una quadragesima parte crescit; adeoque ab alia causa, vel simuli, vel seorsim agentur etiam inflammatorius, volumen partis multo magis adaugens, repetendum est.

121. Calore mutatur crasis lymphæ; intima textura, crassities molecularum ejus; unde color ex pellucido in album, velsubdavam abire potest, & feri exhalatione consistētia potest intendi, ac acrimonia putredinosa crescere; unde non mirum si inflammationis non raro pari preventus succedat, cujus quidem gene-

lum



sim pressioo sanguinis & vasorum multæ, horumque detrimento mechanico grajis alii tribuunt, laudibus tamen pluribus dignissimi, quod artem salubrem promouere niantur.

122. *Nota.* Calor corporis humani quiescentis est ad calorem summo exercitio adauctum ut 184. ad 288. *Derham Theolog. Phys.*

*Augusti.* 20. 1740. in memetipso obliuivi pariter calorem urinae in statu sano esse ad 32. gradum, ut calor oris, axillæ, &c. & in statu febrili cum palmarum pedum aduri mihi videretur, calor eorum non ultra 31. grad. ascendebar, aeris calore ad 19. gradum constituto: molestias caloris crescit in maiori ratione quam caloris intensitas.

#### De Rubedine.

123. Colores diversos corporum sensibiliu diversis & determinatis molecularum suarum crassitie, & densitatis respondere docet *Newton Opt. lib. 2.*

124. Si fluidorum ejusdem cum aqua circiter densitatis, ut sanguinis, moleculæ primæ compositionis, habeant crassitiem æqualem octo milionesimis pollicis partibus, illæ constituent corpus rubro-violaceum, qualis sanguis venæ cavæ & pulmonaris arteriæ; si vero 14. hujus pollicis milionesimis partibus pares sint, eo circiter  $\frac{1}{7}$  illæ rubrum splendidum, seu scarlatinum colorem præbent, talis est color globulorum primi ordinis in sortæ & pulmonaris venæ sanguinæ; qui globuli multo majores sunt; sed moleculas habent quales globuli septimi ordinis: *Essais d'Edimbourg. D. Martini. T. 2.*

125. Videtur itaque splendidior sanguinis colorem ex ejus molecularum, vel majori densitate, vel ex majori crassitie pendere, contra quam vulgo Physici sentiunt. Hoc patet quare sanguis in pulmonibus, aeris frigore condensatus, & in patella superficie tenus paululum exsiccat, ut rutilantem ruborem acquirit; maxime cum pressu vasorum, & vi cordis in morbo inflammatorio, vel spissior, vel densior evadit; si vero major assignata sit crassities, ut coctione, ulteriori exsiccatione, aut aliis de causis accidit, alios colores is potest induere.

126. Corporum albidorum, vasis rubroliquore plenis, intertextorum rubedo est eo major, quo plura sunt puncta rubra, & pauciora alba; necnon quo vasorum rubedo intensior est, adeoque fit in eadem superficie vasa rubra longiora, latiora, sublimiora evadant, quod fieri non potest, quo minores evadant areolæ albæ, tota superficies intesius rubebit in harum dimensionum ratione composita. Et eodem recideret phenomenum, si omnia vasa rubra tantum in minori inter se distantia posita forent, ut corrugatis areolis albis fieret. Longitudo vasorum rubrorum crescit, cum cruor ipso lymphatica truditur, quæ inde sanguifera evadunt; subtilitate vasis rubri effrescente, & extra eam prominente, multiplicatur rubra superfi-

cies, & minus alto velamine obtegatur, unde rubedo intensior.

127. Duplici de causa possunt vasa sanguifera in omnem sensum crescere, vel quia vis sanguinem in ipsis trudens absolute major est, vel quia eorum minor est absoluta resistentia; verum si secunda causa, seu ratione laxitatis & atoniæ dilatator vasa ut fit in varicibus, obscurius rubebit sanguis, immo nigrescet, ut in ecchymosis & apice phlegmones, vel erysipellatis ad spachelum vergentis, detestet calor, seorsus, testio. Ergo cum in tumore inflammatorio contrario pressus modo res se habeat, necessum est vasa distendi a sanguine per vim majorem adaucto, unde ruber splendidior, testio major, calor actior, sensus acutior, &c.

128. Cutis sub erysipelatis resoluti finem exsiccat, densatur non raro, immo desuamatur, & lutea simul evadit; hic color denotat moleculas ejus quæ, cum albidæ videntur; habent crassitiem tribus vel quatuor pollicis milionesimis æquales, jam 20. aut 21. milionesimis partes esse. Nonno in aurigis luteus color eum pelliculam afficiens designat biliosum liquidum visciditatem & crassitiem? Cum autem calore & putrefactione incipiente solidorum & fluidorum ita exolvantur moleculæ, ut album referant, per dicitur coacturum, quod calore loci, aut viceris longiori deligatione inspissatum flavescit, ut ex dictis & tabulis *Newtoni* sequitur.

129. Ex allatis (127.) sequitur ruborem majori suffundendas esse partes in quas majori impetu & citius sanguis adauctus fuerit, ut in vasa genarum, cum verecundia motu cruor in eas partes intruit, quod sensu flammæ faciem per volantis ripari solet.

130. *Nota.* Lac bovinum coctum, succus lactæus lactocæ, sonchi, tichymali, cataputæ, ex tinctura cinerum clavellatorum intense rubent. *Acad. Florent. Exper.* calore exaltantur, & alkalescunt sales; anne intenderetur inde color sanguinis ruber?

#### De Pulsatione.

131. Pulsatio est tam velox vasis dilatatio, ut explorantis manu percipi possit. Haec in arteriis, venis & corde sequitur alterna vasis contractio, quæ palpo non percipitur. Debetur autem dilatatio vasis vi fluidi in illud immisi, ut vi contractivæ arteriæ, cordis, &c. debetur contractio.

132. Si columna fluidi A M (fig. 2.) versus altorum M B feratur, vel ista versus primam ex adverso tendit, vel quiescit, vel in eundem sensum (ex M. ad B) movetur. In priori casu, *velocitas respectiva* est summa velocitatum utriusque columnæ; in secundo ea est, ut velocitas solius columnæ impetentis (A B;) in tertio velocitas respectiva est, ut excessus velocitatis columnæ subsequæ super velocitatem antecedentis: *Gravesande Phys. 327.*

133. Si duæ columnæ (AM, MB) (fig. 2.) velocitate prorsus simili procedant, qualis est velocitas communis diversis ejusdem globi aut baculi paribus, evidens est eas in semet non agere, se mutuo non premere, nec collidere, nam nulla est in hoc casu velocitas respectiva.

134. Si vero lamellæ fluidi ejusdem diametri eodem inclusæ tubo se mutuo sequantur suæ collisione, aut pressione mutua, evidens est ejus moleculas non defluxuras esse ad latera, nec latera ulterius dilataturas esse, cum semel ad æquilibrium devenere vis, seu altitudo genitrix velocitatis in fluido, & vis tenacitatis vasæ: nam utcumque flexibile sit vas relative ad vires majores, illud est velut æneum & ferreum respectu virium quibuscum ejus tenacitas æquilibrium est, observante *Mitchell*.

135. Verum si in se mutuo impingant columnæ fluidi, aut altera alteram collidat, quod ratione velocitatis respectivæ tantam heri possit, tunc fluidum inter utranque compressum ad latera dilabatur, & vas distendit quodcum prius erat in æquilibrio. Non secus ac si embolus (A) fluidum in (AB) contentum versus (B) premeret, cum (B) simul vel recederet, vel versus (A) moveretur; fluidum intermedium cum vas parietes premeret ea vi quæ a velocitatis respectivæ quadrato æstatur.

136. Si tubus A B (fig. 2.) cylindricus, a pressione emboli (A) vel altitudinis receptaculi (H) fluidum accipiat per immissarium (A) & per emissarium (B) transmittat, docet experientia & ratio quod si eadem velocitate qua subit immissarium, aqua emissarium ejiciatur, aut quod eodem recidit, si orificium effectivum emissarii sit æquale orificio immisarii, nulla in parietes vasæ (A B) pressio a fluido inferatur.

137. Si enim foraminis cuidam (ut M) apertur tubulus vitreus exiguus utriusque parulus, aqua in ipsum non ascendet, immo si orificium effectivum (B) fuerit majus immisario, exsurgat fluidum in rubulo laterali deorsum inflexo currentum, & contra propriam gravitatem a veloci illo fluente in tubum (AB) abripitur.

138. Aut si emissarium effectivum minus sit immisario, ut in arteriis esse vidimus, tunc fluidum transfluens agitur in latera canalæ, quod ex ascensu ejus in tubulum lateralem aptam mensuram licebit; nam ea altitudo fluidi ascendens erit pressioni accurata mensura: *Hydrodyn. Sect. 12. pag. 258.*

139. Sit emissarium (B) ad immissarium (A) ut 1. ad 10. constet ex hydraulica velocitatem in emissario fore semper, ut est radix altitudinis (H) genitricis, & vis emboli propellens, quam constantem ponimus, eadem est pariter velocitas, qua fluidum ex immisario (A) effluere conatur, & de facto transgreditur, si emissarium coarctatum non sit; verum coarctato emissario, velocitas fluidi in tractu canalæ (AB) est ad velocitatem in emissario actua-

lem, aut ad velocitatem fluidi per immissarium appellere nicens in sectionum ratione reciproca, seu ut 1. ad 20.

140. Si jam quaeritur pressio lateribus illata, ea reperietur æqualis quadrato velocitatis respectivæ, quæ hic est differentia velocitatis in emissario, & velocitatis in tractu tubi vigesimi ampliori; velocitas in emissario est radix vis prementis; adeoque hujus quadratum est ipsa vis prementis (H) velocitas in tractu canalæ est vigesima hujus pars, cujus quadratum est  $\frac{1}{100} H$ .

differentia ergo quadratarum velocitatum erit vis propellens fluidum (H) e qua detracta sit  $\frac{1}{100}$  pars ipsius H,  $(H - \frac{1}{100} H)$  quæ eodem recidit ac 399. partibus H, & hæc est vera & accurata mensura pressioni laterum canalæ. Ita ut si tota vis fluidi sit æquali 400. partibus pressio quam in statu sano ipsi arteriarum parietes experiuntur, est æqualis 399. hujus partibus.

141. COROLL. Obstructa penitus arteria, pressio quam ejus parietes experiuntur, est æqualis toti vi fluidi in illam immisi, seu altitudini genitrici velocitatis fluidi in ipsam apertam fluxuræ vel altitudini ad quam in tubo vitreo huic verticaliter aptato posset sanguis ascendere. Et ea pressio quaquaversum æqualis est.

142. COROLL. Vesum experientia hæmorrhagicis, si tubus aortæ canis minoris apertur, sanguis ad pedes quinque, & in æquo ad pedes novem assurgit, & in homine ad pedes septem, vel circiter, potest assurgere, adeoque in his animalium arteriis, ex earum columnarum pondere per vas internam superficiem multiplicato habemus pressionem absolutam vas illatum.

143. COROLL. Si in hoc experimento secetur arteria cruralis, quæ liberum exitum sanguini transfluenti offerat, & si facta ratio emissagiorum ad immissarium, seu orificium aortæ, ut 1. ad 10. altitudo sanguinis in tubulo verticali statim minor evadet, seu erit ad altitudinem (H) ut 99. ad 100. & si binis locis arteriis cruralibus ratio emissarii ad immissarium sit, ut 1. ad 3. tunc altitudo prementis erit ad totalem (H) ut 8. ad 9, & talis erit pressio.

144. COROLL. Aut e contra si emissaria respectu immissarii minora evadant, ut v. g. si dimidia arteriarum pars obstructa vel ligata supponatur, aut omnes simul ad sui dimidiam partem coarctatæ, tunc emissaria erunt ut 1. ad 40. (ex art. 51.) si ad tertiam vel quartam partem sint angustata, tunc erunt ut 1. ad 60. ut 1. ad 80., &c. atque in his casibus pressio vasæ illata erit,  $\frac{1}{400}$ ,  $\frac{1}{600}$ ,  $\frac{1}{800}$  parte minor pressione totali, quam data vis cordis in trunco penitus obstructo potest exercere. In statu vero sano pressio vasæ illata est  $\frac{1}{200}$  parte minor pressione totali cordis.

145. COROLL. Cum autem velocitas in diversis arteriarum ordinibus sit in ratione alia vel totius reciproca, pressio a sanguine ipsi illata,

illata, quæ ceteris paribus est ut quadrata hujus velocitatis, erit minor quam in aortæ truncō, in ratione reciproca duplicata sectionum alvei: adeoque pressio illata naturaliter ramis primi ordinis arteriæ aortæ est ad pressionem illatam ejus truncō ut 64. ad 81. nam sectiones sunt, ut 9. ad 8. ex nostris mensuris.

146. COROLL. Invenit *Ill. Jac. Keill* sectionem ultimam fere tamorum arteriæ mesentericæ superioris esse ad sectionem ejus trunci, ut 37. ad 15. adeoque pressiones sunt, ut 225. ad 1369. pressiones ergo parietibus arteriarum illarum continuo a corde ad extremas arteriolas intensitate decreverunt, quod ipsarum pulsus decrementum satis indicat.

147. Pulsatio arteriarum est effectus collisionis sanguinis, (ut patet ex *Theor. pulsus*) qui cum velocis subsequatur, quam alter antecedit, collisionem patitur, & ad latera diffuit, & ea collisio est in ratione vis emboli prementis, & duplicata velocitatis respectivæ.

148. Verum quoniam immixtura venarum sunt emissaria arteriarum, & ea comperta sunt vigetibus angustiora, quam truncus aortæ, ea a fortiori erunt angustiora, quam venæ cavæ utriusque emissaria. Si itaque sine ulla resistentia fore in auriculas, & cava cordis, venæ patulo orificio suum fluidum continuo infunderent, illæ & ramis vicinis velati exsugenter, & in se rapere sanguinem, (ex 137.) & experim. *Ill. D. Bernoulli Hydrod. pag. 164.*

149. Nam in hoc casu pressio in sectionem mutatur; non mirum itaque, si venæ pulsū saltem procul a corde desistantur, licet aliquis sit in auriculis resistentia.

150. Tam pulchra & admiranda est hæc pressio-nem atque pulsationem theoria ad *Illust. D. D. Bernoulli* referenda, ut hujus exponendæ finem nonnumquam facerem, nisi illis, quibus ex-fa est Geometria, fastidium crearem. Sufficiat itaque monuisse quod obstructa alvei sanguiferi parte, vel imminuto emissario, etiam si vis coti-dine eadem remaneat, pulsatio vasorum paululum major evasura sit; sed hanc causam ne nimium verbis amplificet Medici, qui vires morrices nihili faciunt.

151. Arteriolarum intestinorum majores, quas pro exemplo sumere liceat, non habent pro interna diametro magis quam lineæ partem decimam in systole, aorta vero habet 10. lineas; sint earum dilatationes in pulsatione, ut nativæ diametri, & aortæ altitudo inter pulsandum crescat una lineæ, jam arteriolarum intestina-lium diameter a pulsatione crescat una centesima lineæ parte. His positis, obtineat penitus arteriola, pressio totalis cordis in vasa penitus obstrata est ad pressionem in vasa naturaliter patula, ut 400. ad 399. (ex art. 140.) sed pulsatio, id est, dilatatio arteriarum est effectus pressio-nis lateralis sanguinis adeoque illi proportionalis; ergo quantitas absoluta, qua crescit, erit  $\frac{1}{400}$  pars lineæ, & in arte-ria carpi, aut aliis lineæ unius diametri,

$\frac{1}{400}$  pars lineæ, &c. Tota sunt ut partes, ajunt Arithmetici; ergo viscera, glandulæ, si-milibus vasis conflant, hac de causa crescent tantum  $\frac{1}{400}$  sui parte.

152. COROLL. Verum in quantum judicare licet ex pulsatione parantur, aut similibus pleg-mones, multo est major pulsatio arteriolarum in inflammatorio tumore quam  $\frac{1}{400}$  pars suæ diametri; ergo non solum ex adaucta veloci-tate respectiva, sed etiam ex viribus emboli (adeoque cordis) adauctis, in hoc casu pul-sus eruentis est, ita & tumor. Vide *Theor. tumor. class. I.*

#### De Tensione.

153. Sit chorda flexilis & elastica B A C (*Fig. 3.*) pundis B & C. affixa quæ flectatur pondere nunc minori p, nunc majori P: inflexiones erunt ut sagittæ, A d, A D; & produ-ctiones seu quantitates quibus a diversis po-deribus elongabitur chorda, erunt inter se ut sagittarum A d, A D quadrata.

154. Productiones d e, D E, vocentur e & E, sagittæ vero A d, A D. vocentur f, F: hoc venit demonstrandum e: E = f: F F.

Ex puncto C, velut ex centro & intervallo dimidiæ fibræ C A, ducatur semicirculus A e E. Si ex puncto D extra circulum ducantur ad ipsum tangens D A & secans D C, tan-gens D A est media proportionalis inter se-can-tem integram D C & ejus partem D E ex-tra circulum, ut ostendunt Geometræ; adeo-que C D: A D = A D: D E. Et si radius C A vel C E vocetur R, atque A d, A d, sint f, f; & extensiones chordæ D E, d e, sint E, e, hinc fiet ut R + e: F = f: E; & R + e: f = f: e; adeoque F F = R + E < E & ff = R + e < e: sed si sagittæ vel inflexiones minimæ supponantur, productiones e & E velut infinite parvæ, pos-sunt cum radiis A C collatæ pro nihilo haberi, & tunc temporis F F: ff = R + E: R + e, & dividendo per R ac invertendo E: e = F F: ff. Quod erat ostendendum.

155. EXPERIMENT. Si chordæ B C rectæ & tenax applicentur vires flectentes, seu pon-dera P, vel p, sagittæ A d, A D erunt inter se ut radices ponderum.

156. COROLL. Adeoque si pondere unius libræ chorda inflectatur, & a recta linea re-cedat spatio unius lineæ, operetur quatuor li-bris, ut inflectatur ad duas lineas; novem libris, ut ad tres lineas, &c. *Physiol. Elem. num. 55.*

157. COROLL. Vidimus inflexiones, seu sa-gittas esse ut radices productionum (art. 154.) verum (ex 155.) illæ etiam sunt ut radices virium flectentium; ergo productiones chorda-rum factæ a diversis viribus sunt, ut vires in-flectentes: i Gravissandæ §. 407.

158. COROLL. In vasis corporis fibrarum

strenuarius longitudines debentur pressuribus fluidorum tranantium; nam vi sanguinis explicatur, nvi vasa, & illae longitudines constituant vasis circumferentias, quae sunt inter se ut radices sectionum, seu amplitudinum, adeoque vires inflescentes, quae sunt ut elongationes, (153.) sunt ut radices amplitudinum vasorum.

Tensiones fibrarum eo majores aestimantur, quae resistunt magis suae inflexioni, adeoque quo majores viribus pressae, minus inflectuntur; unde si aequalis sit vis premens, tensiones sunt eo majores, quo sagittae minores sunt. Et si sagittae sunt eadem, tensiones eo sunt majores, quo vires inflescentes sunt majores, docente experientia.

159. COROLL. Si sint phlegmonodei tumores diversae altitudinis supra cutis libellam efflorescentes, evidens est sagittas esse his altitudinibus aequales; at data eadem partium elasticitate, ubi tumor est duplo altior ceteris paribus, vis sanguinis est quadruplo major.

160. COROLL. Si eadem vi sanguinis duas partes urgeat, & eae sint inaequaliter ramidae, quae magis est tumida, minus tensa fuit ante tumorem, quam altera. Si pars ut perioleum, tendinea, calyptra, aponeurosis, sit triplo magis tensa quam altera, & ad duplo majorem altitudinem simul intumescat a vi sanguinis, illa urgetur vi duodecies, circiter majori.

161. Pili similes effusitiei, & aequalis longitudinis diversae appendi pondera, & 1. inveni (juxta 153.) eorum productiones esse ponderibus appensis proportionales; 2. maximam quam intra paucos dies pariebantur elongationem, ante rupturam, esse vigesimam quintam pristinae longitudinis partem; 3. successu temporis crescere aliquantulum elongationem.

162. COROLL. Cum successu temporis crescant productiones fere ut tempora, & quamdiu producitur chorda insensibiliter, remouetur raptionis periculum, si subito distrahatur ad majorem quam 25. suae longitudinis partem ea solvetur; tutius est ergo eam sensum magis ac magis distrahi.

163. COROLL. Calore trigessimam quintam gradum non superante fibras produci vidimus, minore vero vel majore decurrit; docet praeterea experientia. longiores longius distrahi posse (i. Gravefande 408.). citra rupturae periculum, breviores vero minus; ergo tutius est calorem in tumore inflammatorio naturali paulo majorem esse, tum ut minuat sensum, tum ut vasa magis libera evadant, minusque sit rupturae periculum.

#### De Dolor.

164. Dolor est idea molesta, raro ex imaginatione, frequentius ex sensatione oriunda, periculo raptionis fibrarum, nervearum proportionem respondens.

165. Quo diuturnius tempore producuntur fibrae, eo (161.) magis elongantur, immo nutri-

tionis ope roborantur in animali vivente; ergo eo minus est rupturae periculum, minorque dolor, quam si breviori temporis spatio tantumdem producantur.

166. Quo magis accedit productio, pari tempore, ad maximam, quae rupturam quam proxima sit, distractionem, eo maius est periculum, quod sequitur in hoc casu vires producetes, & inflexionum quadrata; (154.) unde dolor major, & vice versa.

167. Quo fibrae sunt magis tensae, eo magis accedunt ad maximam illam, quae rupturam proximam est, productionem; adeoque a pari inflexione majus est periculum, dolorque major, & vice versa.

168. Quo crassior est densiorque fibra, eo majores vires adhibendae sunt ad eam aequaliter producendam in ratione composita ex duplicata diametri, & simpla densitatis; ergo tanto minus est rupturae ab iisdem causis periculum, & vice versa.

169. Quo magis est meticulosus, delicatulus, mollior educatus, pusillanimis homo, eo magis sibi timet a quocumque periculo, eoque magis attendit; aut sensatio & imaginatio eo vividiores sunt, quo vividior est attentio, adeoque & dolor.

170. COROLL. Dolor est in ratione composita ex directa virium distrahentium, virium fibrarum prius tendentium, attentionis animi, & inversa temporis, crassitiei & densitatis fibrarum, ac (i. Gravefande 409.) ex inversa nativae fibrarum longitudinis.

171. Docet experientia numeros vibrationum fibrarum intra datum tempus esse in ratione composita ex subduplicata virium tendentium directa, & ex inversa longitudinum ac diametrorum (i. Gravefande c. 14.). Si doloris acumen sit ut tonus; dolores eo acutiores sunt, quo radices virium tendentium majores, & longitudines fibrarum, ac earum diametri minores, & erunt gravesiores vice versa. Verum ad dolorem requiri fibrarum nervearum vibrationes tremulas est falsum, cum non ablata vi premente fiat dolor, & nequaquam vibratio.

172. COROLL. Sit arterialis (CDE) (f. 1.) obturata, vel in extremo (E) ligata; sit (DE) ramus alter patulus, & liber huic aequalis, supponimus immisissarium utrumque (E) simul esse minus immisissarium (C) in ratione qua vis, ut 1. ad 2. quaeritur quanta erit post obturationem fluidi velocitas, vasis dilatatio, & alterna contractio?

173. Respondendo 1. vim fluidi orificium liberum (e) tranantis fore ad vim ejus ante obturationem, ut  $\frac{1}{1} \frac{0}{0} \frac{0}{0} H$ , ad  $\frac{1}{2} \frac{0}{0} \frac{0}{0} H$ , seu ut 6396. ad 6304. ex *Hydrodynam. sect. 6. pag. 96.* adeoque velocitatem fore, ut 79. 97: ad 79. 64. Si vis cordis eadem remaneat, ille velocitates sunt ut 1004. ad 1000. seu ut 251. ad 250.

2. Quoniam demonstravit experientia, & i. Gravefande de *legib. elasticit. §. 497.* ejusdem fibrarum productiones diversas esse inter se, ut vires

producentes; fibrarum circularium vasis longitudo post obstructionem erit ad longitudinem pristinam, ut vis premens sanguinis post obstructionem ad vim pristinam ejus, seu ut 6396. ad 6384, quod eodem secidit ac 1005. ad 1000. seu 202. ad 200. Verum amplitudines vasorum sunt inter se ut peripheriæ quadratæ ex *Elementis Geometr.* ergo amplitudo vasis ex obturatione erit ad pristinam amplitudinem, ut 101. ad 100.

174. 3. Si sanguis eadem jugi velocitate ad arterias appelleret, evidens est eas semel dilatatas numquam elatere suo restitutum iri; nam remanente eadem vi premente elateria non restituntur: *à Gravefand de Leg. elastiis.* §. 306. At cum sanguis majori velocitate appellat in arterias durante systole cordis, quam in ejus diastole, tum quia vis impulsiva cordis est major quam vis arteriarum, demonstrant *Schreibere Elem. med. math.* t. 1. p. 335. tum quia minores sunt affricus respectu columnæ in arterias fluentis in ratione diametrorum, debent arteriæ per diastolem distrahæ vi elastica sua restitui, cum intermittitur motus cordis; atque differentia velocitatum in diastole & in systole est ut differentia radicum virium cordis & arteriarum, cujus differentie mensuram ignoramus.

175. 4. Scimus tamen eadem lege restitui arteriam cæcam extremosus obturatum (D E) ac restituitur gruncus, & ipsum cor, adeoque in casu allato duplo cardiorem solito fore arteriæ cæcæ restitutionem, si vires cordis non creverint; at ratione pressiois adauctæ quidpiam est addendum; nam si ratione pressiois adauctæ non tanta proportionem dilatatur orificium liberum quanta in omnem sensum distensa retinetur arteria obstructa, crescet tarditas restitutionis in ratione differentie, quæ est inter hanc dilatationem orificii & pressioem vasorum.

176. 5. Verum orificiorum amplitudo post obstructiones est ad amplitudinem pristinam ut 101. ad 100., & pressio est ut 201. ad 200., seu  $\frac{201}{200}$  parte major, adeoque tantumdem tardior erit vasis cæci restitutio ex hoc solo capite. Ergo tempus restitutionis arteriæ (D E) obstructæ erit ad tempus restitutionis ante obstructionem, datis hisdem cordis viribus, ut 401. ad 200.

#### De Tumore.

177. Cutis est inter duas potentias sibi mutuo contrahentes, vim scilicet sanguinis qui a centro ad circumferentiam urget, adeoque cutem, & viscerum membranas dilatate nititur, & vim elasticam propriam inherentem, ambientis aeris pressione adjunctam, quæ corpus & singula viscera in minus spazium continuo redigere conatur.

178. Membrana determinatæ figuræ & magnitudinis, quæ fluida hinc & inde premencia patitur, aut viribus oppositis pressæ est, suam figuram extensus servabit, quatenus undequaque introsum vel extorsum æqualiter. & suam magnitudinem quatenus tam introsum quam extorsum viribus æqualibus urgetur, & ablato

virium antagonistarum æquilibrio mutabit. Braebium in ancliam immisit *Boyle*, illud illico intumuit, extractum vero detumuit; animalia, poma rugosa in vacuo intumescunt, in aere dein detumescunt; partes sub curcubitula, arteriæ laxatis, derales tuniis intumescunt, fortius pressæ detumescunt, &c.

179. Ad tumorem quemvis in corpore humano producendum necessum est, ut vires contentorum, vel relative, vel absolute majores evadant; viribus partium continentium, si, posterioribus non mutatis, sanguis violentius urgeat, fluida majori impetu rarefiant.

180. Vires contentorum relative majores evadunt continentibus, si, prioribus non mutatis partium continentium vis contractiva tum muscularis, tum elastica, tum tonica minuat, aut etiam si aeris ambientis, fasciarumque pressiones decrescant, mutatis ambabus viribus antagonistis, sit tumor, si vires contentorum crescant in majori ratione quam vires continentium, & si vires continentium decrescant in majori ratione quam vires contentorum.

181. His positis ad tumorem inflammatorium producendum absolute necessum est, ut vires contentorum crescant in majori ratione quam vires continentium.

182. Nam ad tumorem inflammatorium requiritur 1. calor intensus qui cum a causis internis, ut ab acribus fluidorum & solidorum, dependet, est ut quadratum velocitatis respectivæ, seu ut vis collisionis corporum. 2. Requiritur rubedo intensior quæ fit in corpore, dum sanguis majori nisu & impetu vasa distendit, & subit. 3. Requiritur major tensio quæ viribus illecebentibus respondet. 4. Requiritur dolor, qui, ceteris paribus, est ut vis vasa flaccida & distrahens; augentur effectus, ergo & causæ.

183. Proindeque si fiat tumor ex eo quod laxatæ sint membranz fluida vel solida continentes, minor erit 1. calor; nam calor, cæteris paribus, crescit ut densitas & tensio partium sese atterentium; 2. minor erit rubedo, aut ad nigredinem verget, ut in varicibus, ecchymosis; 3. minor tensio, ut per se patet; 4. minor sensus, quæ omnia majori, vel minori gradu observantur in tumoribus quos frigidos dicunt.

184. Jam si tantum adaugatur in quadam parte sanguinis nilus & impetus, ceteris eodem modo quo prius erant in statu sano permanentibus, exceptis effectibus necessariis, sequetur maior collusio fluidorum & solidorum; nam respectiva velocitas major erit solito, adeoque arterius, seu collusio cui præcise tribuenda sunt generica inflammationis phenomenæ.

185. Vidimus vasa ab obturatione non magis quam  $\frac{1}{10}$  sul parte ampliari, ergo nec glandula, nec musculus ex obturatione magis quam  $\frac{1}{10}$  sui parte crescere potest; verum inde non fit tumor sensibilis inflammatorius; requiritur ergo ut vis cordis solito major evadat ad tumorem sensibilem inflammatorium efformandum.

116. Tumor inflammatorius glaber est & uniformis, non vero, ut cancer, exasperatus, adeoque vasa licet inaequalia partem inflammata constituentia proportionaliter ad suam naturam diametrum diffundantur; si enim minima non distensa forent, tunc majora extuberarent, unde tumor isognalis esset.

117. Phlegmones sunt tumores sphaeroides, in quorum centro calor est intensior, & quorum apex majoribus distractionibus est obnoxius; calore in centro intensiorem esse, ubi major est pressio, & minor partibus vicinis calorem communicatio, facile potest evinci; aut tensionem in apice majorem esse non ita evidens est. Hoc autem sic intelligi posse puto; concipiamus fibras cuti perpendiculares, quarum ope ipsa cuticula, reticulum Malpighii, cutis, adeps, &c. sibi invicem coeunt, quales sunt fibrillae, nervae, vasa perspiratoria, pili, &c. illae & similes isognaliter distractae sunt in diversis tumoris sectionibus ad cutem perpendicularibus, adeoque quae ad apicem pertingunt, sunt omnino maxime elongatae & distractae in ratione subtilitatis suae.

118. Si itaque calor, attritus, & fibrarum ruptio ad suppurationem concurrant, ut certum puto, debet potissimum in centro, & ex illo ad apicem juxta axim tumoris primum fieri suppuratio, si cetera sunt paria, quod experientia confirmat. Si vero concipiamus tegumenta varia esse lamellas tumoris concentricas quae prius erant planae, evidens est eas magis elongatas esse quae magis a centro sunt remotae; cum in majoris diametri curvam fuerint intra duo puncta inflexae; verum sunt ipsae textus tenaciores, quam partes internae; ergo licet magis fortis distracta tegumenta ipsis partibus concentricis, fieri tamen possit ut tardius disrumpantur, inde fit ut cutis saepe sit integra, cum mucro tumoris pure jam albacit interius lateat; ex hac majori cutis tensione sequitur eam doloris acrioris sedem futuram esse.

119. Cutis est magis tensa quam partes interiores tumoris, adeoque vasa cutanea magis compressa, & fluida cutim irrigantia, potissimum vero ejus apicem, difficilior circulatori; aut si propter violentiam pressionis ibi moram trahant fluida, & defectu sufficientis temporis, vis pulsatilis, aut caloris in suppuratione non abeat, ea putrescere necesse est; nam sanguis, circulatio & ideo secretion non repurgatus & quiescens, ibi putrescit citius, ubi calor est major, nec tamen exsiccat nimium; verum putrefactione nigrescit, solvitur, fluidior fit sanguis, solida vicia pariter laxantur, remollescent, tonum, sensum, calorem nativum amittunt, fit sphacelus qui in mucrone phlegmones primum debet nasci; si vero validius pressa fuerit pars, ut circa fracturas accidit, si vero gravioribus oculis cataplasmatis, si vero frigore, acidis applicatis fluida in tumoris apice fuerint coagulata, ut aetere calidissimis erysipelatibus admo. saepe fit.

*Sanguis Nofologia Methodica, Tom. I.*

### De Febre.

120. Quantitas sanguinis a corde in arterias ejeti est eorum resistentia reciproca, si vires trahiles ejus pares fuerint; aut obstricta parte alvei, resistentia sanguini & cordi oblata est ut obstrictio, quae si dimidia totius alvei sit, dimidio minorem, dato tempore, facit sanguinis a corde ejectionem, adeoque pulsus cordis dimidio minor est.

121. Verum quod de corde, ut praecipuo embolo dictum est, de arteriis intelligitur; illarum enim pulsatio sanguini a corde immisso debetur, & in statu permanente est ut earum contractio; atqui quantitas qua arteria contrahitur est praecise aequalis quantitati sanguinis eo ipso tempore in venas expressae, adeoque positae emissarii dimidio minoris illa contractio dimidio minor est.

122. Quamvis velocitas la emissarii arteriarum eadem est, & traot copia sanguinis illorum amplitudini proportionalis, radio vis cordis est eadem; nam velocitates fluidorum in vasorum sectionibus aut orificiis effectivis minimis sunt inter se ut radices virium premencium; verum si arteriae, quarum fines dimidio sunt angustiores, quovis secundo temporis semel pulsant ad altitudinem ut duo, siue bis ad altitudinem ut unum, eadem dato tempore eadem emissaria trans sanguinis quantitas, scilicet censueta dimidia; ergo cum velocitates sub eisdem orificiis & temporibus sint ut quantitates, traosfluentes, eadem proflus est in emissarii velocitas & vis in embolo.

123. Si itaque tantum amittit pulsus in altitudine quantum acquirit datis obstrictionibus in frequentia, non crescit velocitas sanguinis in venas transfusentis, quam tamen adaugendam esse uno ore consentient fere omnes ad febrem constituendam febri ergo quae in sensu veterum est lucta; seu vis major naturae materiam morificam atterere aut expellere omni ope molientis, non ex frequentia sola, sed ex frequentia & altitudine simul pulsuum solito majoribus est derivanda.

124. Frequentiam pulsus ex mechanica legibus nemo haecenus deducere potuit, nisi ad causam motricem iteratis vicibus agentem, & non mechaicam confugiat, quo magis obturatur arteriarum emissaria, eo tardior est columnarum in majoribus arteriis fluctuum motus, & eo pariter tardior, non vero frequentior, harum & cordis contractio. Qua vero da causa frequentior fiat, hoc alibi indicatum potamus, (*Theoria Febris, Class. 1.*)

125. In morbis inflammatoriis est pulsuum altitudo, & simul numerus, vel productum ex utroque majus quam ex virium muscularium gradu expectandum esset.

126. Si omnis potentia motrix animalium eis sit vel ad motum cordis, vel ad motum aliorum corporis muscularum adhibenda,



quo major ejus pars in cordis vi impendetur, eo minor in musculari vi supererit potentia. In quocumque gradu sit potentia motrix totalis, eadem remanebit inter musculares & vitales vires ratio; si alterutra major evadat, hoc alterius dispendio fiet. Initio quidem morborum integra est, & major potentia motrix, in fine minor; nam ex labore assiduo minuitur, adeoque in quocumque gradu sit potentia motrix, si majori ratione crescant vires vitales, quam vires musculares, signum est intendi simul vires ejus motrices in majori ratione quam ex viribus muscularibus foret expectandum.

197. Si excessus virium a corde absumptarum sit notabilis & assiduus, potentia motrix imminetur, ut a labore alio musculari assiduo diu nocturne perseverante; & quo majores exerentur, simulque minor erit potentia motrix, eo labor erit periculosior, & potentiam motricem citius exhauriet, unde mors.

198. His positis tota febris intelligitur. theoria. In hac scilicet, vires cordis intenduntur notabiliter, & si febris aliquandiu perseveret, labor cordis est notabilis, unde vires musculares tanto minores evadunt; & potentia motrix tandem exhauritur.

199. Vis cordis requisita ad eandem, quæ in statu sano promovendam sanguinis copiam, datis obstructionibus, est in ratione duplicata reciproca emissariorum; itaque si emissaria in febre sint tertia pars emissariorum in statu sano, ut solita circuletur sanguinis moles, vis noncuplo major requiritur. Verum ab illa vi noncuplo majore pulsus altitudinis & frequentia productum idem erit ac in statu sano, & vel febrem malignam, vel nullam adesse pronunciant plures Medici.

200. Adeoque ut productum ex frequentia per magnitudinem pulsus consueto majus sit, requiritur etiam major quam noncupla virium cordis impensa. Sit frequentia duplo majorem, posita pulsus altitudine quæ in statu sano, in casu obstructionis recentis vires cordis erant necessario quater majores prioribus, id est, trigieses sexies majores; & si, ut accidit, tunc simul pulsus altitudo duplo major evaserit, adhuc quadrupla prioris erit vis cordis seu 64. vicibus major; nullus autem est labor voluntarius qui ad hunc gradum accedens possit diu nocturne continuari citra periculum & lassitudinem; non mirum itaque si in febribus lassitudo & periculum accedant.

201. Hinc intelligitur quorsum a maxima & acutissima febre cito ægri moriantur, cum virium impensa tanta est in spatio brevi, ut in majori multo ratione amittantur, quam resarciantur; non possunt autem resarciri tanta proportionem in labore febris, quanta in labore voluntario, cum etiam noctu & inter somnum perseveret labor febrilis, nec tantas digestio & chyli proventus in sanguinem, viribus ad cordis distractis, & a ventriculo reclusis, possint superpetas asserre, quantas in labore voluntario,

qui pluries refectioe cibali & quiete reparatur.

202. Ex dictis explicantur bene multa paradoxæ prius thesaurata; qui fieri possit ne cum conatus cordis sint maximi respectu ad vires potentia motricis superfluit, in se tamen & absolute minimi sunt, ne in agone mortis doceat pulsus exilitas. Qui fieri possit ut cum frequentia pulsus est maxima, periculum mortis sit maximum, ut in peripneumonia & plenitudine desperata, si tantandem exilis sit pulsantis arterie altitudo?

203. Quorsum in præliis morborum inflammatoriorum, pulsus per aliquot dies languidus sit, parvus, interea tamen vires musculares languent, functiones animi torpeant, animus ipse ægre se habeat? Cur metus, anxietas, cur capitis gravitas, corporis vacillatio, agrypnia, vertiginosæ perturbationes, vel somnolentia, fastidium omnium rerum, inappetentia, turbulenta insomnia, morbos illos prænuncient?

204. Ast quorsum febris illico sæpe evolvatur, licet haud dubium sit quia materiam morificam prius in corpore extiterint, rigores, horrores intercurrentes, frigoris præteritum? quorsum adeo subito est morbosum insultus, ut ægri velut ex cælo percussii visi sint Veteribus, ut in apoplexia, epilepsia? Quorsum vires vitales sensim ad usque morbi vigorem intenduntur, & aliquam cum periculo vel materie morificæ viribus proportionem servant? Quamnam est causa quæ tot motus in corpore de novo procreat inivitis resistentis, quæ maximam ejus motus partem extinguunt?

205. Ex decem virium partibus quæ sanguini in arterias movendo impenduntur, unica pars in venis superest, in statu sano, ut in thesi de natura rediiva demonstratum est. Verum ubi major est actio & collisio, ut in febre inflammatoria, ibi major est jactura virium, quæ, si moles movenda æquales sint, sunt inter se ut quadrata velocitatis respectiva, demonstrante Gravesando de Collisione n. 335.

206. Cum itaque vis cordis, positis obstructionibus, 64. vicibus solito major est, si pulsus sit duplo major solito, simulque duplo magis tensa arteria, & duplo magis frequens pulsatio, demonstrari facile potest jacturam virium esse octuplam illius quæ sit in statu sano, cum collisio octuplo major sit.

207. Data eadem particularum ignearum copia, quo major est calor, eo major est collisio; verum jactura virium collisioni respondet (Gravesando §. 382.); ergo quo major est calor a collisione, eo major est virium jactura; adeoque ab inflammatorio morbo, cum vires æquales summe exerantur, potentia motrix maxime debilitatur; non mirum itaque si convalescentes a pleuritide, peripneumonia, & somno longiori indulgeant, & ab omnibus animi corporisque voluntariis exercitiis abstineant; & licet euchyma pluries in die sumant alimenta, vires integras potentia motricis recuperare vix possint.



possint, nisi intra tempus morbi duratione longius.

208. Resoluta, subacta, expulsa materia morbifica pulsus evadit rarior, minor & mollior, docet experientia.

209. Judicatio feliciter morbo, seu correctae aut eliminatae morbificae materiae, febris cessat, id est, pulsus frequentia minuitur, ejus plenitudo ad diametrum naturalem minorem revertitur; qui tensus erat antea, jam mollis evadit. Hoc in convalescentibus a pleuritide, peripneumonia, febre quacumque acuta quotidie observatur; simulque sensim vires musculares prius prostratae resurgunt, sensim ad consuetas animi, corporisque actiones aptae evadunt, ac demum cum pulsus ad statum consuetum omnino pervenit, potentia motrix corporis est integra.

210. Si conseramus dicta superius cum hac ultima observatione, pari iure concludemus potentiam motricem non alia methodo se habituram fore, si sit intelligens, & inutilibus virium impensis parcat; quippe cum nullum jam insit periculum, ablati scilicet circulationis repagulis, ea non velocius ut in meris machinis, suos motus exsequatur, sed e contra tardius, rarior, & parcius vires suas exerat; easque, si altera urgeat necessitas, ad debellandas morificas causas praesto effundendas reservet.

#### De causa Inflammationis.

211. Quo intensior est caloris gradus, quo dolor acutior, tensio major, tumor grandior; & rubeo rutilantur, eo major, intensior, fortiorque dicitur inflammatio ex uniformi Medicorum loquela, & vice versa.

212. Causa itaque inflammationis est illud, cui proportionem respondent calor, rubeo, tensio, dolor, tumor, &c. nam effectus sunt suis causis proportionales. Verum in humano corpore sanguinis & vasorum collisioni proportionem respondent calor, rubeo, pulsatio, tensio, dolor, tumor, febris; cum ergo illa omnia phaenomena in parte inflammata intensiora sunt, quam in parte sana, eorum causa est major sanguinis & vasorum collisio, a sanguinis nilu & impetu majori oriunda.

213. In statu sano calent partes, rubent, pulsan, tense sunt, sensu pollent: verum calor in statu sano a moderata sanguinis & vasorum collisione, rubor a praesentia cruoris in vasa cutanea impulsu, pulsatio a vi sanguinis in arterias projecti, tensio a pressione sanguinis vasa distendentis, sensus a vasorum tensione dependet. Quid mirum si causis adactis hi omnes effectus adaugeantur?

214. Audio scilicet impetu sanguinis in determinatam partem projecti, & excessus velocitatis ejus supra velocitatem columnae antecessoris solito major evadit, unde velocitas respectiva major, inde collisio seu attritus major, inde vero calor intensior, & Verum si sanguis antecessor quiescat, aut tardius solito moveatur,

tunc excessus velocitatis subsequens supra illius velocitatem est tanto major; adeoque tanto major est calor ceteris paribus, quo firmior est obex in arteriis potissimum positus. 3. Quo minor est alveus sanguifer, eo velocior est sanguis; verum in arteriis minor est alveus sanguinis quam in venis congeneribus, docet Anatomia, & sanguis sanarum virium, quas a parte accipit, minorem in arteriis quam in venis partem amittit, ergo obstructis inde venis, inde vero arteriis, multo major debet esse excessus velocitatis sanguinis arteriosi quam venosi supra velocitatem obicis, adeoque major collisio, calor, inflammatio. 4. Cum arteriae a corde recedunt, major ac major evadit alveus, adeoque minor evadit velocitas; ergo si caetera paria sint, minor est excessus velocitatis sanguinis ex illis obicem fixum appellentis, quam esset in majoribus arteriis; debiliorque proinde inflammatio. 5. In minimis arteriis, minor sanguinis copia transit, quam in majoribus: verum inflammationis intensitas, periculum, gravitas, respondet quantitati sanguinis intercepti; ergo obstructione simili facta tum in minoribus, tum in majoribus arteriis erit majus periculum in majoribus, minus in minoribus.

215. Audio sanguinis in determinata vasa impetu globuli purpurei, ceteris ponderosiores, (Martin *Essais d'Edimb. T. 2.*) impetum acceptis ferius amittunt lymphaticis, fortius in totam vasorum internam superficiem impetunt, parietes arteriarum diducunt, ac proinde vasculorum ora dilatant; sed eatenus illi globuli minima lymphaticorum vasa non subibant, quatenus minora erant horum globulorum diametro lymphaticorum oscula, & ad resistentias horum superandas sufficientem vim non habebant, cum ad ea devenerant; adeoque dilatatis osculis, superatis resistentiis, illi globuli fortius impulsu, auxiliore etiam facti, debent lymphatica vasa subire, ut docet oculorum rubego in ophthalmia, & observatio *Dr. Vieussens novum System.* Verum illi globuli exet minoribus sunt conflati, qui seorsim lymphatica ejusdem diametri subire valent, non vero conjunctim; ea vero separantur tum majori successu, observante *Leuwenhoeck*, tum potissimum ad obstructionem vasorum minimorum, docente *Hallii*, maxime cum a tergo fortius impellantur; atque semel divisi globuli secundi ordinis subintei sunt, aut pelucidis, ergo quae cruoris forma sanguis transire nequit, ea sub forma lymphae transibit, velle dato sanguinis impetu in suos truncoos regreditur; non eadem vis quo obstructio trunci emissario fluidum in lateralia vasa propellit, eo aperto exsurgit a lateralibus, sicque rubor inflammatorius aucta vi sanguinis intenditur; ea immutata imminuitur.

216. Audio sanguinis impetu in determinata vasa, plures globuli simul secundum vasis diametrum sese orificis continuo angustioribus offerunt; docet Anatomia; verum quo plures sese his angustis simul offerunt, eo plures sunt casus

in quibus sibi ipsis viam præcludere queant (de-monstrante *Bellini Opuscul.*) adeoque obstru-  
ctionem pariant, aut transfluxui subsequenti  
sanguinis resistant; verum hoc posito, vel non  
posito major erit semper diffusus sanguinis ad  
latera, major vasorum exteriorum vergens pres-  
sio, adeoque major vividiorque pulsatio, major  
fibrarum omnium tensio, major sensibilitas quæ  
dolor est in majori gradu, major tumor, ut  
evidens est. Ergo sanguinis in data vasa adau-  
cto impetu, simulque majori inde necessario  
oriundæ collisioni proportionem respondent ef-  
fectualia inflammationis symptomata.

217. Augetur sanguinis impetus in determi-  
nata vasa, & ea subit majori vi quam alia ejus-  
dem directionis & diametri. In statu sano san-  
guis vasa æqualiter à corde distantia æquali an-  
gulo ad truncum posita, & æquali officio præ-  
dita eadem profusè velocitate & proinde quan-  
titate subit, & uest in data & certa ratione flui-  
dorum anadosis in vasa quæcumque corporis,  
ita ut v. g. totius sanguinis a corde ejecti pars  
decima carotidem sinistram, decima sexta me-  
sentericam superiorem, & sic alias, subeat.

218. Jam vero augetur vis cordis, & duplo  
major quantitas sanguinis, quavis ejus contra-  
ctione, in arterias projiciatur, si eadem super-  
sit ratio sanguinis carotidem & mesentericam  
subentis, quæ erat in statu sano, utraque du-  
plo majorem sanguinis copiam accipiet, sed semper  
carotis decimam, & mesenterica decimam  
sextam partem sanguinis a corde ejecti recipiet,  
unde non adaugebitur impetus sanguinis in illa  
determinata vasa in in majori ratione quam in  
alia.

219. Verum si carotis v. g. jam nonam san-  
guinis partem accipiat, cum mesenterica pro  
solito more decimam sextam aut decimam se-  
ptimam tantum accipit, tunc temporis dicimus  
impetum, & sanguinis distributionem fieri in  
majori ratione determinatam ad carotides, quam  
ad alia vasa: hoc autem in æconomia animali  
fieri supponit nostra propositio.

220. Docet observatio verecundia affectis fa-  
ciem illico rubore suffundi, cum pectus, ma-  
nus, cæteræque partes ejusdem fere coloris sunt  
ac ante verecundiam, docet & hoc rubedinem  
flammæ aut halitus calidioris forma subito dis-  
pergi; verum subita rubedo cum aliquali calo-  
re genas non potest efficere, nisi sanguis ulte-  
rius in vasa cutanea faciei, ac proinde caroti-  
dum ramos maxillares distos irruat; si enim a  
laxatis horum vasorum oculis minueretur resi-  
stentia, non adaucto sanguinis impetu, nulla  
daretur solito major collisio, nec major calor  
nec ita subito fieret rubedo; adeoque ab adau-  
cto in vasa genarum sanguinis impetu pendet  
hoc phenomenon.

221. Jam vero si æquali passu crevisset in omnia  
indiscriminatio vasa sanguinis impetus, nulla

foret ratio cur præcise genæ, non vero aliæ  
corporis partes, ruberent; cum autem effectus  
suis causis responderent, nec ulla rubedo solito  
major in aliis partibus appareret, non esse ma-  
jorem solito in aliis vasis cutaneis sanguinis im-  
petum concedendum est; adeoque sanguinis im-  
petus in certis determinatis vasibus majori ratio-  
ne crescit quam in aliis.

222. Roborent a verecundia oriundum pro  
exemplo, ut omnibus notissimo, summissus, ve-  
rum plura similia suppetunt, e quibus similem  
conclusionem elicere pronum est. Ex idea cibi  
jucundi, aut etiam objecti desideratissimi, sal-  
iva uberrimè in os confluit; sed fecrecionum  
quantitates sunt ut fluidorum excretionum  
celeritates simul & orificiorum amplitudines,  
cum eadem remanet in sanguine humoris fecer-  
endi ad sanguinem ratio; ergo alterum crescit,  
vel sanguinis ad salivales glandulas appel-  
lantis, vel fluidi nervi eorum parietes contra-  
cturi, velocitas, vel etiam laxantur eorum emis-  
saria: sed orificiorum amplitudo valet tantum ex-  
cretionem adaugere, ubi adest majus orificii il-  
lo receptaculum, ut in organis secretoriis ves-  
tibus, cellulosis, non vero in organis vas-  
culosis, quales sunt salivales glandulæ: reli-  
quum est itaque ut fluidorum impetus in de-  
terminatas partes sit adauctus, cum uberius li-  
bido saliva in os confluit.

223. Qui hominum carnicinis intersunt, non  
raro commiseratione perciti, sentiunt in auri-  
bus subitum calorem cum sibilo, & aures ipsis  
intensus rubent, quod est brevissecuturæ lipo-  
thymie prodromus. In iracundiæ summæ im-  
petu sunt mulieres, quæ dentibus stridunt, spu-  
mant ore, vocem amittunt, suffocantur; verum  
ea omnia fluidi nervi in horum organorum  
nervos, vel sanguinis in eorum vasa, impetui  
majori debet adscribi, ut convulsionum & mo-  
tum quorumvis docet theoria.

224. Nec quis obijciat minorem esse in his  
partibus resistentiam; nam non majori vi colli-  
derent dentes; nec insisterent tanta furoris  
vehementia, cum, quæ proportionem laxatur mus-  
culorum textus, ea pariter eorum vis & mo-  
tus immittitur, superest itaque ut majori vi  
fluida in determinata vasa ferantur.

225. In morbis quamplurimis observantur et-  
iam Antiqui motus anarrhops, seu fluidorum  
in superiora tendentias & impetus, nec non in  
aliis motus catarrhops, seu ad inferiora determi-  
natos, non ex simplici & defluxione & lapsu, sed  
ex facultate majori partis amandantis. Sic in  
apoplexiæ sanguineæ insultu non raro tanto  
impetu versus caput defertur sanguis, ut cinn  
pallet, & frigit totum corpus, facies subrubeat,  
intense rubeat, oculi extrorsum prominent, cap-  
ut quasi fasciis ardè restrictum doleat acer-  
mimè, spasmus faciei distortiones accedant,  
dein vero apoplexiæ symptomata superveniant.

226.

*Nota.* Vbi calor & dolor, hæc sanguis uberius efflu-  
sit, alioquin Antiqui & hoc experimento facile probentur: Ob-  
servantur vascula rubra, quæ sunt in scitis vix aucta, dein  
discolora, ac deinceps ita, pellucidam illam membranam  
interioris obducunt vasa rubra, & eo numerosiora vide-  
buntur.

216. Sanguinem & fluidum nervum voluntatis iussu in certos determinate musculos uberrime irruere, norunt omnes; ea fluida imaginationis libidinosæ impulsu in organa aphrodisiaca summa deferri violentia certum est.

217. Imaginationis pariter vi & energia multas inferri mutationes obliuatiissimi vix negant Pyrrhoniæ, quæ tantum admittunt, quæ suis principis, consonare videntur. Sic puella, cuius in brachiis intans phlegmaticus insinuat obiectum, tantum frigus percipit in altero, cui moriens caput incumbat, brachio, ut linteis calidissimis glaciem, ut ajebat, vix intra triiduum dissolvere poterit. Ut enim imaginautis animæ vividis phlegmatis potest in certa vasa uberius sanguis & fluidum nervum immitti, ita in alius casibus potest ab illis revelli, ut voluntas pro libitu tendit vel laxat artus, ut metus sanguinem fluentem sistit, & ira uberius profundit. Hæc ultima argumenta altioris indaginis sunt, quam ut satis elucidata, multo minus demonstrata putemus, atque ut non profus audentem addidimus. Ex prioribus autem satis comprobatum putamus principium.

218. Auso sanguis in determinata vasa impetu, collisionem augeri demonstratum est; aucta collisione inflammationis periculi in phænomena supervenire pariter certum est; ergo cum de facto augeatur non raro in certa vasa sanguinis impetus citra præviam obstructionem illorum valorum, inflammationem seu attritum majorem, sine prævia vasis oburatione, fieri quandoque consequens est.

219. Si potentia motrix sit intelligens & sanitatis tutrix provida, sedatis brevi pathematibus, si nulla sit causa morbifica prævia & vasis eliminanda, ea non debet vires incassum impendere, nec proinde illos furibundis fluidorum impetus diutius sustinere, unde nec gravis, nec notabilis exsurget inflammatio; aut si præextiterint cause materiales morbiæ, motrix potentia eas constanter ex virium suarum parte periculo proportionata debet aggredi, node inflammationis morbus exsurget: Vide *Dissert. de natura rædioris*, versus finem.

220. In omni morbo inflammatorio supponere sanguinem inspissatum, coagulatum, in ultimis arteriis impactum, quæcumque sit hujus morbi occasio, sive, ut ajunt, causa procacitica, videtur minus rationi, quam systematis decori contentanum; a frigore suscepto, a fumis acidis mineralibus haustus, inflammationem pulmonum oriri tanquam ab occasionali causa verisimillimum est, licet non demonstratum; verum a febris materie metallis, a vociferatione immodica, a serventis sanguinis sibi per vasa pulmonaria viam eudentis impetu, ab scribis alkalinis, fermentatis liquoribus inflammationem exortam simili coagulationi deberi, nulla, nisi ex systemate preconcepta, suadet ratio.

221. Violam, rubeolam, febrem a dentitione oriundam supponere validiores impetus sanguinis ad vasa arteria expellenda, ad cutem

dilatandam, ad gingivas lacerandas suadet eventus; laxata cute, dentibus extrusis, & in aliis febribus dilatatis inguinum glandulis, ad iacremmentum præparato corpore, hos impetus sedari videmus: verum in his omnibus casibus prævias obstructions supponere, sanguinem scilicet glutinosum, inspissatum, erodentes a primis viis in sanguinem transfusas, & similia, systematum uniformitati potius, quam accuratæ veritati, consulere est. A puro resorpto, arthritica materia, ichore acri, scorbutica materia, scabiosis miasmatis, pestilenti vapore, vasa molestanti, irritari, lacerari posse facile crediderim; verum & necessario obstrui, obturari, ut inde febris & phlogosis exoritur, credant Systematici.

222. Quippe cum vasis quomodocumque molestatis, irritatis, eadem motrix potentia, quæ vires suas intendit ad obstructions referendas, eas pari fere ad corrigendas & eliminandas materias putres, acres, erodentes, quaslibet debeat intendere. Levi tabaci in aures immixtio, timulo, sternutatio; levi fumo-acido in tracheam illapso, tussis, dysphœa; grano veneni in ventriculum lapso; vomitus, diarrhoea superveniunt, & ad eliminationem morbificæ materię continuo vigent pro potentia motricis viribus, pulvisculo in oculos illapso sit constrictio, nidatio, lacrymarum uberproventus ad elucendum & educendum pulverem; verum illi motus excretorii, & expressivi validiores non supponunt semper factum in his organis meatuum oburationem; ita cordis & valorum contractiones validiores non semper sanguinem obstruunt, & ipsiorem aggradiuntur.

223. In fluctuatione aer e pulmonibus emissus majore ratione nares impetit, & majore velocitate aer ejicitur e bronchiis, & in dyspnoea frequentius dilatatur ac contrahitur, seu pulsatur thorax, in vomitu contracto ventriculo quoquoersum æquali vi, premunt & premuntur contenta; interea tamen contractio ab eadem potentia motrice, a pyloro versus cesophagum determinate promouentur, &c. Accersent alii sympathiam, organismum singularem, perinde est, modo simili pacto in organis sanguiferis horum fluidorum rapus majores, horum minores, certos in data vasa impetus fieri concedatur.

224. Ex dictis forte explicatur quare ligato digito, febris & digiti inflammatio superveniant, quare intensitas inflammationis, non obstructionum tantum intensitati, sed potissimum vigori potentie motricis proportionem respondeat, adeoque in subiecto debili, seni, phlegmatico eadem digiti ligatura minus validam producat inflammationem, quam in adolescente, vegeto, sanguineo, vel bilioso robustissimo. Idem de pleuritide, phreuritide, aliisque dictum esto. Quorum in extrema debilitate, & paucis aut mortem horis ac debus febris cesset, non raro, ita uteger adstantibus, teste *Vallesio* fauus, salvusque videatur? Quo pertinet illud

*Galenus* effatum: cum natura vires suas viribus morbis materia inferioris perennis, tunc ne pugnare quidem adversus eam aggreditur.

235. Quorum, spina tendinibus infixa, validæ sunt hujus tendinis & vicinarum partium distensiones, inflammationes, convulsiones? quem in finem tot conatus?

236. Quare in phlegmone quiescit motus sanguinis, sedatur inflammatio, cum materies morbifica suppuratione sibi fecit emissarium, & in erysipellate cum desquamata fuit pars seu cuticula a cute sejuncta, atque acres, pruriginosi ichores emissi? Quare in vulneribus hiantibus & non satis exsuctis, eatenus perseverat febris conatus, inflammatio, nequequo sanguis in vasis relictis coagulatus, puris forma ejectus est, & vascula utriusque labii nimis distita in contractum putum per elongationem devenere?

237. Ex dictis colligitur inflammationem curari posse, sed levem & fugacem, acanthis externis, ut ab igne admoto, attritu corporis cum aliis corporibus asperis validissimum, ut vidi in puero, qui funem & campanili præalto pendulum manibus amplectens celerrime delapsus fuerat; verum propter enatum stimulum his se interinæ causæ comites adiungunt, sique crescit inflammatio. Idem evenit cum sanguis pathematum impetu in certas partes deferretur, fugax enim & non notabilis inde provenit tumor inflammatorius, nisi simul accedat vel stimulus inhaerens, vel obex pertinax: adeoque non parvus immerito obstruccionis eam tribui, si tribuatur tanquam occasione, non vero tanquam causæ efficien- tæ, nam obstruccionis intensitati nequaquam proportionem respondet inflammatio; sic in scirrho obstruccionis intensissima est, & inflammatio nulla; in phacelo sanguis hæret, ut in cadavere, nec ullus calor, vel dolor exurgit; iteratis phlebotomiis sanguis in ultimis vasis hærens, tenax, impactus nequaquam educitur, cum resistat ipsi vasorum & sanguinis subsequens viribus adactis, interea tamen imminuta cordis vi & motrice potentia, sedatur. Adde quod in idea sanguinis hærentis, quiescentis, non continetur idea sanguinis fortius in vasa arietantis, ea fortius diducen- tis, velocius atterentis & magis agitati; nec quidpiam in mechanicis debet de alio pronunciar- ni quod in ejus idea clara continetur; sic etiam si dum ventus navem impellit, velorum tensio eo major sit, quin navis velocius move- tur, nemo physices principii vel leviter im- butus motum navis velorum tensioni tanquam causæ efficien- tæ, & proximæ tribuerit, licet occasionalis causæ vices gerat; nec pariter li- cet occasione aggeris flumen retinentis, & in decliviorum molestrinam dirigentis, rotæ hujus- ce machine moveantur ab aquarum irruentium vi & impetu, nemo nisi in mechanicis igno- rum pro molestrinæ motore, seu causa movente, ag- grem habuerit, qui tantum occasionem aquarum directioni præbet, quæ ab aliis causis, & circumstantiis pendere possit.

238. Sequitur ex dictis, (*Class. II. 249. ad 155.*) diversis esse naturæ scopos in augendis cordis viribus & morbis inflammatoriis excitandis, nec semper inculandas esse cum Nuperis vasorum obstrucciones pro morbifico principio; sapiens *Sydenham* sæpius incutiabat sanguinis cras- sim viscosum, seu impuritatem tum sanguinis, tum humorum, a qua corpus humanum expur- gare sen deputare natura contendit.

239. Diversa mala quibus obnoxium est ge- nus humanum, partim ab istis aeris particu- lis nascuntur, quæ, cum corporis humoribus male convenientes in diem se insinuaverint, nudo sanguini permixtæ, corpus omne mor- bifico affiant contagio; partim a variis fer- mentationum generibus, vel etiam putrefac- tionibus humorum, qui in corpore ultra ju- stum tempus ideo sunt commorati, quia sci- licet iidem dirigendis prius, dein exer- cendis, vel ob nimiam eorumdem molem, vel qualitate incongruam, suppari deinde non sinit. Hisce rerum circumstantiis ita intime, essentia humanæ intertextis, complicatisque, ut nemo quisquam se ab illis in solidum queat liberare, natura de ejusmodi methodo, ac symptomatum concatenatione sibi prope- xit, quibus materiam peccantem, atque alienam, quæ totius fabricæ compagem aliter solveret, & suis finibus posset excludere. *Sydenham* pag. 19. 20.

240. Acutrum alii a secreta atque inex- plicabili aeris alteratione hominum corpora inscientis, gignuntur, neque a peculiari san- guinis & humorum crasi omnino dependent, nisi quatenus occulta aeris influenza dictis corporibus eandem imprefferit. Hi durante arcana illa aeris constitutione, nec ultra pergunt lacerare, neque alio tempore invadunt. *Epidemici* hi dicti sunt.

241. Acutorem alii ab hac vel illa parti- culari corporum particularium anomalia ori- untur, qui cum a causa magis generali non producuntur, ideo neque plures simul corri- piunt; hi insuper acuti quibuslibet annis, & quolibet anni tempore indifferenter invadunt; hos egræ acutos intercurrentes, sive spe- radices, appello. *Sydenham* cap. 1. pag. 22.

242. Utat autem ab *Hippocrate* ad nos usque non desuerint periti Medici, qui *Ballonii*, *Sydenhami*, &c. instar, constitutiones epidemicas observationibus neotericis illustrare satagerint, fatendum est eos nequicquam profecisse in deter- minandis miasmatis, quæ his respondentem morbos excitaverunt, & fere pro certo habeo cum ipso *Sydenhamo*: eorum morborum partem quam minimam a manifestis aeris qualitibus, ut humiditate, siccitate, frigidity, caliditate, gravitate, levitate, &c. pendere.

243. Nec a posteriori quid certe deducere possumus circa hanc materiem peccantem, ex mutationibus excrementitiorum humorum, qui critico molimine, aut artis opera, foras cor- pore demum eliminantur, forma poris, spon-  
tanea,

mæ, ichoris, bilis, urinae, fæcis, diversimode mutatorum, ita ut in his communem ignorantiam profiteri sapientius sit, quam hypothesi determinatæ adhaerere, ut illis quæ vel plethoram, vel sabarram, vel spîdum, vel aerem constanter inestant.

244. In his æguitis minus infida ad cognoscendam indolem principii morbifici est attentæ symptomatum coexistentium & successivorum consideratio, & speciei cujusque morbi historica cognitio: ex his etenim atque pensatis non raro quidam sunt tum felices, tum fœstissimi modi, quibus terminandus est morbus, præfigimus, quæ cognitione in curando ipso nihil est utilius.

245. Præcocepta videtur opioio multorum Neotericorum morbos inflammatorios omnes pendere ad infarctum ultimum vatorum partis ob materiam crassam, imperviam, illis impactam, quæ sit juxta leges hydraulicas, ut ipsi putant, ut sanguis postice accedens congeratur, vasa sanguifera obstructa, & vicia lymphatica distendat, & non aucta vi cordis in tumorem subrum reniteat, dolorificum elevet; ea vero theoria legibus hydrodynamicæ eorradicit, ut & experientia: leges hydrodynamicæ docent quod obstruatur autem emissariis velocitas emboli terminatur in ratione angustia emissariorum, ut obstructa ultimorum dimidia parte, pressio lateralis a sanguine subsequente vasis obstructis inducta sit vix octingentesima parte major pressioe confecta, adeoque longe minor quam quæ ad vasa dolorifice distendenda requiritur.

246. Experimenta vero in animalibus vivis insinuat doceat arterias tum majores, ut carotidem, tum minores, ut intercostalem per diem integrum flos vinctam omnino in cane vivente, minime intumuisse; ligatis omnino in cane ambabus carotidibus, animal ad quintum diem vixit, eoque tuoc intersecto inveimus carotides filo omnino vinctas, & impervias, nec ullateos tumidas. Vidi sæpius in raoc mesenterio, ac pene obstructa arteria, globulos sanguinis versus cor pacate retrocedere filo coactos, & sine tumore vasis obstructi alteram viam legere.

247. Necessum itaque est ad inducendum tumorem phlegmonodem, ut auctis & repetitis incisionibus cruor in vascula deducenda propellatur a retro, dum antice ipsi resistit, sive ab impaeto viscido obstruente, sive a contractione spastica membranae partem, aut glandulam, aut viscus ambientis, eo sine ut materies peregrina ibi hærens calore & pulsu digeratur, liquecat, resolvatur, aut quovis modo mouteur.

248. Materies vero impaeta est, vel idiopathica; si sit idiopathica, ea est ibi geocia, aut ibi vim irritantem acquirit mora sua; sic lapillus vasis uriniferis impaetus, sic glomer verum in intestino hærens excitat molestiam, ratione cujus canalis ambiens utrinque contrahitur, & arte noxium corpus amplectitur, erroco sæpe conamine, quia ocura omne no-

xium, tanquam calore & pressione resolvable foyet, sic in vasis contrahitur, contect, quod non raro, dum illud resolvable est, feliciter succedit, aut suppuratione foras amandatur, si irresolvable fuerit.

249. Metastatica est congestio, si per viam circulationis, aut secretionis ex massa sanguinea generaliter infeda, aut ex parte singulari materies morbifica advehatur in colatorium, vel exore loci in viscus, aut partem externam imperviam, ibique foveatur, contrahatur, majorique sanguinis accedentis nisu impellatur in finem felices resolutionis, vel diræ, aut tunc necessariz, suppurationis: sic phluxes videmus offium frostra separata, peregrina corpora in vulnere relicta, mediante abscessu foras felicitate amandari; sic videmus in peste materiem morbificam in glandulas, vel anillares deduci, & per suppurationem ægrum ab iocivabilis alias mortis periculo viodicari.

### Therapia.

250. In morbis inflammatoriis paris, quos pulsus fortis, teofus, frequens, calor, dolor, rubor iociosi comitantur, quique ut plurimum adultos, biliosos, sanguineos, robustos, exercitatos, phleboticos adoriootur, summum auxilium est repetita phlebotomia, & dicta iudicanda, diluens & refrigerans, ita ut æger a iudiculis carniis, saltem primis diebus, abstineat, dilutissimo cremore hordei viticans, & potu aquo emollienti, copioso, tepido, pars inflammata simul, quantum fieri potest, foveoda halitu, fomento, cataplasmate laxante, emolliente; febris intra debitos limites coerenda, ne plus æquo ferocia, & phlebotomia eo usque iteranda, donec symptomata ad resolutionem materis morbificæ loutilia compefcaotur, non tamen eo usque repetenda est phlebotomia, ut vires vitales huic resolutioni profuturæ infrangantur.

251. Initio quidem tantus est quandoque infarctus, tantaque plethora, ne vires vitales suffocentur, pulsusque obfcurus sit in hoc vœ casu: prima aut altera phlebotomia pulsus resurgit, fortior evadit, & febris evolvitur, qua suppressa ægro persequenda foret.

252. Cum ægri tudo creicere desierit, seu ad statum pervenerit, tunc attente observanda sunt naturæ conamina, & quo verant est observandum; felix æger, si antea suffocantes phlebotomias passus sit, si leonibus catharticis laxantibus primæ viæ expurgatæ sint; tuoc enim evadendum ne naturæ conatus interturbentur, & non nisi urgeatibus symptomatibus occurrendum est; interea resolutio omni opo tentanda, & si quæ sit via materiei morbificæ, cujus conditioni natura insidit, præparanda ea est ad ejus excretionem; quænam vero via sit, hoc vel fida morbi cogniti docet historia, vel atrecta: prævidet Medici observatoris sagacitas, io quibusdam morbis narium hæmorrhagia, in aliis

parotis, in istis anacatharus, in multis sudor, in quibudam diarrhoea, in non paucis urinae proventus, materic morbiſicæ exitum præbet.

253. Ergo Medicus eventum ignorans ſedulo inſpiciat naturæ conatus & tendentias, illique opituletur; aut potius negotioſus ſpēdator ſit, quam inopportuna perturbator.

254. Longe diverſa eſt therapeia, ſi impura febris inflammationem comitetur, quod docet pulſus raro fortis & vehemens, ſed ſæpe molis, obſcurus, inæqualis; inconfantia & in puris non obvia ſymptoma, narium ſtillæ, ephedroſes, cardialgiæ, nauſeæ, vertigines, anxietates, ſanguis in patella extractus, corio albo deſtitutus, ſero flavo virideſcenti dilutus, ſætor corporis, excretionum, color pallidus faciei, ſpurcitiæ linguæ, &c.

255. In his ſiquidem circumſtantiis languor & inconfantia conatum naturæ non ſolum magnum eſſe malum, & periculum indicant; verum & multo minus natura eſſe exſpectandum, quam in aliis morbis, ita ut, nedum phlebotomia & laxantibus ejus conatus infringamus, ſæpe necellum ſit eam ad vomitionem, alvi fluxum, ſudorem, diureſim ſtimulare, necnon languentem per velicatoria excitare; cum expurgatæ ſunt primæ viæ, per cardiaca, ſudorifica reſocillare; quæ therapeia a priore longe diverſa eſt; interea tamen ſunt caſus in quibus phlebotomia una aut altera initio celebranda eſt, ut emetica & cathartica tuto poſſint deinde præſcribi, quæ in ſpeciali therapeia debent enarrari.

## CLASSIS TERTIA.

### PHLEGMAſIÆ,

#### SEU

#### MORBI INFLAMMATORII.

**INFLAMMATIONES** *Ludovigi's Phlegmonæ interna.* P. Alpii, *Medic. Method. lib. 7.* cognoscuntur ex pyrexia ſeu ægritudine acuta febrili univerſali, cum ſignis inflammationis. Sunt vel interna, quæ ex ardore, dolore, tenſione, pulſatione, tumore partis designantur; vel externa, quæ ex maculis, exanthematibus, phlegmonæ vel eryſipelate conſpicuis, cognoscuntur.

Dividitur hæc claffis triſariam. 1. in *phlegmaſias exanthematicas*, quæ maculis, papulis, puſtulis cutaneis, aut tumoribus externis, phlegmonodeis, eryſipelatoſis cum Pyrexia ingeniuntur.

2. In 2. In *phlegmaſias membranaceas*, quæ pyrexia acuta cum viſceris cuſiſdam dolore, calore, tenſione, tumore denotantur.

3. In *phlegmaſias paronychiatoſas*, quæ pyrexia acuta, cum partis internæ calore, dolore, ſiti, virium proſtratione, aliſque ſignis cuique generi propriis determinantur.

Cum phlegmaſiæ exanthematicæ maxime affines ſint febris, poſſimum remittentibus, ordo exigit ut proxime juxta febres collocentur, unde eas inter febres malignas plurimi Auctores repoſuerunt.

Pyrexia eſt pulſus frequentia, velocitaſque cum calore in morbis, quorum præcipuum ſymptoma aliunde quam a febre deſumitur. Sic in

pleuritide, phrenitide, febris non eſt ſymptoma præcipuum, a quo morbus denominatur, licet eſſentialis ſit; adeoque ut diſtinguatur a morbis primæ claffis, *Pyrexia* vocanda eſt: ſic in dyſenteria, arthritide non raro adeſt frequentia pulſus cum virium proſtratione, ſed ille ſtatus rectius *pyrexia* quam febris dicitur, cum præcipuum morbi ſymptoma febris non ſit. *Pyrexia* itaque eſt frequentia pulſus cum athenia ſeu laſſitudine & debilitate, quæ cum morbis aliis quam febris complicatur. Diverſi ſunt pyrexie gradus, qui æſtimantur ex velocitate, plenitudine & tenſione pulſus, necnon caloris intenſitate: unde dicitur pyrexia magna, ut in pleuritide, phrenitide veriſ & parva, ut in rubeola, variola benignis.

*Phlegmaſia*, deſignante *Caſſello* in *Lexico Medico*, eſt inflammatio ſeu febris inflammationi alicui conjuncta: *Galen. comm. in Aphor. 7. l. 2.* dicta eſt a *phlego*, *uro*, *inflammo*.

Nomen pyrexie vel pyrexie opponitur apyrexie, & latine dicitur *febricitatio*; & ut in decurſu quartanæ, datur per intervalla apyrexia, & pyrexia, evidens eſt integrum morbum ex his duobus temporibus conſtare, ſeu ex pyrexia, & ex apyrexia, adeoque febrem pro morbo ſumptam non involvere aſſiduam pyrexiam, ſeu a pyrexia diſtingui poſſe.

In phlegmaſis omnis pyrexia eſt vel continua, vel remittens; nulla vero intermittens?

Morbi omnes hujus claffis breves ſunt, & ut plurimum periculoſi, adeoque acuti, exceptis tamen ſpeciebus benignis, necnon ultimis exanthematicis, ut eſſera, ſcarlatina; &c. quæ periculo carent.



## ORDO PRIMUS.

## PHLEGMASIA EX ANTHEMATICE.

## Fibres Eruptivæ.

**S**unt illæ quæ cutem eruptionibus inficiunt. Eruptiones vero sunt vel phymata phlegmonodea, vel cryparola, vel phlyctenodea; aut maculæ purpureæ, lividæ.

Plurimæ inter morbos malignos & pestilenciales accensentur, ex his tamen qualitatibus genera morborum minime determinari debent, ut visum erat *Rivierio*, *Huebero*, aliisque Galenicis; inde enim sequeretur variolam benignam alteri generi adscribendam esse quam malignam; dysenteriam, pleuritidem, cæcæ et alios morbos ratione benignitatis aut malignitatis in diversa genera esse revocandos, quod nullus Pathologus Logicæ guarus admittit.

Malignæ vocamus phlegmasias eas quæ sub exiguis pulsus, caloris, et nunc mutationibus statim latentes, ex improviso dein symptomata multo graviora exerunt, quam quæ ex pulsus vi & impetu possent expectari, proindeque etiam ægro insidiatæ videntur.

Typhoides propriæ sunt illæ in quibus pulsus, urina & color confectus & sanis sunt similes, ita ut imperitis ægri vix febrem videantur, interea dum vires sunt maxime prostratæ. Vide genus typhi, class. II.

Pestilenciales vocantur illæ quæ malignæ vel typhoides, simulque epidemice grassantes plures et medio tollunt, quam convalescentes relinquunt; illæ vero diversæ qualitates pendent non raro a vitiosa medendi methodo; sic syphilis, antequam cognita foret ejus antidotus, pestilentialis erat, quæ hodie vix malignus morbus est.

Malignus morbus differt a gravi, quod gravis symptomata ex vehementia pulsus, & anatomiz, physiologia, ac mechanice principii intelligi possunt, ut pleuritis pura, phrenitis &c. maligni vero symptomata ex qualitatibus occultis, ut vi deleteria, dissolutione putredinosa, fermento, veneno, gangrenosa corruptione, verbo ex principii physicis, minime vero ex mechanicis ac physiologicis, intelliguntur in præsentem saltem Medicinæ statu.

Phlegmasiz quarum theoria mechanica & physiologica datur, pura, aut merè inflammatoriz dicuntur, ut pleuritis pura cum sanguine bene constituto, & sine apparatu putredinis in primis viis; quæ vero a corruptela humorum prava & abiectione plurimum crasi, vi, ut ajunt, venenata, miasmatis, contagio, oculis deum aeris, aut humorum qualitatibus pendent, impura, & pro diverso gradu periculi, maligna, pestilentialis vocantur.

In phlegmasiis puris ex pulsus plenitudine frequentia, tensione, magnitudo pyrexiz estimatur, & ex numero ac intensitate symptomatum morbi gravitas judicatur; in illis autem, quo major

est pyrexia, eo sunt graviora symptomata, ut ardor, sitis, prostratio virium, areum, pervigilium, anorexia: quo major est pyrexia, eo affricus vasorum a sanguine major; hinc ignearum molecularum extricatio, unde calor; inde salivæ siccitas, acritudo, avolantibus parvis aquis; inde sitis; major impensa fluidi nervi in organis vitalibus movendis; unde parior pro liberis moribus, inde asthenia: natura vero, sanitatis & vitæ castus, non potest in tanto periculo quiescere & somno indulgere, quando hunc statum, nervorum & cerebri interventu, percipit, unde vigilia, metus, fastidium ciborum, quod in gravibus nesotilis & periculis moralibus etiam accidit: si cortex cerebri sanguine infarciatur, adeoque anima statum sui corporis non possit percipere, utpote a vicio cerebri delusa aut oppressa, inde fiet delirium, vel sopor, in quibus natura negotiis vitalibus incumbet nobis lapsa, ut in somno & insomnio consuevit, cum viget sanitas.

Haec enim ex physiologia mechanico-physiologica principii hæc phenomena deducuntur, verum quæ in malignis phlegmasiis accidunt, quatenus malignis, phenomena aliis principii debentur, ut bili acri, materiei verminosæ, acidæ, vel putridæ, quæ primas vias vellicat, molestat, unde nausæ, cardialgie, anxietates, vomitiones, diarrhææ, spasmodicæ contractiones: in valis vero stases, corruptiones, gangrænæ, vices, anthraces, pectechiæ; & licet materiam morbificam eliminandi necessitas urgere videatur, interea natura velut oppressa nec pugnare quidem aggreditur, ut ait *Galenus*, hinc pulsus vel sano similis, vel etiam debiliior, inæqualis, intermitens, respiratio similis, singultus, syncope, &c. in malignis itaque, & pestilentialibus morbis materies morbifica, ita noxia est, ita viribus naturæ suffocanda apta, ut symptomata multo plura hujus quam naturæ energia tribuenda sint; in benignis vero morbis minus materiei morbificæ quam naturæ viribus respondent symptomata.

Ex his vero prognosis eruitur facile; cum enim tanto minus sit periculum, quo naturæ conatus liberiores, vegetiores, minus & materia morbifica sunt impediti, evidens est exitum morbi benigni felicem fore, maligni vero infelicem, & tanto majus in isto periculum imminere, quo naturæ conatus magis turbati, impediti, anormi, dum vires materiei morbificæ sunt intensiores, qualitas acrior & magis deleteria.

Indicationes vero generales sunt in morbis benignis tollere obstacula quæ impediunt quominus natura materiei morbificæ coctionem, ejusque in phlegmasiis internis resolutionem ac criticam evacuationem molliatur: in cutaneis vero, pustularum, bubonum maturationi, papularum miliarium, morbillosarum exsiccationi, cutis desquamationi, incumbat; illæ etenim sunt viæ per quas materies morbifica colla evacuanda est.



Verum in maligis hi fines solis naturæ viribus attingi non possunt, & requiritur ultior, ut a sarcina humorum nimia liberetur natura, ope phlebotomiæ maturæ sed parca manu instituat, deinde vero ope emetici, quod primas vias a fomite putriliberet, necnon per petitas, catharticas colatorum intestinale detergendo, ut excretio bilis, succorum intestinalium & residui cæcechyli succedat, dum materies morbifica sanguini commixta per medicamina diluentia, veneno dato opposita, corrigitur, & per sudorificam ad cutem amandatur, simulque ope cardiacorum, cephalicorum, vires vitales sustinentur, aut ad strenue agendum sollicitantur.

Quoniam in quamplurimis exanthematicis humores ad putredinem vergunt, ut patet ex fœore oris, excrementorum, & cito cadaverum gangrena, septica tum medicamina tum alimenta fugienda sunt, & antiseptica anteponenda; notum autem est vegetabilia alimenta, exceptis acribus, esse minus putredinosa, quam carnes animalium, adeoque ægros crematibus avenæ, oryza, decocto albo Sydenhami esse nutriendos, nisi tamen a iulculis expectetur major corroboratio, ut cum pulsus languidus est; in quo etiam casu psifana de cornu cervi cum radicis aromaticæ, ut angelicæ frustulo, immo vinum aquatum requiritur; antiseptici accensentur chamæmelum, radix contrayervæ, kinkina, camphora, quorum proinde usus in exanthematicis frequens est.

Quoniam vero maxima pars exanthematicorum pendet ab effluviis putridis quæ in castris, nosocomiis, viribus obfessis, locis paludosis, tempestate fervida, & humida abundant, summi momenti est ad prophylaxim & ad therapiam, ut aer purus sit, aura liberiore renovatus, vel accensis aromatatis, pyrio pulvere correctus, vel ventilatore exagitatus; ut cibi ex carnibus animalium morbidorum, anthraxe peremptorum, fugiantur; ut aquæ cognoscæ vitentur; ut acidis, limonum succo, aceto condiantur, alimenta ad arcendam putredinem; ut perspiratio libera fervet, indusis puris, siccis, & aere minime humido; perspiratio etenim retenta est veluti fermentum putredinosum, materię morbificæ vim exacuit.

I. PESTIS; *Febris pestilens*. Fr. Hoffmanni cap. 12. *Pestilientia*. Schreiberi; Græcis *Loimos*. in *Peste*.

Est phlegmasia exanthematica, sæpius epidemica maligna, cujus eruptio est bubo, parotis, vel anthrax, nec non pustulæ parvæ albæ, lividæ, nigrae, carbunculosa, per habitum corporis dispersæ.

Nomen Pestis, si usum tantum spectemus, terrorem secum involvit & morbum quemvis epidemicum lethiferum significat, ita ut dysentericæ, variolæ, amphimericæ, purpuræ, malignæ epidemicis conveniat; verum genus morbi

ex ejus benignitate; aut malignitate minime deducendum est; ut vidimus; & ut character variolæ ex pustulis, ita Pestis character juxta omnes fere Neotericos ex bubonibus deducendus est, nec repugnat dari Pellem sporadicam, & benignam, ut similis datur variola, & ut confirmant observata Medicorum Monspeliensium, Massiliæ & Alesia pestiferos curantium.

Differt Pestis a pestilentialibus morbis, quod Pestis est genus morbi nunciam jam definitum; pestilenciales vero tot sint morbi, quot sunt maligni & epidemici, qui plures a modico tollunt quam sanos dimitteunt.

Pestis affecti vocantur *pestiferi*, Gallico *pestiférés*. Bubones sunt glandula duræ, tumida, dolentes, ad supurationem tarde vergentes, sæpius in inguinibus, quandoque in cruris angulo, in axilla, maxilla, jugulo, pone aurem enati, unde evidens est parotidem a bubone non nisi situ discrepare.

Anthrax malignus epidemicus cum febre maligna vel pestilentiali erumpens speciem pestis etiam constituit, & hic morbus ad aliud genus vix amandari potest, maxime cum in eadem epidemia, quæ bubones profert, anthraces quandoque erumpant; si quis vero genus distinguere constituit velit, non repugnabo.

1. *Pestis vulgaris*. *Pestis Londinensis* Sydenhami anno 1665. *Pestis Massiliensis* classis 2. 3. & 4. D. D. Chiconyeau, Deidier & Verny, ann. 1720. *Pestis Alesiensis* D. Gouzier. &c. Chirac des fièvres Ch. 7.

Ea est species in cujus tuminitio tum decursu bubones sæpius inguinales erumpunt, quæque epidemica & perniciosa est.

Incipit a frigore, capitis supore & gravitate, quasi ebrietate, pulsu frequenti, tenso calore interno deurente, externo mediocri, siti inextinguibili; lingua alba est, vel obscure purpurea; loquela est præceps, balbutiens; oculi rubri, errantes, scintillantes; faciei color vividus, in albis lividus, cardinalis frequentes; respiratio frequens, laboriosa, quandoque magna, rara, sine tussi, & dolore; accedunt nausæ, vomitiones biliosæ virides, nigrae, cruentæ, dejectiones alvi similes, sine dolore, ac tensione abdominis; deliria vel lenia, vel phrenitica; urinæ quandoque sanis similes, sæpius turbida, albæ, nigrae, cruentæ; sudores raro fecidi, noxii; quandoque hæmorrhagiæ, quæ insalubres; virium omnimoda prostratio, agni præsertim dejectio, & metus mortis continuus; demum ipso morbi initio vel in decursu apparent bubones inguinales, vel crurales, vel axillares, alii parotides quandoque seorsim, vel simul anthraces in artubus, nec non pustulæ exiguae albæ, lividæ, nigrae, vel maculae purpureæ hac vel illac dispersæ.

Duratio morbi, nisi mors præcesserit, extenditur ad decimum quartum diem circiter; tunc cessat febris, & bubo resolutione rarissime, sæpius supuratione, quandoque induratione terminatur.

Epidemia apud nos (1) vix quovis seculo occurrit, apud Anglos quovis quadragiesimo anno, apud Constantinopolitanos multo frequentius.

Epidemia apud Alesienfes, Aquisextienfes &c. vifa est ter vel quater in anno intermittere, ita ut dein post duos quadragiesimos (secessus, cum omnino nullus fuisset) ager ab uno altero mense, subito, eademque fere die cum Alesia, tum Aquis Sextiis & Marignoli plures Peste corripentur, cunctis post paucos menses utrobique Pestis evanesceret; ex qua pluries repetita Alesienfium Medicorum observatione inferendum videtur principium Pells in aeris singulari constitutione, non minus quam ejusdem regionia hominum dispositione, inquirendum esse. Alesia certe e trecentis pestiferis vix unus aut alter fuit supra Plebeciorum ordinem elatus, unde pravam videtur rationem ad Pestem disposuisse vel simile est. Cum in intermissione Pells illustr. Doctor Gibert prescripseret, ad avertendum Pestis recursum, ut omnes pestiferorum cum convictores, tum in eadem domo degentes, emetico purgarentur, observatum est omnes convictores vermiculorum alborum grano bordei similium immensam copiam vomuisse, nullam vero aut rarissimam cohabitatores. D. Privat Doctor Medicus eximius cum antea ab urbe abesset; Alesiam adiit incunente Peste, atque urbem ingressus dolorem in glandula inguinali sentire cepit, qui dolor per singulas epidemias exacerbationes perseveravit, in intermissionibus vero cessavit, ita ut reditus accessum ex dolore inguinis, Pestis prodromo, non semel prædixit: Ille vero merito videbat plebem & Magistratus, qui, quoties Pells redibat, toties communicationem quandam illicitam, aut mercium infectarum exportationem, tum Alesia, tum aliis in urbibus iuculabant, atque ex hoc præiudicio non pauci qui legem sanctam violaverant morte pledebantur, quasi novæ Pells exacerbationis rei.

Prostat Alesia pestiferis in prædia pro & frigidulo aere gaudentia prius purgata dimittere, nec non omnes convictores emetico in prophylaxim expurgare. Plurimi Peste correpti & in suburbium seu lazaretum delati perire ob formidinem mortis quam in hoc nosocomio inevitabile putabant; metas enim & desperatio sunt funestissimum huius morbi symptoma; de cætero intra annum quo Pells Alesia inhaesit, non plures obiere Pells, quam cæteris annis morbis sporadicis seu diversis generis adripi consueverant, circiter trecenti, & quam intra annum nati sunt; sed hoc observatu dignum fuit omnes alios morbos acutos durante Peste siluisse; & omnes morbos acutos & Pells genere fuisse.

a. Pells benigna 3. Classis. D. Chicoyneau & Verny.

Ea Pells varietas vel varietas Massilia & in aliis Urbibus eodem tempore observata est, quo prima species; in illa nulla erat sensibilia ægritudo, nulla virium prostratio, pulsus tantum adest

frequentia eaque minima, cum eruptione bubonis vel anthracis: cura vero exigat, ut bubo cataplasmatibus suppurantibus maturetur. Ea species videtur affinis variolæ benignæ quam plures pueruli invicem colludentes, & per vicines ambulantes sine ulla cautela, sine speciali regimine & cum felici successu patiuntur.

3. Pells interna ex 2. classe. D. Chicoyneau & Verny; vel Retrocedens. D. Gibert.

Ea est varietas Pells primæ, seu vulgaris, in qua nulli bubones aut anthracis erumpunt, licet conatus naturæ eo vergere videantur, quod ex cadaverum extispicio apparet, cum in partibus internis harum eruptionum manifesta appareat indicia, & externarum loco vibices, petechiæ, aliæque imperfectæ eruptiones adfint.

Sigæ hujus sunt frigus universum, rigores anormali, pulsus exilis, molli, frequens, inæqualis, depressus, a pressione digitum evanescens, capitis gravitas cum stupore, vertigine, titubatione, obtusa fixa, debili, facie desperationem exprimente, voce tarda, querula, lingua alba, in fine sicca, nigra, scabra, vultu pallido, cadaveroso; aderant syncopes frequentes, anxietates horrendæ, prostratio animi & corporis, vomitus, nausea, deliria, sopores, tremores, & prima, secunda vel tertia hora mors.

Differt ab aliis aphysitis seu moribus subitatis, ex eo quod mixta sit cum aliis Pells speciebus, & per phlegmones, anthracis, gangrenas, quibus interiora cadaverum scateant. Hæc species initio epidemias sævit, nec ullus a peste convalescit nisi bubo vel anthrax eruperit, ut nullus a variola interna vel abortiva convalescit.

Observata in Peste Alesienfi ab Illustriss. D. Gibert D. M. Monsp.

Pells initium ab ebrietate distinguere difficile est. Prima die adest virium prostratio, calor, sitis molesta, pulsus frequens, oculi scintillant; errant, facies rubet, lingua spongiosa & cocci-neæ; adfunt dolor capitis, inguinum, axillarum, faucium, pone aures, nec non cardiacæ, nausea. Secunda die accedunt vomitus biliosi, virides, quibus rejiciuntur vermes ascaridibus similes, deiectiones ejusdem modi; quibus succedat erupcio bubonis, parocidis vel anthracis, eo majorum quo major præcessit evanescit.

Facta eruptione ægri surgunt, incedunt, morbum contemnuunt; diætam respuunt, calor & sitis sedantur, pulsus tamen adhuc frequens & durus, lingua balbutiens; oculi & facies pallent, fames vero notabilis est. Sexta, septima, vel octava die tumbres evanescunt, vel retrocedunt, suppuratio sistitur; pulsus retardatur, evanescit, mors adest, vel quod frequentius, accedunt orthopnoæ, carus, phreuitis, & præmissis convulsionibus, mors.

Vomitus quicumque ac diarrhæa initio salutaris. Qui parum vomere vel deiecere, illi cum viribus prostratis, facie cadaverosa, quasi temuleuti,

(1) Pestem in Orichania vidit Vallerius anno 1533. Ruellius anno 1630, nos anno 1720, cum observavi nos, aliis in cæteris temporibus annis 1598, 1642, & 1710.

lenti, ante quartam diem fatocedebant, exanthematis vel paulo ante vel post mortem defecant; alii vero sub minore morbi vehementia, aut pre constitutione debiliore ad vigesimum diem vitam protrahabant, maxime qui suum morbum tardius denunciaverant. Alefiz vomitus quicunque initio salutaris, in decursu morbi lethalis, diarrhoea initio & in decursu salutaris; Massiliz non item.

Pestem dari sporadicam observarunt Medici Monspelienses; quo etenim anno Pestis epidemice grassabatur Alefiz, tres quatuorve Monspeli observati sunt aegri peste bubonifera laborantes, atque non video cur ad hoc genus non referendi sint illi morbi quotannis ubique observandi, sed sporadici, qui eruptione parotidis critica vel symptomatica stantur; certe si quid obstat, est terror, quam non raro Pestis plebi incutere consuevit, simile enim præjudiciū efficit ut vitium emericum quæ benedictæ nomine præscribitur, & ut plebs anthracem & cancerum propriis nominibus non indigitet.

Non pauci fuere Massiliz quos subitanea mors abstulit, sine aliis symptomatis quam lassitudo, virium prostratio, quique interrogati bene se habere dicebant.

4. *Pestis sporadica* Sydenham. pag. 62. *alii febri maligna vel pestilens, parotidis pestilens.*

Est ea species Pestis quæ non epidemice grassatur, nec proinde tantas strages edit ac vulgaris, sed quæ sæpius parotidem, rarius bubonem aliarum partium insert. Ea certe contagiosa vulgo non creditur, nisi a plebe, & ab amphimerinis, tritaphis & typhis non discrepat, nisi per eruptionem parotidis.

5. *Pestis carbunculosa* & *Anthrax pestilens* Auctorum, Forest. L. IV. Obs. 21. *Pestis Indica, Carazzo, Gemelli Carerit* *Chorbon pestilens* et.

Ut bubo sine satellitibus morbi maligni pestem non constituit, cum in syphilide etiam detur, & Pestis benigna sit epidemica, atque eodem quo Pestis vulgaris tempore vigeat, ita anthrax benignus Pesti non annumerandus est, sed malignus huc accendendus: non quidem diversa Pestis species est a vulgari, quando erumpunt simul cum bubonibus anthraces, sed quandoque tantummodo anthrax erumpit pestilens, ægrum intra breve tempus & medio tollens cum pulsu parvo, debili, intermittenti, facie ræsa, summa virium prostratione; quales anthraces maxime collum, auris vel maxillæ viciniam occupant, & ille morbus merito in Pestis genere reponendus est, sive sit sporadicus, ut in Gallia Narbonensi, notante *Plinio*, familiaris est, sive pandemicus, ut de Indiis refert *Gemelli Carerit*.

Hic morbus aggreditur rusticos qui carnes vervecum anthrace peremprorum in cibum adhibent, passiores, laniones, iocrices, quicorum cadavera, lanam trahant. Viget circa Perpinianum opinio ex perdicibus primitus in pecora propagari virus carbunculosum, & quotquot verveces biberint in rupium foveolis aquam prius a perdice degustatam, tot anthrace deinceps af-

fici, experimenta a *Doctore Campagne Med. Monsp* a Sigean instituta, & Societati Regiæ Scientiarum relata, hanc opinionem paradoxam confirmare videntur: ratio vero nulla suppetit.

An morbus ardentium, *mal des ardens*, qui olim in Gallia, Pestis instar, strages horrendas edidit, fuerit Pestis carbunculosa?

Vidi aliquoties anthraces duplicis speciei, malignos scilicet, qui cum pulsu exili, facie pallida, frigore extremorum, cardiagia, virium subitanea prostratione, intra paucas horas aut diem ægrum de medio tollebat; in collo vero nullus exterius tumor, sed tantum sub cute distinguebatur glandula tumida vix dolens, cujus apicem tegebant macula livescens, cuticula non adhærens, quæ resecta, interior macula nigricans, sensu experta, sphacelosa, larebat; alias vidi anthraces minus malignos cum febricula partem faciei, ut palpebram, afficientes, qui plures dies perseverabant, exulcerabantur cum tumore inæquali, atro-rubro, labiis inversis, fungulo, vel excrefcente, siccò, minime purulento, canceri exulcerati instar horrendo, & sese in viciniam diffundente, quæ altera species a morbo ardentium minus abluat, cujus descriptionem videlis apud *Moray Histoire de France* ann. 996. nec non *ignis sacri vel ignis sancti Antonii* nomine anno 1090. regnante Philippo I.

6. *Pestis Gossantbrax* Ligeri de morbis jumentorum, Maisson rustique.

Boves, equos, mulos per Galliam, nec non homines plures Nemausi anno 1731. infecti & jugulavit hæc Pestis, quæ ad linguæ radicem anthracem proferebat, quo tota sensim lingua intra paucos dies exedebatur, hac vero erosa penitus, jumentum, quod huc usque præter sebre & virium aliqualem prostrationem functiones suas aliquatenus obibat, illico moriebatur.

Pro cura radebatur anthrax ad sanguinis effusionem intervenit pummi argentei, vel similis instrumenti, & vulneri applicabatur decoctum ex alio, sale, pipere, & assaetida in aceto; similisque methodo tum hominibus tum jumentis profuit.

7. *Pestis anticardiaz* Liger Maisson rustique; Hippitatis Ancour vel *Avantcur*.

Pestis hæc homines & equos est familiaris, sed sporadica; pili in dorso horrent, febris adest inflammatoria, cordis palpatio, moror, anxietas, capitis inclinatio, & non raro syncope; in antica vero pectoris parte excrefcit tumor phlegmonodeus pugni magnitudine qui *anticardiaz* dicitur. Morbus hic pericul. plenus est; si tumor anticardiaz evanescat vel retrocedat, mors est in prociū.

Cura anticardiaz exigit phlebotomiam e collo ad libram unam vel unā & semissem, clysmata bis in die injiciantur, nudentur pilis tumor & ad maturitatem deducatur, dentur interea potus cardiaci & sudorifici ex theriaca, antimonio, aliisque.

8. *Pestis Siamæ*: le Siam, mal de Siam. Ille morbus allatus fuit ex Siamia Martinicæ

anno 1636. cum nave *l'Oriflamme* in diversis epidemiarum stadiis diversa eratejus facies, nunc *synocha Siamæ* erat, nunc *stomacæ Siamæ*, nunc *pestis Siamæ*, bubonibus scilicet inguinum, vel axillarum erumpentibus cum pandemia; morbus initium ducit vulgo a gravi *cephalalgia & lumbragine*; sequebatur febris interna, id est, typhodes, quæ nulla sui in pulsu & calore signa præbebat; sæpe superveniebat stomacæ universalis seu fluxus sanguinis ex naribus, ore, poris cutis, urethra, alvo, &c. Interdum vermes diversi coloris, diversæque magnitudinis ano antecato catervatim prodibant. Quibusdam bubones ad inguina, vel axillas erompebant pleni cruore nigro, foetido, vel vermibus fæcti. Morbus intra sex vel septem dies terminabatur; omnia cadavera intra horam æque livida & putrida erant ac si quatuordecim forent. In acutissima ægri post *cephalalgiam* levem homi procumbent mortui.

Epidemia Anglis, Hispanis non pepercit anno 1705. *Pater Labat*, qui hæc narrat, bis hoc morbo affectus fuit: aliter hoc morbo ægrotans clamabat sibi *empi* genua, paulo post femora, dein lumbos; nigredo cutis ad superiora ascendit, inferiora sensum amittunt, & intra semihoram mors ossa possidet.

Doctor *Dix* Medicus Anglus qui scripsit anno 1731. *the ancient physician Legary* &c. milites suos incluserat in Templo in quo pestiferi recenter sepulti fuerant; horum æro. Peste correpti sunt cum pethechiis & bubonibus; ille autem iussit ut omnes successive phlebotomiam paterentur, nec vinciretur vulnus primi, priusquam ultimi phlebotomia peracta fuisset, ita ut quilibet 100. circiter sanguinis uncias amitteret; oleum & spiritu vitrioli ad gratiam aciditatem aquæ intinxit, pro potu ordinario, omnes autem evasere exceptis octo qui liquores spirituosos bibere voluerunt. Hæc in Peruvia acta sunt: in Europa vero phlebotomia vix in Peste institui potuit ad paucas uncias.

9. *Pestis remittens* D. Chicoyneau observat. ultima.

Est varietas Pestis vulgaris aut benignæ, quæ febre non continet, sed remittente æque amphimerina stipatur, hæc observavit Archiater laudatus in puella Massiliensi, quæ quotidie hora quinta vespertina paroxysmum febris patiebatur a frigore & horrore incipientis, mane vero sudore oborto remittebat, in illa bubonæ inguinalis ovi columbini magnitudine enatus erat initio morbi, & præter terrorem, nullum aliud symptomata aderat.

*Curatio* Pestis vulgaris, quæ Alexiæ fuit minus infelix quam alius in locis, eo vergebat, ut tollerentur impedimenta eruptionis quam natura molitur ad glandulas potissimum inguinales, quippe Pestis nihil aliud est quam naturæ conatus, quo miasma quoddam sanguini infusum, in illis glandulis tantummodo feliciter fecerandum, excernere contendit; nam bubone felicitè erumpente, crescente, suppurante sanitas

restituitur, eo suppresso, represso, non satis exuberante, mors adest: quo plures bubones erumpent, eo melius, quo plures anthracæ, eo pejus; ergo anthrax miasma magis deleterium aut magis evolutum gerit quam bubo: quo copiosior eraticinio vomitus aut diarrhœa, eo felicius erat bubonis eruptio, ergo saburra primarum viarum hanc eruptionem impedit; morbus ille est inflammatorius, sed a materia maligna naturæ conatus suffocantur, ejus vires oppressæ sunt initio, non exhaustæ, ergo phlebotomia, eaque repetita curatio ordiendæ est, si pulsus permittat, quam indicant ardor, sitis, rubedo, hæmorrhagiæ variæ, &c. Si pulsus phlebotomiam non permittat, ab emetico initium ducendum est: vomitionem biliosam, verminosam, copiosam bene tulerunt ægri Alexienses, qui prophylaxias gratia somno emetico talia vomuere, omnes fere a Peste immunes fuerunt; qui vero sumpto emetico non vomuere, deinceps Peste perire, qui pestiferorum conviciores fuerant; si prima dosis emetici nihil egerit, reitetur post horam & semissem, cum pituita purgante; si vires faciant, sumatur drachma discordii. Facta eruptione bubo naturæ committatur, ut in variola; bubonis ulti, dilaniatio, apertio semper male successit Alexiæ. Juvant diluentia, refrigerantia, potus theæ, emulsiones coctæ, &c. cavendum, dum æger rubet & fervet, a calefacientibus. Si parum evacuatus fuerit æger, hauriat pituitam laxativam, addito bolo aquilæ albæ; si non dormiat, adhibendum narcoticum; pituita ecceprotica per quatuor vel quinque dies continetur. Si vero pulsus langueat, sudor lenis erompat, eruptio retardetur, sumatur pituita sudorifica. Si e contra æger fervet, continetur pituita refrigerans addita manna: bubones erumpentes more solito ad suppurationem deducantur.

10. *Pestis scorbutica* Lind. traité du scorbut, ch. des dissolutions.

Quibusdam scorbuticis, quibus tantum gingivæ exulceratæ, enascentur tumores duri, rubri ad manus & pedes; dein inguina & axillæ bubonibus facile in abscessum abeuntibus afficiuntur, cutis maculis subcæruleis variegatur, in cadaveribus invenitæ sunt glandulæ inguinales & axillares tumidæ, pure circumfusæ, interstitia muscularum in brachiis & femoribus purulenta.

*Observanda circa Curam*. Pestis vulgaris & Pestis interna fere omnes ægros Massiliæ eripiebant cum signis inflammationis gangrænosæ in cerebro, pulmone; & quo robustiores & magis pingues erant, eo minus spei supererat; in Peste interna nec phlebotomia nec emetica aut cathartica tolerari poterant, sudorifica & cathartica mortem tantum aliquot horis retardabant.

In Peste vulgari vix phlebotomia sustinebant, nisi mature institueretur, inde sæpe syncope lethalis sequebatur, licet ægri ipsi phlebotomiam petissent. Solum inter emetica tuto adhibebatur picacuana, & deinceps pituita, laxativa, nec non pri-

pitiana diluentes niterat, leviter diaphoreticæ; fortiora evacuatia lethales hypercathartica excitabant, fortiora sudorifica gangrænas internas accelerabant. Nullus evadebat nisi interventu bubonis vel anthracis. Massiliæ viginti circiter mille homines Peste benigna affecti sunt, quorum bubones sensim excrescebant sine febre, lassitudine, aut alio symptomate; illi bubones vel in scirrhum abibant, aut, quod melius, in suppuratum, aut, quod rarissimum, resolvebantur felicissime: illi ægri quasi sanati urbem perambulabant, emplastra suos bubones tantum curabant.

Vires ab emetico aut cathartico dejectas restituebant partim cardiaca, potissimum theriaca, diascordium, lilium; sicim urentem, ardorem temperabant pitianæ niterat. Spiritu sulphuris aut niteri acidulatæ, syrupus de limonibus, &c.

Bubones initio profundi, exigui & summe dolorifici, sine mutatione coloris in cote, deinde crescentes cutem attollebant, ac incrementum adepti indolentes erant. Quocumque morbi stadio erumpabant bubones, illico eas foras attrahere curabant per cataplasmata emollientia, anodyna ex lacte, mica panis, ovorum luteis, vel herbis emollientibus, dein capis, sapone, oleo, &c.

Verum quoniam ægri Peste interna affecti peribant antequam bubo extrorsum protuberasset, illico cum sui signa dabant, lapidibus causticis inurebatur locus, & post aliquot horas eschara cultro perfodiebatur usquequo glandula in conspectum venirent, quas extirpare non potuerunt sine lethali hæmorrhagia, ut ut parca, adeoque eas leviter scarificatas in suppuratum vertere quantocius conabantur; cucurbitulæ & vesicatoria non succedebant, & saltem vesicæ inflammationes excitabant. Alesæ vero ulla incisionis profuit, sola cataplasmata, & naturæ vires bubones ad exitum perducebant.

11. *Pestis Egyptiaca* Prosper. Alpini de med. Egypt. lib. 2.

Ea est bubonifera & quovis septennio Egyptum invadit, nunquam in urbe Caire alio mense accedit, quam Septembri, vel Octobri, nec recedit nisi Junio; Junii scilicet die 17. oriente Sole Nilus crescit, & crescere desinit circa finem Augusti, 16. ad 26. cubitos attingens, tamdiu stant Etesia versus Æthiopiam ubi per 40. dies pluit, unde aqua Nili crescit quidem a mense Maio, sed incremento parum sensibili, quoad mensurare incipiunt tantum mense Junio. Ægyptii, qui Mahumetanæ prædestinationi credunt, nullas cautelas Pesti opponunt, & ea misere regio devastatur, cum anno 1580. in urbe Caire quinquaginta hominum millia Peste interempti sint. Quamdiu furie Pestis, nullus morbus sporadicus apparet, quos tantum observare datur a Julio ad Septembrem, eo enim tempore sponte cessat Pestis. Pestis illa vix unquam principium suum habet in Ægypto, sed vel aliunde quasi seminum adheiret, quæ ex Græcia & Syria, melior est; quæ vero ex Barbaria procedit, dirissima est & longissima, ita ut octo, novemve menses perseveret epidemia.

*Observanda circa Pestis carbunculosa curam.* Carbones ut plurimum bubonibus erant stipati in Peste vulgari. Anthracis illi raro faciem, collum, abdomen, sæpe vero femora, tibias, brachia, pectus afficiebant. Statim apparebat pustula albescens, flavescens vel subrubra, in medio pallida vel obscure rubra, qui locus dein evadebat sensim nigricans, crustaceus maximo in ambitu, aliunde diversis coloribus distinctus, ita ut respectu coloris prædominantis, nec non doloris aut indolentiae, alii anthracis phlegmonodes, alii erysipelatosi, ultimi gangrænosus videbantur.

Infelici cum successu adhibita sunt cauteria vel actualia vel potentialia: inde enim inflammationes gangrænosæ, & laborum induratio sequebantur. Melius succedebat incisiones ad vivum usque, densæ, immo ablatis partis gangrænosæ seu escharæ callosæ, quæ eorum aliquot anthracum comitabantur.

Scarificatis superimponeretur, uti bubonibus, plumaceum digestivo onulium ex terebinthina, balsamo Arceæ, oleo terebinthinæ, theriaca, additis; in anthrace magis putri, aloë, myrræ, & camphoræ. Plumaceola vero tegerantur cataplasmatibus emollientibus, anodynis; vel spiritibus pro re nata, ut in bubonum cura; deinceps vero lotiones, ut in bubonibus, detergeret, vel emollientes sequebantur; immo ubi digestiva dolorem excitabant, plumaceola nutritio onusta applicabantur; in his itaque anthracibus alia methodus requiritur quam in anthrace simplici, quem escharoticis innere solemus est.

Pesti vulgari affinis est erysipelas, ignis sancti Sydenhami pag. 66. ita ut axillarem & inguinum dolor bubones mentiatur; verum non prostant ejus accuratæ historiæ.

II. *VARIOLA* Haly Abbatis, Jouberti & Antiquorum; *Euphlogia* vel *Chaspe* Rhazis; *Variola* in plurali Recentiorum; *Bösten* Germanis; *Smallpox* Anglis; *Viola* & *Vaiola* Italorum; *Petia vérale*; Occitanis *Picotte*.

Æger, licet plures pustulas scabiosas, miliaris, variolosas gerat, unico morbo afficitur: unus vero & singularis morbus nomine singulari, non plurali indigatus est.

Hic morbus novus censetur ex Asia in Europam, cum bella *Crisidae* dicta vigeant, ex Europa in Americam deductus, quo tempore Fernand Cortes Peruvium sibi subiecit.

Variola est genus phlegmasie exanthematicæ, sæpius epidemice, cujus eruptio in pustulis phlegmonodes ad suppuratorem tendentibus, pili magnitudinem demum æquantibus, consistit.

Differt Variola a Peste, quod in Peste erumpant bubones vel anthracis, in Variola pustulæ sensim crescentes, suppurantes, dein crustaceæ quibus elapsis remanent in cute foveolæ; A rubecula quod papulæ rubeculosæ in cuticulæ furfuraceam deliquamationem vergant, præcedatque coryza, epiphora, tussis, quod præulium



vix unquam Variolam præcedit: A pemphigo, quod pemphigus bullas vel vesiculas aqua plenas nuchæ magnitudine præstat.

Si vigiliam hominum partem excipiamus, qui nunquam spontaneam Variolam patiuntur, nec infectione possunt recipere, cæteri omnes in vice, decursa semel Variolam experiuntur, æt frequentissime infantes.

Variolæ aliæ sunt *discreta*, quarum scilicet pustulæ ab invicem remotæ & distinctæ sunt; harum aliæ benignæ, aliæ malignæ: Sunt vero aliæ *confluentes*, quarum pustulæ bene multæ invicem coherent, aut in unam ducunt, tresve conflungunt, coalescunt, aut saltem in facie in corymbos sunt aggregatæ, quæ corymbosæ dicuntur; confluentes vero sunt peiores discretis benignis.

3. *Variola lymphatica* & *Variola velatica* & *discreta*: *Variola halitosa* seu *aquosa* Brendelii; *Hydrachnis* D. Gasson; *petite vérole volante*, vulgo *Verruete* & *Verolete* Gallis; *Cryphalline* quibusdam; *Escapete* Occitanis; *VWaterpocken* Anglicis, *Ravaglia* Italici.

Est species est quæ sine notabili febre, sine ægritudine infantes, bimos, trimosve aggreditur, exieritque, in facie potissimum, pustulas exiguas, scaris rubras, lymphæ pellucidæ aut subalbida plenas, lentis magnitudine, quarum alie intra biduum exsiccantur, dumalæ solum siccant; & omnes intra quatuor circiter dies exsiccantur delabuntur, ut plurimum nullis relictis in cute forolis, ut nullum fere incommodum attuleret.

Hujus varietas est altera quæ recens natos fere una ab ortu hebdomade afficit, & similes aquosas pustulas circa umbilicum, axillas, digitos emittit, quæ intra tres vel quatuor dies exsiccantur, & in crustam mutantur, excidunt, Occitanis *Bourguirels* dicta.

Curatio soli naturæ commissæ feliciter succedat; sufficit decubitus in lecto, si tempestas frigida sit, victus ex pisculis & potus calidus.

4. *Variola discreta benigna* & *Variola regularis* Sydenhami; *Variola aurea* Liedlini Lin. Med. *Petite vérole discrète simple*, i. *sorte*, Helvetius Obs. sur la petite vérole. A.

Quatuor stadia in ea sunt, præludium, eruptio, suppuratio, exsecatio.

1. *Præludium* illius speciei est, 1. lassitudo spontanea; 2. frequentia pulsus; 3. cephalalgia cum somnolentia in infantibus; 4. lumbago, vomitus; 5. quandoque eclampsia seu convulsio minime ominosa.

2. *Eruptio* circa tertium vel quartum diem incipit, quo serius, eo melius; puncticulæ seu maculæ rubræ, acuminatæ; in quo a purpura differunt, initio rariores, faciem, mentum, pedus occupant, sensim crescent; pustulæ extuberant usque ad septimum diem, quo desinit eruptio, & incipit suppuratio.

3. *Suppuratio* a septimo die ad novum circiter extenditur, in confluentibus vero malignis ultra excurrit.

4. *Exsecatio* incipit in discretis nono, & ad decimum quartum extenditur; incipiunt vero exsiccari, quæ primæ erupere pustulæ pedum, manuumve; quæ ultimæ erupere, sunt omnium maximæ.

Benignis hoc commune est, quod erumpentibus pustulis symptomata præludii evanescent, pyrexia minuitur, pustulæ gradatim crescant, & nullus alter morbus accedat.

Discreta & confluentibus differunt non solum symptomatum minori vehementia, sed pustularum numero minori, potissimum in facie, & distantia majori; quocumque fuerint in residuo corpore, modo raræ sint & distinctæ in facie, perinde est, & prognostis multo tutior est.

Discreta benigna habet pyrexiam vere continuam, quæ in quibusdam sublevis vix est conspicua, & infantes orthostati more solito efficiunt, impune etiam offas suam manducant, ludunt in suo lectulo, ridet maxime eruptione peracta. Observatur tamen sed raro pyrexia remittens, ut *amphimerina* quæmi vidi, *triacapha* quam *Helvetius* observavit. Alvis est ordinario adstricta; si vero diarrhæa accedat, observante *Helvetio*, hæc vices deprimit, pustulas supprimit, vel reprimat, unde periculum majus quam si confluentibus supervenerit.

Datur varietas in qua septima die nulla suppuratio fit; sed pustulæ sensim resolutione terminantur sine periculo, & quandoque sine pyrexia sensibili, hanc varietatem *resolutam* Anglici *Empetor* appellant, quod maxime distinguendum est retrocessu pustularum, qui in aliis speciebus, alitque stadiis accidit, & funestissimus est, de quibus consultat *Helvetius*.

Ad discretam benignam pertinet fere semper *variola inscripta*, vulgo inoculata, quæ etiam eruptita dicitur apud *Trans. Phil. tom. 8. pag. 661.* quæ scilicet inferitur brachio vel tibie ope incisionis pollicem longæ in cuticulâ factæ, cui superimponitur lintheum carptum pure varioloso onustum; vel ope emplastri vehiculatori datur puti varioloso aditus; hoc vero contagio admisso septima vel octava die supervenit rigor, calor, & eruptio Variolæ, quæ benigna & discreta solet esse, modo infans ultra quinquennium constitutus bono & refrigeranti regime usus fuerit, per quindecim dies a carnibus & vino abstinuerit; aut purgatus, & aliquot jusculis diluentibus præparatus fuerit: constat autem observationibus ducentum millibus circa Variolam inoculatam institutis in Angliæ, America, Italia, Gallia, &c. & super Genævæ, Nemausis, &c. vix et trecentis aut quingentis unum, immo si eligantur sublevis, ut fecit *Ramby*, vix millesimum e medio tolli, cum ex calculo *D. Jurini* a variola spontanea circiter septimus quinquæ æger e medio tollatur, collectis in unam summam pluribus epidemiis, unde evidens est nihil caritati & prudentiæ convenientius esse, quam infantes circiter sexennes victu emolliente & refrigerante præparatos hujus institutionis interveni a tanto periculo liberare. In No-  
foco.

focomio inoculationis Londinensi ex 492. inoculatus nuper unus tantum obiit.

*Gara Variolæ discretæ benignæ* spontaneæ; vixit sit diluens & refrigerans, ex iussulis vel cremoribus oryzae, avenæ, quarta quaque hora, potus ex pennis bordei. Clysmata emollientia singulis vel alternis diebus injiciantur; quantocius sanguis ex brachio, & altera die e pede mittatur, vel e pede tantum; si serius accesserit sit Medicus, in subiectis calidis plethoricis, symptomatis urgentibus, phlebotomia ultra duas vices repeti; alii in cacochymis, frigidis, junioribus sæpe nullam præmitti, maxime si epidemia benignissima sit. Febre imminuta vel remissione data in ipso prælium, quantocius purgandus est æger ope emetici, ut quatuor vel sex guttarum syrupi Glauberiani, vel aliquot cochlearium aquæ tepidæ, in qua dissoluta sint tartari stibiaci granum unum, duo, vel plura, pro aquæ copia, & subiecti sensibilitate, ac ætate minori vel majori. Hujus vero emetici effectus sustinebitur ope cathartici sequenti die propinati, immo ipsa eodem die, si eruptio imminet; neplucimum operæ pretium est antequam eruptio fiat, ægrum phlebotomia & cathartici decenti præparatum fuisse; residuum curæ solius naturæ neplurimum opus est. Ca vendom ne æger plura vel pauciora frugula sibi imponat, quam quibus sanus affluens erat; ne aer cubiculi calidior sit. Si phlebotomia in temperamento frigido instituitur, aut admissio aere, pustulæ recidunt, tunc pennis de cornu cervi, & cardiaca viperina in usum sunt advocanda; verum sæpius peccant regimine calidiori; & ære non satis libero, unde fervet sanguis & pustulæ ea de causa supprimuntur. Si excrementa viscescant, aut acidum erudent insanas; potus absorbentes & anthelmintici identidem offeruntur. Si pustulæ non replentur, aut circulus hæfæo pallefcit, diaphoretici mineralis, vel pulveris bezoartici, aut de guttata grana aliquot sumantur. Si adit agrypnia, anxietas, pustulæ maturæ aperiantur, syrupus de papavere albo cum pulvere absorbente, & quoniam febris abest, atque infanti esuriunt, pauillum micæ panis, vel cremoris oryzae, iussulis addeendum est immo apud pauperes, cum sanguis est effusus, & nulla symptomata contraindicant, vini paululum cum aqua & pane conceditur, quod in Nosocomio generali solemne est, potissimum absoluta suppuratione; crustis decidentibus instituat purgatio; immo si plerumque, furunculorum, febris quædam superest reliquæ, altera vice repurgetur. Si febris remittens, absoluta exsiccatione, sui det indicia, ad kinkiam recurrendum.

Si in discretis diarrhæa accedat, eruptiones deprimentur, æger in periculo versatur, tunc ad theriacam, diascordium, aut syrupum papaveris albi cum absorbentibus est coniugiendum.

3. *Variola discreta compliansa* Helvetii 2. species; 2. anomala Sydenhami; 1. a discreta compliansa; petiæ verole discretæ malignæ, Helvetius Obs. lux la petiæ verole.

In benigna seu regulari, facta eruptione, pyrexia aliæque symptomata epiphenomena cessant: in anomala seu maligna non item.

Scilicet febris *antrruptionem* est ardens, prostratio virium magna; cutis arida, fervens est; carotides pulsant; tendines rigescunt; oculi sunt viridi, erore turgidi; dolent caput & lumbi, sæpe citra delirium ac soporem. *Falla vero eruptione* cephalalgia, lambago, vomitus & alia accidentia quidem minuantur, sed pyrexia reviviscit, eaque tritaphya est, cum novis aut supra dictis accidentibus, unde in paroxysmis agrypnia, deliria, anxietas, stillæ cruentæ ex uaribus, sudor copiosus, calor & ariditas cutis eadem, non raro erysipelas miliare pustularum interstitia obidet, vel maculæ purpureæ accedunt. In *suppurantia* febris & accidentia crescunt, jactationes, deliria, spasmi accedunt, pustulæ tamen nec subsident, nec pravi moris sunt. Hujus varietates possumus fuit.

4. *Variola discreta dysenteriodes* Sydenham. constit. annos. 1670.

Dicitur dysenteriodes, quia 1. tempore dysentericæ epidemici accidit, hujusque indolem sapit. 2. Quod per fluxum alvi cruentum non raro virus variololum eliminatur, si calidiori regimine tractetur.

Distinguitur 1. quod eruptio non quarto die, ut in benigna, sed tertio fiat. 2. Pustulæ sunt semper minoris molis & asperiores & sub finem in apice nigricantes. 3. Ptyalismus ut in confluentibus non raro ægrum exercet.

5. *Variola discreta vesicularis* Mead of the small pox. Sæpe 1748. Contingit, Dissert. de variol. *Crypsallus discretus*.

Distinguitur a miliati vesiculis piliformibus; maligna est.

6. *Variola discreta verrucosa* Mead of the small pox.

Distinguitur pustulis duris, verrucosis, prominentibus, quæ siccæ nigrescunt, & vix antemensem delabuntur; apud nos. medice sunt inter benignas ac malignas, atque discretæ.

7. *Variola discreta filiginea* Mead discourse of the small pox.

Est maligna vesiculæ & verrucosæ affinis, a quibus differt siliquis vacuis mollibus, effectum ab ichne pellucido sub cute diffuso.

8. *Variola discreta miliaris* 3. species Helvetii Obs. sur la petite verole, p. 204. petiæ verole discretæ, vesicularis & purpurea.

Hæc est altera discretæ malignæ varietas. Cognoscitur 1. ex pustularum majori distantia, minori numero. 2. Cum purpura & pustulis morbillosis accedunt vesiculæ dentæ, minutissimæ & 3. Symptomata febris malignæ adfunt.

Quandoque pustulæ sunt in brachiis duæ vel tres, interea dum pectus miliari, aut tuberculoso erysipellate obidet, vel petechiis, dum vesiculæ miliares per actus disperguntur, & potissimum pectus obidet sero pellucido plenæ, quæque cutem tantum exasperant.

Therapeia discretarum malignarum. Ante eruptionem febris impetus retinendus est pluribus phlebotomiis.



botomilis, e pede præsertim insilientis, ut duabus vel tribus, si de adultis agatur.

Diæta, præfata, clysmata: ut in benignis, sed victus tenuior, in fine exacerbationis emeticum vel catharticum, ut prævertantur sudores colliquativi, hæmorrhagia & dysuria, quæ his speciebus succedere solent.

Si paroxysmi cum occitatione, frigore, procedant, nec obstat calor & siccitas cutis, præfata ex kinkia & borraginæ usque ad quartam diem haurienda.

Si eruptio jam facta sit, cum advocatæ Medicis, nihilominus phlebotomia e pede bis celebranda, emeticum & catharticum adhibenda intra tres primos eruptionis dies, tunc circulus pustularum coloratior evadit, eruptio lentius crescit, suppuratio minus laboriosa fit, vigilie & anxietates minuuntur. Interea perspiratio & urinæ fluxus diluentibus, decoctio borraginis, capillorum veneris infuso, cieri debent, additis antimonio diaphoretico, vel alio simili.

Si alvus nimium fluat, absorbentia adhibentur, & potus calidus, præsertim incipiente suppuratone, præscribitur.

De dysenteriodis Variolæ cura, videatur *Sydenhamus*.

In vesiculari uberius est hunc modum & refrigerandum.

De verrucosa & filiquosa consuletur D. Mead.

#### *Variolæ confluentes.*

9. *Variolæ confluentes*: *Confluentes regulares* Sydenhami, Freind Epist. de purgantibus, *petite vérole* confluentes *simple* d' Helvetius 1. species.

Differt a discretis per coalitionem multarum pustularum, & a subsequentibus quod istæ sunt minus malignæ, sequentes vero pestilenciales, seu multo magis exitiales, simulque vel in facie corymbosæ, & crystallinæ, vel nigrae, ut videbimus.

Invasio ejusdem generis, sed multo intentionior adducit symptomata quam in discretis, scilicet anxietates, ægritudinem seu virium prostrationem, vomitiones, nec tamen ita prompte in sudores dissolvitur æger ac in discretis; diarrhæa nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix accidit.

Eruptio fit tertia die aut citius, & quo citius, eo magis confluit, pejoresque sunt pustulæ: interdum tamen ratione doloris atrocis, ut nephralgiæ, lumbaginis, pleurodynes cum vomitu, retardatur ad quintam diem: symptomata non remittuntur ad eruptionem, ut in discretis, sed ultra perseverant. Febris singulis diebus vespere exacerbatur: ex *Sydenhamo* pustulæ non sunt distinctæ, sed erysipelatis, aut subeolæ ritu paulo post eruptionem confunduntur in vesiculam rubram, quæ totum vultum contegit, nec multum ultra superscificem cutis protuberant, cum in discretis pustulæ distinctæ magis eleventur intesticulis albis usque ad octavam diem, & tunc apice albelcunt, dem am-

bitus rubet; ast in malignis die octavo aggraves pustularum, quæ constituunt pelliculam albam, quotidie magis exasperatur, & sulca evadit & dolet, ac demum non undecimo, ut in discretis, sed tardius, ut post 15. vel 21. dies latioribus laminis desquamatur: in adultis salivatio, in infantibus diarrhæa confluentium comes est: vide *pyralismum variolosum*. Cessat salivatio undecima die, & nisi tunc crescat facies, manuumque intumescencia, ægro protinus moriendum est. Vide *Oedema variolosum*.

#### *Variolæ confluentes malignæ.*

10. *Variolæ confluentes crystallinæ* & *variola japonica* Kempferi; *Vesicula Diva Barbara* C. Pisonis Obs. 149; *Petite Vérole crystalline* præmitte *espèce de confluent maligne* d' Helvetius pag. 208.

Primis diebus difficile distinguitur, quia pustulæ nondum sunt ejus magnitudinis ut crystallinæ apparent, id est, ut plures simul coactæ vesiculam sero tergidam constituant, qui character est crystallinæ; cum plures similes vesiculæ adjuvant: in miliari quidem sunt etiam vesiculæ, sed aciculæ caput non superantes, adeoque miliaries.

*Symptomata prædicti* sunt febris vivida, diarrhæa serosa notabilis, cephalalgia, sitis magna, cutis albo-pallida, subrumida.

*Symptomata eruptionis*, pustulæ minus rubrae, citius crescentes, & majores quam in aliis speciebus; circulus, qui basin pustulæ conjunctus ambit, est semper pallidior, seu minus ruber; pellicula vesiculæ tenuissima, fundus vesiculæ pallidus, ut circulus ambiens; magnus tumor tuberculosus artuum; demum febris maligna, sæpius tritophya sua addit symptomata cum miliari eruptione, qualia in discretis maligna descripsimus.

Prognosis crystallinæ tutior quam coherentis.

11. *Variolæ confluentes coherentis* 1. *secunda espèce de confluent maligne* d' Helvetius, observ. pag. 210, *petite vérole cohérente*.

Hujus character sunt pustulæ in apice depressæ, invicem coherentes, in facie unicam superficiem æqualem constituentes, intervallis miliaribus, & purpuratis ut plurimum.

Præjudicium idem ac Variolæ complicatæ, sed pyrexia major, exacerbationes longiores, fortiores, præcipue carotidum pulsatio, oculi rubentes, tendinum rigiditas.

Eruptio totalis prompta, figura pustularum inæqualis, apice depressio, circulo intense rubro, mediocri elevatio, maxime in facie, quæ multum turget, epidermide in unicam veluti pustulam planam æqualem intumescens; cutis ardens, arida, etiam a sudoribus non remollescens, urina pauca, intense flava; pulsus durus, parvus, vel magnus & celer; oculi nunc rubri, scintillantes, prominentes; nunc lividi cum mydriasi; cephalalgia violenta, nisi delirium, aut coma accedat; delirium & rigiditas tendinum, ac convulsiones frequentiores quam in aliis speciebus.

12. *Variola confluenta nigra* Sydenh. pag. 224.; 3. *Species confluentium malignarum* D. Helvetii p. 213. aliis *Variola hamatodes* vel *strabulica sanguinea* Mead.; *Petite Verole noire ou scorbutique*, Sydenham *Variolæ* ann. 1764., Huxham de aere, pag. 37.

Hujus character ex pustulis nigris, sanguinem nigrum fundentibus, fundo grangæuoso, midu cruento, hæmorrhagiis variis, interval- lis pustularum atris, &c. eruitur.

Præludium ut aliarum malignarum. Eruptio secunda die incipiens, pustulæ parum latæ, nigricantes; sæpe fundunt cruorem atrum, li- vidum; midua ut plurimum cruentus: dejectiones alvi, urinæ, sputa, vomitiones, lacrymæ etiam quibusdam sanguinæ; interval- la pustula- rum atra, febris vehemens, paroxysmi violenti.

Hæc species ut plurimum lethalis secunda vel tertia die.

13. *Variola confluenta corymbosa* 4. *Species con- fluentis magna* D. Helvetii pag. 214. *Petite Vo- role à placards*.

Character vel aggeries pustularum non con- fluentium, sed densissimarum, potissimum in facie; interval- la inter hæc aggeries pustula destituta.

Præludium & eruptio eadem ac in variola complicata. Eadem prognosis ac complicata seu discreta malignæ; quo plures & densiores corym- bi in facie, eo majus periculum, quanti- cumque sit eorum in cætero corpore multitudo.

Cursus discretarum malignarum & confluen- tium. Mittatur sanguis ante eruptionem semel aut pluries e brachio, vel e pede, in adultis liberaliter; postea vomitorum exhibeatur, & si tempus eruptionis non urgeat, sequatur cathar- sis quam proximè. His primis diebus diluatur sanguis uberi potu, vel pitæne hordei, vel deco- di cornu cervi in scobem redacti ad unciam semissem pro aquæ libris duabus, aut scorzo- neræ radicem, &c. Si vero æger calidi sit tem- peramenti, spiritus vitrioli ad gratam acidita- tem addatur usque ad plenam eruptionem pu- stularum.

Cum variolæ omnes eruperint, quod est cir- citer sexto die post invasionem, vespere propin- qetur syrupus papaveris albi usque ad diem decimum ab invasione, quod mane etiam repe- tatur in coquantibus, atque magna dosi, si phrenitis accesserit, parcissime insantibus utpo- te somnolentis. Si ischuria accidat, æger ele- ctio eximatur & obambulet paululum. Si saliva adeo sit viscida ut excerni nequeat, fiat garga- risma ex aqua hordei cum mele rosato: Si sop- por accedat, pustulæ depurimur, laugueat, visicatorum nuchæ applicetur, antallium plan- tis pedum, singulis diebus renovandum.

Si undecima die amphimerina secundaria cum inquietudine, iactatione, cæterisque symptoma- tia ita effusetur, ut paregoricis suffraginari ne- queat, & mors quasi imminet, sanguis illico e pede detrahatur uberius, & bis sequentibus diebus iteretur phlebotomia, si opus sit, & ci- to catharsis, immo quandoque emeticum in usum

advocetur prout vires sinunt, non omittis para- goricia; catharsis autem una vulgo sufficit.

Cum pustulæ omnino exaruerint, inungatur facies per bidadum & non ultra pomata cum oleo amygdalarum.

Si ocula infunt pustulæ, aut palpebræ in- meant admodum, infusio croci in aqua rosarum intra palpebras immitatur.

Methodus Fischeri Medici Germani in enan- dis variolæ; ut præmissa phlebotomia & ca- tharsis, balnei tepidis non solum eruptio, sed maturatio cietur, atque pusquam viginti for- tuitis Monspelii sacis observationibus constat præmissis balneis, etiam aliquot frigida, non expectatas feliciter erupisse variolas; verum hæc in cacochymicis corporibus tententur bal- nea, nec dum timentur malignæ variolæ, cer- tus suadeo.

Methodus Mortoni consistit in usu diaphoretico- rum, quibus venenum eliminare nititur, præ- missis tamen phlebotomia, & visicatoriis ad nu- cham, atque pedes, necnon interpositis pro re- nata aetodysis, quibus etiam cardiaca & he- zoartica addit, demum vero bolia cathartichis curam terminat.

Sunt autem plurimi casus, in quibus Syden- hamiana & Montoniana methodus debent in- vicem combinari, vel alterutra antepuui, obser- vantæ Huxhami: Infusum vinosum kinkinæ in malignis optimum. Journ. de Med. Avril. 1764. pag. 342.

Methodus Indica Daniel. Ludovici, Collat. Acad. T. 3. pag. 338. Prima die immerguntur variolosi in flumini proximo aqua. Secunda die utuntur sero lactis ad se potu. Tertia die encephalico aceto conditi esuriantur. Quarta die erumpente variola merguntur, etiam velli- ti, in flumine, dein in lecto suo reponuntur: hæc methodo utuntur in insula Java Nigritæ, tum ad variolam, tum erga puerperas; morbus salubriter sua percurrit stadia; cicatrices vero relicte albæ sunt, qui color dedecorus ipsis videtur & ridiculus.

Quid sint Variolæ pilosæ Carriechteri ignoro. Pustulas Variolæ larvæ muscæ caruarie for- tas vidit P. Boerlasi Cent. II. Obser. 72. sed di- stinctius Clariss. Razoux D. M. Nemausensis.

III. PEMPHIGUS, *Pemphigus* & *Pemphigodes* pu- retos Galen. 6. Epidemiar. *Hydros* Car. Pilo- nis; sic dicta a *pemphix*, bulla vel phlyæna; *Bullosa* febris, Nouvel. Class. *Fibula Vésicalis* airo.

Phlegmāsia est sæpius acuta, exanthematica, bullis vel vesiculis magna pellucida, sero fla- vo turgida per cutem sparsa insignita.

Differt maxime a miliaris seu porpora alba, in qua vesiculæ quidem sunt, sed grano miliis non majores; a variola crystallina, in qua ve- siculæ etiam sunt, sed pure turgidæ, seu ex- pluzimia pustulis suppurata in unam majorem collectas effusæ: in Pemphigo bullæ sunt avellane circiter magnitudinis; quoadque majores, raro minores, sero diluto flavo turgidæ.

Eum

Eum morbum novum esse facile crediderim; cum hujus nulla distincta apud Græcos, Arabesve inveniat historiam; non ita tamen rarum esse, quin eum sexies saltem observaverim.

1. *Pemphigus major* Christophori Sellgeri; *Hydatis* C. Pisonis observ. 127. 149. ubi descriptio morbi. *Febris vesicularis catarrhalis* Delli Amoeni.

Est morbus pyrexia acuta continua stipatus, in quo altera, vel tertia die ampullæ seu vesiculæ pellucido-flavescente sero turgidæ percutem obhorrentur, nunc vel avellanæ magnitudine, quibus ruptis & effuso sero succedunt amplæ maculæ atque rubræ, cussis epidermidis nigricantibus circumdatæ; morbus intra duas septimanas terminatur: primum illum observavi an. 1755. in Nosocomio Monspeliensi apud militem, cui in febris acutæ continuæ initio, numerose in abdomine & femoribus exoriebantur vesicæ hemisphæricæ, pellucidæ, in ambitu rubræ, quibus correptus fato cessit. Hujus morbi nomen se ignorare fatebatur. *M. D. Doidier*, atque eum *vesicularis morbi* nomine indigitari posse. Deinde pluries eundem morbum in medicis, & pauperibus nosocomii generalis observavi, inter quos bis vidi *pemphigum aegyptium*, ita ut hoc commune sit exanthematicis, ut pesti benignæ, variolæ benignæ, aut satem lymphaticæ, quasdam species sine notabili pyrexia prodire. Curam vide in *Annotat. medicis M. Doidier Decad. 1. casu 9. pag. 71.*

2. *Pemphigus Costensis* D. Thiery Medic. experimentalis pag. 134.

Regnabat, ait ille celebris Medicus, anno 1736. Pragæ morbus valde contagiosus, adversus quem artis Medicæ præsidia nulla proderant; ferocia morbi omnes methodos eludebat. Magnus hujus urbis Clinicus tandem considerans vesículas avellanæ magnitudine percutem erumpentes, ipsas cum vesicatoriorum phlyctænis a similes esse percepit, fuscatusque idem esse genus fermenti acris, quod habet vesículas excitaret, atque illud quod cantharides suppeditant, unde acetum bezoarticum ægris suis præscripsit & omnes salvos fecit, intetæa dum vix unus aliis Medicis commissus mortem evadebat.

3. *Pemphigus Helveticus* Dan. Langhanst A. G. Helvetic. vol. 2. pag. 260.

Brevis delineatio morbi qui anno 1732. in valle Simmia epidemice grassatus est. a Dan. Langhanst M. D. Zurich.

Peculiaris morbus epidemicus, a nemine hoc usque neque observatus neque descriptus, ex utraque hieme præcedente exortus fuit, qui per totam æstatem æquali vehementia duravit, ita ut omnes, qui eo corripiebantur, obierint.

Contagiosus omnino est; quoties unicum ex tota familia invadit, reliqui ex eadem familia omnes brevi post afficiuntur: is nulli alteri morbo comparari potest, quam syphilidi, sed eo discrimine quod pemphigus intra diem, syphilis ne quidem intra annum lethalis evadit. Invadit cum dolore levi, tenui, vix percut.

pitibili in faucibus & externe pone aures usque ad thoracis partem anticam, cum horrore & nausea, frigore, ut in febribus intermittentibus, sed nullus calor aut æstus, vel levis tantum, subsequitur. Collum externe plerumque intumescit, interne in faucibus, circa uvulam & pharyngem, bullæ, aut pustulæ magnitudinis avellanæ circiter, sine magno dolore oriuntur, quæ ichorem flavum, odoris valde ingrati in se continent, sæpe de iussu corporis partibus, ut in inguine, inter femora & pendenda, in digitis, in labiis, &c. evasunt, e quibus vel sponte ruptis vel lanceola incisus, ichorosa materies exhillat.

Die secundo, tertio, vel quarto collabuntur pustulæ in faucibus, earum loco apparent frustula albidia, æger anxietatem sentit in thorace, tumor externe in collo incipit evanescere, vel increscere & in abscessum degenerare, quo, si cito aperiat, vita servatur, ac si priusquam colli tumor aut penitus evanescat cum pustulis faucium, aut abscedat, gravitas in pectore sentiat, pereunt ægriti instar eorum qui a rupto emphyemate suffocantur. Quidam a retro pulsa pustularum materies subito exspirant sine ulla antea prægressa suppuratione.

Quoties venenosa illa materies febrili quodam impulsu ex faucibus in externas corporis partes protrahitur, æger ab omni periculo liberatur. Sic morbum solvit abscessus in glandulis inqualibus, axillaribus, parotidibus, maxillaribus, oesophageis, exortus. Idem præstunt vesiculæ in partibus exsensis prodeunt, sæpe digiti manuum vesiculæ quodam circumdantur, in quæ venenum totum colligitur & ex qua tandem expellitur. Nicolæ credunt hoc venenum a nebulis hanc regionem antea infestantibus originem traxisse: familiaris illis est putus spiritus frumenti, ceralorum, &c. cibus est cæcus acer & pinguis.

Curatio. Præmissa una aut altera larga phlebotomia, amplius vesicatorum fincipi applicabatur, collum cataplasmatibus ex lacte paratis omni bihorio renovandis involvebatur, simul æger sudorificum sumebat ex oxymelitis scillitici, & helleborati ana, drach. ʒ. mellis rosati & spiritu nitri dulcis ana, drach. ʒ. superbibendo aquæ cordii, ꝑnc. ʒ. mixturæ simplicis sen camphoratæ scrupul. ʒ. hinc sudor copiosus sero lactis vel infuso salviæ ad sex horas promovebatur. Sequenti die tumores externi, & pustulæ oris evanescere solent; altera die pulvis retolvens ex sale ammoniac & nitro propinatur cum haustu largo infuso salviæ, nocte sequenti theriacæ dosi cum aqua cordii hauritur; unde sudores profusi, & æger sic restitutus post aliquot dies sale Sedlicensi putgatur.

4. *Pemphigus Indicus* Bontii de medicina Indorum observ. ultima. *Mullosa febris cum dysenteria*. Morron. pyretolog. appendix. pag. 163.

Hanc speciem comitatur apud Indos febris maligna cum dysenteria: observavit etiam in

amphimerina epidemica ab anno 1658. ad 1691. vesiculas aqueas per collum & pectus sparsas *Bontis*.

Extractum croci & opii a *Bontis* commendatur, 3. *Pomphigus Brasiliensis*, Observationes curientes sur la Phylisque tom. 1. 1730., le P. Bougeant J.

Tadua colubri bicephali apud Brasilienses, etiam mortui, excitat hanc speciem, quam ipso passus est & expertus D. Coules Acad. Reg. Paris. *Scorix*: vesiculae scilicet ipsi egupere aqua flavescere turgida, quæque tres menses duravere.

Nam ad pauciores species reduci debeant hujus generis morbi aliis indagandum relinquimus.

IV. RUBEOLA sic primitus nominata a traductoribus Haly Abbatis Practicæ lib. 3. cap. 1. de Variolæ & Rubeolæ medela; *Blaccia* Aaronis interpret. *Morbilli* a Latino-Barbaris in plurali dicti quasi parvi morbi; *Hafsa*, nec non *Roseola* Castelli Lexic. Medic. *Aurefchia* Maabab Arabum ex Golio: la *Rongola*.

Cognoscitur ex papulis pulicum morsus æmulantibus, asperis, in squamulas furfuraceas abcutibus, quam eruptionem præcessit tussis sicca, sternutatio, lacrymatio & febris catarrhalis.

1. *Rubeola vulgaris* Pienus: *Morbilli Regularis* Sydenhami ann. 1670., febris *morbillosa* Fridex. Hoffmanni. *Rongola ordinaria*.

Insantes infra & supra septimum annum maxime adoriunt, in eadem urbe nunc a septentrionali ad meridionale plagam vel reciprocè progreditur epidemia, sæpius terminanda intra sex menses.

Morbus intra octo dies definit, verum aliis morbis sæpe pejoribus viam sternit.

*Prælium* est catarrhale: primo scilicet die, rigent, horrent, calent, & frigent alternatim, secundo die febris major, ægritudo vehemens, sitis, inappetentia, lingua alba, humida, tussicula sicca, capitis & oculorum gravedo, somnolentia perpetua, coryza, oculorum splendor, humiditas, aut lacrymatio cum sternutatione, palpebrarum deinde tumore, vomitu, diarrhæa, deiectione in dentitionibus viridi, omnia ingravescent usque ad eruptionem: quarto die eruptio, maculae scilicet parvæ rubræ, in fronte & facie, pulicum moribus persimiles in corymbis congestæ: in singulis succrescunt papulæ tactu, non visu, discernendæ, quæ dein pectus, ventrem, & artus afficiunt, in quibus maculae sunt tantum non prominentes, sed lariores & magis rubræ quam in facie. Eruptione facta, nullus vomitus, tussicula & febris ac dispuata intenduntur, defluxio in oculos, somnolentia & inappetentia perseverant. Diefexto frons & facies asperascent: pulvis exsiccatis, dum in reliquo corpore papulæ rubiculae permanent. Octavo die in facie evanescent & in reliquo dein corpore. Nono die papulæ totius corporis in farinam tenacem atram abeunt, sed febris,

dyspnœa, & tussicula quandoque augentur, non ita ramen ac in maligna rubeola.

Si quarto die superveniat phrenitis, malum, in quo casu pulvis est exiguus, & hirudines temporibus feliciter admoventur. Si verminosus Rubeola aggradiatur, scarim lumbrici sursum & deorsum egrediuntur omnes, vel saltem a cathartici & emeticis, deinde nullum lumbricum videre est. Circa finem rubeolæ, si crescat febris & ardens evadat cum siti intensa, malum. Cathartica, phlebotomie, pitæonæ emulsionæ vix prosunt. Post vomitiones viridescentes superveniunt diarrhœa aut dysenteria, quæ finita Rubeola perseverant; hæ cathartici absorbentibus resistunt, phlebotomie vero cedunt. Rubeola per se raro summi momenti est, verum morbi eam sequentes sæpe funestæ.

Dantur Rubeolæ benignissimæ quæ vix tres vel quatuor dies infantes læsio adducunt & febre sine febre ex tussicula sicca & maculis rubris tantum se produunt, quamque uti variolæ benignæ soli naturæ committæ, brevi sanantur, maxime quæ sunt sporadicæ.

2. *Rubeola anomala*: *Morbilli anomali* Sydenhami cap. 3. ann. 1674. pag. 143. *Morbilli epidemici* & *maligni* Mortonii de febr. inflammationis cap. 3. *Rongola maligna*.

Differt a regulari seu benigna, 1. quod eruptio serius fiat quam in benigna, scilicet a 5. ad 7. diem, immo juxta *Sydenhamum* quandoque oculus seu ante quartam diem; 2. Quod gravia sint tum prælium tum eruptionis symptomata; 3. Quod non ita a facie exanthemata, sed potius ab humeris & trunco incipiat; 4. demum sequelas periculosiores adducit. Symptomata ante eruptionem sunt rigor, occitatio, pandiculatio, virium prostratio, nausea, vomitus, iactatio inquietæ, vertigo, cephalalgia, lumbago: morbis gravibus hæc communia, sed & sunt exanthematis illis magis propria, ut pulvis frequens & exilis, respiratio frequens & brevis, hypochondriorum oppressio, urinæ pallida, sopor, subsultus tendium, spasmi, deliria cum oculorum rubedine, aquositate, palpebrarum gravitate, punctura cutis dolorifica; anginam etiam accedit cum rancedine clangosa, tussis molesta, serena, in qua pueruli veluti suffocantur, ingesta evomunt, nigrescunt facie; cum autem post tam ærem lucidam eruptio facta est, febris malignitatem suam partim deponit, morbus in flauus est, & homotona febris usque ad exsiccationem papularum, quæ ramen non semper in farinam abire visæ sunt *Sydenhamo*. Eventus autem hujus speciei sæpe est tristis & funestus, nam papulis recedentibus febris & dyspnœa intenduntur; datur *peripneumonia morbillosa*, in aliis vero diarrhœa *morbillosa*, quæ non est innoxia ut sæpe fit in benignis; sed acris, dysenterica, aut terminosa; quandoque tussis, dyspnœa, & febris hecticam accersit, alias succedit phlogymata & *anasarca*, sæpius ophthalmia.

Differt Rubeola 1. ab *scarlatina* per intervalla angulo-

angulosa, quibus in pectore potissimum separantur corymbi papularum rubearum, cum in scarlatina est uniformis veluti rubedo, quasi vino rubro perfusa foret cutis; 2. a purpura seu petechiis, quia maculae petechiales sunt exacte circulares: verum rubefactio sunt magnitudinis & figure incerta, variae, undeciam, 3. ab incipiente variola discrepant: variolae enim nascentes, maculas exiguas sed rotundas referunt; in purpura scorbutica maculae sunt lividae, non sanguineae aut scarlatini ruboris, ut in Rubella & scarlatina, atque incipit circa tertiam diem in benignis. In malignis quidem Rubellis color papularum a rutilante recedit, sed acuties symptomatum eam a purpura scorbutica satis distinguit.

Quae morbillis superveniunt aut succedunt peripneumoniae, anginae, tussis, diarrhoeae, anasarcae, ophthalmiae, phthides, &c. vulgari methodo resistunt, & propriam Rubellae curationi affinem exigunt.

*Curatio Sydenhamiana.* In adultis regimen validum peius est quam in infantibus maxime in pituitosis, frigidulis, inde enim sivefunt & dein nigrescunt exanthemata.

Aeger se contineat in lecto, saltem per biduum, post primam eruptionem; decocti pectoralis cum syrupo violarum & capillorum veneris furat uncias tres vel quatuor quarta quaque hora, intermodis iusculis; ex elegmate cum oleo amygdalarum, (syrupis bechicis & saccharo parato, saepius lambat, dum tussis urget; singulis noctibus fumat paragoricum usque dum convalescit.

Papulis evanescentibus, febris, dyspnoea, peripneumonia si superveniant, indicantur phlebotomiae cum decocto pectorali & elegmate; circa diem duodecimam ab invasione purgetur aeger.

*Methodus Barberyaciana* eadem est in Rubella ac variola, ita ut incutere Rubella, si pulvis plenus sit & aeger plethoricus, a phlebotomia initium ducatur; dein primae viae aut eruptionem, immo post eruptionem expurgentur; atque in pituitosis, frigidisque per diaphoretica cardiaca eruptio promoveatur, sustineatur; cum e contra ex Sydenhamo bechicis tantum insistendum, & non nisi duodecimo die purgandum sit. Cathartica magis indicantur cum veniosae aut putridae febris signa simul se produnt, quod aliquoties vidimus.

3. *Rubella variolodes, Febris lenticularis Boneti Polii;* *Variola herpaphroditica Fehrii;* *Rongelo boumante.*

Est ea species Partulis familiaris, in qua post praeludium morbillorum, scilicet tussim siccam, coryzaam, epiphoram, &c. superveniunt papulae acuminatae, multo majores quam in Rubella vulgari, quaeque vestigia sui relinquunt; an vero ad variolam referenda sit, dubito, quippe notum est variolam etiam mali moris non raro incipere a catarrhali affectu seu tussi, lacrymatione, oculorum splendore, uti Rubella vulgaris: de his vide *Van dermonde* 1758. *Juill.* pag.

*Sauvages Nosologia Methodica, Tom. I.*

82. *Buxiera* observavit Rubellam variolodam, cujus eruptio vel praecedebat vel immediate consequebatur variolam benignam in eisdem subiectis; sed in hoc distincta est variolodes a lymphatica, quod apud eos qui paucas variolae pustulas habuerant, pustulae Rubellae variolodis in farinam facebantur, cum lymphaticae variolae pustulae intra diem circiter in suppuratum habeant, relicta quandoque cutis foveola. Haec est eruptio quae pro variola recidiva apud plurimos habetur, non secus ac variola lymphatica.

4. *Rubella anginosa, Essais d'Edimbourg, T. 4. pag. 617.*

*Curatio Rubellae. Methodus D. Gontard Journ. de Medec. 1758. pag. 338.* Non eadem methodus in variola & Rubella debet adhiberi; in Rubella scilicet, maxime apud adultos, post unam alteramve phlebotomiam sive eruptum sive non papulae, vomitus est excitandus, & dein alternis diebus purgandum, interpositis bechicis, ac vespere anodyni pro diversis circumstantiis. Saepissime post emeticum papulae ubertim erumpunt, & sere semper tertia post eruptionem die, papulae, febris, omniaque symptomata evanescent; inter emeticum & cathartes sequentes phlebotomia pro circumstantiis iteratur; si pulvis mollior, parvus, dissuaderet phlebotomiam, emetica & dein cathartes repetitae sufficiebant, quod numerosis observationibus Autor confirmat. Hanc ego methodum dudum secutus sum, maxime cum rubellosos verbis scitantes curarem.

V. MILIARIS. *Febris Efflorescens* Zacuti Lusitani; *Punctiliaris, miliaris* Petrii Castro; *Febris vesicularis* diversorum Auditorum; *Purpura alba*; *Purpura purpurarum*; *Febris purpurarum miliaris*; *Febris purpurata* Fr. Hoffmanni; *Purpura maligna*; *Purpura miliaris*; *Febris miliaris*; & *Morbis Miliarium* Allioni Tract. 1758. Taurinensibus *Miarola*; *des frises* Lipsiensibus; *Galis le Millot, Maladie miliaire, la Miliaire, Pourpre-blanc, Millet, Snottio.*

Genus est morbi inflammatorii, seu febrilis exanthematici, in quo minores, rubrae & milii granis aequales pustulae, per cutem sparsae, occurrunt, quae cito in vesiculas sero plenas evadunt, grano milii non majores, pellucidas vel laetaeas; rarissimas morbus apud nos.

In scarlatina aequali rubore tota cutis perfunditur absque pustulis. Rubella pustulae in pectore, facie prompte agminatim prorumpunt, nec in vesiculas eunt, & majorem ruborem faciunt quam Miliaris. Praeterea sudor olidus, symptomata convulsiva, pulsus contractus, urinae aquosae, exigua febris ante eruptionem hoc genus ab aliis distinguunt. Morbus hic anno 1650. Lipsiae primus observatus est, qui totam Germaniam, Angliam, Helvetiam, Sabaudiam, Longobardiam hodie per intervalla afficit, nec auctis parit.

1. *Miliaris benigna* : *Purpura rubra* Germanorum ; *nova Febris* Sydenhami *Schedula* ; *Febris miliaris* Purganti ; Allioni *simplicissima*.

*Ante eruptionem* prima die horror sine calore insolito sequente, caput vix dolet, febris lenissima pulsu depresso, durinculo, urina sana, nullus dolor, nec sitis, appetitus viget, sudor importans. Secunda die pulsus celerior, urina aquosa, metus & tristitia, scrobiculi cordis compressio, suspiria cogens, subitaneus motus involuntarii, sensus in digitis stuporis eujusdam pungitivi *Græc* didi, somnus interruptus spectris, sudores acidum corruptum olentes aspidui enim pulsu magis contracto. Tertia vel quarta die, raro serius, vehementer sudoris impetus, alterni horrores & calores, præcedentibus puncturis, & non raro pruritus in collo, pectore, dorso, raro in facie efflorescunt rubrae aut albentes minutæ pustulae.

*Post eruptionem*. Hæ pustulae cito grandescunt, limbo sero replentur, basi inflammata, ubi cutis plenior & tumefacta perforescit; intra 30. horas fere absolvitur ruptio; & tunc symptomata convulsa mitescunt; evanescent, sudor perseverat, sed parcius, urinae colorantur. Septima die pulsus mollis, æqualis, exanthemata exsiccantur, cuticula squamatim decidit.

*Extispicia*. Cadavera quæ miliari pereunt, cito intolerabiliter foetent & intumescunt. *Bianchi* phlogem in utero puerperæ tantum invenit. *Allionius* vero venas cerebri cruore turgidas. Cadavera calorem diu servant, & sanguinem & naribus fundunt.

*Cura*. In prima periodo phlebotomia minime pertimescenda est; febris, delirium in altera periodo phlebotomia non cedunt; immo convulsiones ab ea, morsque accelerantur. Emetica promptiorem non minorem eruptionem movent; ante eruptionem purgantia antiphlogistica, ut castia repetita, eruptionem utiliter retardant, immo prohibent; post eruptionem nocent. Diaphoretica efficaciora in primo stadio eruptionem accelerant cum nocumento, in altera febrem & calorem adaugent perniciose. Antiphlogistica acida, ut limonata, saccharata in prima periodo, venenum corrumpunt, in altera nocent. Diluentia, acefcentia, emollientia profunt. Focus repidi emollientes ad pedes, artus, in secunda periodo valde utiles sunt. Vesicantia pulsum elevant, eruptionem sollicitant; aut in secunda periodo perniciofa, nec in prima multum profunt.

Convulsiones quæ pustularum eruptionem sequuntur, nec opiatas, nec antispasmodicis cedunt; disruptio vesicularum inutilis est.

Nimius calor lecti, cubiculi, regiminis maxime miliariam excitat in regionibus frigidis. Prædictis Taurinensis eximius linteis aqua tepida mællidis corpus fovere consuevit ad papularum eruptionem promovendam.

2. *Miliaris maligna* Allioni num. 76. *scarlatina*.

*Ante eruptionem* omnia ut in benigna, sed symptomata convulsa ab eruptione crescunt,

& in benigna mitigantur. Febris scilicet angustur cum pulsu celeri & contracto; circa meridiem, & noctu gravior est; urinae multæ, tenues, aquæ; lingua albidæ, arefcit; noctes vigiles cum somnis terrificis & cephalalgia distensiva interna; facies plenior; calet & inflammatur cutis; sudores minuuntur; tertio eruptionis die omnia graviora sunt, febris ardet, pulsus durus, & calet, tendines subiliunt, sudores evanescent, pustulae subsident, calor urens, cutis scabra fit, urina aquosa copiosissima, ægri inquieti, sitibundi, morosi, queruli, loquaces, quoquo versum se jactant, deinde delirant, convelluntur; alvus hæcenus dura, jam biliosa fecida egerit; aliquis si redeat sudor, hæc scævities eruptentibus iterum pustulis mirescit; sequenti die copiosiora erumpunt exanthemata, majoraque sunt, primoribus jam exsiccati incipientibus; verum secunda exanthemata circa tertium diem eruptionis suæ novæ & prioribus similes turbas excitant, mitiescunt; accedunt tertia, immo quarta, exanthemata, donec stadium ultimum, seu declinatio accedat similis priori speciei; in hoc vero statu alvus liquida est, & biliosa fecida dejectis pergit cum horborygmis; urina interdum prodit albescent, ut serum lactis, non subsidens & ardens. Salus ordinario non accedit nisi post 14. & 20. diem; illa eruptio fit in certa die per manipulos & cohortes, eaque suppressa vel repulsa, tubæ recensite revertuntur; typhus vero vix definiri potest.

Si malum exitum prompte morbus habeat, bilice tubis comites accedunt delirium & convulsiones; scilicet ægri inquieti nullo situ se continent, torvo, & defixo obtutu objecta per caliginem, aut duplicata vident. Loquaces etiam cum delirant aut caligant, se recte loqui & videre pertinaciter asseverant; sægros vix esse concedunt; magna est, rara & suspiciosa respiratio. Sunt qui repente & sine causa lachrymis & mœnore se conficiunt, e lecto surgere tentant, ad motum omnem prompti, ingesta vomunt, in adstantes etiam expuunt, adde strepitum potus eum deglutitur; hinc passionem in convulsiones abeunt, immo in eclampsiam, & stertore adveniente, pulsuque deficiente, mors advenit. Quo numerosiores pustulae & præcociore, eo finis lunellus promptior est.

3. *Miliaris recidivans* Allioni num. 82., aliis *diuturnior*.

Hæc est malignæ varietas, sed quæ in longius tempus distrahitur, in qua pustulae propter entis densitatem, aut lymphæ visciditatem non bene efflorescunt, aut in cute ipsa subsident, aut retrocedunt; tunc enim morbus diuturnior evadit recidivam alio tempore daturus, valetudine lente redeunte; interdum & mors sequitur; sed paulo diversa ratione morbus procedit.

Si itaque pustulae non elevatæ sint, sed tantum vultor aliquis cum minutissimis pustulis ante conspicitur, & profundius hæaret venenum, pulsu velocitas tanta non est in stadio secun-



secundo, sed altitudo & frequentia inæqualis, aliquando pene intermittit; urinx nunc tenues, nunc coloratæ, sæpius turbidæ, pæcæ; calor insignis, non tam acerrimus; tendines continuo subillant; lingua tremula, delirium & identidem convulsiones: hæc denique paulatim misceantur, sudore viscido, febrili oborto, qui & majores aliquot vesiculae & pustulae varorum inter majusculas affert.

Aliquando vero post hunc statum jam descriptum ægri in soporem incidunt, assiduis tendinum motibus aut convulsivis ructibus detenti; stupidi, oblivisi, lethargici evadunt, & demum post varias convulsiones, stercore lente accedente, intereunt.

Hæc varietas, si ægri revalescant, reverti solet anno subsequente, eodem tempore quo primum accessit; mulieribus id sæpe accidit post quodlibet puerperium, & sæpe relinquit dispositionem ad sudorem, furunculos, memoriæ debilitatem, summam proclivitatem ad timorem, hysteriam; accedit rheumatismus; sanguis extractus in secundo stadio post sudores est coctineus & sine ferro; ante sudores gelatinam concretam, & paucum serum habet.

Duratio hujus varietatis est circiter trium septimanarum, cum maligna ad duas utplurimum exeat, & benigna post septimanam cito terminetur.

Dantur plurimi morbi miliares, seu quos venenum miliare excitat & fovet, qui proinde a miliari larvata procedunt, ut synochus, amphimeria, tertiana, peripneumonia, pleuritis, cynaoche, erysipelas, eclampsia, odontalgia, tussis, coryza, stertoratio, apoplexia, trismus, melancholia, crampus, ischiæ, arthritis, quæ omnes species curam generi propriam & miliari communem simul exigunt; sed illi morbi, quos hoc venenum proteiforme excitat, evanescent, aut mitigantur facta eruptione miliari. Si vero hi morbi non recedant eruptis miliaribus, tunc signum est morbum esse complicatum, seu a duobus distinctis principiis pendere; ut arthritis, peripneumonia, synochus, purpura, variola, rubæola, quæ cum miliaribus exanthematis complicantur; primos morbos vocabimus miliarios, id est, a veneno miliari lateo excitatos.

*Prognosis miliaris in genere.* Periculum respondet, 1. veneni copię; 2. humorum visciditati; 3. eculi densitati; 4. irritabilitati.

Robusti, sanguinei, strigosi, herpetici, podagrici, bibones vint, melancholici, magis periclitantur, quam femine molles & viri laxi, imbecilli, hydropotæ, blando sanguine donati. Si acutissimi symptomatis convulsivis, pulsus mollis, & amplius reddat, pustulæque grandescant multo sero plenæ, bonum. Cephalalgia ante quartam diem evanescent, maxime in sanguineis, malum. Pulsus contractus, post eruptionem contractior, cum tensione & frequentia crescente, convulsionem & perniciem portendit. Sudores quo magis diffusi & præco-

ces, eo peiores, maxime si pulsus una sit vade contractus, Urina, quæ cito ex rotula sit aquosa aut constanter aquosa, mala; albescens, ut serum lactis, longitudinem morbi denotat. Stupor punitivus, *Grav* dictus, in plurimis locis magnam veneni copiam arguit; sed si leves sint stupores cum urinis aqueis, sudoribus, pulsusque contracto, periculosum est signum veneni copiosi, & erumpere non valentis. Erupcio quæ citius advenit, eo pejor. Quæ tertio, aut quarto die exeunt pustulæ, sepe sunt septimo & octavo die lethales, minus sanæ quæ sexto die accedunt, seniores etiam tiores; quo citius apparent pustulæ, eo morbus durior & magis recidivus; Minutæ pustulæ mali ominis sunt, si multæ fuerint: male quæ erumpentes non pungunt, sed pruriunt; eas recedente pessimum; tum ægros vomere, male videre, cum strepitu deglutire, singultire, loquaces balbutire, pessimum. Quæ copiosiores & prominentiores pustulæ, eo promptior, his subsidentibus, mors accedit; quæ modo subsident, modo effruntur, longam ægritudinem significant. Post eruptionem fortiter vexantia symptomata convulsiva ominosa sunt. Si æger maxime timeat; spem abiciat, territus expersicator, periculosum. Cutis ab eruptione non tumefacta, vel ex epistictis, aut cucurbitulis non affecta, malum est. Convulsiones, quæ morbum inchoant, aut eruptionem præcedunt, benignæ; quæ pustulatum subsidentiam sequuntur, exitiales. Stillæ sanguinis e naribus quovis tempore funellæ, sanguis extraxus si continuo coctus sit sine sero, malum. Si morbo soluto cutis disquamatio nulla, aut paucæ, persistens symptomatis convulsivis, recidiva expectanda.

a. *Miliaris Boia* & *Miliaria de Cussis* en *Bourbonnois* par M. de Brest Med. Juro. de Med. Juin 1756.

Pustulæ hujus morbi sunt vesiculæ 6. die erumpentes post cephalalgiam, astheniam, febrem, acutam, nausæ, vomitiones, ægriam; græpinum antevire phlebotomia, emetica; die septima: pulsus parvus, frequens, variabilis. In paroxysmis pulsus vegetus, ita ut septedecim phlebotomis intra 23. dies celebrari puterint; delirio tamen crescente, accessere parotides, hæmorrhagiam narum larga, longos agon, mors. Nulli ætati, exceptis senibus, nulli sexui parcir. Methodus Hamiltonis non feliciter cessit. Methodus typh vulgaris paucissimos liberavit. Temperamenta debilia, delicatula, facilius evadebant.

b. *Miliaris critica* Guib. Jout. de Med. 1756. Juin. Ab arsenicali pravis effectibus ægrum liberavit tandem miliaris desquamans totum corpus ægri.

Ab arsenicali drachmis duabus ore assumptis a viro viscolento, ferme phisticis, super tunc vomitio, pulsus frequens, debilis, convulsivus, irregularis, respiratio laboriosa, obtutus serox, oculi prominentes, lacrymosi, lacrymis genas corrodentibus; facies convulsa, vox tremula, lingua arida, labia maculis nigris adusta, ar-



dos viscerum, sitis inexhausta, meteorismus ingens, delirio animum adurens, involuntaria, sudor fetidus, ischuria, paraphrolyne; ea per sex dies permanere, assumptis affatim oleo, lacte, juleculis adiposis, mucilaginosi. Sexta die eruptio miliaris copiosa universalis priora symptomata sedavit, per quindecim dies eundem renovata eruptio, sudoribus excitatis, ulceribus ad talos fluentibus, demum squamæ farinose cutis delapsæ sunt, & lacte assumpto convaleuit æger; excepto quod debiliior sit, tremore universali & ophthalmia laboret.

c. *Miliaris læta*: *Miliaria maligna laiteuse*, Puzos, Traité des accouchem. pag. 378. *Eruption laiteuse à la peau*: rectius multo Cl. Bonnet Journ. de Medec. Janv. 1757.

Miliaris puerperarum est alba, pustulis aciculæ capita æquantibus, per pectus, abdomen, collum resperis, cum pruritu importuno, & inde quandoque pervigilio, non turbatis inde lochiis; epidermidis disquamatione, scilicet terminatur; hic affectus milite sæpius quam hieme accedit, & stragulis densioribus fovetur; aere liberiore iuvatur puerpera, &c.

Varietas hujus speciei est eruptio miliaris febre, calore urenti, & manuum, digitorumque rumore cum pustulis stipata; cum pustulæ crescunt, decrevit febris & cutis tumentitas; sit effusio sub cutem panaritio similis, quæ maturata foras effluit sine dolore & periculo; verum miliaris vere lactea maligna est, eruptio tarde procedit, intereaque febris & cephalalgia vigent; febris initio mediocri, lochia serosa, remissiones in febre dantur; sed post aliquot dies caput incalcescit, ægra obscure delirat, somnus inquietus, eruptio languet, febris acuta continua evadit, lochia supprimuntur, & ægra in periculo versatur, quod prævertere oportuit ope diæte severæ, lenium diaphoreticorum, de quibus, dum de miliari puerperarum.

d. *Miliaris nova* febris Sydenhami Sched. monit. de novæ febris ingressu.

Est ea species quæ anginozæ initio affinis videtur, sed ad eam & phrenitidem sponte aut levi data occasione vergit, & initio pulsu sano similis est. Æger per vires calore & frigore tentatur. Poroxyzni parum regulares quotidiè versus noctem ingruunt; initio caput & artus dolore vexantur, cum tussi, dolore colli & faucium, quæ symptomata eo minorâ sunt, quo magis tempus recedit ab hieme. Sanguis pleuriticorum sanguinem æmulatur. Lingua est alba undequaque, & crassa alpera tegitur, humida tamen: sudores sunt insalubres, non critici, si æger jugem in lecto decubitus servet, a fortiori si regimine calido utatur; febris eorum accersit, aut phrenitidem, sed in qua tranquille delirat, incongrua subinde effluens: ab eodem regimine petechiæ & pustulæ morbillosæ, sed quæ in squamas non abeunt, efflorescere solent; lingua fusca & sicca evadit, sudores proliantur effusi sine levamine; ubi vero phrenesis invaluit, pulsus quæ citatior est,

nunc tardior, demum inordinatus evadit, subsultusque membrorum mortem prænuntiat.

Hæc febris est simplex sanguinis inflammationis, quæ tamen paucis phlebotomiis, sed aliquot chatarticiis, juleculis refrigerantibus, & abstinencia a lecto per diem, compescenda est. Phlebotomia repetatur, si dyspnœa, cephalalgia tussis intendatur, epipasticum nuchæ applicetur, chatartica mediocriter alternis diebus usurpentur ad tertiam circiter vicem ex infuso leniæ, thei in decocto tamarindorum, addita manna, & syrupo rosarum solutivo; die purgationis somniferum vespere, non vero alius diebus præscribatur, ad vitandum soporem caroticum, quem agitato sanguinis secus excitare possit.

Aphræ, singuleusque si superveniant, nullum periculum inferunt, quæ si non sponte recedant, sugantur usu kinking cum syrupo papaveris rheados, modo æger e lecto surgat; vel si debilis sit, vestitus & capite elato ipsi incumbat, quod per morbi decursum observandum est.

Diebus a purgatione liberis, æger sumat vel electuarium e conservis juleulæ, cynorrhodonis, berberidis, grossulariæ & cremore tartari cum syrupo lymonium ter in die; vel toties sumat julepium ex aquis portulacæ, lactucæ, paralyseos, syrupo de limonibus & violarum; vel utatur limonata pro potu; si sudores nocturni accedant, caveat æger ne plus vel minus regatur stragulis, quam cum sanus erat; vidus sit ex cremoribus avenæ, hordei, decocto albo, & post secundam purgationem julecula ex pullo, vitulove permittantur. Febre subacta, modo in intermittentem non abierit, vinum ad vires restaurandas permittatur.

e. *Miliaris sudatoria*: *la Suette miliaro*; *Rivora putrida maligna*, appellat la Suette, qui a régné à Guise duravit l'été de 1759. par M. Vandermonde, Journal Avril 1760. *Rivora Helvæ*, ou *Suetto* de Meyzeroy Tom. 1. n. 256.

*Ætædium*. Gastrodyniam gravatam, lassitudinem, cephalalgiam gravatam vel tensivam, pectoris oppressio, dyspnœa suspiciosa, furvor corporis accedens, sudor acer, sopioles sæpe accedunt nauseam, oculi scintillant, facies accensa, lingua alba humida, polydipsia, pulsus frequens; undolus, subrentiens.

*Augmentum*. Post dimidiam diem pruritus ferinus, pustulæ sphericæ miliares, densissimæ, semine sinapis non majores; anxietas & agitatio; dein toror oris & perspirationis putridus; alvus stridula sæpius, quandoque diarrhœa serosa putris, pervigilium & delirium; urina, nunc cruda & copiosa, alias pauca & rubra. A secunda ad tertiam diem, pulsus durus, tensus, magnus, dyspnœa præceps, laboriosa; hinc sudores crescunt, pulsus debilitatur, vires musculares minuantur, urina supprimitur, sanguis ex naribus, mariscis, urero fluit, & convulsio maxillæ ac tendinum mortem prænuntiat.

Constantissima symptomata sunt; 1. sudor continuus & uber; 2. eruptio miliaris; 3. dolor acutus cordis;

cardiz, 4. cum lassitudine universalis, & 5. pulsu duro, tenso, frequentissimo.

Duratio morbi, cum letalis est, ad septem dies vix exoritur; cum natura victrix est, ad 14. extendi solet & ultra.

Epidemia est aggregata morborum diversis generis, sed ab eodem viri miliaris & putredine synochali penduntium; combinatae liquidem sunt in Millari sudatoria synochus putris cum Miliari morbo; aut in epidemia eadem intercurrente, ut pleuritis, diarrhoea, tertiana, amphimerina, menorrhagia, haemorrhagia narium vel ani, erysipelas, &c.

Subiecta huius morbi adulti, robusti, laboriosi, fusci, non senes, nec infantes; temperata media, aestas, aer impurus.

Partes miliaris eruptione exasperatae, pectus, abdomen, extrema. Hic morbus ab ephemera sudatoria genere diversus, licet nomine Gallico idem sit.

Curatio infelix, si ultra biduum triduumve differat, si cardiacis, sudorificis, vino utantur acri, sudoris sustinenti provocandigratia. Diarrhoea, sudoribus juncta initio morbi, letalis, nisi mature antiseptica & mucilaginoso adhiberentur, non phlebotomia nec antiphlogistica. Qui rite tractati ex gravissimo morbo subito convalescentes sibi videbantur febre & symptomatis, ante signa coctionis, sedatis, sequenti die phrenitide correpti, convulsu moriebantur; qui robustiores erant, illos symptomata graviora & acutiora verabatur, illis promptiora auxilia necessaria erant. Menorrhagia vel haemorrhagia a tertia ad quartam diem dissolutionem sanguinis periculi plenam indicabat; sudor foetidissimus, tenuis, pustulae atrox rubrae letales; a sudore copioso, & diarrhoea uberi, urina flammea, fortens & pauca, cum pulsu undoso, parvo, conclamatum est. Urina citrea cum copioso sedimento, pulsu molli, forti, elato, respiratione liberiori; sudores pauciores, minus olidi, sitis minor, pustulae pallidae, cuticula squamosa vel farinosa, calor lenis, boni ominis erant.

**Curatio.** Phlebotomia bis vel ter repetenda; sequatur vomitus ope tartari stibiaci magna aquae copia diluti, simul ac gastrodynia permiserit. Si his praemiis symptomata pessitent, decoctum tamarindorum tartari stibiaci grano accuat: symptomatis sedatis, limonata vel acetum in aqua adhibeantur; sedata febre purgeatur ex tamarindis & sale Epionensi, in limonata tartarum stibiatum optime purgabat. Julecula ex vitulina carne cum borragine, buglosso, pistaciis, prusana ex boris corseolae, grato. Cum viros non permittebant phlebotomiam, acida & dein incrassantia mucilaginoso conveniebant. Ad sudores compellendos vapores aceti lectulus perfundebatur; ad diarrhoeam decoctum album, limonum, syrupus, ecceprotica. In delirio vena pedis secabatur, pulveres temperantes, clysmata; in summa putredine kinkina, contrayerva, camphora cum acidis, in ascite secundario julecu-

la ex radicibus fragariae, foliis agrimoniae, succis naturitii aquatici, borraginis.

Cavendum a sudorificis & a vesicatoriis. f. *Miliaris Germanica* V Valthieri Medic. Germanorum pag. 151.

1. Invasio varia est.

A. Plurimi mense Januario frigerunt per plures horas; frigori successit magnus calor, redibat frigus cum calore alternans per duos tresve dies, dein permanit febris cum aestu, cephalalgia, dyspnoea seu angustia pectoris, pulsu non strido, mox pleno, asthenia notabili, polydipsia, agrypnia, nausea, aliis vomitione, urina per totum morbum sana, postremis diebus sudor.

B. Miliaris in aliis *intermittentem febrem* ultra septimanam mentiens, symptomata in paucis arthritica.

C. Miliaris apud plures pleuritidis schema sumplit cum tussis feroci, urina rubra, horrore praevio, aestu subsequente, pectoris angustia, albedine ineffabili: intra septimanam aliquot extinxit.

2. Progressus morbi.

A. Cephalalgia immanis, paraphrosyne, facies rubens, turgida, lingua sicca, polydipsia magna, tremor artuum spasmodicus.

B. In paucis maculae pectehales pectoris, in aliis tantum minuta puncta, rubra, quae post biduum vel triduum evanescebant, tuncque miliaria alba per triduum succedebant sine desquamatione evanescentia; in multis miliaria 11. 15. vel 16. die apparuerunt.

C. Apud omnes fere narium haemorrhagia, diarrhoea per tres, immo octo dies continuata, qua cessante miliaria exanthemata succedebant cum remissione tremoris & paraphrosynes.

Subiecta foeminae praeter viros, juvenes praeter adultos, adulti praeter senibus.

Principia, tempestas frigida, victus crudus, miasma acre, nervis infensum, contagiosum, aetis subita mutatio; quo major tremor, eo peior exitus.

*Haemorrhagia* stillaticia narium moderata, & iterata omnia symptomata mitigabat; effraenata vero letalis. *Paraphrosyne* ultra triduum durans, sine cum, sine sine exanthematis miliaribus, non remittens, letalis. *Sudor* vel epidrosis continua optima, siccitas cutis funesta, exanthemata vesiculosa, minuta quae videri poterant, sed non incredebant, nec levamen in aditu afferbant, ea funesta. *Tussis* ad septimanam durans, utilis; in hoc casu urina ab initio rubra & saturata circa diem quintam, vel sedimento crasso, vel flocculos ad fundum vitri deponere, clara supernante urina; quibus nulla tussis fuit, urina erat sane similis. *Urina* cocta cum sedimento sine criticae similis, primis diebus morbi, pessimus erat nuncijs. *Diarrhoea* minime metuenda, etiamsi pertinax, modo non suffocata foret, seu remediis repressa. *Crassa gelatinosa sanguinem extractum* obducens salutem certo portendebat; sanguis dilute ruber; tenuis, minus bonus. *Cephalis* optimum in hoc morbo signum, *Erysipelas* cum

genarum, orbitæ oculorum, circa aures tumore, crisi optima cum ichore largo inde fluent. Pæci defuncti sunt.

*Praxis.* Phlebotomia initio citra septimam diem, etiam fluentibus menstruis, ablentibus adhuc exanthematis, mire profuit.

*In Miliari intermittente simulante præscripi* emetico ex ipecacuanha cum sero lactis acidulato, dein sanguis mittebatur, rursus ad ipecacuanha revertetur, si opus foret, ut ros amaro & nausea suadentibus; tartarum emeticum non bene successit.

*In Miliari pleuritidem simulante* cum tussi, spūto colorato, præmissa phlebotomia, mixturam absorbentem & sudorificam præscripi singulis trihoris ad coelestria tria hauriendum, continuandum usque ad crisin. *Mixtura ex aqua florum tilia & sambuci, ana, unclis tribus; pulverem marchenii, lapidum cancerum, matris perlarum ana, scrupulo anti sibi diaphoretici, nitri pulvis, ana, scrupulo semisse, extracti croci, gr. quatuor i sacchari perlati drachmis duabus, misce.*

In progressu morbi, cum febris est continua, sudores sunt diluentibus, minime vero æstuosis, ciendi aut sustinendi, in infuso foliorum cardui benedicti, vel emulsionis opiorum, ac mixturæ temperantes suot præscribendæ toto morbi decursu.

Datur v. g. ter in die pulvis ex cornu cervi philosophice preparati, corallii rubri, ana, gr. viij. matris perlarum, sibi diaphoretici, nitri puri, cinabaris autimoni, ana, gr. iij. olei dissilati ligni Rhodii, gatt. f. extracti castorei, gr. semisse, misce.

Porus ordinarius sit decoctum lenæ radicem scorzonæ, cornu cervi cum paxillis seminum feniculi, insula sint ex carne virulina & bubala, vel substituantur panatellæ, & non gelatinæ, nisi urgat diarrhœa; hic pulvis & hoc julepiam dantur exanthematis eruptis cum delirio, polydipsia, dyspnœa &c.

*Diarrhœa miliaris* si sitatur, pædissequas habet febrem, polydipsiam, dyspnœam gravativâ, cephalalgiam gravativam, vel eorum augmentum; fovetur autem emulsionibus amygdalinis iotra julecula, & decocto kinkinæ pro potu; posteriis diebus compescitur pulvere pannonico cum pilulis de cynoglossio vel emulsionibus; quibus adduntur semina plantaginis, papaveris, crysallus montana, coralli rubri & cornu cervi, ana gr. viij. pro singulis emulsionis uncis; externe faciei calidi, avena rosta semipleni, abdomini admoti, diarrhoicos debiles sublevant, miliariumque expulsiorem sollicitant.

Miliaria in syphilitidis lente procedebant, & per duas septimanas perdurabant subseque te crisi desquamatione; in hoc casu madorem continuum sollicitare opus est mixtura ex aquis cardinalibus unc. iv. aqua florum tilia, acacia, sambuci, ana, unc. i., matris perlarum, pulveris marchenii, ana, drachma semisse ieboris asii, coralli rubri, ana scrupul. i.; sibi diaphoretici, scrupul. semisse spiritus nitri dulcis, gatt. xl. sacchari plati, drachmis ii. datur singulis bihoris duo

cochlearia, & sic pro potu pilula ex scorzonæ, cornu cervi, & semine feniculi.

Cum post phlebotomiam, diarrhœa perseverat, nec febris remittit, peristatque delirium loquax, vel sopor profundus, nec miliaris eruptura est, transito ad vesicatoria duo magna furis applicanda, atque inde intra biddum exanthemata efflorescunt & delirium evanescit, intus vero emulso leviter diaphoretica adhibetur ex seminis frigidis, semine cardui maris, papaveris cum aqua florum acacis, sambuci, malvæ, adde oculos cancerum citratos, cornu cervi, corallum, ana, scrupul.; nitri, gr. xiv. &c. Sumatur quarta pars omni trihorio.

Vitæ essentia, elixiria, omniaque spirituosâ, præter liquorem anodynum Hoffmanni, vel spiritum nitri dulcem.

Polydipsia exigit aquam frigidam aceto anacis partibus mixtam pro colutorio, & si desit diarrhœa, datur serum lactis assuso vino albo præparatum.

Cephalalgia mitigabitur epithema ex aceto, aqua rosarum & albumine ovi.

Alii laxiter primis diebus ciebatur enematis, quibus deinde abstinebant.

*G. Miliaris Nautica, febris nautica Huxham. Morbus carcerum Lind. de scrobuto; Miliaria scorbucica.*

Est Miliaris etiam purpurata ut prior, a qua discrepat scorbuticus symptomatis combinatis; febris adeit, eruptio copiosior in tibiis, sensum livefcit, nigrescit, ut miliaris erysipelacea; sequuntur ulcera gangrenosa, saniosa, fordida, hinc venosa, caries peritineas sursum non dorsum in parte serpentes, gingivæ molles, vix tumidæ, sæpe crevæntæ, maxillæ cariosæ, dentium lapsus, sitis continua, cutis sicca, urens; pulsus parvus, frequens, oculi sæpe fixi, quandoque errantes; torvi; vivid; æger inquietus interdum delirat; lingua humida, tremula; hinc orbus cito trucidat: si vero tardius, non minus certo, occidit, per metastasin carie tibiæ infra genu, ibi ulcera canerosa, summe dolencia, lethalia; Lind. Parum differt ab illa febris nautica Huxham. de aere, & epidem. 44. ubi fufe de utra agitur.

Differt miliaris carcerum & nautica ab amphimerina Hungarica per eruptionem miliarium erysipelacem; forte species nollæ sunt in his adhuc fixæ, quia venenum miliare cum purpureo & scorbutico combinari multis modis potest, aut nondum satis observatæ sunt differentie essentielles.

*h. Miliaris purpurata, febris carcerum Huxham de aere pag. 82. Ludvvig. instit. n. 190. jail. distempers Anglis, Pringle differt. of the jail distempers; The Jail-fever Germanis.*

Febris est putrida contagiosa ac pestifera valde, cum ingenti virium damno, maxima precordiorum oppressione, tremore, tendinum subultu, vigiliis, delirio, lingua nigra & sæpe arida valde, faucibus squallidis, hæstu feridissimo; pulsus vacillat plurimum, non abintia.

tio morbi, idque vel in robuillis, urina est plerumque lurida & vappidā, sæpe subnigra & olida, raro aliquid inest sedimenti, interdum vero continet fursurosa quadam, inæqualiter sparsa; in statu febris erumpunt petechiæ atræ, sæpe papule aut pustulæ livicentescunt oleoso fetido sudore; pustulæ floridæ in morbiacme salubres; dividiæ & subnigræ lethales; petechiæ semper malæ; alvus nigra, foetidissima, citissima plures fluxu sineum abripit; phrenitis quandoque, alias carus sub ipso morbi initio accidit quibundam. Si incisus his oborta est alvi dejectio, certissima secuta mors est, biduo vix exacto.

Hic morbus vix ullam tolerat phlebotomiam; prima vice extractus sanguis est rutilus, valde floridus, secunda vice lividus aut niger non concreiscens.

3. *Miliaris Britannica*, Journ. de Med. Juill. 1759. pag. 57. *Febris inflammatoria, catarrhalis & putrida* D. Moucet. Maladio contagioso qui regne en Bretagne entre Brest & Rennes, surtout a Pleneé depuis 1757. par M. Moucet.

4. *Miliaris puerperarum, purpura puerperarum* Ludvigij Inst. Clinicæ n. 244. *Eruption laiteuse à la peau Puzos*; *Miliario des femmes en couche*.

Miliaris puerperis superveniens, ut & aliis est vel alba, vel rubra; miliaris alba si tertio, quartove post partum die erumpit cum delirio, æstu summo & aliis gravibus accidentibus, semper ferre funesta est, in primis si sudor copiosus eam præcedit; si metritis cum sensu refrigerii in abdomine, si petechiæ cum miliaris simul erumpant; si vero febriculus largo fluxu materie foetidæ ex ore remittit, spes salutis aliqua superest.

Multo mitior est miliaris in puerperis, si rubra quinto, septimo, vel nono die demum erumpat, si symptomata mitiora sint, & lochia ex voto succedant.

Curationem videlicet apud Puzos *Traité des accouchemens*, pag. 327. qui huiusduas species distinguit. Levia diaphoretica ex infuso theæ, croci, artemisiæ, chamæmeli, & oleum amygdalarum tantum suadet D. Puzos in simplici, quæ sæpius a flagrantibus densioribus quibus onerantur puerperæ, ortum ducit.

Ex *Classif. Bonæ Journ. de Med. Janu. 1767.* hæc miliaris a lætis evagatione & æore dependet, hinc odor acetii putris ex his ægris exhalat; purulentæ statim limpide successe ferum lacteum turbidum admittunt, hinc abscendit; eruptio inconstans est, aliquot a partu diebus accidit, maxime si lochia supprimantur; asthenia & animi abjectio totalis sunt symptomata inseparabilia. Legi certe merentur quæ de his scriptit Auditor.

1. *Miliaris Scorbatica*, Chr. Gottl. Ludvigij, Inst. Clinicæ num. 230. *purpura scorbatica* ipsi dicta.

Miliaris scorbatica, in corporibus quæ impioris humoribus scatent, sæpius sine febre evidenti, æstivo potissimum tempore accidit; non-

numquam vero aliis levioribus morbis: v.g. amphimerinæ catarrhali, supervenit; in utroque casu semper chronica est, & ægros diu exercet, rubras ostendit pustulas & asperam reddit cutis superficiem cum pruritu multo, in primis si costipora intalescant; cum hac morbi specie nec languor insignis, nec anxietas præcordiorum, nec alia gravia symptomata occurrere solent.

Causa in acrimonia feri posita est, quæ a falso & aromatico vultu in corporibus sedentariis frequens est; potus copiosus calidus, abusus tabaci cum defectu exercitii, & alvi constipatione huic ansam præbent; diluente & non fermentato potu, cibis blandis, exercitio sufficienti in aere puro, frictione & balneis multum solatii ægro affertur. Præsanæ demulcentes ex scorzonera, china, bardana, præmissa phlebotomia & levi catharsi, conveniunt; evitentur alexipharmaca, adhibeantur æstati a quæ acidulæ; superato morbo balneis frigidis cutis roboretur. *Ludvigij*.

Urina in hac specie valde colorata cito foetida, si fervetur, crassa, oleosa & salina tegitur; ægri torminibus laborant & feces foetidæ ejiciuntur, pulsus in hac febre rarior est & lentior quam in sanitate. *Lind. de scorbutis*.

VI. PURPURA, *Porphyra* Græcorum; *Potachia* febris Germanorum; *Potachia*, *Potichum* & c. aliorum; *Potachialis vera*, Frid. Hofsmanni cap. 21. *le Pourpre*.

Genus est phlegmatis, cujus notæ sunt potissimum maculæ subrorundæ moribus pulicam similes, sed purpureæ quandoque, lividi aut atrii coloris, sine tumore & pruritu adde amphimerinam vel tritæophyan duplicem.

Differt 1. a pulicam moribus, qui in febribus illudere possunt ex eo quod pressione evanescent rubedo horum morsum, non vero Purpura; & defectu stigmatis vel puncti ab insectis percussu, 2. a maculis scorbuticis, quod scorbutus sit sine febre, Purpura vero febrem acutam comitem habeat, præterea scorbuticæ maculæ aliis scorbuti signis adiunguntur, ut stomacaci, quæ hic deficiunt, 4. in rubecula erumpente adest affectus catarrhalis, in erupta est alperitas, horum nulla sunt in Purpura, si Viennensem anni 1758. ab *Hafenschild* descriptam excipias; adde quod maculæ rubeculosæ sunt incertæ figuræ, purpuratæ vero exacte circulares, 4. in scarlatina est rubedo quasi uniformis in trunco velut a vino rubro affuso, in Purpura sunt maculæ lividæ ab invicem distictæ, intervallis cuti omnino concoloribus & apprimè distinctis, nullusque pruritus, qui serius est in scarlatina.

Purpura accidentalis, quam symptomaticam dicunt, currit quidem cum variola maligna, rubecula maligna, miliaris maligna, peste vulgaris, &c. at ab illis omnibus exanthematis discrepat; de cetero petechiæ faciei parvæ, truncum vero maximo infestant.

1. *Purpura benigna* Chr. Gottl. Ludvigij Inst. Clinicæ

fitur. Clinic. num. 145. *Petechia benigna* ipsi dicitur; *Fibris purpureis*: Vide Foresti observ. 59. lib. 6.

Cognoscitur ex febre, quæ more aliarum incipit ex horrore, frigore, subsequente calore & circa quartam diem per truncum potissimum efflorescunt maculae non lividae, nec arro-pureæ, sed rosei coloris & paucæ; ubi apparet per totum corpus post signa coctionis, instat crassus morbum solvunt.

Verum si reprimantur, ut in easu Foresti, dicitur alios morbos excitant, ut gastrodyniam diffusam cum angustia præcordiorum & dyspnœa. Ad revocandam illam eruptionem optime convenit pulvis bezoarticus ad drachm. 1. cum niri scrupulo r. & camphoræ granis quatuor, qui omni trihorio est sumendus.

2. *Purpura maligna*, *Febri purpurata* Sennerti lib. 4. cap. 11. Riverii Cent. 1. obs. 21. *Febri pestilenti* eisdem Pr. Med. *Febri peticularis* R. Fortis; *Febri lenticularis* Germanis; *Febri petechialis* Juncker Tab. 72. Chr. Ludovigii n. 146. Tabardillo Hispanis; *Fibris purpureis* maliguis.

Unicum datur symptoma, ait Riverius Lib. XIII. Sect. III. Cap. 1. febris pestilenti proprium & peculiare, quod in reliquis febribus non contingit; maculae nimirum purpureæ in toto corpore, ac præcipue in lumbis, pectore & dorso apparentes; moribus pulicem plerumque similes, quæ petiula seu petechia ab Italis vulgo nominantur.

Riverius obs. 18. centur. 2. vidit quadragenarium purpura maligna laborantem cum siti intensa, præcordiorum æstu, & inquietudinibus, præcelleret cholera, tertio die hæmorrhagia copiosa, postuserat parvus; maculae lividae; præter julepos cardiacos cum sale prunellæ ter in die exhibendos, præscripsit in pulverem ex salis prunellæ uncia semisse, camphoræ drachma semisse, sumat quartam partem tertia quavis hora; eadem die melius habuit æger, & his remediis iteratis intra paucos dies convaleuit.

Idem observ. 21. centur. 1. refert historiam febris purpuratæ remittentis ab octo diebus durantis, in qua æger semel purgatus & tres phlebotomias passus; pulsus erat frequens & inæqualis, & totum corpus exanthematis purpureis refertum; urinae laudabiles, paululum coctæ, in viris cucurbitulis, pitiana de cornu cervi, inunctionibus ex oleo scorpionum, undecima die delirium cum convulsionibus accessit; decima sexta circa vesicatorium dorsi apparuerunt pustulae plurimæ quasi variolosa, quæ sequenti die ruptæ exsiccabantur; alii in parte anteriori pectoris infinitæ prodire papulae perexiguae, pellucidae, humore seroso refertæ, verbo miliares, unde febris valde remissa, & delirium imminuitur, purgatus æger decima sexta, iterumque vigesima secunda convaleuit. Successum tribuit Auctor potissimum pitiana, in ejus singulis cyathis miscebat salis prunellæ drachmam unam & spiritus vitrioli guttas decem; adhibebat etiam cum salis prunellæ

drachma semisse bezoarticum minerale ad scrupulum unum & camphoræ grana sex.

SCHOLIUM. A petechiis discrepant mox quidem judicio vibices seu maculae violacæ aut lividae, quæ in peste sporadica, nec non epidemica per eundem disperguntur: vibices dicuntur, si virgatae quasi a sigillis infundantur. Vide obs. 64. Riverii cent. 2. ubi refertur nomine febris malignæ, pestis sporadica parotide terminata circa diem undecimam.

Hujus morbi historia vide apud Frid. Hoffmannum de febribus petechialibus variis cap. 11. n. 3.

3. *Purpura Symptomatica*, les *Petechies accidentelles*, *Purpura accidentalis*, Huxham lib. I. pag. 105. 108.

Ea est quæ aliis morborum generibus supervenit, nec eos judicat, nec in illis constans est, nec in morbi incremento observatur; morbi, quibus illa jungitur, non petechiales, sed petechiantes a Juncker & Nentero cognominantur, & tales sunt omnes febres remittentes, potissimum typhi, hemitritæ & tritæ, omnes phlegmasiæ exanthematicæ; ut pestis, variola, rubella maligna, miliaris, quæ etiam reciproce postulas aut papulas suas symptomatice admiscunt purpuræ, & sibi mutuo; sic in observat. 21. centur. 1. Riverii, pustulae variolosa & miliares papulae purpuram malignam symptomaticæ adornarunt; sic in peste Massiliensi petechiæ, pustulae carbonum, vibices, aliaque exanthemata bubonibus se comites addebant. Pestis sporadicæ cum petechiis historiam vide apud Riverium centur. 2. obs. 64. morbus enim qui parotidis solvitur nomine pestis sporadicæ videtur designandus.

Utrum purpura maligna sit contagiosa, ut contendit Ludovigius, valde dubito, cum de pestis contagio maximi in arte viri dubitent; in quam tamen purpura pesti conjungi solet; venenum tamen multiplicativum in ipsius principio morbosico admitto, idque tenuissimum, halituosum, acre, septicum. In hoc morbo phlebotomia raro adhiberi potest ob pulsus debilitatem; emetica vero & cathartica feliciter adhibentur; dein lenia diaphoretica, antiseptica præferuntur, ut camphora, chamæmelum, serpentaria, &c. usurpantur.

4. *Purpura verminosa*. Hist. de l'Ac. des Sc. 1754. pag. 14. A.

Ægri multos lumbricos rejiciebant, cum mature succurrebat illis, & tunc Purpura erumperebat; quicunque ab ea evadebat epidemide spoliabantur; ceteri intra triduum obibant, & tanta erat putredo cadaverum, ut vespillones sepius contagio assicerentur. Morbus circa Tulum in Lotharingia epidemice grassabatur. Gœsfroi.

VII. FRYSIPELAS. *Rosa* Sennerti, & *Iguis* Sacer, *Erysipelas pernicijsimum* Moroni Dicoch. *Febrib. erysipelatoſa* Sydenhami pag. 174. 655. Fr. Hoffmanni *Tom. 2. Fadura Eryſipelatoſa*, vulgo *ſeu de S. Antoine*, Mezeray *Hist. de France*.

Vulgo eodem nomine inſignitur ac *Erythema*, ſeu morbus gravis & levis affectus, vtrum res adeo diverſa nomina deligatoſe debent.

Cognoscitur ex pyrexia acuta & tumore diſuſo coloris rubro-roſei cum ſenſu ardoris.

Diſſert ab exanthematicis prioribus quod non per puncta exigua & maculas pulicum morbiſus ſimiles erumpat, ſed in lateſ, amplas, pollicares aut majores areas ſubtumidas ſe diſſundat: ab erythmate per febrem ſæpius patriam qua Eryſipelas lupatur, cum vix ulla ſit in erythmate, ſiſtem a principio, externe procedenti. Eryſipelas vero ut erythema, cutis deliquamatione terminatur.

1. *Eryſipelas* *Rosa* Sennerti de febrib. libr. I. cap. 15. *Febrib. Eryſipelatoſa* Sydenhami Sect. VI. cap. 5. *Febrib. eryſipelatoſa* Fr. Hoffmanni *Tom. II. cap. 13. de Reſiſſaſſi. Germanis; Eryſipelas*.

Phlogomaſia eſt cum febre continua ſynocha; cum alicujus partis, poſitiſimum faciei, erythemat ſimile; juxta Sennertum deſinitur febris continua, ſanguinis parte tenuiore corrupta & inflammata, qua ut natura ſe liberet, eam in aliquam partem externam expellit forma tumoris aut macula rubra, lata, qua a parte in partem ſerpit.

Præluſit ab horrore, rigore & ſequenti circiter die invadit, poſitiſimum ſub ſinem æſtatis, dum æger ſub die verſatur; ſummus ſubitusque rubor ac dolor exoritur in quadam parte, apud Germanos in inguinibus, aliis, ſemioribusve cum prævio glandularum vel axillarum vel inguinalium dolore, ita ut æger ſe peſte correptum judicet; apud Anglos vero & Gallos ſæpius faciem occupat hic tumor calore acri, rubore roſeo, cum ſumma cutis tenſione & elevatione exigua; lata, diſſuſa non circumſcripta, febris intenditur cum calore, ſiti, anxietate, non raro apud nos lingue albedine, oris ſæcitate. Si vehementius ſit malum, phlogomaſia ſupra tumorem elevarunt, aqua ſubluſa turgida; hinc per frontem, palpebras, capillitium, collumque circue, atque ſi male tractetur, accedit gangræna, delirium, utplurimum vero morbus intra ſeptimanam terminatur.

Sexagenaria menſe Februario magna debilitate cum ſomnolentia ac pulſu parvo corripiebatur, præmiſſo frigore & horrore; illico potionem cardiacam adhibui, ſequenti die phlebotomia & brachio ſuit inſtituta, poſtridie cathartis ex duobus cyathis priſana regis cum panillo tartari ſibiati; ſæpius enim præcedunt naſæ, & nihil felicius in hoc morbo ſuccedit quam vomitorium, eodem vespere iterum vena ſecta fuit, tunc ſeu tertia die eryſipelatoſus tumor

in parte dextra faciei apparuit, caput ſeu ſim circuevit, nihil applicui; ex aure ſerum ſanguinolentum effluxit, bullæ apparuerunt & cito crepuerunt, pulſus major & frequentior evaſit, phlebotomia iterata eſt, & priſana regia ſine tartaro ſtabilito alternis diebus ſumpta, lingua, quæ erat ſicca & nigra, humidæ evaſit, ſeptima die nitida fuit; eryſipelatoſus tumor, qui palpebras in magnum tumorem ſubalbam inflaverat, eaſque deim deſeruerat, reſedit, exſiccatus eſt, & in magnas ſquammas cuticula delapſa eſt.

2. *Eryſipelas typhodes*, *Fadura malignæ eryſipelatoſa*.

Eſt febris maligna, initio typhodes; deinde biliola, alternis diebus paroxyſmum fortioſiorem, ſed unum quotidie inferens, in qua cum delirio, ſumma virium proſtratione, tertia die erumpit tumor eryſipelatoſus faciei, vel humerorum, colli, brachii, febre tunc temporis vivida, ardente, quæ primis diebus ex pulſu vix poterat cognolci.

Domina de Graſſes triginta annos nata menſe Februario e templo exiens, horrore, frigore, cephalalgia corripitur, ſecto poſt tres dies tantum ſe addicit, febris erit, remittens, tritaëphyſa duplex, qua creſcens cum frigore, & dein calore ſummo exaperdens, delirium aſſerebat; tertio die tumor eryſipelaceus faciem affecit, aſt recedens ad mutatum ſectum, dein in humeris, collo, pectore apparuit, mox brachium dextrum ac manum invaſit; vena novies ſecta fuit, ſanguis erat coriaceus; diebus a paroxyſmo fortiori vacuis, purgata cum priſana regia & tartaro ſibiato; die decima ſeptima, ob iram ſuſceptam paroxyſmus vehementis cum horrore aquæ, lucis averſatione, & lacrymatione exigua ſine ratione; vena pedis tuſa fuit; ſequenti die vini emetici puri uncia una ſumpta, eryſipelas quod reſceſſerat, iterum faciem inſeſtavit; delirium imminutum eſt; interea in manus, brachioque quovis mane tumores molles, albi; ſeſe offendeſcant ſine prævio rubore aut dolore; his apertis pns effluſbat, vulnus cito ſanabatur; nova apoſtemata die ſequenti apparebant, & illico aperiebantur; trigefima die ſenſum paroxyſmi debilitata & vix exceſſit. Vidi ſimilem morbum Nemaſi in muliere quadragenaria, in qua per tres quatuorve dies ex pulſu & delirio obſcuro hyſtericum inſultum tantummodo inculſandum putabant, aſt repetita phlebotomia eryſipelas in dorſo apparuit, emetici & cathartici febris illa tritaëphyſa intra 24. diem reſceſſit.

Sunt qui linteolum æquis vini & aquæ tepide partibus madidum, alii vero decocto ſorum ſambuci in aqua tinctum, & quavis hora renovatum erythemat ſuperponunt, aſt nihil imponere ſatius eſt.

3. *Eryſipelas a veneno*.

Anno 1772. menſis Auguſti, ſutor oppidi *Pias* dicti, ejus uxor, duoque nati, ſcizum hepatis ſqualiculi *Linnaei* manducabant, tertius natus nihil ex eo attrigit, puella perparum, & latius

statim a pastu qui manducaverant hepas, somno correpti decumbunt per biduum, triduumve somno, & delitio detenti; vicini admoniti accedunt, & hos ægros erysipelate universali citra calorem tamen, sed cum acri pruritu correptos, ac velut ebrios contemplantur; femina prima exurgens cutemque exagitant, cuticulam totius corporis a cute secedere sentit; maritus ægrius cuticulam deposuit non sine violentis pandiculationibus, tota epidermis naoris intra sex dies omnino avulsa est, aut viro intra mensem; interea Agatham ego accersit ad ægram nobilem, sutorem & ejus uxorem accessit, & frustra ampla epidermidis ab illis accipio; ipse a calcaneo viri frustum amplum adhuc hærens avellit; puella partim tantum desquamata furunculum in femore passa est. Hepar illius, piscis semper rejici solet ab ipsis piscatoribus; piscis vero ille non probat nisi mense Augusto in nostris oris, vulgo *casulus marinus*, vocatur; hepar constat ex duobus lobis pedem longis, instar lori coriacei complanatis, ex luteo variegatis vel punctatis.

Simile vero erysipelas collum, & faciem tantum, infestans corripuit Monspelii tres adolescentes, qui alterius generis piscem manducaverant. Idem Agathæ de alterius etiam piscis esu factum dicunt: forte illi pisces, venenum hoc concipiunt cum frusta carnis putridæ hamis, affixa vorant. Hic morbus a myxolorum esu sæpe productus fuit *Wenzelhofi* teste.

4. *Erysipelas ambustus, grande brûlé.*

Morbus, est isque valde periculosus, cum magna pars corporis, præsertim vero faciei, oleo, aqua, aut aliquo liquore ferventi comburitur; lebetes effuso, lapsu in calcem vivam recens aqua, solutis, aut in ignem, qui contiguat, aut pulveris pyritii explosione attingitur; inde dolor ærox, peritux, febris acuta, pervigilium, & quandoque cita mors, aut etiam sphacelus partium combustarum, amplæ phlyctenæ, &c.

Pro arcano est apud mulieres unguentum ex aqua secunda calcis & oleo; sed ætatum Galeni ad dolores demuicandos eque valet, ubi partes erofæ sunt. Si vero nulla exoriatio, sedato primo dolore, vinum repidum aquatum continuo admotum optimū est. Vide *Gangranam* 4. ejusque curam.

5. *Erysipelas Pestilens, Ignis sacer, Feu S. Antoine, Feu sacré; Mezeray Hist. de France ann. 1090. Mal. des ardens in 1130. fons: Louis VII. Ardet ardentius.*

Hoc anno utramque Lotharingam devastabat morbus epidemicus, ignis sacer, vel ignis Sancti Antonii nuncupatus. Præ Temporum sitibus, inque mediis plateis ægri miserimam vitam doloribus atrocibus exercitiam ducebant; aliis pedes, manns alia, quibusdam facies hoc pestilenti morbo exedebantur; an ad erysipelas, an ad anthracem referenda sit, hæc epidemia dubito. Erysipelaceam tamen fuisse febrem videntur innuere *Samartius*, *Sydenham* & nuper *Frid. Hoffmannus*, qui animadvertit erysipela-

ceam dari febrem, quæ cum atrocissimo morbo pestilenti summam affinitatem habet; utrumque enim cum horrore, æstu, delirio, virium prostratione, vehementi dorsi capitisque dolore invadit; inter tertium, & quartum diem erumpunt ad glandulas axillares vel inguinales materiz adurentes, quæ in igne sacro ad pedes usque descendunt. Hæc materiz in glandulis abscessum format, ac partibus extremis gangrenam inducit: demum in utroque morbo a materiz morbosæ retrofessione summum impendit vitæ periculum: Vide *Frid. Hoffmann. de febre erysipelata num. 2.*

6. *Erysipelas symptomaticum Frid. Hoffmann. de febre erysipelata n. 4.*

In anasarca, ascite, immo aurigine & melasichero accedit haud raro symptomaticè erysipelas & cito ægrem jugulat.

Complicatur etiam vulneribus partium nervosarum, præsertim cranii & fracturis ossium, & tunc æger in incipiti versatur.

7. *Erysipelas Chinense du Halde Hist. de la Chine pag. 317.*

Operari qui vernicem extrahunt ex arbore quæ *Rhus vernix* Linno dicitur, si exhalationes hujus excipiant, erysipelate universali intra diem afficiuntur, facies deformatur, corpus intumesceit, quasi lepra insectum videtur; cutis ubique erepat, unde multum seriefuit, demum cutis exsiccat, decedit & nova succrescit.

Cura petitur ex hydragogo vehementi, deinde balnea in decocto cimarrum abietis, corticis cassaneæ cum nitro & baselia, stupor hujus decocti adhibetur, & cinis basellæ vulneribus aspergitur.

8. *Erysipelas Zoster Plinii lib. 29. cap. 11. Langii Epist. pag. 220. Zoma Frid. Hoffmanni, de febre erysip. nu. 6. Russellii de tabe glandulari, pag. 125. Anglis the Shingles, pag. 13.*

Hic corporis truncum infestat, modo thoracem, modo scapulas, modo latera & costas occupans; frequenter etiam inferius oritur & medium corpus tanquam cingulum cingit atque totum amplexatur, in quo casu, teste *Plinio*, enecat. Subnascentur vesiculæ quædam flavescens nonnunquam, sed sæpius livescens; quæ ad instar herpetis, cujus speciem maxime referunt, corrodere solent. Hinc *Arper Scribonio Largo* dicitur: fibracula tantum stipatur, & si reprimantur vesiculæ, magna symptomatica enascuntur. Vide *Historiam a Russellii* traditam, in qua gravis dyspnoea successit.

Duo in cura sunt obervanda, 1. ut maturationem ulcusculorum adjuvemus, 2. ut a purgatione nos contineamus, donec se per cutimevacuarit eruptio; tum autem vel sale Glauberi, vel aqua marina venter subducendus est. Vide curam fufus apud *Frid. Hoffmannum*, 8. 1. cap. 13. de febre erysipelata.

9. *Erysipelas contagiosum Deslandes Hist. de l'Acad. des Sc. 1726.*

Egitudo Tolosæ Epidemicæ, & ut ferunt, com-



contagiosa fuit anno 1746. epidermis faciei, apud eos qui convalescunt, decidit.

30. *Erythelae a vespie.*

Vidi militem calvum, qui apud examine ita fuit involutus, & lacessitus, ut caput, collum & manus quasi erysipelate uniformi mire intumescerent, cum rubore & atroci dolore, ex quibus fore exanimatus fuit; vesparum mortum reperiit eandem morbum produci & atrocior; nullum tuius auxilium est quam frigida continuo renovata pars ablueret, teste *Remmario*.

**VIII. SCARLATINA, Morbilli confluentes** Morton de febr. scarlatina, pag. 28. cap. 3. dicitur *Scarlatina* a colore rubro rutilo exanthematicum. *Figura scarlatinae, Figura rubeae.*

Phlegmasia est exanthematis maculosus, rubris, crebrioribus, latioribus, & multo magis tubentibus, at non perinde uniformibus, ac sunt illae maculae quae rubeculam stipant; illae pariter farinosus squamulis terminantur, sed sine praedulo catharrali exantemat, & ad secundam, tertiamve vicem se produunt ac recondunt vicissim.

1. *Scarlatina febris Sydenhami*, cap. 2. sect. VI. & p. 699. *Rubeola confusa.*

Haec febris ueplurimum sub aestatis finem accidit; integras familias & praesertim infantes aggreditur, sine tussi, epiphora, unde distinguitur a rubeola; sed praeterea in rubeola dantur in trunco dorymbi macularum intervallis cutis albis, invicem discreti; in scarlatina maculae sunt uniformiter disseminate, quasi vino rubro tinctae forent partes. Die quarta facies intumescit, exanthemata se produunt, & post tres vel quatuor dies evanescent; incipit cum horrore & frigore; agilitudo est mediocritas.

Cura simplicissima est. A phlebotomia, cathartici & magis etiam a sudorificis, & cardiatis abstinendum; carniū esus interdicatur, foras non prodeat scarlatinus, nec se lecto iugiter adducat; desquamazione peracta, utatur leni cathartico. Si coma, & clampsiae initio supervenerint, ut infantibus accidit, epipasticum ampulum nuchae applicetur, & paregoricum quavis nocte usurpetur; pro potu sit hydrogala, seu lac cum aqua triplo coctum.

2. *Scarlatina urticata, altera erythelata* species Sydenhami Sect. VI. cap. 6. *Purpura urticata* Junckeri Tab. 74. pag. 599. *Figura rubeae pruriginosa, Figura urticae de Meyserey* Tom. 2. pag. 232. P.

Incipit cum sensu refrigerii, sequitur moderatus calor, sitis, cephalalgia, dein cum multo pruritu, & curaneo rigore exanthemata tam in facie quam in reliquo corpore se produunt, quae cutim superant & cito accrescunt, & papulae minantes coloris ex pallido rosei, urticarum puncturam similes referunt, quandoque cum protuberantiis ferme erysipelaceis & asperitate serpiginosa; febris, si adest, mitissima est; exanthemata interdum evanescent subito remittente, aut

circa vesperam denuo prodeunt, cum febre, pruritu molesto & ardenti; intra tres aut quatuor dies cessat affectus, minutissimis squamulis exente secedentibus. Vide *Tertianam urticatam*. - Vide etiam in *Illustr. de Morbo Malade de Arunde* Tom. 2. pag. 261.

3. *Scarlatina pruriginosa, Tertia eruptionis* species Sydenhami, Ibid. pag. 176. cap. 6.

Haec rarior est antecedenti; saepius in pectore se prodit, ac aliquo loco determinato se figit; vix cutim supereminens ac latiore maculam praese terens, cuiusmodi aliquidantulum pruriginosa ac squamulis havescentibus distincta; hac apparente aeger bene se habet, recedente aegrotat, urinam turbidam ac rubram mingit. Haec postrema eruptio curatur ut scarlatina urticata, aut quandoque non nisi aquis ferrugineis diu potus codie.

4. *Scarlatina intermittens*, Morton Pyretol. p. 33. 97. 98. P.

5. *Scarlatina variolodes* Journ. de Med. Juill. 1763. pag. 275. B.

Ea est species quae post epidemiam variolosam accedens, praesedit non secus ac variola, scilicet cum pyrexia, delirio, nausea, vomitione, haemorrhagia narium, tussi; accedit dein in trunco rubedo qualis cancri codi; morbus intra tres dies recedit, aut rubedo quandoque resistit.

Curatur phlebotomia, potu copioso, levisimis cardiatis, & cathartici pluries in convalescentia repetitis; saevit Parisiis vere anni 1712. anno etiam 1763. mense Augusto, scarlatina stipabatur ante quartam diem pustulis variolarum annalis, ita ut Medici deciperentur, sed postea multo citius suppurabant & escificabantur, nec crustas relinquebant, nec maculas rubras.

6. *Scarlatina anginosa anni 1765. A.*

Haec aetate Montispeii viget apud infantes scarlatina, in qua totus truncus intense rubet cum voce rauca, & angina ulcerosa, immo in quibusdam gangraenosa, quassante biennium sola sine scarlatina plures infantes abstulit. Curatur emetico quod nauseae indicant, dein cathartici, mox vero detersione faucium ope mellis & decocti hordei cum pauxillo acidi marini; dein, remissa pyrexia, lixivio calcis vivae cum melle ulcus exsiccat; verum saepius infans & medio tollitur, nisi angina simplex fuerit, & docilis aeger remedia admittat. Morbus hic contagiosus apparet, ut & cynanche maligna ante biennium fuerat,

## IX. ESSERA, Purpura.

Phlegmasia est ut plurimum apyretica, vitii & quae ac morbis accendenda, in qua maculae rubellae, pollicares, plures, discretae, in diversis corporis partibus subito erumpunt, post diem unum aut alterum recedunt ac revertuntur.

Differt a purpura urticata, ex eo quod multo rariore est, nec ullatenus pruriginosa; vix doleat, febriculam minimam comitem habent. Illae maculae vix supra cutem eminentes raro phle-

phlebotomiam possulant, & sæpius post quatuor dies recedunt, sub regimine moderato; cavendo a frigore, abstinendo a viuo & carnibus. Vidi Efferam cujus exanthemata pollicaria diametro, ex interiore rubris demum albefcebant, cuticula scilicet nummi parvi magnitudine a cute semota, nullo fluido interposito, deinceps exsiccata, & frofultatim delapsura. Harum specierum desunt accurati characteres.

**X. APHTHA;** *Pemphigodes* Galeoi Finit. Medic. *Pustula oris* Haly Abbas; *Alga* Arabum; *Ulcuscula oris* Fel. Plateri; *Vesicula gingivarum* Sennerti de aphthis; *les Aphthes*, *Chancrez*; *Bresigne* Occitanis,

Definitur a *Gulena* febris quæ per calosis intentionem pustulas in ore, quæ Græcis *phlyctides* dicuntur, excitat.

Ejus itaque character est, erapcio phlyctenarum interiorem oris superficiem occupantium; sunt vero papulæ subrotunda semilineares in palato valde dolentes, in lingua concolores, apice pertusæ, quæ ulcuscula, abrasa cuticula, serpunt, & acriter dolent; inde deglutitioni, suctioni, & apud adultos malicationi valde nocent; perixia vero sæpius nulla aux exigua, nisi Aphtha complicata sit cum variola, tritophya, &c. Color est varius, vulgo albus in medio, ruber in ambitu; vidi in lingua ipsi lingue concolores. In maligna Aphtha papulæ sunt brunneæ, flavæ, nigre, lividæ. Infantes sæpius quam adulti aphthosi sunt.

Duplex est itaque status in papulis. Initio tumor est, seu elevatio epithelidis instar graoimilli, sed apice foraminulum gerit; hæc vero vesicula nil continere videtur; sed alba est, quia non coheret partibus subiectis, ut accidit in ambusione epidermidis; dein latet hæc erosio maxime in Aphtha syphilitica, mercuziali, &c. & ulcusculum morum est, vulgo *chancre* dictum, cujus fundus est albus, sordidus.

Efflorescentia illa tribuenda videtur ichosi euidam alkalescenti in glandulis miliaribus oris deposito, halituofo, corrosivo; hæc erosio apice vesiculæ, relinquat ulcusculum, acute dolens quoties cibis, poturæ attingitur; auxilia vero in genere sunt antialkalina (specifica, ut acida, spiritus scilicet salis, sulphuris, alamen, vitriolum egyptium, &c. vel edulcorantia, ut oleum rapum, butyrum, radix althææ; demum sanguinem depurantia generalia, cathartica, &c.

1. *Aphthæ lactucinae* Maugeri Bibliothec. Med. Pr. Mauriceau lib. 3. cap. 36. *Aphthæ infantiles*, *efflorescentia oris alba sine febre*.

Vocatur illa species *lactucina*, tum quia lactentibus familiaris est, & a lacte corrupto ori scilicet creditur, tum quia sub forma papularum albarum fundum oris obduat hæc efflorescentia.

Hanc suspiciantur naturæ, ex eo quod lac fugere reculant, vel nequeant infantes, valde anxii, pervigiles, febrientes sunt; papilla in os immissa, nutritice calorem oris infantis, etiam

sentiunt, tum aperto eorum ore vident maculas albas, semilineares diametro, invicem coherentes, quæ palatum, geas internas, aliasque oris partes obduunt.

Apud adultos antiam ac supernam palati partem obduunt, alperam reddunt & albidam, cum acuti dolore & difficillima malicatione. Verum apex & latera lingue etiam puncto hic & illic percussa videntur, quod acerrime dolet etiam colore vix mutato.

Curatio obtinetur lacte blando, dulci, adeoque electione nutriticis, vel edulcorato prius sanguine per dietam convenientem, cathartum, iucula refrigerantia, pituitam ex ossyria, balnea, &c. necnon collutorio oris infantis frequenti ex decocto hordei, uncis tribus; molli rosati & syrupo de moris, aa, unc. i. misce, fiat collutorium immo prægetur infans; diem absorbeos pulvis, ut equaliorum gr. x. in cochleari lactis præbeat; purgari potest cum axone, unc. i. rhei, gr. octo vel alternis diebus cum syrupo de cichorio composito.

Si erosio papularum crescat, remediis quæ restant, summa cum cautela, collyrio Lanfranci maxime diluto, ope penicilli, tangantur ulcuscula, dein os abluatur, & inclinato capite residuum expulsetur. Apud adultos vel paucæ sunt papulæ, vel multæ; si paucæ, sufficit eas appressio vitrioli; carulei tinctulo contingere, vel penicilli ope eas spicula sulphuris vel latis velere, unde pyralismus uber; si copiosæ, ut in epidemia anni 1759. observari, phlebotomia utilis est; dein cathartici, oris collutio ex aceto, decocto hordei cum melle, vitus humedans & refrigerans, oleum rapum cum saccharo, mol cum tantillo aluminis ori admoveatur; Germani aqua in qua ferum candens exinsum est cum saccharo & erodo, ope linteoli rigidioris pullulas aphthosæ abluunt.

2. *Aphthæ febriles*, *Aphthæ in adultis* Sennert. lib. 2. pag. 1. cap. 38.

Est quædam necnon adultis familiaris cum febre, oris inflammatione, ulcusculis; ejus albis ad oropharyngum quandoque extendis, ea species vero est phlegmasia; atque si hæc papulæ interiora oropharygi, ventriculi, &c. afficiant, inde angore, vomitus, dysentericæ excusantur pestifera, dein vero pervigilium, dysphagia, pyralismus, summa macies & debilitas, unde quodamque mors.

Filius L. Riverii quadricion fluxione accensam patiebatur in linguam & fauces, cum in suis ulcusculis albicantibus doloribus, & magna inflammatione cibum capere nec lac fugere poterat; die ac nocte ejulabat, infomnis, macilentus, quod bilem porraceam rejiciebat, mol colicæ cum spiculis vitrioli guttulis aliquot, quod alias mitius conducebat, non profuit, vaticatorium capulis admodum valde profuit, sed dolores & clamores perleverant, æger per os humorem lerosum & aerem emitebat, tandem narcoticis magna dos sedatus est; hinc adhuc

cathartici convulvit. *Riveri, obs. 43. cont. 2. & obs. 35. cont. 3.*

In adultis a phlebotomia & cathartici cura inunda est.

3. *Aphtha maligna Aphthæ acanthosæ* *Gæzi*; *Pauli Arguta lib. 1. cap. 10. An Aphtha Belgarum Aug. Blondel?*

*Aphthæ* symptomaticæ in febribus malignis, lividæ, scetidæ, gangrænoeæ cum tricophya, aut umili febre maligna citam mortem prænuntiant, teste *Avicenna*. In dysenteria non sunt melioris ominis, monente *Sydenhamo*, *Sci. IV. cap. 3.*

*Aphthæ* quæ superveniunt miliari febre debellantur catharticis, sanguinem contemperantibus; deinde vero usu kinkinæ, & gargarismate ex succo pomorum agrestium, & syrupo de rubo idæo. Vide *Sydenhami*, pag. 523. *Aphthæ* esse pustulas ipsas miliarisæ interiora convulsas existimat *Ill. de Haen*.

4. *Aphtha syphilitica ulcuscula venerea oris* *Astruc*; *Gallice Chancrez vénériens de la bouche Mauriceau*, *Malad. des femmes*, art. 34.

*Illæ* sunt duplicis ordinis: alia enim sunt spontaneæ, & a viru syphilitico jam inveterato, aut si recens, per bala suscepto, oriuntur, vel tum sanis, tum syphiliticis ab hydrargyrosi, aut remediis mercurialium usu copiosiori oriuntur.

*Aphthæ syphiliticæ* exulcerationes superficiales, mucosæ vel griseo obductæ, quæ sapius velum palatinum, aruatam, ejusque columnas, partemque pollicem faucium obsident, & a parte in partem serpunt cum oris fetore, pyralismo importuno, & si diutius durent, cum vomeris ossiumque vicinorum erosione, carie.

*Aphthæ* mercuriales sunt alveola dolorifica, sordida, scetida, quæ potissimum ad latus & basim linguæ, ad interiora genarum in extremo ductu Stenoniano confertim erumpunt ob fortio rem hydrargyrosim, aut repetitum panacæ, aquilæ albæ, &c. usum, cum dolore, fetore, pyralismo, linguæ intumescencia, angina, oris aperiendi difficultate, & sequenti stricture, quæ ægri dicuntur capistrati, *Gallice bridés*.

5. *Aphtha scorbutica, Ulcères de la bouche scorbutiques*.

Vidi purpuram scorbuticam cum pertinennarium & gingivarum hæmorrhagia, oris fetore prægresso, pyrexia; post aliquot dies ab invasione, maculis atro-purpureis, circularibus, vel ovalibus lineæ diametro per totam cutem dispersis, pyralismo sanguinolento & phlyctænis in ore copiosis: in scorbuto graviore accedunt ulcuscula gingivarum cum pyralismo, phlyctænis ruptis enata, rodentia; quæ veram scorbuticam aphtham constituunt.

Nihil melius quam si tangantur oleo vitrioli puro, aqua Rabel, & similibus.

## ORDO SECUNDUS.

## PHLEGMASIÆ MEMBRANOSÆ.

*Morbi inflammatorii viscerum membranaceorum, ut meningum, pleuræ, stomachi, intestinorum, vesicæ, &c.*

*Invadunt* cum horrore, frigore, si a principio interno procedant; dein calor, lassitudo, althenia, pyrexia, & symptota visceri affecto propria succedunt, crescunt, in statu perseverant, cum pyrexia sæpius continua, in quibusdam remittenti, & tunc in paroxismo symptota cætera adaugentur, potissimum pullus frequentior, arteria plenior, vel magis tensa, dolor vividior, calor major: si terminentur per resolutionem, sudores, diarrhææ, perirrhææ, in morbis pectoris anacathartes succedunt: si in suppuratum abeant partes affectæ, febris evadit hectica, lenta, chronica, sudores colligativi; accedunt tabes, phibeses, cachexiæ, ascites, alique morbi chronici ultimæ classis.

Sanguis in patella collectus modo juxta brachium, aut in largum vas destillando non fluxerit, sed pleno saltu in angustam patellam delapsus sit, ibique quietus aliquandiu steterit, regitur corio albo, denso, specifice leviori quod *sereno* dicitur, hinc sanguis coriaceus; *rosæ*, *Sydenhami* pleuriticus dicitur. Hoc corium pro putredinis indicis habebant Veteres, pro pure vulgus habet. Specialis suppuracionis signum aut affectus existimabatur ab *Ill. Quæsar*, sed pus vulgare, licet ad putredinem propius vergat quam corium; specifice gravius est cruento, corium vero levius. Quo febris purior, pyrexia vehementior, dolor intensior, eo corium densius, crassius. Si vero phlegmasia sit maligna, æger cacochymus; seu si morbus sit, ut aiunt, symptota febris cujusvis remittentis, typhi, vel exanthematicæ malignæ, corium vel sero flavo immersum, vel nullum, & cruor fluxitior est.

Licet *Ill. Hallerus* sensum denegat membranæ, docet experientia eas inflammatione correptas acerrimo dolore, suadente experientia apud nos in vivis animalibus capta, dolores autem sunt in hoc ordine intensiores quam in subsequenti, ubi viscera fardæ, parenchymatosa dida, ut cerebrum, pulmo, &c. afficiuntur; species hujus classis legitimas vel veras cognominant Veteres, quas a puro sanguine fieri putabant; quas vero a cacochymico, *spuriæ*, *biliosæ*, *pituitosæ*, &c.

XI. PHRENETIS, *Phreneticiæ* *Castelli Lexicon*; *Sirsen* *Arabum*; *Phrenesio* & *Transpos* *an corporum*.

Est genus phlegmasiæ acuta pyrexia & delirio perpetuo insignitum, & cephalalgia atroci reple-

ut plurimum incipiens: definitur vulgo *mentis alienatio continua cum febre acuta*. (J. R. Fortis.)

Distinguitur a paraphrenesi, quod primis etiam morbi diebus pyrexia vehemens & cephalalgia meninges inflammari designent: a cephalalgia per vigilias & dolores, cum in cephalalgia sit delirium soporosum: Phrenitis, paraphrenesis & cephalitis a velanis differunt per pyrexiam, qua stipantur. Delirium in illis est insomnium a vasorum cerebri fortiori pulsatione & infarctu determinatum, unde anima ideis ab interno cerebri statu determinatis, minime vero ad externis circumstantias accommodatis detinetur, percellitur, ut in insomnio dormientium; cum autem anima roboretur, quo pollet phreniticus, conscia fit per sensum confusum, delirium audax est; audacia enim pendet a robore sui conscientia.

Anima in insomnio illo morbofo decentem negotiis vitalibus simul invigilare mirum non est, cum quotidie accidat ut insecti & alii ideis attenti ambulemus, maudulemus, immo quod magis mirum, preces solitas lingua & labiis deblateremus, quasi mirum loquelæ opus foret automaticum.

1. *Phrenitis vera* Boerhaave aph. 771. *essentialis* R. J. Fortis: *Phrenitis idiopathica* Junckeri tab. 63.

Ille est species cæteris rarior in qua meninges primario inflammantur: & delirium simul cum febre adoritur, cum in paraphrenesi delirium in decursu febris accedat. In illa itaque est serox & assiduum delirium a cerebro, seu meningibus primario affectis, cum pyrexia acuta continua, seu, ut ait Willis, desipientia cum febre synocha.

Antecedunt calor & dolor inflammatorius capitis cum oculorum & faciei rubore, somnis turbulentis, levi desipientia: vigilie, ira, protervia, oblivio, apud adolescentes calidos, biliosos, liquoribus ardentibus, insolatione abusus, per ætatem iter facientes, solent accedere.

Stripatur pulsus duro, frequenti, veloci, ideis depravatis, unde pathemata & actiones inconcinne, vox mutata, tonus audax, loquela temeraria, ferocitas, inquietudo, somni turbulenti, oculi truces, protuberantes, stillicidium sanguinis e naribus: tertio vel quarto die necat, prægresso sopore profundo vel convulsibus: cadavera exhibent piam potissimum meningem inflammatam.

*Curatur* Jargis e brachio, dein e pede, immo e collo tandem reperitis phlebotomiis; si pulsus in fine debilis sit, hirudinibus ad tempora admotis: potus emulsionatus, vel acidus, nitrosus, laxantia ecceprotica, clysmata, rasio capitis, demum narcotica, profunt.

*Phrenitides symptomatice*. Quantum variet phrenitidis curatio per indole morbi primarilæ quæ pendet, patet ex observatis Sydenhami circa diversas species phrenitidis; & maximi ad primum momenti est hoc ill. Van. Swieten pronuntium, ut nempe in harum specierum cura at-

tendatur ad genium morbi primarii ex quo phrenitis orta fuit; ut plurimum vero delirium in his morbis non nisi in decursu febris supervenit, cum in vera initio febris appareat delirium.

2. *Phrenitis synochi pleuritica* & *phrenesis* Sydenhami pag. 142. *Phrenitis in febre continua* anuor. 1673. 74. & 75. Sydenham. pag. 146. Hippocrat. Aphor. 12. Sect. VII.

Hæc febris pleuritidis epidemicæ genium imitatur, & vocatur *synochi pleuritica*, licet sine dolore lateris fuerit. Incipit morbus a dolore capitis, & dorsi: satis atroci, stupore item & dolore articulo, artuumque tenfivo, immo & totius corporis fere rheumatismo; lingua subalba, dispositio ad sudores, sitis mediocri, urina sanæ similis; febris duratio ad 14. raro ad 20. diem, extendebatur, nulli ex hac febre in carum incidente febrilem; ast apud alios erat phrenitis valde diversæ: vera; siquidem æger tranquille delirabat, nec eo exandescens; & furor ascendebat, qui solent illi qui phrenitide vera auctiam variolosa corripiuntur; nam per intervalla æger abrupte dormiebat, stertebat etiam profundius, illudque symptoma erat diuturnius, minus acutum: pueri etiam hoc plerumque accidebat, ast adultis maxime, potissimum si regimen calidum adhibitum fuisset: cum vero æger sine stupore delirabat, nec ulla ratione regi poterat, tunc acutius erat hoc symptoma, nec dabat inducias, & ægrum intra paucos dies tollebat. In hoc casu potissimum præsidium tulit spiritus vitrioli, quem post venæ sectionem, atque enemata unius, alteriusve injectionem, cerevisiæ rebus intillatum pro potu ordinario concedebat Sydenham, qui intra paucos dies, & somnum conciliabat, & superatis symptomatibus ægro sanitatem reddebat, quod nulla alia methodo effici potuisset.

3. *Phrenitis miliaris*. Vide Frid. Hoffmanni observat. 3. & s. p. 131. *Phrenesis nova febris superveniens* Sydenham Schedula monitoria, pag. 317.

Hic morbus nova febris dictus Sydenham, est species miliaris morbi, monente Mead, quæ præ cæteris caput petit, nec sine ingenti tum molimine, tum ægri periculo, indo valet demerari. Præcaveatur maxime hæc phrenitis ac petechiæ, regimine temperante & a læso abstinentia, quantum vires permittunt, saltem situ semi-erecto, & stragulis immixtis. Hæc phrenesis ubi semel invaluit, nec subito deleri potest, nec repetita ultra limites præscriptos in miliaris vel phlebotomia, vel purgatione ejus curationem aggredi tutum est. Ad hoc nil æque confert ac ægri caput radi; hac methodo cerebrum refrigeratur admodum, ita ut sensum phrenitis evanescat, non focus ac cataphora huic superveniens.

4. *Phrenitis synochi sanguinea*: *Phrenitis symptomatice febris continua* anuor. 1661. 62. 63. &c. Sydenham pag. 40.

Huic febrî, ob regimen vel temperamentum

cali.

salidius apud Juvenes vegetos, supervenit phrenitis, vel quod proxime illuc accedit; ex quo nullo non dormit, sæpe exclamat, inconditis vocibus utitur, multo ac loquela ferociter, potum avidè rapitque bibit, urina supprimitur.

In hoc casu liberalis mitterit sanguis, clyster aut medicamentis refrigerantia usurpantur, eo usque quo phrenitis in indisturnitatem aliquam excurrat, & tunc non erit difficile ægrum in phrenitidē & febre liberare, scilicet opem narcotici quod in morbi principio nec augmento tuto datur, ne secretionis remoretur, aut innrile sit, immo experientia teste noxium, aut in declinatione, ut post duodecim febris diem, immo melius post decimum quartum, maxime vero si antea putari possit æger. Narcoticum autem est, vel laudanum liquidum ad guttas sexdecim, vel syrupus de meconio cum syrupo simonum, aut caryophyllorum, de cætero aqua rosarum fronti cum successu imponitur ex lintheo hac modico.

5. *Phrenitis variolosa* Sydenham Variolæ Reg. anni 1669. pag. 85. & 96. & 361.

A nimia sanguinis ebullitione, tam in discretis quam in confluentibus variolis, phrenitidem supervenire quotidianum est, atque in hoc casu a regimine calido sæpe malum oritur, quo circa clysmatis, immo phlebotomia, stragulum immolatione hinc symptomati occurrendum est; verum prudenter cum phlebotomia agendum est, nec fore usurpari potest post eruptionem, nisi cum phrenitis in discretis variolis ideo accidit, quia facies non turgescit, & pusillis copia facies magna comparantibus; sanguis adeo effusus est; ut indiciis ferre nequeat, donec medicamentis purgatis, & aliis ad id faciendis addebitam temperiem reduci possit; facies autem turgere debet circa octavam ab invasione diem, & deinde manus facies vero undecima die detumesceat, quod si ob regimen calidius variolæ non erumpant, sed phreniticum delirium accedat, in hoc casu Sydenham jubet, ut ne æger a lecto eximatur, & cum non nisi nocte ingredietur ante lapsum sextum diem; si ne syrupus de meconio dosim affusum largam; & si ea post horæ spatium nil egere, iterum novam affinat; & sic deinceps, atque sic fructu morbi impetu, tantum semicuniam quavis vespere pro pueri decenni quotidie repetatur. Sydenh. *differt. epistol.* pag. 393.

6. *Phrenitis morbillifera* Morton de febre scarlatina hist. 1. 5. & 6. Hoffmann. Tomi 2. de Phrenitide.

In rubenia, immo scarlatina (quæ videtur Morton nihil aliud esse quam rubeoque confluenti) delirium, cum febre acuta, corripit ante eruptionem, in quo casu Morton venam secari jubet, epispasticum dein nuchæ applicari, & suo more cardiaca bezoartica, ad expellendum quod finit venenum, consuevit, methodo sane a Sydenhamiana longe discrepante.

7. *Phrenitis verminosa* Sennert. Gallis de Verminosa.

Phrenitidem in febre verminosa apud puellam urbis Cæsar memorat Jan. Bauchinus in obs. Hippiatri contendunt equos in furorem agi a verme intra cerebrum genito, & hunc morbum Verminosa vel Verlequin nominant, teste etiam Forestieri Dictionario. Hanc biliorum confirmat Paracelsus, lib. 2. paramiri 2. dicitque phrenitidem ortam esse a verme utramque meningem perforante.

8. *Phrenitis a plica* Frid. Hoffmanni de febre phrenetica 2. 4. Stabel de plica, hist. 2.

Familiaris est apud Polonos, cum ob isoporphoram capillorum plicatorum refectum, tum ob illius virus retentionem; hæc vero phrenitis erumpente plica cessat.

9. *Phrenitis aphrodisiaca* Dan. VVincleri, in Mangeri Bibliotheca Med. Pr.

Adolescenti amore percitus incidit in sehem cum vehementi delirio; in quo se nunc Cæsarum, nunc Dei Filium esse somniabat; animum instruebat; nunc vincebatur, nunc resistebat; ad se reversus vibices monstrabat, quas a matronibus accepisse se referebat. Balneis poposce, quo concessio ad sanitatem sensim reversus est.

10. *Phrenitis apyreta* Theodor. Collado advers. lib. 1. cap. 20.

Phrenitis est sine pyrexia cum inflammatione cerebri & meningum; Hic auctor sande affirmat se vidisse aliquot ægros omnibus symptomatibus phrenitidis affectos, excepta febre, atque cadaveris unius horni aperta, cerebri & meningum inflammationem compersisse; verum forte typho laboranti illi phrenitici, in quo pulsus sanorum similis est.

11. *Phrenitis calentura* Philosophical. Transact. abridg'd Vol. IV. Oliver. Gallice *Calenture* Encyclopédie lettre C. Pringle Maladie des Armées T. 1. pag. 269.

Ex est: quæ subito in delirium phreniticum ægros inducit; familiaris illis qui longa itinera per regiones calidas instituant, aut qui navigant sub linea æquinoctiali. Furor ille, potissimum nocti; cum naves undique clausæ æstuant, subito exoritur; plures eo correpti in mare se projiciunt cæteris insensis hoc accidit in triethrophia biliosa & canosa.

Nauta triginta annos natus, procerus, macilentus, tam violenta calentura correptus fuit, ut quatuor viri vix eum continere poterant; obtutus ferox & vagus; pulsus ita velox, ut nulla pulsatio distinguere posset; ardor corporis summus; e lecto exilire & divagari volebat; sanguis ex brachio; fronte, jugulo educus fuit, sed parce fluxebat, & post aliquot uncias sistebatur, sanguis autem fuit floridus; præmissis phlebotomis febris deserviebat, furor imminutus, obtutus magis consuetudo similis, pulsus distinctior; sanguinis unclæ quinquaginta alterius educatæ sunt, tunc sanguis liberius effluebat; diacodium præscriptum est; unde placide dormivit, & cum summa lassitudine, ac debilitate convalevit.

Conveniens in hoc casu juxta D. Schæfferi.

phlebotomiæ, 2. post decem horas emeticum, 3. epispasticum nuchæ, 4. iterum phlebotomia, nosse vero paregoricum sedato morbo cathart. alternis diebus ad duas, tresve vice iteranda. Epidemicam calenturamque rabiosi moriebantur narrat *Mexeray Hist. de France*.

12. *Phrenitis Indica* Bontii de Medicina indorum.

Febris est putris continua delirio phrenitico continuo stipata, quam tribuunt odor arborum fantali recessus caesarum, aut ipsi tribuitur tritæophya mimosa; hæc apud Tymorenses familiaris est.

13. *Phrenitis a dolore*.

Non omnes sed atroces dolores phrenitidem inducunt, quales ab otalgia inflammatoria seu auris internæ inflammatione, observante *Hippocrate*. Aurium dolor, ait ille in *Prognosticis*, cum febre continua ac vehementi difficilis est, periculum enim delirii & mortis imminet; natu minores septimo die aut citius ab hoc morbo interimuntur: natu vero majores multo tardius; febris enim ac delirium minus eos infestant.

Talis est etiam dolor a paronychia periostei aut tendinis ortus cum gravi manus & brachii inflammatione & febre acuta, ex quibus delirium ortum memorat *Ill. van. Swieten*. Nunquid etiam videmus ab odontalgia desipere, febrile, immo furere quosdam homines.

14. *Phrenitis a Tarantismo* Baglivii diff. hist. v. 1.

Qui per tres dies saltat cum suspensis tororem incutientibus, frondes arundinis & vitis gestans, is certe nec sine acuta febre est, nec sine delirio, maxime cum invehatur in adstantem rubro colore sibi insensos, aut alia desipientiæ & furoris signa edit. Tales autem sunt multi tarantati, sive a Tarantula demorsis sint, ut vulgo fertur, sive ab alio principio vesania ea pendeat, ut putat *Saras Acad. Neapolitana a Steretis*.

15. *Phrenitis hydrophobica*.

Certe plurimi hydrophobi, licet aquam, aerem, specula horreant, illisque visis contremiscant, convellantur, sunt ita prondentes ut adstantes admoneant, ab illis sibi vincula injici deprecantur, ut vidi, atque sine febre sint. Verum non minus constat observari in *mea de rabie dissertatione* relatis, quosdam vehementi febre per duas aut tres ultimas vitæ dies, ferocique delirio laborasse, adeoque vere phreniæ fuisse. In paroxysmo tritæophyæ aquæ horror quandoque observatur.

16. *Phrenitis inanitorum* De Meyseroy *Mal. des armées* Tom. II. art. 249. A.

Superata amphimerina Hungarica aliiisque aëtis febribus, non raro supervenit phrenitis his quos longa diæta tenuissima, pluresque evacuationes debilitant; pulsus mollis est & debilis, calor nativus non major, lingua nitida, super nullus in ore prævus, nec alvina excreta insolitum odorem spargunt. Cum hæc paraphrosyne phrenitica ab inanitione procedat, abstineendum est a phlebotomia, a cathartico,

immo a clysmatibus: e contra vires reparandæ cremoribus hordei, oryze, ossis sale & nucis myristica conditis, utin insaturæ; immo vinum vel cerevisia moderate sumpta profuunt; Cum confirmata ferme fuerit convalescentia, moderate purgandum erit; sic vires & ratio sensum restituerunt, ut monet *Sydenham*. Hæc species paraphrosyne potius quam phrenitis est. Si plebem audiamus in ipsa phrenitide vera cerebri vacuitas incusanda est, & æger cibandus.

XII. PARAPHRENESES; *Paraphrosyne* Menjotii Dissertat. *Paraphrenitis* Boerhaave aph. 907. *Eidre maligne cerebrale*, De Meyseroy Tom. II. n. 232.

Dissertat a phrenitide ex dolore obscuro lateris, vel sensu cinguli præcordia stringentis, vel oppensione gravi pectoris, sputo sanguinis, quæ omnia latentem pleuritidem, vel peripneumoniam delirio conjunctam designant.

Varia fuit hætenus nominis acceptio apud Neotericos; sunt qui diversum genus esse volunt a phrenitide, si sit delirium, ut ajunt, symptomatium, morbusque primarius sit peripneumonia, hepatitis, immo tantum tritæophya, vel synochus: verum si genesa morborum repectantur a causis vel a principiis abditis, nulla erit nosologæ certitudo, idem enim symptoma quod ille essentialia vocat, alter accidentale reputat pro sua theoria; nec minus est essentialia ex eo quod in decursu morbi tantum accedat, utruptio in morbi exanthematicis; nec discrepare debent genera ex eo quod symptomata sint majora aut minora, ut delirium ferox, aut mitæ, quod discrimen inter phrenitidem & paraphrenesim aliqui instituerunt; convenientius est genera morborum a symptomatibus diversis repetere, modo ea constantia sint.

1. *Paraphrenesis diaphragmatica*. Vide Boerhaave *paraphrenitidem* §. 907. de Haen tom. 2. cap. 7. Muxham de ære l. 2. p. 118.

Ea est quæ a diaphragmatis inflammatione primaria vel a pleura diaphragma succingente inflammata oriri creditur. Qui morbus ex Boerhaave longe frequentior est quam vulgo censetur, licet præcæsis sæpe ignoretur, neglectus, vel alterius morbi titulo tractetur.

Verum non omnis diaphragmatis inflammatio paraphrenitidem ponit, ut cadaverum sectio & diaphragmatis vulnera communistrant; requiritur infarctus inflammatorius aut febrilis: cum cerebri, tum meningum, vel, ut ajunt, translatio materiæ morbificæ ad cerebrum, ut delirium accedat; nec enim sedes animæ, ut crediderat *Plato*, in metaphrenibus seu præcordiis est reponenda, in qua hypothefi ex solius diaphragmatis inflammatione delirium repetebatur.

Cognoscitur hæc species ex febre acutissima, continua, dolore inflammatorio diaphragmatis, intolerabili ob membranas nervosas: qui dolor immoiter augeatur in inspiratione, tussi, repletionem stomachi, nausea, compressa abdominis in alve,

vel



vel urina reddendis; respiratione hinc sublimi, parva, celeri, suffocativa, quiescente abdomine, solo thorace peracta; delirio perpetuo, revulsione hypochondriorum, risu sardonico; convulsione, furore &c. Vide apud *Ill. de Masso* cadaveris aperturam.

*Curatio* itidem & prognosis ex *Borhaave* expectantur.

*a. Paraphrenesis pleuritica.*

Febris maligna cum obscuro dolore lateris & delirio. Hujus morbi etiam epidemici primæ præstant historię. Sic in *Journal de Med. de M. Vandermonde* Mai 1753. pag. 95. hæc lego: Altera species febris putridæ quæ hoc anno viguit insidit apud. Flandros fuit absolute maligna. Adoriebatur cum symptomatibus pleuro-peripneumoniz, & paraphrenitidis; ægri maxime prostrati dorso constanter incumbentes, facie livida vel flava, subtumida; cutis sicca, non ardens; lingua brunnea sordida anusta, facile exsiccata, liceti dentes; conquerebantur de obscuro dolore punctorio lateris dexteri, de magna pectoris & epigastrii oppressione, de singulo dolorifico lumbis stringente; urinæ suppressæ erant vel paucæ, quod symptoma clysmatis, & potibus nitrosis diu resistebat; interea nullus meteorismus, nulla vel pauca expectoratio, nisi sanieatem quædam spuma cocta prænunciarent; lumbrici morui ejiciebantur. Subsulsi tendimus, convulsiones, risus sardonicus, linguitus, stertor supervenientes adolescentem rusticam robustam nono die post erysipelas, in hoc morbo abstulerunt.

Adolescentem sanavit *D. Boucher*, præmissis quatuor phlebotomiis, usu apozematis casti ex cassia, tamarindis, nitro & aliquot tartari sibiati sibiati granis, quo ano & cæto fuit multum evacuatus; successit dein portio absorbens cum confusione hyacinthina & guttis mineralibus anodynis Hoffmanni; dein insusum aquosum kinlinæ, serpentariæ virginianæ, rutæ, scordii, nec non linctus, cui addebatur kermes mineralis & oxymelitis scillitici pauxillum.

Mense Martio 1756. vidi aliquot viros robustissimos qui tertia die hujus morbi perierunt summo furore & convulsionibus exagitati. Morbus incepit a dolore lateris punctorio cum pulsu molli, frequentis; post tres phlebotomias præscribo manne unciæ, tres & tartari sibiati granum unum, quo assumpto secunda morbi die, bilem evomere, & per inferiora uberissimam, celeremque evacuationem experti sunt; nulla in abdomine tensio, respiratio parum coacta; neq. subsequens paroxysmum & dolorem lateris adducit; tertia die post quartam phlebotomiam e. lecto surgunt, vestes indunt, se omnino sanos dicunt, & ut sani respirant, ambulant liberrime, nemo eos pridie ægrotasse dixisset, frequentia pulsus nulla, lingua nitida, nulla tussis; ad parientes admoneo ut ægri rebus illico consulant, Sacerdotem advocent, quippe docet Hippocrates in *Procræsticis*, quod si pleuritide dolens lateris sine ratione sufficienti evanescat, delirium Sauvages *Nosologia Methoica*, Tom. I.

*gravis est, & intra duodecim horas mors assit* pulsus. Illos vero qui sanos se prædicabant mane, ipso vespere tertiæ die delirium phreniticum tam vehemens corripuit, ut vix quatuor bajalis in lecto contineri possent, & intra paucas horas convulsi moriebantur.

Anno 1753. eandem in aliis subjectis observavi paraphrenitidem a priori diversam, quod febris non erat remittens, sed synochus; exordium, ut moris est, a frigore, calore, dolore lateris punctorio. Præmissis phlebotomiis uberitum purgabantur, cum manna, tartaro sibiato, iterabatur dein phlebotomia: tertia die delirium accedebat; æger e lecto surgebat, doloris, tussis, dyspnææ expertus, quippe delirio accedente respiratio rara evadit; pulsus sano magis similis; cruræ extractis paululum coriaceus. Delirium phlebotomia sexta post iteratam catharsim fuit sedatum, & tunc dolor, dyspnæa, immo spatium rubiginosum revertentur, quæ redeunte delirio evanescebant, sudor sextodie exiguus, pulsus intermittens, convulsivus, inæqualis, cathologia, subulsi tendimus, mors.

Quomodo hic morbus a pleuritide maligna cum delirio differere non video. Nuper in hæc paraphrenitide epidemice vigente insituebatur phlebotomia, tam ubi, ut æger ter vel bis animo inquireretur; ægri erant rustici horum aliquot sanitati restituti sunt.

*3. Paraphrenesis hepatica.* Vide Blasi observ. Med. a. pag. 6.

Ea est quæ ab inflammato hepate, potissimum in convexa parte, nascitur, adeit enim in hoc casu morbus ita pleuritide similis, ut hepatitis sæpe sæpius pro pleuritide traditur; tussis sicca, immo quandoque cruenta, dyspnæa, febris acuta, diaphragma vero simul non raro tenditur, incalescit, inflammatur. Si itaque dispositio ad delirium concurrat, ut observatur apud mulieres, apud viros etiam studiis negotiisque multum addictos, virido & poetico ingenio præditos, facile ex his combinatis oritur hæc species, cujus curatio eadem ac diaphragmaticæ.

**XIII. PLEURITIS;** *Passio pleuritica Cælii Anselmi lib. 2. cap. 13. Telsm Sereni Samonici; Pleuritis Gordonii Lil. Med.; Phlegmasia membrana costar succingentis Pr. Alpini Med. Method. Lib. 7. cap. 12. Pleura furens; Helmontii; Pleuritis febris Pr. Hoffmanni; Febris pneumonica ejusdem cap. 6. Morbus costalis Vernæ de Pleuritide; Peripneumonia pleuritica Triller de Pleuritide pag. 12. Pleuritis; point de côté; Mal de poitrine Italorum.* Dicitur pleuritide a pleura latius, quia plures species lateris dolorem inferunt.

Est phlegmasia seu pyrexia acuta, continuæ, sæpius synocha, dolore acuto pectoris, respiratione frequenti, difficili, pulsu duro, & tussi vel tussendi conatu stipata; seu est concursus quatuor symptomatum, pyrexia acuta, dyspnæa, dolor.



doloris sæpius lateralis in pectore & tussis molestæ. Variant autem hæc singula symptomata in diversis morbi speciebus & diversis conjuncte speciei stadiis. Initio frigus; horror, lassitudo, dein calor, tussidendi impotentia, & desiderium, inspiratio brevis, quia dolore impeditur, frequens. In vigore pulsus vehementes, tensus, frequens, sanguis in patella coriacens, tussis quandoque cruenta, sudatio, genarum rubor, calor interior. In declinatione sudor frequens salubris, pulsus mollis, expulso facilis, ubi, tussis rarior, faciliior, dolor lateris minor, respiratio minus impedita. Inter dormiendum nullus per intervalla dolor; tussis nulla, remanente pyrexia & dyspnœa quoad frequentiam.

Differt a peripneumonia per pulsum tensum, durum, absentiam gravitatis in pectore medio, sputum rarius eruentum. A pleurodyne per pyrexiam acutam, inflammatoriam, sanguine coriaceo, quæ deficient in pleurodyne; nec non quod sæpius in pleuritide dolora pressione, contredatione, non mutatur, nec levatur, nec intenditur, quod in pleurodyne sæpius evenit.

Causa est conatus naturæ, plenæ, vel costalis vel pulmonaris, infarctum inflammatorium ope tussis, febris, respirationis frequentis discutere appetentis. Sola pleuræ inflammatio non ponit pleuritidem: vidit *III. Morgagni Epist. XVI. 31.* &c. pleuræ inflammata vestigia in cadaveribus hominum qui nullum dolorem pleuriticum passi fuerant: multæ similes observationes prostant in *Boneti Sepulchre.*

Principium morbosum est inflammatorius pleuræ infarctus, unde metus est ne, ita gangræna sequatur, quapropter natura, aliunde dolore irritata, effragens non raro conatus exeat, qui penes eam sunt, & simul sine quibus infarctus tolli non potest.

Infarctus tollitur 2. spissum in vas minimis impactum resolvendo, quod calor auctus præstat; 3. vasa dilatando, ut pervia sint materię hærenti, quod præstat vis truliva cordis adacta; 4. ut mechanice atteratur eror constrictus ab moram, quod pulsatio vasorum aucta efficere conatur, tussique & dyspnœa concurrant, simulque tussis dirigitur ad sanguinis superflui expéditionem, & frequens respiratio ad sanguinis refrigerium & accelerationem. Principia præputumena sunt sanguis viscosus & servidus, qualis in bajulis, adultis; prava pectoris conformatio, pulmonum tubercula. Principia præcatarrhica, frigas æstuant corpore susceptum a vento frigido, per rimam potissimum fenestras illapso; potius frigidus; ira, vociferatio; vehementes conatus, principia febris synochæ, ut erapula.

Numerus. Pleuritis & peripneumonia simul sæpius sunt decima pars morborum in nosocomiis observandorum; sic in Nemausensi nosocomio per mensem Junium, & Julium anni 1757. ex 367. ægris fuere 53. pleuritici, vel peripneumonici, & æmen illi morbi vere sunt frequentiores quam æstare, Utinam numerus respecti-

vus diversorum morborum a nostratibus inquireretur!

Cadaverum aperturæ a *P. Servio Romano* instituta: in trecentis pleuriticis exhibere pleuræ pulmonaris inflammationis vestigia, seu extrema & superficialia pulmonis vasa inflammata, quod anacatharsis sanguinis, putis, febris acuta, dyspnœa, aliunde suadent.

*III. Zeviani* observat pleuritides humidas, seu in quibus sanguis expulso, residere potissimum in pulmone, adeoque malum esse si tussis, quæ primis diebus erat sicca, evadat deinceps sanguinea; quippe signum est inflammationem, quæ erat tantum in musculis intercostalibus, ad pulmones irrepisse contiguos, quod maxime fit ubi pulmones cum plenra costali sunt connexi. Peripneumonia primaria est ut plurimum lethalis quarta die; aut peripneumonia, quæ a pleuritide seu dolore lateris sine sputo eruento versus tertiam quartamve diem supervenit, multo sæpius sanatur juxta eam observata, quia recens est coram illud sanguinis quod pulmones infarct & sputum sanguinis excitat, adeoque facilius resolvitur, quam quod a longo tempore præparatum illico peripneumoniam facit. Ex 70. pleuriticis 35. cisciter pleuritide semper sicca, id est sine sputo eruento vel subigino, affecti sunt, & omnes illi evaserunt crisi per urinæ vias aut sudores facta; ex illis 70. fere 66. latero dextro dolere; ex illis vero in quibus pleuritis in peripneumoniam mutata fuit & sputum in decursu morbi accessit, dimidia pars oblit; horum vero tot a dextris quo a sinistris dolere.

Si toties inventus est pulmo pleuriticorum sanguine salsus post mortem, non minus verum est dari pleuritides veras multas in quibus pulmones sunt illibati; aut paucæ sunt illorum cadaverum aperturæ, quia pauci ex hac specie moriantur; cum vero in peripneumoniam ablit pleuritis, hoc accidit ex connexione pulmonis cum plenra costali, quæ ex *Diemerbroeckio* in tertia hominum parte familiaris est; falsum est itaque omnes fere pleuritides in pulmone residere, ut *Servius* & post eum non pauci cogitaverunt.

2. Pleuritis vera Boerhaave aphor. 378. Sanguinea Hippocratis; *Pura* Baglivi, Sydenhami pag. 163. *Flammia* Triller pag. 149. *La Pneuza* Italica.

Pleuritis vera, quæ juxta *Zevianum*, musculis intercostales tantum eorumque plenram afficit, raro sputis repurgatur, raro & paucæ sputa cruenta adducit; sicca est tætor humida & diuresi critica sæpius terminatur. Si ægri pereant, sæpe inveniuntur abscessus inter plenram & musculos intercostales, quod bene multis cadaverum aperturis constitit; vera dicitur pura vel putris aut maligna.

3. Pleuritis pura est mere inflammatoria, non a synocha ortum ducens, sed in qua sine signis saburrae dolor lateris initium ducit, similique pulsus est durus, tensus, dolor ad costas veras, non ad spurias, tussis initio sicca, laboriosa,

ægri

æger dicuntur se tussisse non posse, nullæ sunt exacerbationes à frigore orientes, dolor a phelione non remittit, nec crescit, cruor extrahitur corio albo, crasso tequus simul & densus, cum in pleurodyne rheumatica corium est crassum, sed molle & tremulum.

Illa species hieme & vere frequentior est; infantibus minime accidit: senibus & cachecticis raro, aut saltem mitius; adultis, exercitatis, rusticis robustis familiaris, & quo robustiores sunt, eo gravius ægrotant; si ante finem secundæ aut tertie diei succurratur per phlebotomiam & potus diluentes, vix ullus moritur.

In illa specie noxia sunt cathartica & emetica; levis tantum post sedatum morbi impetum conveniunt minorativa; adultis, quarta quaque hora prima die, bis vel ter secunda die, mittendus est sanguis ex brachio quovis; pista-na ex decocto cicchorii & infuso capillorum veneris, solum papaveris rheados, adde succum borraginis si sputa viscida difficulter expectorentur, sperma ceti in oleo amygdalarum solutum, vespere syrupum anodynum parca dosi. Videbis curam ex *Sidenham* pag. 163. adde camphoræ & niri grana pauca; vesicatoria lateri admodum profungetiam ab initio morbi. *Pringle*.

Para frequens est hieme:

6. Pleuritis vera maligna ea est quæ ex improvviso delirio suspensa aut sedata videtur, & tamto promptissimam inferre mortem; ea quidem pestilenter minus letalis est, nec epidemica semper est, aut valde haic, ut erysipelas & verminosa affinis; prima die dolor lateris sinistri vehemens, pulsus durus, frequens, æger lecto jacet, lingua est fœtida, mæco albedo; bis vel ter secatur vena, & subsequenti mane magna cum tartaro stibato assumitur; hinc æger cum impetu ano vel cato multum evacuat, quasi intestina foras proruerent; eadem die ægere lecto surgit, vestes induit, ambulat, sanum se dicit; nulla est pyrexia, nulla tussis, dyspnœa, latet delirium sub perfidissima sanitatis apparentia; de ægro enim conelamatum est tertia die; cum delirio aperto phrenitico, pulsusque febrili exiguo, frequenter, æger e medio tollitur.

7. *Pleuritis pulmonis* *Veriani* de parapleuride; *Pleuris peripneumonia*.

Ea est quæ incipit a symptomatibus pleuritidis & decursu ægritudinis peripneumoniam imitatur, dolore punctorio in gravatum mutato cum majori dyspnœa, opprestione, spæto cruento &c. Castro Sarrafini anno 1763; per sex menses, hieme scilicet & vere, ea pleuritis fuit epidemica, & vix trigemina ex ea evadebat. Incipit ab horrore, lassitudine, cephalalgia vehementi; accedit pyrexia acuta, pulsus durus, serratilis, dolor pectoris vagus vel fixus, sputa sanguinolenta, dyspnœa, faciei rubor, tussis, tertia die dolor lateris vel dorsi gravissimus evadit, quarta æger moritur. Sedor primis diebus, diarrhoea versus quartam superveniens mortem accelerat: sanguis in parcella

coriaceo molto fero flavo innatus; in cada-veribus pleura sphacelata, pulmo ipsi coherens purulenta flava turgidus, suppuratus vel gelatina alba obdurgus vel sphacelatus; in hoc morbo urinae erant rubrae, sputa seroso-sanguinea, respiratio sibilans; tussis initio inanis, calor pectoris magnus, dolor ad costas veras, ad omoplatam, ad scrobiculum cordis, lingua arida cum fordite alba vel lutea.

Indicabantur, post auxilia generalia & vulgaria, cathartica ex manna alternis diebus; promissio levi emetico, iuscula optima: quippe frumenti inopia & pravus visus huic epidemice aniam dederant; dein potus ex olei amygdalarum unc. 4. camphoræ gr. 6. niri gr. 15. coctileum sumendus quarta quaque hora; pro potu infusum chamæmelis, limonata cocta, decoctum kinkins emulsioni mixtum, nec negligenda vesicatoria ipsi lateri dolenti admoventur, quod prospere successit in simili morbo observante *Clariss. Franc. Raymond Massiliensi Medico & Ill. R. H. 1776*.

3. *Pleuritis dorsalis* *Hippocratis* de affectibus *Verna* cap. 8. *Balloni* de pleurit. dorsali.

Dorsum dolere velut ex plaga, non punctum; æger suspirat, exspuit pauca, tertia aut quarta die sanum ingit suberueant, dolor dorsi ad spinam protensus; ægrus respirat erecti quam capite ad antica inflexo; tussis est pyrexia acuta; quinta die, ad summum septimæ, mors.

Sedes inflammationis est in parte mediastini postica.

Species est ita rara ut ex ducentis pleuritibus vix una sit dorsalis. Hujus tres varietates *Verna* post *Hippocratem* vide *Verna* pag. 76 & 77.

4. *Pleuritis Mediastini* *Freind* histor. medicinarum, de Avenzoare; *Verna* cap. 9. Salus corat. morbor. part. 25. *Ac. Acad. Bononiens.* tom. 2. pag. 188.

Dolor in medio sterni percipitur non adeo intensus & acutus, sed veluti gravativus, cartilaginem versus ensiformem declinans: mediastini pars antica inflammatur, pericardio saepe simul affecto. Adest acuta febris, anxietas, sitis, respiratio frequens & celer, ingens in thorace fervor, doloris nihil fere nisi in sterno; ubi molesta potius angustia & interclusio in inspiratione sentitur, tussis nunquam abest pulsus durus est, multo minor spirandi difficultas quam in peripneumonia.

Cum suppurata est illa pleuritis *Columbus Barbette* auctores sunt ut crebretur sternum.

Legatur *Rondeletius* lib. de morbis per symptomata distinguendis cap. 10. *Hildanus* centur. 3. 43.

Hoc morbo in itinere laboravit Avenzoar & ex arteria podicis secta sibi libram sanguinis detraxit; hoc brevi perisse *Trombellus Bononiensis*, repulsum fuerat dudum herpes dolor erat in antico pectore, inde ad col-lum & aurem sinistram extensus, die vena

secta, fomenta adhibita. Trombellus nigra vomuit, febricula tunc est orta, somno ingruente obijt. Cruor niger in mediastino inventus; mediastinum tres digitos crassum, lividum; pulmo sinister cruore distensus.

5. *Pleuritis pericardii* Zacuti Lusitani prax. admir. 138. Verna pag. 77. Freind. hist. med. pag. 108. Le Cat, Mercure de Novembre 1753. Salmuth Centur. 4. observ. 13.

Pleuritis illa, sæpe cum præcedenti combinata, differt ab ea, syncope frequenti, palpitacione, cordis tremore.

Quidam in ætate florentiâcuta febre est prehenus cum siti ingenti, anxietate, respiracione creberrima, thoracis incendio, tussi sicca, syncope, cordis tremore, levi dolore in thorace versus sterum cum angustia summa, pulsus durus, intra triduum obijt; totum pericardium inventum est erosum, nigrum, miliaribus postulis exasperatum, & in alio casu pure surgidum.

#### 6. *Pleuritis traumatica.*

Pleuritis est quæ a gravi costarum, sternive fractura, pectoris, dorive vulnere, contusione, ortum ducit, sæpe cum sputo cruento; si tantum vehementer inflexa fuerit costa, ut a lapsu, tunc dolor atrox, respiratio suffocativa suppressa; si effractæ sint, costæ, tunc peripneumopleuritis est cum gravissimis symptomatibus, ut vidi factam ab equi calce; pleuritis illa est pura, mere inflammatoria, ut plurimum repetitis phlebotomiis, abstinentia tridua, potu diluente, auxilisque chirurgicis tractanda.

7. *Pleuritis biliosa; pleuritis a bile* Tulpii lib. 2. cap. 12. *Pleuris-peripneumonia epidemica* Anomala apud Normannos, Marteau de Grandvilliers observante.

Initium, horror & frigus mane, pyrexia acuta, sitis, calor cutis, anxietas, cephalalgia gravitas, nausea, vomitio biliosa, pulsus latus, durus, subsæpens, febris cretens, facies intensè rubens, respiratio frequens cum suspiriis. Post 12. vel 15. horas dolos pungitivus lateris, nunc fixus, nunc ab uno ad alterum latus, nunc sursum ad clavicularæ extensus aut ambulans. Prima & secunda diesputa cruenta, dein rubiginosa, crocea, vel brunnea & fluidissima. Pulsus quarta die mollis, angustus, frequens, præcepit; sanguis in patella reclusus corio crasso, flavo, molli; urinæ sæpius brunæ cum nubecula in medio, quandoque turbidæ sine sedimento, licet primis diebus sedimentum lare. itum inæquale, fursuracum, undosum deposuissent: gena seu os jugale & lateris doloris rubro-violacei, facies pallido-livida, lingua humida, sed albescens vel flava, alvi fluxus, si aderat, quarta die supprimebatur. Die tertia vel quarta dolor lateris nullus, respiratio magis æqualis, sed difficilior & subillans, tunc gravitas sterni, tussis sedata, ægri moliusse habere putabant, sputa pauciora, spumosa, meteorismus, obtutus vagus; si urinæ forent turbidæ, delirium vagum, magna agitacio, moras alius mens constabat, pulsus mollis undosus, vel parvus, fugax, in-

de stertor & 3. die vel ad summum 7. mors. Sudores critici inter 7. & 9. quibusdam profuere, aliis vomica post 40. diem crepuit.

In cadaveribus lobus pulmonum dolens, durus, gangrenosus, aëro erore turgidus, pleura adhærens, corio albo, crasso, intermedio, pleura costali sana; bronchia huius lobi sanie purulenta plena; lobus oppositus mollis, sed gangrenosus, in pericardio cyathus feri flavi; in cordis auriculis concretum cruoris & concretum lymphæ crassum, in colo grangræna, cætera intestina statu distensa.

*Cura.* A phlebotomia; saltem tres, non flores octo, intra quatuor primas dies, non ultra; post primam, emetici tartari grana duo cum manna & oleo amygdalarum, nunquam vero post tertium diem metu meteorismi; initio siccus emolientes & resolventes lateris tertia die piz, olibanum & cerebinthinæ, & si dolor ambulatorius, vesicatorium applicabatur, præmissa excubacula, quod mature adhibuit succellio.

Accedente oppressione circa quartam diem secabatur jugularis ob delirium; secta sapienter male cessit forte ob meteorismum. Suppressa sputatione vesicatoria tibiis admovit modo ante dies cretosis. Si escharæ pallidæ oculis siccarentur, conclamatum erat. Ad præcavendum phacelum usus sum nitri 24. grani cum camphoræ grani quatuor; sunt sex dolores; sumat sextæ quaque hora anam; alius chamæmelis insusum præscripsi; eventus huius morbi ut plurimum letalis fuit.

Huic afflicto pleuritis vixit Monspelii anno 1753. Phlebotomia vero a novem ad quindecim adhibita; sunt; febris eras remittens sine ordine. Vomitorium secunda vel tertia die præscriptum, dein iterum ad phlebotomias deventum est, ac catharsis alterius diebus iterata.

8. *Pleuritis verminosa* Quercetani Pharmac. cap. 7. River. Cent. 1. Obs. 75. *Asma bilis* Bianchi pag. 232. Schenkii lib. 2. pag. 264; a Gabucino mutuata historia. Verna pag. 3. & 88. De Meyseroy Tom. 2. n. 328.

Frequens est hæc pleuritis apud pueros; dolor est lateris punctorius, sæpe ad costas inferas, cum tussicula sicca, quandoque suffocativa, ut in amphimeria quinta dicta vel *ragueluche*; pulsus est durus, respiratio difficilis, quandoque siagultus; genæ nunc calentes & rubent, nunc frigide & pallent. Hic morbus frequens mihi occurrit, & sanatur, sine phlebotomia saltem repetita, leni emetico, cathartico & vermifugis, non neglectis bechicis; lumbricos 379. in hoc morbo dejectos vidit D. Marteau Journ. de Med. Juill. 1762. Obs. 4.

9. *Pleuritis purida*; vide Vandermonde Septembre 1758. pag. 269. a D. Roullan. *Aglyvisia* Trilleri pag. 245. *Pleuripneumonia* Neotericor. *Pleuritis impura, symptomatica, secundaria* Audouard. De Meyseroy Tom. 2. pagin. 314.

Est ea species Mospioli frequentissima, quæ initium ducit à Symptomatis febris putridæ vel biliosæ, cui deinceps, ut secunda die, calor lateris, tussis, accedit, cum oris sorditie, nausea. Ea est frequentissima in regionibus meridionalibus, ut puta, apud monticolas, rusticos vegetabilibus tantum nutritis; vocatur vulgo pleuritis symptomatica; sed catarrhosa, verminosa; aliisque sunt pariter symptomaticæ; putrida frequens est mense Junio; febris, cui conjuncta est pleuritis, est vel synochus, adeoque continua, non remittens; & hæc est frequens; vel tritoxophya, quæ pleuritis biliosa dicitur Bianchi & aliis.

Sic Brendelinus observavit pleuritides quotidiè exacerbantes: sic *Essais d'Edimbourg* 2. 5. pag. 32. refertur historia pleuritidis biliosæ epidemice, in qua dolor lateris secundo die febris adjuugebat, venæ sectio repetita nocebat, levius emetica mire proderant; aderat initio bilis, vomitio; dolor erat deinceps ad ultimas collatus; stomachi ægrotudo; pulsus nec frequens, nec plenus erat; sanguis emissus fuscus, flavus vel viridis, sine corio illo quod in pura paretella tegit.

Illa species vel synocham sanguineam comitatur, ut a plethora, suppressis catamenis, sine nausea, aut pondere epigastrii cum pyrexia magna, ardenti sanguine crassa alba obducto, & in hoc casu phlebotomia iteratæ profunt; intermixtis levis carthartici ex-manna, cassia. Vel febris princeps est vere putris cum nausea, lingue amarore, sorditie, pulsu submolli, frequenti tamen, sanguineæ nam post alteram phlebotomiam non coriaceo, & in hoc casu parce mitemus sanguis, & methodus *Rauandi*, quam tantopere execratur *Trillonus* in usum venit; scilicet misso semel vel bis cruro, præmisso clysmate, secunda die leve emeticum, guttæ aliquot syrupi Glauberiani cum manna uncis duabus, unde nunc sursum, nunc deorsum sine pectoris læsione æger purgatur, quod in pleuritide pura valde noceret; immo frequentibus diebus, maxime si dolor lateris remittat, eadem medicina iteranda est, & ut in verminosa pleuritide, etiam insalium sennæ est cathartici admiscendum, & alterius diebus iterandum usque ad morbi finem.

Si delirium accedat, datur paraphrenesis pleuritica.

Pleuritidis putridæ varietates sunt, pleuritis biliosa, pleuritis maligna, pleuritis verminosa, & pleuritis petilens.

10. *Pleuritis catarrhalis* Hippocratis; *Peripneumonia epidemica* anni 1565. Dodonæi cbl. 21. *Symptothica* Bianchi hist. hep. pag. 233. lib. 1.

Est ea species quæ a coryza, rauoedine, angina ortum ducit cum dolore catarrhali pectoris, qui dolor pressione mutatur, levis etiam tumore externo stipatur, & non semper pueri est affixus, sed hæc & illuc extenditur. Febris est amphimerina, quovis vespere exacerbans, tussis mollesta, dyspnoea gravis, sæpe spatio cruen-

ta, & pleuropneumonia videtur esse ob additionem symptomatum peripneumoniz hiemalis Boerhaave; Incipit ab horrore & frigore vagis, identidem per primas dies recurrentibus; pulsus non ita durus &ensus ac in vera, & corium, quo sanguis in paretella tegitur, magis gelatinosum; exigit phlebotomias iteratas, potiusque cheiformes calidos, levius diaphoretici; phlebotomia tamen parciore multo fuit quam in vera.

11. *Pleuritis erysipelatosa* Baglii appendic. ad pleuritid. p. 37. *Pleuritis biliosa* Hippocrat. lib. 3. de morbis, Bianchi pag. 236. *Pleuritis cum febre ardenti* Mospioli consil. 24. pag. 39. *Pleuritis cum magno asu & siti* VVolfgangi Cent. 1. fol. 7.

Inter perniciosissimas pleuritides est pleuritis sicca, sive erysipelatodes acutissima, quæ fit a sero acri pulmones preme, lacerante, cum pauculo dolore, & ægrum derепente iugulari; signa sunt ex Hippocrate rubores faciei genarum, tussis inanis, paucus dolor, iactationes, ariditas magna lingue, ardor viscerum, doloris excursio in varia loca; si dolor lateris obscurus sit, æger decumbat in latum, & fortiter tussiat, tunc temporis dolor in latere percipietur.

Distinguitur hæc species a vera & ab hepatica, 1. oris amarore assiduo; 2. nausea frequenti, vel vomitu bilioso & viscido; 3. doloribus ventris ad epigastrium cum diarrhoea quandoque biliosa, aut tenesmo; 4. siti inextinguibili; lingua bile suffusa, tamen non aspera, non sicca, non hincula; 6. febris tritoxophya cum calore acerrimo, cum vigiliis & quandoque delirio; 7. pulsus post cathartism remollescit. Distert ab hepatica, quod dolor sit sub mamma sinistra, quod nullus timor, dolor, durities nulla, aut tensio ad hypochondrium dextrum; putra sunt intense flavescens, licet sanguine mixta, immo amara, urinae crocæ.

Pleuritidem biliosam diversam facit *Cl. Bianchi* ab erysipelatosa pag. 231. eamque typhodem essentialem nuncupat.

12. *Pleuritis hepatica* Bianchi Hist. hep. spec. 6. pag. 234. tom. 2. vel *Hepaticæ pleuritica* ejusdem.

Similis est veræ & biliosæ quoad acutiem febris, dyspnoeam, pulsus duriciem, tussim sæpe croentam, differt dolore ad dexteram thoracis partem profundo, genæ dextræ rubore inextingibili, tinctura subicterica per cutim, oculos, linguam, locum, excreta omnia; sitis, ariditas, amarities oris, bilis in sputo adest cum sanguine; dolor ad costas; spiras descendit, & obtusæ ad dextrum hypochondrium affigitur, ubi ad eadem leviores molestissima sensatio; tensio, tumor, renitentia, durities hepatis circumferens; calor intensus, iactatio assidua, sitis, ardor, ariditas.

Vide aperturam cadaveris in *Panaroli Pentecost. 2. observ. 37.*

13. *Pleuritis erysipelatosa* Bianchi Hist. hep. lib. 1. pag. 234. Sicca Hippocratis 3. de morbis.

Dolore atroci in principio est stipata, sed post plurimum

rimum circa quartum diem crescente febre dolor mitigatur, aut si dolor una aut altera die febrem præcedat, febris accedens morbum solvit. In hac angustissima est resperatio, cum tussis rara & inani, seu sicca, & ob doloris vehementiam difficillima. Hujus crisi est qualis sanguinæ, sed ampliori potu humectante indiget quam aliæ, ait Hippocrates.

10. *Pleuritis periodica* Morton. de intermitten-  
tium diagnosi, p. 39. *Pleuritis febricosa* Tor-  
ti de febris; Morton. Pyret. Hist. 8. p. 141.  
Anonymi de recondita febrium natura, cap. 18.  
p. 101. 1759. Lauret. Hist. Med. Viennæ 1762.

Est species, quæ per paroxysmos a frigore incipientes singulis vel alternis diebus invadit, paroxysmis sudore terminatis recedit, & rursum data hora revertitur, seu quæ pendet a veneno febris testianæ aut tritophyæ.

Centes observavi, ait Morton, pleuritidem acutissimam & vere spasmodicam, cum symptomatibus pathognomonicis intensissimis a veneno febris intermittens ortam fuisse; illa symptomata, statim periodis redeunt, urina redditur late-  
ritia qualis in intermittentibus febribus effluere solet, & hanc febrem, cum vel sponte sua, vel arte coacta larvam deponit, kinkina cito semper & feliciter curare consuevit.

Vidit Anonymus mulierem sanguinis sputo laborantem, cum dolore lateris punctorio, febre acuta, exacerbationibus variis, in summum discrimen adductam, quæ kinkina assumpto brevi convalevit. Vidit idem virum pleuritide acer-  
rima detentum cum copioso sanguinis sputo in paroxysmis periodicis recurrentibus, qui non sensim, sed subito impetu ex improvviso insurgebant, qui simili febrifugo, protinus exhibitio similiter evasit.

Color urinae lateritius in remissione, subitaneus, & periodicus recursum singulis vel alternis diebus, invasio cum frigore, sudor primos paroxysmos terminans sunt signa fere infallibilia veneni febriculi latentis in his morbis, quos *febricosa* cum *Viertelhofi* nomino, nec enim cognomine pleuritidis febrilis quicumque ejus indolem singularem suspicatur.

Eadem est cura, idem decursus rheumatismi, febricose colicæ, vomitus, hysteriæ, syncopes, cardialgiæ, phriciæ, &c. febricosa, seu a veneno febris intermittens aut remittentis productæ, quæ, nisi febrifugo impugnentur, brevi ægros e medio tollunt, ut videre est apud Anonymo cap. 17. Torti & Vierleff passim.

15. *Pleuritis hydrothoracica* Brendal. observ.

Ille Auctor nuperus apud milites in castris degentes durante quadam epidemia, observavit multoties pectoris cavum aqua exundans in cadavere pleuriticorum, qui septima, nona & undecima morbi die perierant; unde summi momenti est hujus speciei signa habere, ut propria methodus, a vulgari certe diversa, obtineatur.

16. *Pleuritis pestilens* Schenckii pag. 731. Rivierii observ. 72. centur. L.

Est morbus epidemicus qui regnavit Forolivi Gallo-Provinciæ mense Februario anno 1755. Aquis mortuis mense Martio anno 1745. & Melgorii anno 1747. Illi D. Hagnon & D. Finae Aquas mortuas se contulerunt hostatui Tribuni Provinciæ septem vel octo pleuritici quovia die subito moriebantur, missus fuit etiam Melgorium, ad debellandam eandem epidemiam; ægri laborabant febre, dyspnœa, dolore lateris, tussis, ægrique turmatim inopinato moriebantur. In cadaveribus Foroliviensium pulmones erant persus punctis nigris, lividicis, milij-granum sequentibus, liquore fœditi sumo pleuris; similis liquor in primis viis cum multis lumbricis. Apud Melgorientes epidemia desinebat cum accelli, nullum ideo cadaver intraspicere valui, sed ex relato superfluum concessa vi a gangrænosa inflammatione in abdomine & pectore multos ablato fœtore. Hieme anni 1764. in oppido S. Jean Diocesis Alesensis plurimos intra triduum abluvit hæc pleuritis, ad ignem sedentes, cum pyrexia vehementi, respiratione orthopnoica in dies crescente, dolore lateris punctorio, facie rubro-livida; frustra erant omnia auxilia; in cadavere reperiebatur pulmo vere gangrænoso, thoraci adhaerens, lividus, dissolutus, scetidus; lumbrici non raro exiebant cadaver ipsa die mortis, Hieme tamen fœtebat admodum. Quinque sanguinis libris intra primam diem emissis quidam rusticus optime se habebat; pyrexia, per paroxysmos atroces reversa, ægros bene consolatores sine delirio auferat. Nitro, camphora plures usi sunt, omnes tamen perierat: tertia die circiter in paroxysmo pyrexia.

17. *Pleuritis latens*. Deple lateris sur la pleuritis Pleurésie latente. Puzos Traité de dépôts latents 2. partie.

Est pleuritis puerperis vel gravidis ante partum propria, quillo sputo sanguinis, doloribus in pectore vel vagis velixis stipata, cum febre remittente, dyspnœa non continua, calore mediocri, sine meteorismo & sine delirio. Nobili mulieri altero a partu die supervenit pyrexia acuta, cum dolore vividissimo ad inferiorem omoplatæ angulum, lochia ubertim fluebant, instituta fuit statim phlebotomia, hujusmodi die iterationem proximi recusavit, sequentibus diebus bis iterata fuit; his sublevata fuit ægra, lochia fluxere, abdomen molle; apocremata ex plantis cicchoracis & sale de duobus alvum laxam servare; aut ob retardatam nimis phlebotomiam octavo die ægra obiit; abscessus in imo lobi dextri pulmonis reperi-  
tus est.

Vide sunt quæ quinque phlebotomiis intra paucos dies repetitis liberata fuit. Vide *Melgorii* observ.

18. *Pleuritis Polonica*. Vide Stabel de *Plid* hist. 8.

Ea est quæ virus trichomatis a plia resecta vel suppressa excitat. Curatur phlebotomiis & decocto lycopodii capiti admo, quo evolu-  
varum

vator plica, fecus abie in phibitum eadem evolutionem plicæ sanabilem.

*Cura Pleuritidis pura*, lætæ a larga, prompta phlebotomia ieratur; sunt qui lanceolam in ipsum latus dolens adigunt, quarta quavis hora aqua destillata papaveris rhæodas ad onicæ quatuor, & bis in die emulso anodyna ex seminibus sili-gidis & cucumeris, ada, semiuncia; semine papaveris alibi, deschi. duab. sacchari, unc. 1. cum aquæ hordei. *§. 2.* Eclegma ex spermate ceti, drach. 1. oleo amygdalarum dulcium, unc. 1. aquæ cinnamonis hordeatæ, semiancia; Inter-rea linimentum sedans ex balsamo tranquillo unc. semiss. vel 1. in quo pro quavis uncia dilue guttas laudani liquidi viginti vel triginta, unge partes dolentes. Si dolor urgeat, panis calidi medullæ aqua vitæ camphorata imbiba-tur, additiciæ guttis laudani 12. applicetur. Vel porri radices tuxæ cum duobus capitibus papaveris bulliant in aqua; dein laði intinctæ lateri dolenti applicentur. Vel demum felis vi-væ extarata dolenti parti applicetur.

Curam absolvant, 1. phlebotomia ieratur; 2. potus copiosus diluens ex radicibus scorzonæ, glycyrrhizæ, floribus papaveris rhæodas, ca-vendo a catharticis & sudorificis; sed cathartica morbo sedato sint ex manna, oleo amygdala-rum, cassia, &c. nisi pleuritis sit putris.

*29. Pleuritis splenica*; De Haen apud van Swie-ten comm. in Aph. Boerhave §. 99. A.

Est splenitis quæ pleuritidis formam refert ipso etiam de Haen ægrum corante. Cadaver ex-hibuit empyema splenis.

*30. Pleuritis miliaris* Camerarii differt. 4735. Allioni de miliari; Roscelli Med. Germanor. p. 123. vide *Miliarem* 3.

Est ea quam erupio miliaris solvit; sætor singularis æscens perspirationis eam distinguit. Primus qui vesicatoria lateri admoveunda in pleuritide suavit. *Docteur Meusspeltensis Turquet de Mayenne*, quæ methodus hodie apud Massilien-ses vulgarissima est; ipsa autem vesicatoria ab Anglis in miliari tum alba rubra passim adhi-bentur, teste *Mead Monit. & Precept. Med.* p. 23.

**XIV. GASTRITIS**, *Inflammatio ventriculi* Ri-verii Pr. Med. Lib. IX. cap. 11. *Dolor ven-triculi* Boneti Sepulchr. Lib. III. sect. 7. *Cardi-algia inflammatoria* Tralles de Opio; *Inflam-mation de l'estomac*.

Est phlegmasia, stipata epigastrici dolore, ar-dore, tensione, siti, vomitione, & pyrexia acutissima: Principium morbosum est ventri-culi toties vel partialis inflammatio.

Causa est conatus nature insarctum inflam-matorium ventriculi interveniente pyrexia, seu impetus sanguinis, & pulsus vasorum adulti, necnon ope vomitionis, nausæ, singultus, re-solvere sitigentis.

Principia procurentia sunt, plethora, obstaculo vasorum ventriculi. Principia procatardi-ca sunt, ictus in epigastrium, vulnera ventri-culo inflicta, venena, medicamina æris inge-

sta, in sanguine genita, & in colatorio huius visceris secreta vel hærentia.

*1. Gastritis legitima* a *Febri stomachica* Frid. Hoffmanni tom. 1. pag. 127.

Est in qua pulsus est plenus, velox, calor intensus, sine lingue sorditie, seu in qua pura est inflammatio, & ut aiebat Galenicus, a san-guine copioso, servido, non bilioso oriunda; ea procedit a metastasi sanguinis copiosi, a ca-temeniorum vel hæmorrhoidalium fluxus emansio-ne, a regimine calidiori; sæpius totum stoma-chum obidet. His signis adde summam anxie-tatem, vigiliam, dyspnoeam, scapularum dōr-um tractionem.

*2. Gastritis traumatica*. De Meyseroy T. II. n. 302.

Ea ea quæ a gravi contusione, aut vulnere epigastrici dependet, a prioris et varietas, quæ pro gradu, intensitate contusionis, pro vulnere extensione, numero, pro sanguinis effusione, va-riat quoad periculum; & ut plurimum cito fe-bilis est, si a vulnere fiat, sitaturque vomiti-onem, & per inferiora rejectione cruoris.

Hinc pertinet videtur *gastritis muscularis*, vel deceptiva, ea scilicet quæ non a ventriculo pro-prie inflammato, sed a muscolis epigastrici ipsius inflammatis dependet, quæ ob loci vicinitatem ead- dem fere sed miora excitat symptomata quæ gastritis legitima, ob calorem, tumorem, pres-sionem ipsi stomacho nocentes. In gastritide mus-culari tumores magis appares & circumscrip-tus, sensibilis major a tactu entis. In legiti-ma tumor, tensio, dolor profundiores sunt. Si pylorus potissimum sit inflammatus, ut de sua siliâ refert *Lindanus*, omnia assumpta vom-itione rejiciuntur, & dolor est in regione pylori. Si cardia potissimum inflammetur, graviore sunt singultus, frequentes cardialgiæ, & syn-copes, dolor in regione cardiæ.

A deglutita acicula gastritidem cum febre ar-dente, & horrendis symptomatibus ottam recen-ter *Lindanus* centur. 1. obs. 54.

*3. Gastritis a venena* Frid. Hoffmanni obs. 1. 3. 4. 6. pag. 123. tom. 2. *Febri maligna species* De Meyseroy Tom. II. n. 225. ab æruginis aut simili veneno assumpto.

Pro dosi & efficacia necnon genere veneni plus vel minus intensa sunt symptomata; diffi-cillima est sæpius huius speciei diagnosi, quia malefici artes suas adhibent, ne origo morbi de-vegatur; ipsi sublimatum corrosivum arsenicum, emetica sibiata larvant & involvant, quando-que opio admiſcent. Sæpius ea venena ipsi ori & oesophago nocent; ab his assumptis dolor ven-triculi, cardialgiæ, nausæ, cholera, similis-que symptomata superveniunt; febris vero ex-pulso dignosci non potest, cum pulsus doloris vehementia, aut cardialgiis & syncope frequen-ter deprimitur, debilitetur.

*4. Gastritis erysipelatosa* Riverii de inflammi-ventriculi.

Si inflammatio est erysipelatosa, symptomata gravissima sunt, & speciem pyrexia est lipp-ria, in qua interiora uruntur, & exteriora vi-gent.



gent, frigentque, sitis est inextinguibilis. Summa est anxietas, jactatio, extremorum refrigeratio, incendium in præcordiis, scorbutici cordis dolor levissimum tactum non tolerans, rejectio omnium assumptorum, exacerbatio doloris ab ingestis paululum lapidis, acerbissime, deliria, convulsiones, pulsus irregularis, frequens, contractus.

5. *Gastritis exanthematica* Frid. Hoffmanni de febre stomachica art. 7.

Est ea quæ ab apthosis ventriculorum intus obducitibus pendet, quæ cognoscitur ex pustulis albis, acriter dolentibus, totum œsophagi orificium infestantibus, si verosimile sit eas ad ventriculorum usque extensas esse, quod ex symptomatibus simultaneis gastritidis, sed maxime apertura cadaverum sero cognoscitur.

Utinam qui has species observant, signa animadvertent & notarent, ut aliquando historia morborum promoveri posset.

Merito accenset Frid. Hoffmannus inter principia hujus morbi variolam, rubellam, purpuram, miliarem, immo scabiem, herpetem repulsas, in quibus materies subtilis, caustica, in ventriculorum defertur; unde post mortem inventur ventriculorum similibus pustulis, punctisve lividis perfusus cum ichore acri, nigro intra ejus cavum.

Non ita rara est ac vulgo creditur gastritis, licet vulgo in scholis nomine proprio delicta sit, & ignota ferme; atque maxime cavendum in ea a cathartici, quæ juxta plurimos vomitu, nausea, cardialgia continuo indicari videntur. Difficillimum est quandoque gastritidem distinguere a certis cholerae, ilei, vomitusque speciebus; ut ab ileo hysterico, seu colica hysterica Sydenhami, necnon a gallrodynia bihoia, quia non ita obvia est febris illa acuta, quæ hujus signum est; propter cardialgiæ, & dolorum pulsus minutus, inæqualis quandoque videtur.

Alias tamen gastritis in longum tempus abit, & chronica fere evadit, ut patet ex *seputheore Boneti*, ventriculi enim ultra, phlegmæ, maculæ febriculam accerunt, quæ atheris indolis morbum constituunt, cum simplici vomitu aliove genere affinem.

6. *Gastritis stomacalis*.

Sub finem mensis Junii 1760. Montpelii vixit hæc species, ejus signa febris amphimerina noctu exacerbans, cum summo capitis dolore; epigastrii totius, infra & circa cartilaginem xiphoidæam, dolor acutus, pressuræ quidem tolerans, alit ab ea crescens; respiratio paululum suspiciosa, minime frequens, siccitatis, nisi sub finem morbis sanguis corio albo tenui tectus; dolor ad collas spuris initio protensus, & secundum spinam dorsii obsecutus; nulla magna saburra vel inflammatio stomachi, scilicet nulla nantes, vel vomitio, nec cardialgia. Nulla fæta inflammatio pulmonis, cum respiratio non esset frequens, nec ulla tussis.

Cathartica tria vel quatuor, interpositis præmissivis totidem phlebotomiis, dolorem epigastrii subleabant licet cum senex; noctu emul-

siones anodynæ juvabant; sic intra septem dies circiter morbus feliciter solvebatur.

Musculus sternocostalis inflammatus in hoc morbo mihi videtur, epigastrum a mediastino etiam dolente distractum, inde etiam dolor juxta spinam dorsii; non est tamen pleuritis mediastini, sed mediastinum ex consensu musculi triangularis sterni distractum.

7. *Gastritis herniosa*. Mem. de l'Acad. R. de Chir. T.I. p. 703. Pendet a gastrocele, seu prolapsu ventriculi inter musculos rectos; cognoscitur ex signis generis, & ex livi tumore circumscripto; curatur repositione, quam juvant phlebotomia larga; inflexio trunci, ita ut musculi recti laxentur; operatione manus, immo, si opus sit, ledione curis; dein splenis & viuentis stomachus in sede sua retinetur; narcoticis, phlebotomiis, dieta tenuissima solidum curæ abolitur.

XV. ENTERITIS; *Chordapsus* Galeni 6. de loc. affect. cap. 2. *Inflammatio intestinum* Scenerti Lib. 3. Part. 2. Sect. 1. c. 3. *Febris intestinum inflammatoria* Frid. Tom. II. pag. 171. *Febris iliaca inflammatoria* ejusdem pag. 174. *Meteorismus* Patholod. Method. 2. species, *Euterophlegia*, De Meyserey, *Inflammatoria des boyaux, du mesentre, &c.*

Est phlegmasia acuta, cujus præcipua symptomata sunt tensio summe dolorifica & tumida eorum partium abdominis, quibus intestina respondent, cum pyrexia, meteorismo, quibus dysenteria, vel similia symptomata adiunguntur.

Ex tensione phlegmonodea, tædum non tolerante, summe dolorifica, cum pyrexia acuta, distinguatur ab ileo, dysenteria, colica, quarum species etiam plures inflammatoriæ sunt, sed in quibus symptomata generi propria prædominantur.

1. *Enteritis iliaca*, *Febris iliaca* Frid. Hoffmanni. Veteres duo tantum intestina admittebant, tenue seu ileum, & crassum seu colon; hinc enteritis iliaca est ea quæ potissimum intestina tenuia afficit; cognoscitur ex situ circa umbilicum, dolore atrociori, distensione epigastrii & umbilici, dyspnoea, nausea, & vomitione assiduis ac vehementibus, ita ut potus contineri nequeat, dein vomitus stercorosus sequatur, & fere semper mors.

De hac specie ab ista orta, Vide Frid. Hoffmanni observ. 3. *Benedicti Sylvatici* centur. 2. observ. 86.

De hac specie spontanea, Vide Frid. Hoffmanni observ. 6. *Faigus* extremorum huic anam præbet. Principia sunt cathartica acra, venena assumpta, plethora, quæcumque ileum excitant.

2. *Enteritis colica*, *Chordapsus* Galeni.

Dignoscitur ex eo quod non umbilicum, sed partes abdominis laterales, afficiat, ubi colon & cæcum jacent. Lumborum adest gravitas, dolor, tensio, cum febre acuta, rarius vomitio accidit. Dicitur proprie *chordapsus*, cum ab intestini parte inflammata adest tumor chordam tensam referens, aut in glomum convolutus.



3. *Enteritis flatulenta, Meteorismus vulgo.*

Est tensio dolorifica totius abdominis cum tumore subelastico tactum non tolerante; sed illud symptoma est accidens pluribus morbis inflammatoriis commune, quoties sabura acris, putrescens in febris, & phlegmasis acutis excitat status, quibus intestina omnia præsertim tenuia distenduntur. Hoc symptoma febribus putridis & malignis valde familiare. Vide *Ballonii obs. lib. 2. Epidem. & Sepulchret. Boneti de illis, obs. 19.*

In nosocomio Montpelienſi vir quidam per septimanam omnia vomitu rejecerat, cum enteritidis signis; secto cadavere inventum est cæcum & sede sua ita distotum, ut ventriculo incumbere, & firmiter adhæreret, colo & recto multum angustatis, cæteris dissentis, inflammatis.

*Curatio.* Potus sit ex aqua pulli, in qua semina frigida majora, immo caput papaveris albi incoquantur, clysmata ex oleo & decoctis malvæ, violarum, seminum lini, fomenta levissima ex simili decocto abdomini ope liniei duplicati apponantur, oleum recentissimum ex amygdalis dulcibus ingeratur; cremores bordei, oryzæ pro cibo sumantur; narcotici dolores compellantur; & quod palmarium est, phlebotomia, quantum fieri potest, & brachio, dein & pede repetantur, si vires suavitatem demum dilutum cassiæ facili & sine strage transcurant spes sit, ejus ope sabura acris, quæ malum fovet, eliminetur; sed si maturius exhibeas catharticum, utcumque lenissimum, grave periculum imminet: ita si meteorismus febribus putridis aut malignis supervenerit, id non raso & neglectis antea cathartici ortum esse censendum sæpe est.

Laudantur in hoc morbo fomenta ex liniei liquore saturati madidis, ex omento animalis; ut vervicis, calido; clysmata ex lacte, oleo; perisana nitrata: si dolor subito & sine ratione cassaverit, licet pulsus bene se habere videatur, sphacelus intestinorum, & mors in prociſa fuit. In Enteride velleatoria abdomini applicanda suadet *ill. Pringle*, quod pessime succellit aliis.

4. *Enteritis mesenterica, Phlegmons mesenterii*

*Prosper. Alpini Medici methodic. lib. 7. cap. 18. Mesenterii inflammatio Sennert. lib. cap. 4. part. 3.*

Difficillime distinguitur ab enteritide, quacum etiam sæpe complicatur; dolor & tumor ad umbilicalem regionem circiter adest profundus, alvi excrementa ægrè aut minime ejiciuntur; a clysmatibus post primas species oibit excernitur; febris est quandoque mitis, nunc hemitrica, nunc vehemens; urina rubra est; oris amaritudo, inappetentia, sitis, vigilia accedunt; alvus deinde excrevit saniem rubram, immo si fides quibundam, ut *Alpino*, materies chylosa.

Si non resolvatur inflammatio, & æger supervenit, accedit suppuratio, mesenterii, tabes, ascites purulenta, aliæque lethifera mala.

*Enteritis enterocolica. De Meyserer lib. 2.*

n. 368. A. ent. v. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

cap. 1. 2.

Ea est quam producit hernia intestinalis, ventralis, inguinalis, aut alia quæcumque. Curatur ut enterocæle.

XVI. EPIPLOITIS; *Inflammation de l'Epiploon.*

Cognoscitur ex febre inflammatoria cum dolore acuto, lancinante, per superiorem & mediam abdominis regionem, infra tegumenta in epiplois cavo, percepto.

1. *Epiploitis vera* Freder. Roebman diff. de omento.

Fœmina febrifugis & pilulis acerbis usa perſentit dolorem acutum, lancinantem in abdomine, & durum in regione umbilici; ea versus hypochondrium dextrum pugni magnitudine eminentem tumorem percepit, qui in dies auctus totum abdominis ambitum occupavit. Chirurgus cataplasmata emollientia admovit, unde intritidum dolor & tumor imminuebantur; abdomen tamen inflatum & fluctuatio inibi ut in ascite aderat, quocirca ope acus triquetra utrumque abdominis latus perforavit, tuncque cum putrida, ichorosa materies efflueret, continuo patentiore aperturem inſtituit, inſuſcepit, & separati omenti frusta cum fœtore ingenti, & magna ichorosiæ aque quantitate, omnia libras duas pondere æquantia, per aliquot dies effluere. Sed ars victa malo fuit, & ægra obiit.

Similem omenti inflammatio & corrupti ex quo magna foetidi & aquali puris quantitas effluxit; similiterque lethalis historiam refert *Storchius A. Natur. Curios. vol. V. obs. 146.* Historia cum apertura cadavere videatur in anno mediæ ætatis, cadavere 12. pag. 132. Laborabat quotidiana, tumore, gravatæque dolore epigastrii, omentum inventum fuit quinque pollices crassum, sphacelosumque. Consulatur de his *Villigius Pathol. cærob. cap. 9. Sennert. Prax. lib. 3. part. 3. cap. 8.*

Cura exigit initio phlebotomias, antiphlogistica; extus vero deſticientia, emollientia: formato accessu incisionem, mundificantia, balsamica, &c.

XVII. METRITIS, *Inflammation uteri* Sennert. de morbis mulierum; *Myteritis* Pathologie methodicæ. *Inflammation de la matrice; Mauriceau lib. 3. chap. 11. Dicitur Metritis a metra, utero.*

Est phlegmasia cuius præcipuum symptoma est tumor regionis uteri cum ardore, dolore, gravitate, & pyrexia acuta.

Immisso in vaginam digito, os uteri tactum non tolerat, rubet, retradum est; pyrexia est continua, synochus ardens, quandoque amphimerina, hysteria, cum horrore perpetuo, frigore extremorum, delirio, inſtatione; caput, potissimum vero sineiput, dolet, necnon oculi; convulsiones colli, manuum ac pedum accedunt.

Dolor ad inguina, femora, diaphragma, clavicalas extenditur cum dyspnœa, pleuritideque sym-

ptomatis; accedit nausea, vomitio, singultus, constipatio alvi, ischuria. Pulsus initio magnus, celer, deinde debilis, frequens; animi deliquium, extremorum refrigeratio, sopor aliaque gravissima symptomata adiunguntur.

1. *Metritis puerperarum* Mauriceau lib. 3. chap. 11. Puzos pag. 252.

Cognoscitur ex magna gravitate pelvis, accedente tensione uteri, ejusque intumescencia, quæ gravitatem quandoque emulatur. Adest mingeudi, & alvi deponendæ difficultas, febris simul magna, difficultas respirandi, superveit dein singultus, vomitio, convulsio, delirium, & mors nisi prævertatur remediis.

Sæpius præcedunt lochiorum suppressio, rudis contractio in difficili partu, iclus, compressio, laceratio a digitis, instrumentis, grunorum retentio, prolapsus per vim repositus.

Hic morbus plurimas puerperas medio tollit.

Febris in hac specie est synochis affinis; si ab hysterice inversa procedat metritis post partum, quam cito restituenda est pars in prius locum.

2. *Metritis typhodes; Fitore maligne avec inflammation de l'utérus.*

Ea procedit uterumque a causis internis, ut saburra putri, acrim, metallasi materiz erysipelatis.

Cognoscitur ex febris amphimerina, lipyria, seu interne cum lassatione, anxietate, delirio, sopore, lingua nigra, siccæ, simulque extremorum refrigeratione, pulsa frequenti, inæquali.

*História.* Mulier triginta annos nata tam acriter dolebat vulva, vagina, & potissimum utero, ut nocte, dieque ejularet. Aderat pyrexia mediocris, & identidem leucorrhæa albescens, purioris, & menorrhagia cuore pelliculo vel diluto stipata; hysteralgiam ulcerosam suspicabatur Medicus; interea uterus, a viris obstetriciz artis peritis exploratus, scirrhi, ulcerisque erat expertus, & tantum inflammatus,ensus, dolens; repetitis itaque phlebotomiis; balneis, fomentis emollientibus, juleculis refrigerantibus, noctu jupapiis narcoticis, horrendi illi dolores post duos tantum menses sanati sunt. Puzos pag. 257. Ex hac historia sequitur metritidem sub forma hysteralgiz ulcerosæ quandoque latere, atque in his morbis præmittendam semper esse uteri explorationem.

3. *Metritis lactea; Dépôt lacteux avec fièvre aiguë.* Puzos Traité des accouchem. pag. 367 1. Mem.

Est morbus acutus febrilis, meteorismo, uteri tensione, dolore, lochiorum fluxu; siccis, cephalalgia, delirio stipata cum torminibus uterinis.

Hæc febris ephemera lactea stipatur vesiculis accedens; ephemeræ lactea stipatur epididymis, mammarum tensione, abdominis molliore; metritis vero lactea, lingue siccitate, sitim, cephalalgiam & delirium accersit, vel insomnium seu dormientis delirium; uterus leviter manu pressus dolet, licet ubertas lochiorum adsit, simulque abdomen tensum est.

Hic morbus periculosissimus est, brevi plures puerperas aufert; & medendi methodus ægre ab adstantibus admittitur; hæc metritis quandoque partum antecedit; quandoque subsequitur.

Methodus medendi exigite magnas evacuationes per phlebotomiam; chathartism & diuresim, cum regimine victus tenuissimo.

Frustra mulierculæ instant adesse tantum epimeram lacteam, hysteralgiam puerperit; delirium a cerebri vacuacione, aut debilitate pendere, lochia rectè fluere, necesse turbandam naturam: morbus est phlogosis uteri, & uti peripneumonia non solvitur per spurum cruentum, ita nec metritis per lochia: lochiorum quantitas vulgaris ad quinque vel sex uncias in die ascendit; in metritide vero & enteritide lacteis multo plures unciz sanguinis mittendæ sunt, ut mors evitatur, & lactis in abdomen extravasatio, aut apostema lacteam prævertatur.

*Cura.* Si febris mediocris sit, lochia, sudores, lac mammarum rite fluant, nulla sit meteorismus, nulla cephalalgia, maxime si alvus fluat, & biliosa deiciat, sufficit evacuationes illas sustinere copioso potu pitisanæ lenientis, olei amygdalarum, clysmatis; & lochia juvare insulo thææ, croci & similium; verum si gravia sint symptomata, mulier vegeta, plethorica, tunc repetitæ & mature inflictoz phlebotomiz, ebrachio, dein epede, necessaria sunt ad lactis statum, & ejus in abdomine effusionem prævertendam, unde mors certa adveniret; qua de re consulendus Puzos, ad quem referenda prima morborum lacteorum historia generi humano perutilis.

De his vide *antegridum lactium, synocham lacteam, &c. hyperalgiam, &c.* Sectis cadaveribus inveniuntur materies lactæ, vel fluxilis, vel grumosa ad libram quandoque in abdomine effusa; & hic morbus maximam puerperarum partem e medio tollit.

XVIII. CYSTITIS; *Vesica inflammata* Sennert lib. 3. pag. 8. s. 1. c. 4. *Cyphoplegia* de Meyerey Malad. des arm. *Inflammation de la Vessie.*

Est phlegmasia, cujus præcipua symptomata sunt intumescencia ovalis in pelvi cum tensione, dolore tamen non tolerante, dysuria, vel ischuria & pyrexia continua; accedunt vigiliz, sitis, delirium, extremorum frigus, tumores durities incrementum a urina per moram congesta, tenosus.

1. *Cystitis spontanea.*

Est ea quæ a causis pendet; ut a plethorâ commota, urina acrimonia concurrente; cognoscitur ex eo quod non detur in externis sufficiens huius ratio.

Curatur phlebotomiis iteratis et brachio, fomentis emollientibus ex herbis malvæ, violæ, feminibus lini, radice althææ, clysmatis similibus; potu refrigerante nitrolo, emulsionato, anodynis.

2. *Cystitis a cantharidibus.*

Si ad libidinem excitandam, aut per infortunium,

nium, pulvis cantharidum assumptus sit ea doli ut cystitis superveniat, adeit gravis dysuria, hæmaturia, apriusimus; accedunt convulsiones.

Præter remedia cysticidii spontaneæ; camphora intus sumpta, quæ veneni huius acrimoniam infringit, emulsiones, semicupia, fomenta conducunt.

### 3. Cystitis Traumatica.

Ea est quæ a principiis mechanici excitatur, ut ictu, contusione, vulnere, compressione, equitatione, immo calculi vesicæ commotione, quæ more aliarum inflammationum, & specierum superiorum curanda est.

## ORDO TERTIUS.

### PHLEGMASIÆ PARENCHYMATOSÆ.

SUNT illi morbi inflammatorii qui sedem habent in visceribus sordis non sacciformibus, quæ Græcis *parenchymata* dicebantur, teste Galeno, *Lib. 2. de simplici medic. Parenchyma* enim est caro viscerum sordis, ut hepatis, renum, splenis, pulmonis; cætera vero viscera sunt mere membranacea, ut stomachus, intestina, vesica, &c.

Cognoscuntur hæ phlegmasiæ cognita sede, figura, usus visceris, sed & etiam quod dolor non sit acutus, nisi tamen extrema horum membrana magis afficiatur, ut in hepaticide, pleuriticide, &c. sed dolor est gravativus, obtusus cum exteris phlegmasiarum signis, ut pyrexia acuta, calore, aliusque; adeo quod parenchymatosa phlegmasiæ magis ad phlegmonem accedant, & ad suppuratum vergant; membranosa magis erysipelati sunt affines, & rarius suppurantur. Faciendum tamen utriusque ordinis limites non satis esse distinctos, nec dari signa specialia phlegmasiæ quorundam viscerum, ut thymi, medullæ spinalis, pancreatis, &c.

XIX. CEPHALITIS; *Sphaelisimus cerebri* Hippocratis ex Bartolinis; Etemullero, Vide Amati Lusitani Cur. 9. ubi de nomine illo differtur; *Siriasis* Hippocratis; an *Sphaerus* aut *Sphalerus* Galeni; Cabelli Lexicon; *Sideratio* Latinis; *Camacephalus* Alex. Aphrodisiæ de Morb. III. *Apoplexia* Brasavoli; *Tlens cerebri* de Passens Amati Lusitani; *Encéphaloneser* J. C. Rhumel; *Cerebri abscessus* & *sphaelisus* River. Pr. Lib. I. cap. 21. *Apoplexia Purulenta* Morgagni V. 2. 4. 7. *Inflammation du cerveau*; *Tumeur maligne cerebrale* de Mezyrey Tom. 2. n. 231.

Est phlegmasia in qua cum pyrexia acuta datur delirium somnoletum, vel mentis stupor & sopor cum erodidismo seu carphologia. Crocidismus est motus manuum, qualis est festucas et vestibus avellendas, aut muscas venandas adhiberi solet. Creditur excitari illum morbum ab inflammatione cerebri vel cerebelli, & respice hanc theoriam plures confirmant cadaverum sectiones.

Distinguitur a *Lethargo* peracutem, quæ sit ut fere intra triduum pereant ægri, ad summum decimo quarto die terminetur, & pyrexia sit acuta. Ab *apoplexia* per pyrexiam & vanum errorem manuum seu carphologiam, ut illi vocant, a *phrenitide* per somnoletiam.

1. *Cephalitis Egyptiaca*; *Dem el mula* Prosp. Alpini de med. *Egyptiorum*; *Phlegmona cerebri* quam *Egyptii dem el mula* vocant, Prosper Alpini de Medic. method. lib. 7. cap. 6. a *dem* sanguis & *mula* aqua.

Phrenitidis similis est morbus, qui singulis fere annis *Egypti* populos, campis ventis spirantibus, in prima æstate divergat, aliquando non minorem stragem faciens quam si magna pestilentia esset; hoc enim affectu, quem *dem el mula* *Egyptii* appellant, innumeri repente eodem tempore moriuntur; nosque ipsum in magna civitate *Cayri* epidemice grassantem anno 1583. mense Mayo observavimus: innumeri enim tunc temporis per universam civitatem quasi repentina morte moriebatur. In his præcedit capitis dolor cum vigilia per aliquot dies, ante non admodum gravis, & postea in altero oculorum angulo interno, oculis quidem tumor rubens, efflorescens, apparet, quasi exinde erysipelas sit futurum, qui tumor paulo post spatio scilicet duorum aut trium horarum ad plus, in retro recurrit, atque evanescit; a quo fere continue homines obmutescunt atque manibus delirio facientes apoplechicorum more extinguuntur.

Venti campini sunt calidissimi, regimen *Egyptiorum* putredinem simul sæpius accersit, inde morbus.

Curatio consistit in repetitis phlebotomiis cum dolor capitis idoritur; prima vel secunda die, sanguinis saltem libram qualibet vice extrahunt præmisso clymate laxatorio, in Eunuchis scarificatur crura, admoventur tucurbitales hamidæ; iterantur etiam phlebotomizæ, & his præmissis balneum vaporarium ingressi ægri sudant & calida lavantur; aliqui post sanguinis evacuationem in balneo assumunt decoctum liquiritiæ & modici seminis feniculi, quo vomere plurimum coguntur; quo facto per horam sudant; ea præsidia statim adhibita plures a morte præservant: P. Alpini.

Legi meretur cephalitis, quam expertus est D. le Blanc ab intenso formam calore, quæque otorrhœa purulenta terminata fuit post tres menses; relatio ab ipso ægro tradita est *Journ. de Med. Sep. 1762.* aderat cephalalgia atrox, mox convulsiones, carphologia, conatus ad laceraanda, rumpenda obvia, intumescencia capitis, agrypnia.

2. *Cephalitis traumatica*; vide River. pag. 29. cap. 12. *Abscessus cerebri* Schenckii; vide *fracturam cranii* apud Heister in Chirurgia.

Est ea quæ a carni fractura, intropressione, vel commotione cerebri dependet; nade sit status sanguinis in cerebri substantia, proladeque cerebri inflammatio.

Memini me interfuisse aperturæ cadaveris hominis

minis qui septimo die morbi periret; is in occipite occiderat & inde factus soporofus, per totum hoc tempus febre & obscuro delirio detentus fuerat, continuo scilicet labiis quiddam obmurmurans, & manibus floccos stragolorum avellens; detracto cranio inveni in cerebelli ipsius substantia nleus digiti diametro, & fere pollicis longitudine, pure refoctum; hoc observavi eum *D. Seraphin* patre in Nosocomio Sancti Eloi. Signa inflammationis cerebri a contusione refert *Rivierus*. Initio capitis torpor, mollitia, dein febricula, dolor, somnolentia, mox febris intensior, æger & profundo somno emergens vociferatur, surgit a lecto, manum ad caput frequenter adducit, &c.

3. *Cephalitis spontanea* & *Phrenitis* *Hæctica* Hippocrat. 1. *Prorethet.* text. 33. *Morbis solis* *Plauti* *Trinum.* *Cerebri abscessus* & *Sphecelus* *Riverii* *prax.* pag. 28.

Invadente affectu ingens capitis dolor ægrum adortur, qui per occiput collo & universæ spinæ communicatur, cui succedit sensuum omnium abolitio, sicut in apoplexia contingit, a qua tamen discrepat in eo quod variis motibus & inordinatis sese ægri exagitant, ut vix in uno loco contineri valeant; manibus interdum partes superiores invadunt, easque divellere ac laniare conantur; ad precedente morbo corpus languescit, & ad motum impetrens efficitur. Febris acutissima & intensissima hunc perpetuo comitatur affectum, & ad ingenti cerebri inflammatione procedit, denique ægri vix quidquam deglutunt.

Quibus cerebrum spaciolum est, hi in tribus diebus pereunt; si vero hos evaserit, sani sunt. *Hippoc.* *Aphor.* 51. *sect.* 7.

Phrenitidem hæcticam vocat *Hippocrates* eam in qua delirium mite est & obscurum; ægri non loquuntur, quieti manent, & dormire videntur, qui morbus vera cephalitis est.

Magna puris copia per os, nares, & aures rejecta liberari hos ægros observatum est memorante *Schenbio*. Vide *Dodenai observat. med.* cap. 1. & 2. *Beneti Sepulchret.* pag. 196. *obs.* 12. & alibi horum morborum historias relatas.

4. *Cephalitis Striata*, *Ardeur capitis* *Plinii* lib. 2. cap. 3. *Siriasti* *Actii* *Tetrab.* 1. *ferm.* 4. cap. 13. *Causa* *Alexandri*.

Morbis est infantibus proprius qui cognoscitur ex incipiens calore, ejusque & oculorum depressione, seu fovea, rubedine faciei, febre ardenti & pallore, corporis siccitate, prostrato appetitu, & vigilis; produci censetur a cerebri ejusque meningum inflammatione, & juxta plures Auctores veluti phrenitis comatosa adeoque cephalitis. Qui eum observant accuratius describant.

5. *Cephalitis Littriana*.

Inflammationem glandulæ pinealis observavit *M. Littré*, & morbum ab ea pendentem descripturum se promissit *Mém. de l'Acad. des Sc.*; sed ea descriptio adhue non desideratur. In ea glandula sæpius inventæ sunt concretio-

nes calculosæ absque ullo functionum animæ detrimento.

6. *Cephalitis epidemica* anno 1510. vulgo *Cogueluche*, *Mezeray*, *hist. de France* sous *Lois XII.* *Typhus Carcerum* *Pringle* T. 2. Cap. 6. §. 4.

Erat febris continua ardens, anorexia cum horrore carnis, delirium, gastrodynia, nephralgia, dolor iururum & cephalalgia gravatissima (nostris vero temporibus nomine *cogueluche* catarrhum designant). Similem morbum refert *Rivierus* *centur.* 2. *obs.* 63. & 73. febris malignæ nomine, cui circa undecimum, alias vero septimum morbi diem, supervenere delirium, subsultus tendinum, icopisychia, lentiores nigri circa dentes, lingua scabra, nigra, exusta.

His præter remedia generalia profere quinquæ vesicatoria, brachiis, suris, vel cervici applicata, deinde Julapium ex aqua cardui benedicti, unc. iij. aqua theriacali, drach. iij. bezoartico minerali, ferupul. ij. & camphoræ, gr. vi: quod Julapium mane fero per biduum repetebatur; atque cuilibet jusculo bezoartici mineralis scrupulus unus adhibebatur; præmissa vero fuit sectio venæ frontis.

Singularem hujus morbi epidemiam narrat *Petrus Borellus Castrensis* *obs.* 55. pag. 60. Alii ægri putabant se ora tria habere, alii veropedes, manusve amississe, plurimi sagarum choreas & conventus dæmonum sibi videre videbantur, quia hoc sæculo ea vivebat opinio, hodie vix plebis fidem extorquens.

7. *Cephalitis verminosa*, *Febris pestilens* que *Gallicis Transfigalans*, *Forelli* *obs.* 7. lib. 6. pag. 156.

Ea fuit epidemica apud Gallos anno 1545. & fortiores juvenes & medio æstatis, unde nomen.

Febris erat amphimerina, vespere quovis exacerbans, aut continua erat vigilia, quæ ægrum ad phrenitidem deducebat, aut continuus sopor qui in lethargum transibat; dolor plerumque capitis adest in principio & renum calor cum lassitudine. Maxima est vermium copia qui vivi per os evomuntur non sine magno cruciatu, ita ut fere stragulari ægri videantur; perisique exanthemata erumpunt, quæ in declinatione apparentia salutaria sunt.

Cura. Nihil præstantius est quam phlebotomia larga repetita; scilicet sanguinis quoddecim uncie in viris, libra una in mulieribus extrahatur; cucurbitulis etiam scarificatis libra sanguinis extrahatur enatis, scapulis; dein cum minorativis purgatur æger, tum apozemata refrigerantia, potus vermifugi adhibebantur. Morbus hic quarto die ut plurimum, rarius undecimo terminatur.

8. *Cephalitis cerebelli*. Vide *Pringle* T. 2. p. 72.

*D. Privat* Doct. Monspel. Aleæ medicinam cum hude faciens sequentia in milite observavit. Morbus a gravi cephalalgia inceperat, inde in soporem comotum altissimum æger incidit, in quo supinus jaces, oculis aperti & erectis, cum pulsu æquali, valido, sano simili ut & respiratione, atque continua carphologia, demum

demum post quinque dies ab initio soporis ob-  
bit. Secto cranio nihil aliud inventum est præ-  
ter abicessum avellanæ magnitudinis in cere-  
bello: hæc anno 1757.

**XX. CYNANCHE;** *Squinancia* Gordon.  
Lil. *Prænalla* Paracelsi; *Angina inflammato-  
ria*, Boerhaave Aphor. *Elquinancia*, *Trans-  
fegalaria*, *Etranguillon*, in *equis les Auvers*,  
Soleysel.

Phlegmasia acuta, cujus præcipuum sympto-  
ma est sensus obicis in faucibus præfocantis,  
aut dyspnœam atque dysphagiam producentis,  
cum pyrexia acuta, faucium rubore, calore,  
dolor, tumore &c.

Licet in Scholis laryngis aut pharyngis in-  
flammatio tantum insensetur, docet observatio  
fere semper in cynanche inflammari, tonsillas,  
aliquando simul uvulam, velumque palatinum.

Differt cynanche ab angina, ut phrenitis a  
mania, nephritis a nephralgia, quod cynanche  
sit cum febre, angina vero hujus experta sit.

1. *Cynanche tonsillaris*, *Cynanche* Græco-  
rum: *Angina 5. specios* Boerhaave n. 805. *Es-  
quinancia ordinaria*.

Ea est species in qua utraque vel alterutra  
tonsilla tumet, rubet, dolet cum vicinis infar-  
ctu, uvulæ elongatione, tumore, veli palati-  
ni etiam inflammatione, quæ omnia, depressa  
ope cochlearis lingua, facile in conspectum  
veniunt. Hujus autem varietates sunt cynan-  
che catarrhalis, cynanche sanguinea vel pura  
vel cynanche lyncobialis, sive cum sebre put-  
tri conjuncta.

Respiratio est incommoda, difficilis, per na-  
res nulla vel parva, per fauces angusta, nisi  
pluries æger hunc morbum passus sit; nam  
observant prima vice cynanchem esse gravio-  
rem quam sequentibus, maxime si prima vice  
resecta fuerit, vel suppurata alterutra tonsil-  
la; cibi deglutendi per os redeunt, excreta  
frequens est & mucosa, viscida, dolor in  
aurem per tubam Eustachianam protensus, cre-  
pitatio in aure inter deglutendum, surditas  
etiam accedit.

*Catarrhalis* originem ducit a frigore suscepto,  
calente corpore, & additur cum coryza, ter-  
nutatione, tussi, dein, ut vulgo ajunt, descen-  
dit fluxio ad pectus, & remittente cynanche ac-  
cedit rheuma seu tussis acrior, dyspnœa major,  
expectoratio viscosa; febris vero non ita acuta  
est, minusque gravis sunt symptomata. Vide  
*Anginam* Claudii Consil. 115. pag. 275.

*Sanguinea* vel plethorica a meritali sanguinis  
copiosioris in tonsillis excitatur, a clamore,  
equitatione, vento adverso facta; labore vali-  
do, vento per fenestras rimas illapso, inter  
ver & æstatem potissimum; cognoscitur ex  
temperamento, prægressu, defectu signorum  
catarrhalis & lyncobialis.

*Synobialis* incipit ab horrore & frigore sine  
causa externa, deinde dolent fauces, saliva vix  
*Sauvages Nosologia Methodica*. Tom. I.

deglutiri potest, febris accedit magna cum eufi-  
si, dyspnœa, dysphagia; lingua est alba, sor-  
dida, adest inappetentia, sæpe nanctia, a tussi &  
anacatharsi crescens, prævus in ore sapor, car-  
dialgia, ventriculi gravitas, febris exacerbatio,  
capitis gravitas; in hac specie non solum phle-  
botomizæ repetitæ conveniunt, pauciores tamen  
quam in sanguinea, sed uberiore quam in cat-  
arrhalis; verum post duas vel tres phlebotomias  
nihil est tam utile quam vomitionem tartaro si-  
biato excitare, etenim inde tam uber fit pituitæ  
viscidæ & faucibus expressio, etiam ante vomiti-  
onem, ut illico a vomitoriis actione guttur liberari  
vel sublevari videatur, saltem fomes febris for-  
assejicitur; unde cum altera phlebotomia & sub-  
sequente catharsis brevi æger convalescit.

Interes in omnibus speciebus gargarismata  
reperientia, aut deterfiva conveniunt, ut  
decoctum hordei cum syrupo de moris, de ma-  
lis granatis; bacchar thois, fumach, nitrum,  
sal prunellæ, mel rosaceum etiam in gargaris-  
matis usurpantur; in catharrali tamen aqua vi-  
tæ optime resolvit in ore volutata.

In cynanche omni præstans remedium, teste  
*Pringle*, est pannos laneos in anacitis olei com-  
munis & spiritus cornu cervi partibus immortos  
collo circumducere & forum quarta quavis hora  
renovare, unde sudor qui præmissa phlebotomia  
inflammationem vel aufert vel minuit. Garga-  
rismata ex decocto ficuum in lacte addito spi-  
ritu salis ammoniaci optima sunt.

2. *Cynanche epidemica*, *Morbus Epidemicus Co-  
queluche* vulgo dictus. River. observ. 9. pag.  
136. *Febris anginosa*, Huxham l. i. p. 92.

Immaniter discrepat hic morbus a cephalitis,  
de, quæ *Cogueluche* dicebatur olim ex *Ménagay*.

Ille cynanche anno 1757. mense Julio Gali-  
liam Narbonensem affecit, plures & medio ab-  
stulit intra paucos dies; erat tussis, faucium  
asperitas, fervensque inflammatio, febris con-  
tinua, gravis dolor capitis, tussis serena, ex  
qua pervigilium, renum & lumborum dolor  
assiduus, coryza perpetua.

Curabatur phlebotomia, bechicis, superve-  
niente sudore fortido; ceteri ob fauces cibis im-  
pervias, non satis cito adhibitis auxiliis, febre  
& inedia consumpei ad interitum periebant; ca-  
tharsis vero lenis ex manna & castia indicabatur.

3. *Cynanche maligna* Panaroli Peuteceoli 5.

Angina epidemica maligna ea est, quæ cum  
tracheophya aut hemitriche malignis conjungitur,  
cum paroxysmis prælongis: ea *Hartmanno* & *Lina-  
dano* testibus valde periculosa & sæpius lethalis  
est, forte eadem ac *Cynanche contagiosa* Strausii;  
*Angina pestilens in capite semitam habens* Boneti  
*Polyalth*, *Tonsilla pestilens* Actii, *Laguurgustua-  
ris*, *Micus*, *Syracum*, *Arctæz*, *Garonilla* Hispanis, *Pa-  
danone* Græcis quibusdam; *Angina sicca* Hippo-  
cratis l. *Pregnosi*. Ex *Socrino* ea species cognos-  
citur ex carbunculo linguæ basim & laryngem  
afficiente. Ea infantibus fœnefissima, unde præ-  
dancone, seu infantum strangulatrix dicta. In  
cadaverum cerebro reperiuntur pustulæ lividæ.

Hæc species ante triginta annos epidemica fuit circa Nemaufum, maxime inter boves, atque etiam aliquot homines infecti: bobus lingua ad radicem exesa decidebat, omnibus summum remedium fuit anthracem moneta argentea vel cochleari deradere, & deterfivo gargarismate eluere; allium, piper, sal, & similia in gargarismate adhibebantur: an hæc species a duobus sequentibus diversa sit, judicet Autophtæ. *Colleg. Acad. T. 2. p. 295.*

a. *Cynanche ulcerosa* Vandermonde 1753. pag. 557. *Mal de gorge gangréneux* D. Boucler.

Debilis magna, pulsatio temporum, amphimerina acuta, a catarractis dejectiones serosæ, stillæ sanguinis ex naribus, catamenia intermixta, dolor gutturis, velum palati rubrum, pulsus debilis, escharæ griseæ utriusque in omnibus fornicis palatinæ oris rubris summe sensibilibus; escharæ crescunt invitis omnibus gargarismatis, excepto gargarismate D. Rubin. Dissolve salis Saturni scrupulum in aquæ plantaginis uncii duabus, & ex lino carpto tange escharas pluries in die, inde ulceris immutatio & consolidatio. Si situr subito hic morbus si flexus in die penicillo tangantur hæc escharæ tincto in mellis rosacei semi-uncia, cum spiritus salis gutt. xx; sit pro gargarismate infusum florum sambuci, quo etiam pro potu utatur. *All. van Soestien.*

b. *Cynanche gangrænosæ* D. Marteau Journ. de Med. Mars 1756. *Maux de gorge malins, & gangréneux* Huxham. *Journal de Med.* Octob. 1757. *Contagiosæ pestilens, quæ Cynanche*, dissert. D. de Rabours de ulcere tonsillarum 1749.

*Preludium varium.* Vulgo calor & horror, capitis gravitas & dolor, dolor gutturis, raucitas, tussicula subitanea, magnæque asthenia, magna pectoris oppressio & debilitas, infantibus nausea & tenesmus; pulsus in omnibus parvus, celer, agitatus, urinæ pallidæ, crudæ, adultis tamen sæpe coloratæ, paucae, turbidæ; oculi graves, subrubri, sublachrymosi. Facies plena, turgidula, vividæ, raro pallida, depressa. Næ omnia crescebant symptomata, febris peior, paroxysmus quovis vespere accedens per totum morbum, cum delirio sæpe improvise. Citius serièvi amygdalarum, parotidum, maxillarum tumor sæpe subitus, quandoque strangulatorius, oris color subito crassæmus, maculæ in fundo oris subalbæ, velociter extensæ, ulcera scilicet nullam, amygdalæ depaupercentia. Lingua alba & humida in apice, saburra crassa, brunnea vel flava in radice. Anhelitus primum injucundus, gradatim foetidissimus. Secunda vel tertia die exacerbabantur symptomata, febris intensior; sed post triginta vel quadraginta horas sedabantur, excepto pervigilio, dysphagia, anxietate, quæ crescebant. Vertigines, dolores, gravitates capitis sæpius cum delirio vel phrenitico, vel stupido, & musitatione. Cuius calida, sicca, aspera, cum epidrosi, urinæ ut initio, nausea, diarrhæa præsertim infantibus accedebant. Respiratio multo difficilior cum gravi siccitate orthopnoico, voce rauca, ca-

va, ipsi propria. Quarta, quintave die spuma mucosa, foetida, purulenta, sanguinolenta vel livida, & abominabilia. Pluribus nares inflammatae, excoriatae, ichore caustico corrodeente genas, manus, potissimum in infantibus, unde in illis sternutamenta. Suppresso oris vel narium effluxu infantes subito moriebantur, hoc deglutito veneno tormina, dysenteria, ano & nati- bus intadlis. Trachea arteria cariola, tunicis rufi rejectis, ægri hæctica conciebantur, sæpe peripneumonia inde oborta et medio tolle- bantur. Circa tertium diem circiter eruptio cutanea, vel crassæmus & erysipelatosus in pectore, brachiis, quæ succo frambeiæ, seu vino tin- cta videbantur, quandoque pustulæ in facie, saltem pruritus & desquamatio furfuracea, erup- tio sæpius ægros sublebat. Eruptio brunnea, livida, subito evanescens pessima; tunc enim purpura nigra, urinæ limpida, convulsiones, orthopnoea superveniebant. Morbi vigor quinta vel sexta die in pueris, tardius paulo in adul- tis, mors peripneumonica, vel comatosa, vel phthetica, vel hæctica. Pulsus rardus, æqualis, escharæ gutturis facile ejec- tæ, ulcera deterfa seu rubra, oculi vividæ, respiratio liberior præ- nunciabant sudorem, vel urinas turbidas, cras- sas, fursurosas, vel anacatharsim copiosam, vel desquamationem universalem epidermidis, & salutem. Si horres revertantur; si exanthe- mata subito retrocedant, livefcent; si pulsus parvus, vividus, cutis urens, sicca, respiratio dif- ficilis, oculi mortui, urinæ pallidæ, limpida; si phrenitis vel carus cum sudore frigido, visco- so faciei, tunc singultus, strangulatio, facies œdematosa, lucens & unguosa, obtutus cadaverosus, mors, accedunt. Unica phlebotomia quandoque utilis, secunda pernicio- sa semper; cuor in prima, crusta tenaci plumbea ob- ductus, infra & in secunda phlebotomia gela- tinosus, viridescens, vel nigricans, minime serosus, mollissimo thrombo dissolutioni proxi- mus. Apertura cadaverum cruorem putrem, dissolutum, sphecelatumque in visceribus offen- debat. De hac specie scripsit D. Serane pater in *Actis Societ. Monsp.*

Cura vergit ad corrigendam sanguinis putre- dinem per antiseptica calida, non tamen per salia alkalina. Ordebat a clysmate mollioranti, raro unicam phlebotomiam adhibui, cathartica lenissima adhibebam, si forent indicata initio, quod rardum; sæpius in declinatione purga- bam; initio tamen ubi nausea erat, oxymel scil- licitum, vel aliud lenie emeticum cynanchica symptomata mire sublebat.

Statim ab his evacuationibus sumebatur potio ex sale absinthii, vel sale volatili cornu cervi, & succo limonum in aqua alexiteria, cum pau- xillo contrayervæ, myrræ, & croci: si febris paulo major, ex bis boli, addito nitro, para- bantur; utrum alterumve camphoræ granum etiam adultis proderat, si stomachus permitteret; secus julepis camphoratus, vel acetum campho- ratum cum syrupo grossulariæ adhibebatur: se-  
cunda



unda vel tertia die addebatur levis kinkina tinctura. His eruptioni & sudori prospiciebatur, in bunc etiam finem levia diaphoretica cum decocto hordei fumebantur. Si sudores fecidi forent, addebam tincturam kinkinae elixirium vitrioli, vel offerebam aquam cum vino, & succo limonum: os assidue detergebam decocto sicum, rofarum, cum myrrha & melle, spiritui vitrioli & mucilaginosus: vapor ex decocto lysimbrii vel cochlearia, rofarum, chamæmeli, cum myrrha & campbora in aceto naribus excipiebatur, epispastica parotidibus admovebantur, vel pone aures; fomenta emollientia.

4. *Cynanche exanthematica*, Collect. Acad. tom. 3. obl. 42. V. Vinceri; *Angina varietosa Sydenhami* pag. 659. 664. *Angina morbillosa Sydenhami* pag. 244. Morrhon. de Morbillis.

*Cynanche varietosa* tunc accedit, cum varicellæ vel suppuratæ, vel exsiccationi proximæ sunt, scilicet circa undecimum ab invasionem diem; tunc ob pustulas narium posticarum, & vel palatini, jussula deglutientiæ per nares revertuntur, mucus exsiccatus exsiccari non potest, adeo difficultas respirandi, angustia in faucibus, febrisque secundaria in confluentibus accedit.

Nihil est convenientius quam gargarisma ex decocto hordei cum melle rosaceo: ope syringæ in os & nares injicere; ut omnia emolliantur, & liberentur ægri.

*Angina vero morbillosa* etiam & maxime ante papularum eruptionem accedit cum voce rauca, tussis sicca, valde importuna, coryza, oculis lachrymosis, respirandi & deglutendi difficultate, ob insarctum faucium a materie papularum exituriente. Præstant autem maxime elegmata & pitasus edulcorantes, quæ in rubellæ curatione laudantur.

De *Cynanche miliaris* ante eruptionem paucis agit D. Allioni in tractatu de morbo miliarum: ea vero accedente eruptione soler evanescere. In *Cynanche scarlatina* & morbillosa H. Bregiani Presf. Pisani lib. de Venenis pag. 101. horrorem potus hydrophobicum observavit salvis ægris.

5. *Cynanche trachealis*, *Cynanchi vera* Græcorum & *Cynanche laryngæ*, *Angina canina* Zacuti Lusitani lib. 2. Obl. 88. *Angina* 1. speciei Boerhaave Aph. 801.

Si sola trachea, illæsis alvis, in interna sumembrana muculosa inflammatur, tum oritur ibi tumor, calor, dolor, febris acuta, calida: ceterum externa signa nulla; vox acuta, clangosa, sibilans; inspiratio acutè dolens; respiratio parva, frequens, erecta cum summo molimine; hinc circulatorio sanguinis per pulmones difficilis, pulsus mire & cito vacillans, angustia summa, citra mors; et hæc una ex his quæ funestissima nec externa dant signa; quo vero propius glottidi & epiglottidi malum, eo sane magis lethale: Cum vero ipsius laryngis mucosus insidet inflammator, maxime si interna fuerit, dolor in elevatione laryngis ad deglutitionem ingens, auctus inter loquendum ac vociferandum; vox a cutissima, stridula, citissima

cum summis angustia: mors; ea varietas est trachealis pessima.

De hac vide *Dodonæi observ.* c. 18. *Tulpii libr. 1. cap. 61.* *Greg. Hippium* &c.

6. *Cynanche pharyngea*, *Parasynanche* Græcorum, *Dysphagia inflammatoria*, *quarta species angina* Boerhaave num. 804.

Quando sola pharynx inflammatur, signa specifica sunt in specibus faucibus apparentia, respiratio satis commoda, deglutitio dolens, impossibilis, materies deglutientiæ per nares rediens; eadem in asperam arteriam pulsa, & tussim violentam excitans; hinc defectus cibi, potusque ingrendi, exsiccatio & exasperatio omnium humorum in corpore, febris non adeo intensa, major morbi duratio, ante illatam mortem.

7. *Cynanche thymica* Boneti Sepulchret. observat. III. pag. 478.

Ea est species rara, quæ a thymi inflammatione procedit, a thymo premitur œsophagus & trachea, tumor est ad imam colli partem juxta sternum, deglutita vomitione rejiciuntur, in faucibus nulla mutatio.

8. *Cynanche hepatica* Guarinonii consil. 168. *Angina salva larynge a jecore corrupto ortum ducens* Boneti Sepulchret. lib. Axioms equis.

Qui angina strangulatus visus est, loco laryngis nihil præter naturam inventum est, sed jecur ipsum putrefactum, adeo ut quasi gleba dissolveretur, nimirum quod abundantia, ex ea putredine, exeuntem halitum & ichorum laryngem sic constringeret, æger spatio triginta horarum extinctus est.

Hic morbus equis est familiaris, cum estuantes in aquam deducuntur; intumescunt tamen illis glandulæ colli, & plerumque intra biduum intereunt; sed jecur, observante *Giffonio*, in illis reperitur præ putredine omnino dissolutum.

9. *Cynanche a deglutitis*, *Angina spuria* Emmulleri. Vide *Dysphagiam*.

10. *Cynanche arthritica*, *Angina arthritica* Mulgrave cap. 13. *Cynanche Metastatica a scabie, herpes repulsi*. De Meyserey T. 2. c. 318.

Ea est species quæ post arthritidis regularis paroxysmum, ex eodem actu febrili, cum articulo dolore fugaci, aggreditur, facillè in abscessum desinit cum copioso pure, & vices arthritidis explet, unde æger ab arthritide diutius immunis vivit; demum, repulsa ejus materia, supervenit arthritidis.

Febris antecedit vehemens, fere ardens; sequitur faucium dolor, tumor phlegmonodes; deglutitio, spirandi difficultas tanta, ut biduo quandoque impossibile sit quidquam deglutire; saliva assatim emanat, alvus adstricta est, sanguis in patella coriaceus est.

Cura. Hemores & corpore evocandi ope phlebotomicæ; purgationis, gargarismatur, vesicatorum, ut in cynanche vulgaris; verum ut e parte affecta revellantur, & in artubus deponantur, entendum est, in quo ab aliarum cura hujus curatio discrepat, in quem finem desinare morbo suadetur ulus pomacei, vini albi aut rhenati,



præmissa catharsi; ea enim dolorem articulem accerunt; articulo prius dolenti apponitur emplastrum ex oxycroco, cephalico & pice Burgundiaca, vel tela cerata, vel phœnigmus acer & stimulan, immo pediluvium in aqua fervida quantum toleri potest; tumor excitatus panno molli, vel linteo duplicato veliatur; cum vero ille tumor pedis vel genu apparet, residuum *cynanchæ* evanescit.

11. *Cynanchi mercurialis* Schenckii libr. 6. observat. *Angina ab hydrargyrosi* Astrucii de morb. vener. libr. 4. cap. 8.

Accidit aliquando post tertiam quartamve inundationem, ut glandulæ salivales, maxillares, parotides, tonsillæ derepente tument, caleant, doleant, lingua tumefiat, foras exeratur, facies, totumque caput turgescat, unde deglutitio & respiratio difficilis, vox suppressa vel incondita, & mugitui similis, sopor, febris acuta, salivatio foetida, copiosa, viscida, ulcicula in ore intra linguam, a lateribus ad genas, sensatio quasi dentium extus protrusorum, gingivarum tumor, rubor, dentium ipsorum vacillatio, lapsus, maxime si operantari connexi fuere; hæc vel plurima ex hisce mala a largiori, aut citra sufficientem balnearum numerum, repetita & frequentiori hydrargyrosi superveniunt.

Cura vero exigit ut. 1. linte hydrargyro infusa deponantur, cutis detergatur in balneo tepido, phlebotomia impetus sanguinis compellatur, dein catharsi foras educatur hydrargyrum, non neglectis gargarismis ex lacte tepido, &c.

12. *Cynanchæ prunella* Etmuller. de febr. pag. 302. & 207. *die brænnæ* Germanis.

Est symptoma tritaphyæ ardentis; adest sitis, ardorque summus cum lingue ariditate, & eniore obscuro, faucium ardore, deglutitio difficultate, dyspnœa.

Convenit mucilago seminum psylli & cydoniorum, cum aqua sempervivi extracta, quæ lingue sæpius applicetur: item gargarisma ex aquis plantaginis, lactucæ, solani, ligustri, portulacæ, prunellæ, addito succo mori, berberidis, citri, lapide prunellæ, aut nitro, &c.

*Prunella Baracelo* idem est ac *angina*.

13. *Cynanchæ a dysenteria* Etmuller. de angina; G. Fabricii Hildani de dysenteria; Lamoniæ tract. de fluxu dysenterico, cap. 5.

Est species quæ dysentericæ suppressæ, male curatæ, succedit, cum gutturis inflammatione, febre, leipotymia; hanc oriri putat *Hildanus* ex pustulis in gutture genitis, quas natura ad salia alia emittere consuevit in convalescentibus.

Curatur gargarismis ex lacte, ex decocto hordei, liru colli ex oleo lilorum, amygdalarum, fomento ex lana succida. Vide plura in *Hildani* ea medico-practica. *Mangeti* de angina pag. 77.

14. *Cynanche parotidea*, vulgo *oreillon*, & *ourlo*. Tissot Avis. au Peuple §. 116 B.

Appyretæ est, tumore parotidem, glandularum maxillarium, deglutitio & os aperiendi difficultate stipatur: ea species diæta tenui, potuque resolvente in loco calido curatur.

15. *Cynanche purpurea parotidea* D. Tiss. n. 117. A.

Differt a cynanche vulgaritumore parotidem totiusque colli, eruptione petechiali, usque ad sextam diem, nisi sudore uberi eruptio suppletur, pyrexia irregulariter exacerbante, exigua deglutitio difficultate, exulceratione non maligna tonsillarum; præmissis generalibus curabatur per sudorificas, maxime opo kermes mineralis.

XXI. CARDITIS; *Inflammatio cordis & pericardii* D. Senac Malad. du cœur chap. VI. & VII. Meckel Mémoires de Berlin 1736. *Synochus cardiaca*, De Mejersey T. 2. n. 230. *Inflammation du cœur*.

Character obscurus anceps deducitur a dolore sub sternum, palpitatione, frequentius animi deliquiis, pulsus inæqualitate & frequentia, quandoque etiam febre acuta; sed post aliquot dies accedente, cura pulsu duro & frequenti. Dolores pectoris, anxietates continuæ in regione cordis, videntur assidua symptomata.

1. *Carditis spontanea*; vide tres observ. D. Meckel & D. Senec. cap. 7. ubi numerose huius morbi hystoriz.

In Carditide Epidemica *Clar. Trecoeur Journ. de Méd. Dec. 1735.* memorat signa sequentia: 1. symptomata peripneumoniz, sed violentiora; 2. dyspnœam extremam, cum longo intervallo inter expirationem & sequentem inspirationem; 3. sitim clamoriam; 4. horrorem potus, ita ut ab aquæ aspectu fremere & convellerentur ægri; 5. dolorem in regione cordis quo pectus tanquam clavo confissum videretur; his addenda continuam, palpitationem, pulsus depressum, oculos lacrymosos, trides, linguam aridam, nigram, sanguinem pleuriticum, coctio flavo densa obductum; minus sanis erant similes; ægritudo contagiosa quæ septimana terminabatur. Scdis cadaveribus plurimis cordis substantia omnibus nigrata; plurimis concrectiones polyposæ, pericardium cordis accretum.

*Curatio*. Phlebotomia æternis horis repetebatur ad 4. vel 5. vices; mox purebantur ægri ex decocto cassiæ cum tartaro stibato; hæc prima die adhibita prospere succedebant; ad alteram dimissa inutilia erant; morbo ad quintam vel sextam diem protracto, spes erat vitæ servandæ. Apozemata diluentia, pulvis temperans cum pauillio camphoræ, ptisganitrate, catharis iterata æternis fere diebus plurimos servare; viginti tamen obiere. Hæcenus *Clar. Trecoeur*.

Adolescentes dolores acutissimos, pungentes in cordis regione, cum anxietatibus & angustis, patiebatur, unde a solitis moriis abstraheretur, sexta die febris cum pulsu frequenti & duro invasit; repetitis phlebotomis morbus decima quarta die remisit, sed anxietates & dolores pectoris recrudescerent ægrum vigesima die abstulerunt.

Apertura cadaveris. Cordis superficies integra pure obvoluta, crassa pingui vel purulenta tegente tunicam ejus erosam; pericardium rubrum, vas turgidum cinereum; textus carnosus cordis, pallidus, mollis.

Plurimas observationes cordis quoad corpus, auriculas, basim, apicem, pericardium, &c. inflammati & suppurati, videbis loco citato. Sed incerta diagnosi, prognosis & therapeia nulla efficitur.

2. *Carditis traumatica* D. Senac, *Blessures du cœur*, chap. VI.

Locus vulneris, instrumenti directio, vulneris altitudo cum signis aliunde obscurissimis eam indicant, scilicet dolor, anxietas, febris altera, vel tertia die superveniens; sæpius animi deliquia, pulsus parvus & inæqualis, sudores frigidi, anxietates sine febre acuta & sine palpitatione. Vide *Synopses & erythemas traumaticas*.

Eventus ultimus lethalis; intra aliquot dies cum hæmorrhagia larga mors accedit.

In carditide & gastritide febris quoad calorem & pulsus vim exigua, rara, vel nulla; quoad eventum & symptomata funesta, ad typhum vel typhum febrem malignam accedit, unde ad hanc classem vix pertinent hi morbi.

Inflammatio oculorum pertinet ad *ophthalmiam*, aurium ad *otitiam*, mammae ad *mastitiam*, vel ad *synocham lacteam*.

**XXII. PERIPNEUMONIA**; *Pulmonaria* quilibet. *Pulmonia pneumonia* Alpini Medic. Method. Lib. 7. *Pulmonia & Peripneumonia Castellii* Lex. *Pleuris peripneumonia* Boneti Merc. Comp. *Pneumo-pleuritis* Dolzæ Encycl. *Peripneumonia*.

Est phlegmasia, horum symptomatum concursu stipata, scilicet pyrexia acuta, dyspnœa gravi, gravativo pectoris dolore, tussis molesta, & expectoratione cruenta, cum pulsu molli.

Principium morbosum est infarctus vasorum sanguiferorum pulmonis, quem natura ope febris, tussis, dyspnœa resolvit, vel in suppuratum deducere nititur, irritata a sensatione confusa obiecti tum circulationi, tum respiratori oppositi.

In asthma datur tantum obex respiratori oppositi, unde nulla febris; in peripneumonia oblat etiam infarctus circulationi per pulmones, unde resilietiam perferunt cor. Hinc vehementer insurgit ad eam tunc, calore, vitruosa auctis superandam, quo pertinet etiam sanguinis expectoratio sarcinæ partem auferens.

In peripneumonia a pleuritide sanguineis seu puris febris est synochia, id est continua hebdomadaria; in impuris, putridis, malignis, febris est synochus aut tritaphya duplex, aut amphimerina ad duas septimanas extendi solita.

1. *Peripneumonia pura*; *Peripneumonia vera* Auctorum, Huxham lib. 1. pag. 66. *Pneumonia* Mich. Bourgard. dissert. 1734. *In vasis Peripneumonia*.

Peripneumonia est quæ, sine sabura putri *Sauvages Nosologia Methodica*, Tom. I.

aut maligna, a plethora tantum commota & infarctu subitaneo pulmonis ortum ducit; febris est continua, synocha, non remittens; linguae anhelitus, fœtoris expers; nulla nausea; calor, incensus, rubedo faciei magna; pulsus velox, plenus, mollis, undosus, quandoque inæqualis ea inæqualitate quæ pulsui pectorali propria est, scilicet reduplicata; sputa sunt vel cruenta, vel rubiginosa, in declinatione alba, viscida.

*Curatur* ut pleuritis sanguinea, flammosa, phlebotomiis, apud adultos quandoque decies repetitis, prima die, quarta quaque hora, ad semilibram circiter, interpositis insculis tenuibus & potu diluente, ut decocto hordei cum glycyrrhiza, vel quod iustitias, decocto soliorum cichorii, item succo borraginis depurato ad uncias tres in iusculorum intervallis; sed succus borraginis paulo magis, quam par est, suffragat excitat initio morbi & apud biliosos, satius est sæpe in infuso capillorum venerit aliquot borraginis folia decoquere, nisi tertio vel quarto die sudor proritendus sit, in quo casu succus borraginis purus, calidus, ad uncias quatuor cum theriaca, antimonio diaphoretico, sanguine hirci, similibusve propinetur.

2. *Peripneumonia putrida* Thesis Parisiens. 1734. *Peripneumonia symptomatiqua*.

Est ea quæ fovetur a febre putrida amphimerina vel tritaphya, seu a cacochylia putri primarum viarum in sanguinem transmissa, quæ cognoscitur ex oris fœtore, lingue sorditie, febris exacerbatione, nausea, pondere ventriculi, cardialgia, syncope invasionis morbi quandoque notante, vomitione biliosa, ortum ducit a frigore, horrore, quem sequitur deinceps prima, vel secunda die tussis, dolor pectoris sæpe simul in latere pungitivus, in sterno gravativus, cum pleuro-peripneumonia, aut pleuripneumonia Schroederi.

In ea specie minor sanguinis quantitas extrahenda venit, & in prima remissione lenecatharticum est præscribendum, ut mannæ uncie duæ dissolutæ in cyatho infusionis florum malvæ & violarum, ubi quandoque tartari stibiaci granum vel syrapi Glauberiani guttæ quatuor adduntur ad accoletandam catharsim; iterum ad phlebotomias revertimur, & eodem modo curamus ac pleuritidem.

3. *Peripneumonia ardens* Brunsellii; *Peripneumonia biliosa* Foresti lib. 16. obs. 46. pag. 71. *Peripneumonia* Mich. Bourgard.

Cognoscitur ex tritaphyæ typo, simul cum siti multa, ardore thoracis, ægri temperamento siccio, bilioso; ex prægressis exercitiis immodicis, potu spirituoso vel fermentato, iracundia prægressa, oris, amarore; lingue flavedine, aut nigredine, & siccitate, sputo & urina citrinis, pulsu celeri, colore acri, siccio.

Ea varietas exigit phlebotomias repetitas, pituitas demulcentes & refrigerantes ex floribus malvæ, decocto hordei cum liquoritia, seminibus frigidis, cathartes lenes in remissione ex decocto calissæ cum manna in infuso florum violarum, fe-

minum lini; noctu syrupum de nymphaea, immo de papavere albo parca dosi, quæ anaetharism non supprimit; cetera ut in prima specie; solvitur autem hic morbus sudoribus qui suo tempore juvandi: vidi in hac specie phlebotomiam octodecies celebratam & feliciter.

4. *Peripneumonia maligna*, *Peripneumonia pestilens* Schenckii obsl. lib. 6. pag. 855. *Peripneumonia erysipelatosa* Schenckii Schol. ad obsl. 46. *Febrii crimedes* Forelli obsl. 37. lib. 1. Schol.

*Peripneumonia pestilens* Europam ita devallavit anno 1348. ut vix decima hominum pars superfuisset, si credamus Gallo & Schenckio: ea intra tres vel quatuor dies cruciabat:

Quarta luce frequens fato perdebat acerbo, infecit Latinum arque Europa sævit omni.

*Fracastor. de Syphilide.*

Aderat tussis, summa respirandi difficultas, ut ægri sedere egerentur; spiritus cruentum, superveniebant exanthemata, abscessus externi, &c. Curatur ut pleuritis maligna, verminosa, pestilens.

5. *Peripneumonia typhodes*, Deplaigne Journ. de Med. Septembre 1757. *Epidemia annua apud milites a Valentianenses*; *Pneumo-peripneumonitis biliosa & putrida*.

Character. Oppressio pectoris, dolor punctivus, aut gravativus, athenia magna, pulsus parvus, debilis, depressus, sæpe concentratus, ut plurimum vix frequens (sine febre, ut ait Auditor), dyspnœa, respiratio interiecta, tussis violenta, siccæ, sputa per vim extraxæ, viscida, tenacia, subflava; succedunt nausæ, vomitio biliosa, lingua crassa, saburra albescens onusta, cephalalgia levis; quæ crescente æger delirari obscure, pari passu ac pectoris insarctus augetur. In cadaveribus omnibus suppuratio pulmonis, alteruter hujus lobus insarctus, vel ambo suppurati; thorax sæpe vel pure, vel sero gelatinoso plenus, similia ramenta gelatinosa in abdomine viscera obducunt: quandoque idem pus vel serum in pericardio; adhaerentia pleuræ dolenti lateri; non raro polyposæ concretiones in corde, quas respiratio impedita & crebra designabat; cetera sana, nisi hepar solito majus & decolor.

Cura. Post unam vel alteram phlebotomiam, emeticum præscribitur, immo si pulsus parvus, minimeque frequens, ab emetica & cardiaca potione inchoandum: deinde vel phlebotomia, vel catharsis ex minorativis & tartari sibiati granis paucis. Statim a primis evacuationibus emplastrum vesicatorium lateri dolenti applicetur; intra horas quindecim omnia symptomata miscescunt; febris minuitur, expectoratio restituitur, diaphoresis accedit, nihil in urinis mutatur; antiseptica energetica minime in hoc morbo pertimescenda; itaque quarta quavis hora fumatur bolus ex radice contrayervæ, camphora & nitro, vel alter bechicus & diapho-

reticus, prout casus exegerit. *Oxymel scilliticum*, *syrupus de althæa* cum aqua scabiofæ, *imperatorice*, vel *scordii*, & pauxillum olei amygdalarum tussim sedant. *Felix* eventus ex diaphoresi & anacatharsi expectandus, adeoque prout indicatæ fuerint, in intervallis præteribuntur cathartica minorativa, elysmata, ptisanæ nitratæ vel bechicæ, cardiaca & diaphoretica; & si delirium, vel cephalalgia urgeant, sedtio jugularis optime succedit.

6. *Peripneumonia catarrhalis*, vide Amati Cent. VII. cur. 79. *Peripneumonia a capitis desillatione*, *Peripneumonia pituitosa* Forelli; *Peripneumonia tussi epidemica succedens* Sydenham Sect. V. Cap. 5. 1. & 2. *Peripneumonia nobilis*, ejusdem Sect. VI. Cap. 4. *Boerrhaave Aphor. 867. Fluxion sur la poitrine.*

Est species hieme exunte frequentior, quæ a tussi catarrhali orditur cum frigore & incallescencia alternis repetente, doloribus totius pectoris, & raucedine; æger vestiginosus est; caput inter tussendum distilare videtur ægrotauti; tussis tamen constans non est; præterea omnia æger vomitu rejicit; senes, frigidos, pituitosos præsertim aggreditur hic morbus, cum febre quidem manifesta, unde ab alimate differt, sed leni tamen, præsertim apud habitiores, ita ut longe minor sit quam in vera peripneumonia; de cetero sanguis pleuriticorum est æmulus quoad corium.

In hac specie paucæ phlebotomiae, catharses vero plures requiruntur; sic Sydenham prima die sanguinis missionem unam præferibit, altera die purgat ex casta, manna, syrupo rosarum solutivo in infuso foliorum fennæ cum scibus & glycyrrhiza; posttride iterat phlebotomiam; interjecto uno die catharsim repetit, & sic deinceps utqueque æger convalescit, diebus vero a catharsi vaevis bechicis, oleosisque utitur; ptisana est decoctum hordei cum glycyrrhiza, æger cremoribus vescitur. Vapore exhalantis aceti III. Gesnerum peripneumonia affectum convalescentem vidit III. Hallerus Severipæ & Boerrhaave consilium secutus.

Si eynanche evanescente superveniat pectoris oppressio, summa anxietas, perpetua orthopnea & suffocatio quasi tussiculosa, hæc peripneumonia lethalis est.

Cura. Sydenhamianam c. 5. sect. 5. videbis. 7. *Peripneumonia arthritica* Musgrave c. 11. histlor. 5. Sydenham process. integri pag. 710.

Est ea quæ a materie arthritica methasti in pulmones debetur, liberatis artubus a dolore & tumore.

Sydenham hanc tractat, ut peripneumoniam absolutam seu puram, venæ sectione scilicet repetita, diæta, remediis refrigerantibus, intransigentibus; purgandus est insuper æger inter venæ sectiones potuibus lenientibus sudoris autem provocatio obest.

Verum Musgravius contendit a Sydenham in hoc recedendum esse, & per sudorifica etiam materiem arthriticam esse ad artus mittendam.

B. Præ-

8. *Peripneumonia phthisicorum* Morton. Phthisiol. cap. 4. pag. 41.

Est febris peripneumonica identidem phthisicis confirmatis superveniens: a nova tuberculorum inflammatione, quoties scilicet a percepto frigore, liberali vini potu, nimis exercitiis, similibusve de causis ista febris exsurgit, difficilis evadit respiratio, expectoratio supprimitur, tussis tamen urget, non raro cum dolore lateris; sæpius oppressio pectoris accedit, cum aliquot striis sanguinis & puris in sputis; sitis, jactatio, vigilie, intensus & continuus calor; unde æger lecto affigitur, & quandoque e medio tollitur.

Febris ista peripneumonica tractanda est ut ceteræ peripneumoniz, habito respectu virium quæ exiles sunt in phthisicis; tenuissima sit dieta ex jussulis vel cremoribus; medicamenta belchica expectorationem cientia, ut decoctum siævum, passularum, syrupus capillorum veneris, violaceus, spermacei cum saccharo tritum; adde linimenta anodyna, & si urgeant symptomata, aliquot sanguinis uncie & brachio extrahendæ, cruor extrahendus erit: ferro multo circumdatus, cum trombo tamen coriaceo superne concavo, sublato, duriusculo: *Mortoni* copiosam vult phlebotomiam, ligatura vero venæ tuse sit arcta, ne cruor elaboratur, quod phthisicis familiare est, & inde sublatum etiam intra Chirurgi manus vidi nobilem virum phthisicum, qui amissa vix femilibus cruoris sensim extitantis, nulla arte a morte eripi potuit; sedata febre antequam diætæ lactem resisteretur æger, lenis catharsis adhibenda demum erit.

9. *Peripneumonia exanthematica*, & *Peripneumonia a variola* Morton de Variol. cap. 7. pag. 64. Sydenham pag. 122. *Peripneumonia a rubella seu post morbillos* Sydenham Sect. IV. cap. 3. *Peripneumonia a miliarum* Allioni de morbo miliarum pag. 107. 53.

Ea est species quæ a viro morbi ejusdem exanthematici vel repressi, vel non libere ad eum irrumpens dependet.

In miliarum peripneumonia pulsus celer, urina decolor, merus & crassities sine causa, gastrodynia cum suspiriis; tinnitus aurium, inquietudines, motus subitanei involuntarii, stupor pangsive dolens in digitis, somnus spectris interruptus, sudores acidi assidui cum pulsu contracto, tunc accedunt symptomata peripneumonice, laterum dolores mobiles & fugaces, sputum ex parte vel ex toto cruentum vel flavum, dein sudores profusi, & dolore imminuto exanthemata miliaria erumpunt; urinx, urgente lateris dolore, rubræ sunt, instante eruptione aquæ evadunt; quandoque delirium supervenit peripneumoniz, pulsus exortis, sedandum.

Si tertio quartove die sputa biliosa vel fuliginosa ad quintam diem perseverent cito cum delirio, catarrho suffocativo accedente, pulsu reddito inæquali, intermittente, brevi pereunt eade m fere die, omnis doloris expertes; hæc

peripneumonia in suppuratum non abit, erysipelatosa est; nisi blande resolvatur, sphacelum promptè inducit. Timenda est præmatura ante sextum diem miliaris eruptio.

In hæc peripneumonia & pleuritide miliaris cito & liberaliter mittendus est sanguis & attendendus; diluentia & emollientia requiruntur; mitioribus acidis venenum est corrigendum, præsertim rob. sambuci: antiphlogistica etiam indicantur; ut nitrum, taraxacum, eichorii, fontichii succus, si imminet sphacelus pulmonis, adhibeantur flores papaveris rhezados, sambuci, camphora cum aceto, oxymel.

In peripneumonia quæ morbillos excipit, quæ plures jugulat quam ipsa variola, potissimum præsidium est phlebotomia.

Quoad variolosam, quæ undecima die, cum exsiccatur facies in confluentibus, supervenit, vide *Festud de febre secundaria*.

10. *Peripneumonia hydropethica*, Journal Encyclopédique tom. 1. 3.

11. *Peripneumonia gastrica* D. Barthes Prælection Monpel. An gastritis sereno-collalis?

Est æ peripneumoniz sicca species, quæ sub gastritidis persona ludit, & sædo cadavore, sanus stomachus, pulmo inflammatus, vel parulenter repertus est.

Dolor acutus, infra cartilaginem xiphoideam, regione ventriculi circumscriptus, hypochondria dolentia & tensa, inanis tussis, sanguis pluries & vana extractus, floridus: sæcto cadavere, nulum vitium in stomacho, hæpar mole adauctum, intestina gracilia, livida, pulmones contracti, magnis abscessibus & tuberculis suppuratis fæcti, in fero natantes, vesicæ urinariæ parietes pollicem crassi, ante hunc morbum æger febre lenta laborabat & dolore spinæ dorsalis.

12. *Peripneumonia rachialgica* D. Dozvam D. M. Monpel.

Est species quæ ab eodem principio dependet quo colica metallica, quæque sine phlebotomia, præmissis decoctis lignorum sudorificorum; curatur emeticis dupla dosi assumptis & catharticis, uti curari solet in Nosophonio Caritatis Parisiensis ipsa Rachialgia metallica.

XXIII. HEPATITIS Galeni I. Epid. Comm. 3. *Febris interictus* Galeni I. Sagoge 146. *Febris phlogos* Foresti lib. 1. Obs. 39. *Inflammatio hepatis* Sennerti lib. 3. Sect. 1. *Inflammation du foie*, la Pile, *Ægri Hepatici Castellii Lex.*

Phlegmasia est acuta, cujus præcipua symptomata sunt tensio dolorifica hypochondrii dextri sub costis spurilis, cum sensu ardoris, gravitatis; dyspnæa, tussis sicca, faciei colore flavescente, siti, anorexia, & sæpius singultus & vomitus. Definuntur a Galeno phlegmone hepatis; verum rectius definiuntur morbi a symptomatibus; quam a sede latente. In scholis definitur per tumorem hypochondrii dextri, calore magno & febre continua stipatum, cui ut plurimum singultus & vomitus adjunguntur. Sed cum pars hepatis possit

ca, immo intima, tantum inflammatur, tensio ad summum, minime vero ignoti voluminis augmentum seu tumor, dijudicari potest.

Sæpius erramus in hepatitide dignoscenda; verum hæc præcipua signa sunt, 1. gravitas in dextro hypochondrio ab hepatis distensione oriunda; unde difficultas in alterutrum latus devolutio ac decubitus, 2. dolor vel gravitativus vel tensivus circa costas spurias pleuritidem mentiens, immo ad jugulum extensus, deorsum tracto mediastino, 3. febris amphimerina vel noctu ingravescens cum pulsu duro, siccissima hepatis membrana inflammatur, secus minor febris, pulsusque minus tensus, 4. dyspnœa cum tussi sæpius sicca.

Cetera symptomata speciebus diversis tantum propria sunt, ut tussis sicca, pulsus durus, inæqualis, cibi fastidium, sitis intensa, lingua rubra, dein nigrescens, auriginosus color, urina rubra, flammea, alvi adstrictio, &c. obscurissima hujus generis specierum diagnosi, ut patet Boneti Sepulchretum perlegendi, cum ex iis appareat Hepatitidis symptomata sine ullo hepatis vitio reperta fuisse, & reciprocè pleuritidis phenomena ab hepatis inflammatione orta; unde satis est genera morborum a phænomenorum concursu quam a sede determinare.

1. *Hepatitis erysipelatosa*, vide Amati Lusitani centur. 1. curat. 26. pag. 169. *Hepatitis aëtile* Jonstoni id. univ. medic. *Biliofa*, Bonetii de Medic. Indor.

Mulier quadragenaria major acuta febris afflicta, siti-intensissima cum lingue ariditate & nigredine cruciabat, stomachi subversionem maximam absque vomitu patiebatur, & circa jecoris regionem querebatur; totam noctem in somnis transiebat, cibum non gustabat, sed avidissime gelidam bibebat; cum supra jecur manum adinoverem, magnam inibi percipiebam caliditatem, & ægrotans dolorem, de quo potissimum conquirebatur; nullus tamen ibi erat tumor aut inflatio aliqua.

Erysipelas jecoris his signis denotari contendit Amatus, & merito, cum fuerit ejus inflammatio sine sensibili voluminis augmento; partem vero hepatis, quæ ventriculo contigua est, magis affici crediderim ex defectu tussis, dyspnœæ seu affectionum pectoris & præsertim ob affectionem ventriculi, ut docet experientia, ergo inflammata erat possimum pars hepatis concava.

*Cura Amati.* Phlebotomia pro altera vice instituta est, emulsionem ex aqua cichorii extractam syrupo de cichorio & nymphaeæ edulcoratam addidit, conservam de aceto sitate citri identidem gustandam permisit, nec non pristinam ex aquis cichorii, endivivæ, acetosæ, portulacæ cum syrupo de aceto sitate citri & violarum, succoque granatorum acidorum propinavit; fovit regionem hepatis linteo infuso in succo lactucæ, endivivæ & paucæ aceti rosati, tempora, nares, frontem inungi jussit ex unguento populeo; pro cibo sinit emulso, cui de-

inde addidit jus pulli cum semine citri, acetosæ & berberidis, nec non decoctum hordei tamarindatum; supervenit autem quinto die sudor criticus & ægra convaleuit.

2. *Hepatitis pleuritica*, *Suspitum irruptum* Pauli Æginetæ; vide Amati Cent. IV. Cur. 1. Duran. Journ. de Med. May 1757. p. 377.

Est ea species quæ ab inflammata parte gibba hepatis procedit, quæque dignoscitur ex eo quod præter dolorem & tumorem hypochondrii tactu asperatum, adest tussis & dyspnœa, non tamen ita graves; sicut nec ipsa febris ita vehemens ac in vera pleuritide, pro qua tamen non raro habetur in praxi; exemplo prostant a Galeno quæ videre est apud Zacutum Lusitanum lib. 2. Med. princip. hysior. 101. & in loco citato; præterea aderat spiritum cruentum. Distinguitur tamen a pleuritide dextri lateris inam partem afficiente dolore punctato mitiori, quandoque nullo, tum expiratione facili, quæ in pleuritide est difficilis, uti & inspiratio, nec non tussis sæpius arida & mitiori.

Distinguitur a colica & ab hepatalgia per febrem acutam, tussim & dyspnœam, morbiq; totius acutiem.

Urinæ in hac specie dicuntur aquosæ, non flavæ. Utut genæ rubeant in vigore morbi, cutis flavescit non raro.

3. *Hepatitis muscularis* Etmuller de inflammatione hepatis pag. 291. Bonet. Sepulchr. Observ. 29.

Musculorum abdominis inflammationi debetur hæc species, & inde compresso, quandoque etiam ab eadem causa conculso hepati; certum porro est pluries errasse Medicos qui hunc morbum hepatis inflammationi tribuerunt, ut patet ex Vallerioli lib. 4. obs. 6. Bartholini centur. 2. epistola 46.

Dignoscitur contactu cutis, pulsatione tumoris, ejus circumscriptione, quandoque ultra hepatis limites & supra costas extensus, absentia tussis, dyspnœæ, vomitionis, singultus. Similem morbum a gravi habus partis contione ortum pro hepatitide habuit cum cadaveris apertura vide apud Boneti Sepulchret. Tom. 2. pag. 311. obs. 29. abscessus erat pugni magnitudine.

4. *Hepatitis cystica*, vide Boneti Sepulchret. observat. 10. Tom. 2. pag. 303.

Est species quæ veram hepatitidem referebat, in qua ita contusa fuerat cystis fellea, ut rupturam pateretur, quod citra gravem hujus dolorem & phlogosim heri non potuit; bilis effusa fuit; æger intra quatuoriduum obiit; ex simplici vulnere cystidis hujus exsurgit tympanitis, observante Alex. Stewart in Philosoph. Transact. Sed ex gravi projectione corporis contra scamnum, puer, de quo hic agitur, debuit inflammationem simul cum ruptura cystidis experiri.

5. *Hepatitis obscura* Jonstoni Idea univ. medic. spuria Bartholin. obs. 73.

Est ea quæ a tuberculis, furunculisve hepatis pendet, vel ab ulcere, vomica fovetur, vel a

calculus tum cythidis fellæ, tum hepatis excitatur, sed ita exiguis stipata symptomata, ut pyrexia sit vel nulla, vel fugax, vel lenta, seu hectica; vel si febris adit, dolor exiguus sit, remittentive aut tumor decedant, vel ab hepatis inflatione, duritie pendeant; vel demum tantummodo sit phlogosis hepatis, quam interperiei calidæ nomine Veteres designant; ea vero species inter hepatitidem & hepatalgiæ mulcerosam, scirrhomam, &c. ambigit, hæque varietates distinguere in vivis valde arduum est.

6. *Hepatitis suppurans* Febris typhodes Foresti obfer. 37. lib. 1. Duran. Journ. de Med. Mai 1757, pag. 377, incisione sanata.

Est morbus secundarius, hepatitidem veram subsequens, ab hepatitide exquisita distinctus, ex eo quod veluti ejus recidiva sit, & in longum tempus protrahatur, atque in purulentiam hepatæ abeat cum febre initio acuta; nam cum suppuratione insituitur, febris intensior videtur, noctu exacerbatur, & factio pure hectica evadit; interea tumor hypochondrii major, mollior, dolor constans, sitis orietur, lingua sicca & aspera est, æger macie notabili in dies crescente absumitur cum calore acri; tum vel supervenit hepatitidis, vel rupto intestino abscessu ascites purulentus, vel extorsum a Chirurgo abscessus aperitur, & si pus album, laudabile effluat, spes est sanationis; si amureosum, biliosum, immedicabile malum est. Vide etiam *Morand Mem. de l'Acad. de Chir.* Tom. 2.

**XXIV. SPLENTIS.** *Lenis inflammatio* Sennert. lib. 2. part. 4. cap. 5. *Splentis* Felici Plateri; *Dolor hypochondrii sinistri qui splentis* Plateri. *Inflammation de la Rate.*

Est phlegmasia, cujus præcipua symptomata sunt tumor in hypochondrio sinistro, lenis motus & figuram referens aut locum occupans, cum lenientia, dolore tactum non tolerante, calore, & pyrexia utplurimum remittente.

Distinguitur a nephritide sinistri renis, quod tumor in splentide magis extorsum protuberet, quod altiore locum obseat, quod pulsatili dolore stipetur; quod hominem mediom quasi cingat, dolore obscuriore noteatur; pyrexia præterea est quarto quoque die utplurimum exacerbans, pedes & genua rubent, nares & aures quandoque pallescunt; adde respirandæ difficultatem, & absentiam symptomatum nephriticorum, ut dysurizæ, retractionis testis, &c.

1. *Splentitis phlegmonæa.*

Cognoscitur ex tumore lenis, utplurimum, locum, figuram retinente; dolore, calore, & pulsatione ejusdem, cum febre acuta, cibi sustinendo, siti, decubitu supra latos sinistri difficultati.

Curatur eodem modo ac hepatitis; de quibus consulatur *Rivierius* verum ita rarus est hic affectus ut præter *Forsellum* qui bis hunc se observasse refert, nec describit, neminem novimus, qui ejus existentiam testetur.

**XXV. NEPHRITIS.** *Renum inflammatio* Sennert. lib. 3. part. 7. sect. 1. cap. 8. *Phlegmonæ renum* Prosp. Alpini. *Nephritis* Helmoctii. *Inflammation des Reins, Nephritique* Aegri *Nephritis*.

Est phlegmasia acuta dolore lumbari & regione renis, urinz ardore, missione frequenti & pyrexia stipata, quandoque etiam vomitione, cruris sapore, &c.

Differt a lumbagine inflammatoria quod æger antroforum flexus erigat truncum sine notabili dolore, in lumbagine cum atroci; quod in nephritide sit dolor ureterum iter sequens, dysuria, urina, quoad colorem valde mutata, non vero in lumbagine. In nephralgia nulla pyrexia est, unde a nephritide discrepat.

Differt ab enteritide quod dolor raro ad exteriora referantur, in enteritide & splentide sæpe ad anteriora, seu ad abdomen; a colica per febrem acutam & dolorem in rene fixum, & viarum urinariorum affectus, excepto quod in colica etiam ichuria accedit.

1. *Nephritis vera.*

Est ea quæ a febre ortum ducit, non vero in qua febris dolori supervenit, ob calculum commotum; in vera scilicet non adfunt cruris stupor testiculi retractio, quæ adfunt in calculosa; de cætero febris nunc vehemens & ardens, nunc mediocris cum pulsu parum duro; renum aut renis alterutrius dolor gravativus, distendens, aut pungitivus, qui respondet infra tertiam costam ab ima numerando, & tres transversos digitos a spina dorsali; accedit sitis, anxietas, pervigilium, nausea, & vomitio; rejiciuntur statim contenta in stomacho, dein bilis; utrum rejiciantur materies urinam redolentes valde dubito, nec experimento in cane captum ligatis vasibus renalibus mihi unquam ostendit alvus est constipata, urina flammea, ardens, quandoque cruenta, in vigore morbi quandoque suppressa.

Curatur repetitis phlebotomiis, præfana leniente ex infuso florum malvæ, violæ, radicum althææ; vespere emulsionem narcoticæ; immo ad dolorem sedandum laudanum solidum interdum præscribuntur; clysmata ex cassia & soliorum malvæ decocto injiciuntur addito oleo, vel æger ex decocto cassiæ purgatus balneum ingreditur tepidum; purgatio autem parari potest ex uncis duabus palmarum cassiæ, florum malvæ & violarum, pag. 1. bulliant in feri lactis vel aquæ pulli libra una; fiat potio pro duabus dosibus.

Vix potest autem purgari, nisi repetitis ter vel quater in die phlebotomiis dolor sublevatus fuerit; balneum vero iterabitur; immo si nulla sit suspicio saburroz in primis viis, temperataque sit calida, ante balneandum est, quam ad catharsim devonias. Si vero febris saburram primarum viarum pro principio ad somite habeat, ut si lingua sit fœtida, sapor prævus in ore, morbus ab horrore inceperit, vix balnea

balnea in morbo conveniunt etiam post catharsin; e contra vero si ab equitatione, itineratione, calore summo, vigiliis, liquoribus ardentibus ortum duxit, sine signis saburræ, in bilioso æstivo tempore phlebotomiæ & balnea sunt summa præsidia.

2. *Nephritis calculosa* Carol. Pison. de morbis a colluvie serosa.

Dignoscitur a nephritide vera; 1. dolore acutiori a calculo per exercitium, iter in rheda commoto, pertinacius revertente, in intervallis gravativo; 2. urina cruenta, quandoque arenulosa, mucosa; 3. stupore cruris ejusdem lateris; 4. testis retractione, dolore etiam ureteris ductum sequente; 5. nausea & vomitione.

Principium morbosum est calculus vesicæ, vel lapillus crassior commotus, e sede assueta dimotus & premeus, vellicans renem, vel ureterem, ubi concurret plethora, hæmorrhoidum suppressio, arthriticæ materiæ metastasis ad renes, error in diætâ, gymnasticave admixtus, usus diureticorum præsertim calidorum.

Curatur in paroxismo eodem modo ac vera nephritis, eo discrimine quod paucioribus phlebotomiis opus sit; aut balneatio etiam bis in die repetita antea necessaria sit quam æger fuerit purgatus, cum saburra primarum viarum incusanda non est, sed calculi commotio; præsentiæ lenientes ex seminibus lini, floribus malvæ; oleum amygdalarum dulcium, potus ai-

erati, emulsiones & narcotica, nec non clysmata ex aqua fontana conveniunt. Si exiguas arenulas rubras æger mingere consueverit, quod senibus nephralgicis est familiare, nec grandiores calculos suspicemur, tunc lenissima diuretica, immo lithontriptica levia, præscribi possunt sub spe ejiciendæ arenulæ; si vero majorem calculum reni impactum suspicemur, ab omni diuretico abstinendum est.

Ad pellendas arenulas valcant, ptisanæ ex succo limonum cum paucis parietariæ foliis infusis, julapia ex decocto foliorum parietariæ, oleo amygdalarum & laudano, infusa foliorum herniariæ, decoctum corticis radicum calcitrapæ, fructuum cynorrhodonis &c.

Quomodo nephritis differat ab psoadis phlegmone vide in *lumbagine psoadica*.

Si Nephritis renem dextrum afficiat, non raro dolor magis deorsum & ad anteriora refertur, quasi circa cæcum.

3. *Nephritis arthritica* Frid. Hoffmanni Tom.

3. De Meyserey tom. 2. num. 374.

Est varietas calculosa, in qua per sinapismos & lavipedia calida materies morbosica ad pedes est revocanda, non neglectis generalibus auxiliis.

De Phlegmone pancreatis vide *Panimitum*.

De Phlegmone capsularum atrabiliarium vide *de Nephralgiam*.





# CLASSIS QUARTÆ SYNOPSIS.

## S P A S M I.

**CHARACTER.** Contractio, vel constans, vel interpolata, musculorum motui locali, non respirationi, nec circulationi propriæ, inservientium. voluntati non respondens.

### ORDO I. SPASMI TONICI PARTIALES. *Rigiditas & immobilitas artus vel Organi determinati.*

- I. **STRABISMUS**, *Strabisme*, oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.
- II. **TRISMUS**, *Tic, Sarrette*, maxillæ inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.
- III. **OBSTIPITAS**, *Torticolis*, colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem & directionem mutans.
- IV. **CONTRACTURA**, *Contracture*, artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, constans, diuturna, rigiditas sensum exorta.
- V. **CRAMPUS**, *Cramps*, subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.
- VI. **PRIAPISMUS**, *Priapisme*, penis injucunda rigiditas.

### ORDO II. SPASMI TONICI GENERALES. *Rigiditas totius sive corporis.*

- VII. **TETANUS**, *Tetanos*, spasmus generalis subito ortus cum dyspnœa.
- VIII. **CATOCHUS**, *Catalepsie*, spasmus generalis sensum factus sine dyspnœa.

### ORDO III. SPASMI CLONICI PARTIALES. *Agitatio invita & coacta cujusdam organi, vel artus, cujus motuum non percipitur.*

- IX. **NYSTAGMUS**, *Le Sours*, spasmus clonicus oculi, palpebræ.
- X. **CARPHOLOGIA**, *Soubresaut*, spasmus clonicus manuum carpi in acutis.
- XI. **PANDICULATIO**, *Tiraillement*, spasmus artus successive extendens per vices, semivoluntarius.
- XII. **APOMYTOSIS**, *Ebrement*, succussio cutis & capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa.
- XIII. **CONVULSIO**, *Convulsion*, agitatio invita artus, vel musculi cum animæ libertate, circumstantiarum perceptione.
- XIV. **TREMOR**, *Tremblement*, artus alterna per itus & reditus frequentes motitatio cum movendi voluntate concurrente.
- XV. **PALPITATIO**, *Palpitation*, pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate, respondens.
- XVI. **CLAUDICATIO**, *Boitement*, est inter gradiendum eruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibilibus dextrorsum, vel sinistrorsum transfertur.

### ORDO IV. SPASMI CLONICI GENERALES. *Sunt spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.*

- XVII. **RIGOR** (rectius phricasmus) *Frisson*, est totius cutis succussio frigoris.
- XVIII. **ECLAMPsia**, *Convulsion des enfans*, est artuum, vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuracione.
- XIX. **EPILEPSIA**, *Epilepsie*, est spasmus clonicus, periodicus, chronicus, artuum, cum sensuum obscuracione.
- XX. **HYSTERIA**, *Passion hysterique*, est artuum, organorumque etiam interiorum spasmus clonicus, tonicive, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensissima.
- XXI. **SCELOTYRBE**, *Danse de S. Guy*, est motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis inter gradiendum, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem præterens.
- XXII. **BERIBERIA**, *Beriberi*, est motus gradientium genua retrahens cum tremore, formationis sensu, vocis rauedine, Indis familiaris.

## CLASSIS QUARTÆ THEORIA.

## MORBI CONVULSIVI,

S E U

## CONVULSIONES,

1. SIC nominatur ea Classis a VVillifio Tom.

1. pag. 453. *Motus excedentes spastico-convulsivi*, Nenter. Tab. 108. *Convulsiones* in genere, Juncker. Tab. 53. *Morbi spastici* Bart. de Moor. *Parthol. Spasmi & convulsiones*, Heisteri Compend. Medic. præd. *Motus inordinati spirituum animalium*, Etmuller. Tom. 1. *Spasmus & Tetanus* Hippocrati, immo *Spasmata*, in Coac. Synce Aretæo: *Spasmodica partho* Galeno. *Distensiones nervorum*, Celfo. *Conductions* Cælio Aureliano. *Morbi motorii* Ill. Linnæi. *Morbi spasmodici ac spastici* Neoterici, vulgo *Spasmes* Americanis; *Maladies convulsives* Gallis; *Convulsives disense* Anglis, or *nervous malady*. Vulgo etiam *Vaporum* nomine dissimulantur, & appellantur a Raulino de affectibus sporosis, 1758.

*Spasmus* dicitur a Græco *Spao*, traho, quia convulsiones esse a nervorum retractionibus versus caput existimabant Veteres, qui tendines a nervis distinguebant.

2. Convulsio est invita & violenta musculorum motui locali inservientium contractio; unde convulsivi dicuntur morbi, quorum præcipuum symptoma est convulsio sive constans, quam Neoterici *Spasmm* vocant, & Græci *Tetannum*; sive interpolata & agitatoria, quam Neoterici *mutum convulsivum*: Antiqui vero cum Boerhaave proprie *convulsionem*, & Græci *Spasmm* appellabant.

Ut itaque cognoscatur convulsivus morbus, cognoscendum est prius in ægritudine præcipuum symptoma, seu magis obvium, de quo æger vel adstantes potissimum conqueruntur, a quo plus metuendum videtur; præterea respiciendum est an organum convulsivum sit motui locali destinatum; nec enim contractio cutis, ventriculi, vesicæ inter convulsiones potest jure referri: quod si valeret, omnes fere morbi inter convulsivos deberent referri, ut evacuatorii, anhelosi, dolorifici, febriles, inflammatorii; demum distinguendum est num illi motus musculares sint invitæ & violenti.

Utrum autem motus ægri sit invitæ voluntarius, non ita facile est dignoscere, ut dum ægri infantes, mente capti, somnolenti exagitantur violentè, nec enim possunt illi quid velint aut nolint loqui; superest itaque ut eorum gestus attente examinemus, & ex circumstantiis judicemus an motus illi sint voluntarii, necne.

Si itaque gestus, motus & positura ea serie se mutuo subsequantur in ægro, seu ita sint ordinata & concinna, ut in finem ab externis circumstantiis cognoscendum conspirent, signa

sunt motum non esse convulsivum, ut si æger aphonus, phlebotomiam aversans, sese a Chirurgi manibus magno conatu defendat.

Verum si ab objectis circumstantibus non videantur ægrotantis motus determinati, sed ab interna cerebri dispositione dependant, tunc ejus adiones sunt vel convulsivæ vel simpliciter deliræ, quod in praxi vulgo confunditur, nec distingui refert; si æger v. g. ob retinæ vitium videre sibi videtur muscas in aere volitantes, easque manibus venetur, aut floccos in stragulis legat, motus *delirus* est, non convulsivus, quia ad finem ab objecto externo imaginario evidenter determinatur; verum si nulum sit objectum, etiam imaginarium externum, ad quod conatus referatur, illi convulsionibus annuerantur.

Præterea violenti sunt conatus convulsivi; violentus dicitur motus, qui majores virium impensas exigit, quam quibusdiu sustinendis pars est motrix potentia; ita ut quo fortiores sunt respectu facultatis motricis, eo violentiores sint; unde fit ut licet in se sint debiles illi conatus, violenti tamen sint, si facultas motrix ægri sit minima, seu æger exsolutus; sic instanti tenelli certe debiles motus tum artuum, tum oculorum exerunt, dum convelluntur; alii convulsivi sunt illi motus utcumque debiles, quia si spectetur exiguus robur hujus ætatis, & musculorum illorum, maxime vero si in agone moris accedant, violenti sunt.

Phreneticus e contra & maniacus fortissimos initio morbi motus exerit, eosque levitos, aut non violentos & absonos, cum scilicet sese ab adstantibus eum vincire aut coercere conantibus expedire nititur. Demum non invitæ quicumque musculorum motus violentus convulsivis accensetur a Medicis, licet inconcinuus sit; motus enim pectoris in tussi, cordis in febre, non proprie convulsivis morbis annumeratur, licet asthma convulsivum, palpitatio hysterica his accenseantur, sed satendum est limites classium accuratos vix assignari posse, ob familiarum Medicis loquendi inconstantiam.

## Theoria Convulsionis.

3. Violenta & coacta musculi contractio Græcis *spasmus*, Latinis *convulsio* dicitur; hinc morbi spasmodici, seu convulsivi sunt illi quorum præcipuum symptoma convulsio est.

Contractio musculi, ex Physiologicis, fit per vim fluidi nervei in fibras motrices musculorum immixti, cujus scilicet interveniunt fibræ illæ corrugantur, & totus fibrarum fasciculus, seu musculus decurritur.

4. Circa mechanisimum hujus corrugationis vigent tres opiniones, 1. Bernoulliana, a Bernello accepta, supponit vesículas oblongas in fibrarum textu, quæ vi fluidi nervei spherideg, adeo-

adeoque breviores evadunt. 2. Moleriana, a *Dr. Prioui de Molieres*, supponit vasa sanguifera musculi fibrillis nerveis transversis vincta, & ex cylindris in vasa nodosa mutata; quorum alternis articulis inflatis, compressæ hinc & inde fibræ carnes corrugantur, & sic muscoli abbreviantur; 3. opinio supponit fluidum nervum electricum majori vi electrica imbui, cum a facultate animæ mortice incitatur in musculos, atque illæ fibræ prius parallelæ, & identidem transversis fibrillis colligatæ, a se mutuo recedunt in nodorum interstitiis, (ut accidit duobus filiis sic dispositis, cum electrica vi imbuuntur) sicque in rhombos dilatantur fibrarum interstitia, quod sine muscoli decurtatione fieri nequit.

5. Facultas fluidi nerveo vim imprimens ad motum muscularem in quacumque opinione, est vel *libertas*, quæ a voluntate aut noluntate determinatur, unde actiones *liberæ* dicuntur; vel est natura, quæ a cupiditate aut aversione sensitivis determinatur, unde actiones *naturales* vocantur.

*Voluntas* vero est inclinatio animæ in aliquod objectum, pro ratione boni vel mali, in illo distincte percepti; itaque motivum quod contractiones musculorum liberæ determinat, est similis seu intellectus boni vel mali perceptio.

6. *Cupiditas* vero est inclinatio animæ versus objectum pro ratione boni, & *aversionis* reclinatio eius ab objecto pro ratione mali in illis confuse perceptum, adeoque *motivum* quod actiones naturales determinat est perceptio boni vel mali, eaque confusa seu sensitiva.

7. Omnis actio corporea fit per contractionem muscularem: ergo cum omnes actiones corporeæ sint vel naturales vel liberæ, omnes motus musculares seu actiones determinantur ab alterutro ex hisce motivis.

8. *Motivum* est ratio sufficiens actionum hominis; verum nihil fit sine ratione sufficiente, ergo nulla contractio muscularis fit sine alterutro ex hisce motivis.

9. Dantur actiones seu contractiones musculares sine apperceptione motivi eas determinantis.

10. Apperceptio est cognitio propriæ nostræ perceptionis, desinente *Voluptate* docet autem experientia plures a nobis actiones fieri, ut mîdare, deglutire, oculos ad objectum dirigere, auris internos musculos ad distinctionem auditum aptare, &c. absque eo quod earum actionum utilitatem cognoscamus, dum hæc agimus: ergo dantur actiones, quas edimus sine apperceptione motivi eas determinantis. Perceptions vero illæ, quæ nos determinat, sunt obscurissimæ, vel dudum e memoria elapsæ.

11. Actiones musculorum ipsæ in corpore latent, ut eorum actio seorsim sub sensu non cadat, qualis actio musculorum oculi, alicuius internæ, gutturis, &c. sunt sine apper-

ceptione motivi eas determinantis, quia cum illas ignoremus, eas non conjungimus cum motivo, utcumque clare percepto: Illæ vero actiones nobis inscitiæ, & nolentibus sæpe sunt. Sic velim, nolim, cum objectum quoddam intueor, amborum oculorum musculi ita concinne agunt, ut palpebra superior sit semper in eadem a pupilla distantia, neque ut ambo axes optici ad objectum visum convergant.

12. Sic velim, nolim, cum progrediendi mihi consilium est, musculi lumborum, & crurum ita agunt, ut centrum gravitatis trunci mei nunc a dextris ad sinistras, nunc a sinistris ad dexteris transferatur, ut *Borellus* demonstravit; secus lapsus vitari non posset, nec proinde progressio fieri.

13. Perceptio obscura necessario confusa est, adeoque cum actiones naturales dicuntur illæ, quæ determinantur a perceptione confusa boni vel mali inde eventuri; actiones, quæ sunt juxta perceptionem obscuram boni vel mali, sunt naturales, non vero liberæ.

14. Nemo, ut puto, dubitat, quin anima sit principium actionis musculorum oculos ad visionem distinctam, crura & truncum ad progressionem momentum: vix enim hodie infantes credunt dari automata, seu machinas quæ ex se ipsis moveantur; ergo actiones, quæ nobis etiam invisitæ & inscitiæ sunt, ad animam tamquam auctorem referendæ sunt.

15. Adde, quod actiones consuetudinales imputantur, quia licet naturaliter fiant, non libere, interea penes libertatem nostram fuit olim pravas illas consuetudines avertere, & etiam nunc illas sensum amittere; sed absurdum foret imputare homini actionem mere mechanicam, ut ajunt, seu quæ ab anima non pendet; ergo actiones naturales ab anima etiam dependent, & non sunt mere mechanicæ.

16. Natura est ea animæ facultas, quæ actiones a cupiditate, aut ab aversione sensitivis indicatas exsequitur; illa est ergo principium movens musculos in omni actione naturali, seu cujus motivum est confusa, vel obscura perceptio boni vel mali, inde expectandi.

17. Actiones, quæ determinantur a voluntate simul & cupiditate, quæque proinde sunt libenter, dicuntur *voluntariæ*, ut deglutitio vini ab homine debili, scientie simul, & vinum esse optimum in hoc casu medicamentum judicante. Actiones *mixtæ* sunt illæ, quas ratio sola fundat, & aversionis sensitiva diluadet, ut porrigere brachium granatiosum a Chirurgo amputandum; injucundam, sed necessariam portionem deglutire.

18. Coactæ etiam sunt naturales actiones, quæ injucundæ, sed quibus ommissis penitus quid eveniturum timeat, ut alium cum nictibus egere in tenebris, rursus dum quid in glottidem illapsum est, sitim mittere in anxietate, quam nullus suus confans sublevari.

19. Actiones alie ordinariæ sunt & faciles, alie violentæ. Faciles sunt illæ, quarum resistentiæ sine

hinc confucto, majori virium dispendio superantur; *Violenta* vero, quarum resistentiæ magnæ sunt, & non nisi vix reparabili virium dispendio superantur.

20. Actiones itaque sunt eo violentiores, 1. quo sunt absolute majores, quod ex virium impensa æstimatur; 2. quo facultas motrix est minor; nam reparatio virium impensarum est eo difficilior, quo actura maior. & facultas eam passa minor est.

21. Convulsio est actio muscularis, quæ virium impensam ejus vehementiæ & diuturnitati proportionalem exigit. Est enim mutatio in corpore humano vivente, cujus principium est in eo ipso homine qui mutatur; ergo est hominis actio.

Omnis actio est effectus virium quarundam, quæ agendo absumuntur in vincendis resistentiis; nulla enim est actio in corpore sine resistentiis; in contractione musculari ipsius musculi inertia, rigiditas fibrarum, pondus artuum, hujus contractioni resistunt. Atque cum vehementia actionis repetatur ex mole movenda, iactura virium respondent vehementiæ motus muscularis, nec non ejus diuturnitati, quod abunde docet quotidiana experientia.

22. Actio muscularis, quæ non plus virium impendit, quam quod quotidie somno & pascu refarcitur; *exercitium* dicitur; quod vero plus impendit & deflassat, *labor* est. Qui convulsione afficitur, vere laborat, adeoque partem virium suarum non facile refarcendam amittit, atque si facultas motrix sit solito minor, aut morbus paulo diuturnior, convulsio est morbus violentus: merito itaque dicitur convulsio violenta musculorum actio.

23. Convulsio vere morbosa est coacta, proindeque involuntaria; docet observatio; nam ægri, etiam si nolint, musculos contrahunt; verumtamen dantur leviores convulsiones, quæ a voluntate determinantur, & quas etiam natura, non amplius consentiente voluntate, cum aliquali voluptate & levamine exsequitur, ut oscitatio, pandiculatio, sternutatio, quas pro lubitu excitamus.

24. Convulsio est conatus naturæ ad corporis humani statum in meliorem vel gratiorem mutandum. Illa propositio, quæ ab omnibus Hippocratis & Galeni ælceis ita admittitur, ut a nemine ex Antiquis ante *VVIII* seculum non admittatur, apud plerisque Neotericis mechanice sectæ clientis paradoxa videtur, adeoque explicanda est:

25. Labor, qui tendit ad quemdam finem, seu scopum vocatur *conatus*; quod vero convulsio sit labor, seu actio violenta naturæ prius definitæ, (16) patet ex antecedentibus; superest ut finem supra (24) indicatam, finem esse convulsionis ostendamus.

26. Natura nihil agit sine motivo, id est, homo etiam invitatus & inscius, si quid agat, aut quemdam arcum moveat, nunquam illum sine ratione sufficiente movet; nihil enim fieri

sine ratione sufficiente, id est, sine motivo, duntaxat de homine agitur, norunt omnes. Motus enim quos confectæ diæ duci, inscius exsequimur, ut nictare, dexteram præ sinistra amico porrigere, centrum gravitatis corporis ambulando hoc & illuc transferre; illud, propter motiva olim percepta (quorum memoria excidit), facimus; cum itaque convulsiones sint actiones, eas a motivo quodam determinari, seu finis cuiusdam gratia fieri consequens est.

27. Illud est finis, quo adeptio levatur homo, & aliquale volupatè perfunditur, atque a labore quiescit; verum est aliquid, licet sæpius ignotum, quod cum adeptissimus, nos volupatè saltem obscura afficit, in oscitatione, in sternutatione, pandiculatione, quæ convulsiones sunt, ut quisque expertus est pluries; ergo in quemdam finem utilem vergunt convulsiones.

28. Antequam sternutemur inspirato tabaco, sentimus aliqualem titillationem narium, quæ ad expectandam sternutationem incitatur, quæ titillatione sedata sublevamur; & finis sternutationis est, aere firmiter expiratur in nares posticas directo, tabacum, vel quid titillans, si sit, evellere.

29. Ante pandiculationem percipimus torporis quemdam totius machine, quem mutare cupimus, & illa peracta agiliore & sublevati nobis videmur. Docet autem *Sanctorius* quod inter pandiculandum & oscitandum sextuplo major quam solito exhalat perspiratio: docet *Physiologus* sanguinem fluxiorem & expeditorem evadere; & hæc est finis hæcunque convulsionum.

30. Qui eas convulsiones sine animæ concursu explicare contendunt, hos motus tanquam inordinatos, & fortuitos considerant sine fine aut scopo institutos, atque sympathiæ inter nervos olfactorios & nervos expiratorios adscribunt, intelligendo per hanc vocem, communicationem motus impressi a tabaco nervis olfactoriis, & inde nervis pectoris.

31. Verum ille mechanismus falsus est, & mechanices legibus contrarius: 1. Nervi olfactorii non possunt majorem motum communicare aliis nervis, quam quem acceperunt; verum motus, quem acceperunt a grano uno tabaci illis adherentis, & ab aliquo tempore quiescentis, est infinite minor quam motus convulsorius pectoris & totius corporis in sternutatione: ergo nec ex hoc mechanismo potest deduci sternutatio. 2. Illi motus minime sunt fortuiti & inordinati, sed constanter incipit lenta, magna, inspiratio; quam sequitur velox magnaque expiratio in nares posticas directæ, & ex mille aliis motibus æque possibilibus, ille solus sequitur, non vero risus, singultus, suspirium, oscitatio, tussis, vox, cantus, loquelæ, &c. quibus finis proposita non attingeretur, & ille solus sequitur qui naturæ cupiditatem explet; ergo iterum falsa theoria. 3. Nervi olfactorii in naribus communicant tantum cum nervis quinti paris, qui non agunt in sternutando: in cerebro vero oriuntur a locis diffisis ab ortu expi-

expiratoriorum; aut liceat in illis tenebris conjectare quod contingant nervos pectoris; tabeum tam agit tempore inspirationis, quam expirationis; æque motus debet imprimi nervis inspirationi intercurrentibus. Nulla est ratio cur constanter muscoli inspiratorii scenam ordinentur, sequantur expiratorii; cur singuli determinato modo agant. non millenis aliis æque possibilibus; ergo ex omni parte falsa est ea theoria. Præterea inde mere mechanica sternutatio sequeretur, non vero ea quam pro lubitu excitamus, aut simulamus, quam derisio inspicitur.

32. Convulsiones morbosæ in hoc a levibus differunt, quod excitentur non ab occasione externa & levi, ut est tabaci pulvis, sed a gravi molesto quodam principio interno, ut a sanguine, vel mucro acri caustico, v. g. membranam pituitariam vellente, adeoque cum illi conatus felicem sortiantur eventum, & sternutationes ægrum potius desatigunt quam sublevant, videtur paradoxum dicere eas esse naturæ conatus ad statum corporis in meliorem mutandum, cum ipsa quandoque eum mutant in pejorem.

33. Fatemur equidem & convulsiones morbosas, quæ semper signum sunt funestum, aut pravam, quandoque, non vero semper, eventum pejorem subsequi, quam quod ab eas determinante materia morbifica metuendum videtur, atque illud ita verum est, ut ratione & experientia duce ars medica eos conatus refrigerare cogatur; verum inde non evectur nostra propositio, convulsionem esse naturæ conatum ad statum nostrum in meliorem mutandum.

34. Neque enim diximus in convulsionibus morbosis conatus illos suam finem semper fortiri, nec eos, utcumque in bonam finem a natura instantur, eventum semper esse salubres. Homo qui sese scalpando crucientur, & inde ulcus grave contrahit, in bonam finem seu in levem pruritum actionem suam dirigit, eventum tamen sibi nocet; qui ut hostem stricto gladio insequentem effugiat, foveam saltu transcendit, & se involuntario occidit, non minus bonæ finis gratia foveam saltu superavit. Cum itaque homo quotidie erret, & incidat in Scyllam dum cupit vitare Charybdim, etiam in actionibus liberis, quid mirum si ad scopum aheret in actionibus naturalibus ad vitandum malum internum cuius non nisi confusa est perceptio, ageodo per organa latentia, visui abscondita?

35. Convulsiones tamen non solum omnes sunt bonæ finis gratia, verum etiam non semper sunt ominosæ. Sic convulsio quæ videtur in præliis variolarum, observante Sydenham, significat eruptionem salubrem sequenti aurora expectandam. Tussis ubi quid noxii in pulmone cavum delapsum est, ut clavi, aciculæ, sola illud expectoratur, & graves morbos prævertit. Sternutatio in puerperis, in soporosis, (bonis avibus) non raro accidit, ut alias multam observationes ab Auditoribus relatas.

36. Immo convulsiones ideo sunt terrificæ, quia funestum corporis statum designant, non vero quod semper eum statum in pejorem mutant. In morbis febrilibus acutis, sopore, delirio, stipitis, facultate exsoluta quid expectandum boni, etiam si natura hoc conatus non exerat? Grave certo cerebro imminet infortunium; & in mortis agone constitutis convulsiones sunt naturæ ultima conamina.

37. Idem est sentiendum de convulsionibus in hoc casu quod de jeccationibus ægrotantis in fine morbi, in quo per præcordia vix circulari potest sanguis, & lethalis imminet ejus ubique hærentia; æger e dextris ad sinistras, rursus e sinistris ad dexteras irrequeletus se vertat, nullius sedis fixæ patiens; hoc pluries expertus iterum sese jacitat, haud ignarus ab illis conatibus vires adeo necessarias imminui, perspirationem cohiberi, mortem accelerari; interea tamen cum situ illo præsentis nihil pejor ipsi videatur, alium situm querere invitus cogitur: homo enim a statu præsentis rerum semper gravior afficitur quam a futuro, quem prævidet tantum, & non experitur. Unde vulgo dicitur: *malum præsens est omnium pessimum*, & in desperato rerum statu, satius est anceps experiri auxilium, quam nullum.

38. Verbis expressis Hippocrates & Galenus (*lib. 6. epidem.*) convulsiones, quales sunt sternutatio, singultus, talis, osecitatio, &c. naturæ tribuunt. „ Depravati motus symptomata „ (*ait Riverius de convulsione*) alia solius naturæ sunt opera, quæ tamen a morbo quæpiam causa violentem moveri sit coacta; nam tunc autem nomine Galenus intelligit faciliatatem quæ ceteris motus in corpore necessarios, sive ex voluntatis jussu, sive contra voluntatem, & regit animal, *Lib. 2. de symptomat. causis*. *Higbormus*, *Schneider*, alii quæ convulsiones tribuunt *expultricis* a materia morbifica irritatæ, & per *expultricem Riverius*, *Higbormus*, alii quæ vim, seu facultatem animæ intelligunt. (*Vide Riverii Physiologiam de facultatibus.*)

39. Ex eo quod actio quædam sit solito frequentior, fortior, difficilior, ex eo morbosæ est, ut respiratio, cordis contractio, sæcum ejectio, quæ frequentiores dieuntur, dispnæa, febris, diarrhæa; verum ex eo quod actio hominis sit frequentior, fortior aut difficilior, non minus eidem principio, ipsi homini, tribuenda est; secus labor non esset effectus ejusdem facultatis, cui tribuitur exercitium; clamor non penderet ab eodem principio a quo pendet vox, &c. ergo ex eo quod convulsio sit actio musculorum fortior, difficilior, vel morbosæ, non alteri agenti tribuenda est quam actio sana, sed coacta & difficilis; secus etiam sine necessitate multiplicarentur. Hic valet Helmontii effatum, quod in sanis edit actiones sanas, illud in ægro edit actiones morbosas.

40. Convulsio est actio hominis, licet morbosæ & involuntariæ; est liquidem contractio muscularis; verum anima; quæ est principium vi-

ta, est principium omnium actionum hominis, ut docet fides, & philosophia orthodoxa; nam vita est series actionum tam naturalium, quam liberarum hominis (Vulphi Philos. pract. 7.) ergo anima est principium ejus actionis, quæ convulsio dicitur, ut omnium contractionum muscularum qua sunt actiones hominis.

41. Elastica retractio musculi scdli, vel ejus antagonista deficit, non est actio hominis, viget enim in cadavere, nollam vim hominis exigit, nullum conatum, & si muscoli in motu libero, vel naturali contraherentur tantum elastice, illi laxarentur in contractione, cum quiete, & sublevaretur a labore, quorum tamen contrarium accidit, quod sufficit ad confutandam opinionem *Illustr. Equivis Deidier*. Qui fluidum nervum cum cruore in musculis effervescere juxta *Borellum*, aut explodi more pulveris pyrii juxta *Villifium* putant, non mechanice, sed physice motus & virium incrementum explicant; verum illud virium incrementum explicatur per hypothesim dudum ex Scholæ eliminatam, quæ etiam non respondet phænomenis, scilicet lassitudini, quæ labori proportionalis est; nam non major est labor una scintilla magnum accendere pulveris pyrii enulum; quam parvum: ex hac itaque hypothesi, vires hominis laborando non minuerentur, quod est contra experientiam.

42. Errabant Cartesiani, qui putabant voluntatem esse potentiam motricem, quæ tantum actiones liberas, ut cupiditates naturales, determinat; immo avertit tum rationalis, tum sensitiva tam determinat motus, quam voluntas & cupiditas, ut in pathematis observare est; ergo ex eo quod actio sit contraria voluntati aut cupiditati, ea non minus ad animam pertinet, quam ex eo quod ei sit consentanea, & utriusque causa est facultatis motricis imperium in musculos.

43. Si cum irritantur nervi a materia morbifica, anima non molesteretur; & si ex hac molestia non inclinaret ad causæ noxiæ remotionem, ac demum si ex hac inclinatione animæ non ageret facultas motrix ad hanc removendam causam noxiam, inutilis foret harum trium facultatum concursus in homine, minus eluceret divina in miseris humanis Providentia, gratis & sine ullo levamine destrueretur machina, discrediretur homo, & eo miserior esset, quo molestiam perferentia, & avertens nullo conatu se posset ab ea liberare: ex theoria nostra, quæ Antiquorum est, elucet nexus, & finis harum facultatum, quas nobis concessit divina benignitas.

44. Ex eo quod homo actiones edat liberas, quandoque recte rationi contrarias, non ideo negatur illum esse animal rationale; errare enim humanum est; nec sequitur illas actiones, non animæ, sed machinæ esse imputandas; ita licet homo actiones naturales edat rectas rationi contrarias, nemo jure dixerit naturam, ea-

rum actionum auctorem, non esse animæ humanæ facultatem, aut actiones eas soli corpori tanquam potentiæ mortici imputandas esse: cum corpus in his muscularum actionibus mere passive se habeat, & nemo unquam viderit cadaver, in quo nihil deficit præter animæ imperium, sedem suam mutare, ambulare, vera musculari contractione gaudere.

45. Ex eo quod anima ignoret, & nolit motus convulsivus, concludit *Ill. Heister* ejus facultatem motricem non esse convulsivum principium.

46. Simili ratiocinio negandum foret animam esse principium movens in loquela, & deglutione; quippe ea non solum ignorat se habere musculos linguæ & uvulæ, necnon laryngis, loquelæ instrumenta necessaria; verum & ipsi Anatomici quomodo avant singula illa organa ad diversas voces & syllabas edendas ignorant maxime; ergo ignorat anima hos motus etiam in vigilantibus, a fortiori in illis qui dormientes clamant, aut qui parva consuetudine ducti se nunquam jueverunt, aut obscena locutura juramento & verbis obscenis iterum affirmant; ignorant ebrii ira commoti quid debiterent, & tamen ipsi debiterant; nolunt quosdam musculos anginosi movere, ne dolant, & tamen deglutiendo movent; ergo ex eo quod anima quosdam motus edere se ignoret, & edere nolit, minime sequitur quod eos non edat.

47. Objicit *Illustr. Archibater D. de Gorter*, non magis intelligi quomodo anima agat in fluidum nervum movendum, quam quomodo levissima causa mechanica; adeoque Animistarum sententiam Machinistarum opinioni non esse anteposendam.

48. Verum 1. ut, etiam si nemo intelligat quomodo gravitatis vis corpora deorsum trahat, nemo tamen jure dubitat quin agat in corpora causa gravitatis; ita etiam si nemo intelligat quomodo anima agat in corpus, non est dubium quin sit in anima motrix potentia, cui tribuendi sunt motus saltem liberi corporis, & nobis sufficit quod anima potentiam motricem, seu facultatem locomotivam habeat. 2. Prima idea motus & facultatis motricis in nobis enata est a perspecto nexu qui est inter animæ cupiditates, & corporis nostri mutationes. 3. Omnis observatio docet cadavera & corpora inanimata, utcumque affabre constructa, resistere motui tanto magis, quo sunt magis extensa & densa, seu quo magis sunt corpora, ita ut resistencia motui sit eis essentialis, si quid de eorum essentia novimus; ergo quantum est contradictorium, ut quod resistit motui seipsum moveat, & motum incipiat, tantum est impossibile ut cadaver in se contineat causam motus efficientem, & ut seipsum loco moveat. 4. In machinis perfectissimis hydraulicis, nedum minimis causa producat magnos motus, demonstrant Mathematici, ut *Eulerus* (*Mém. de Berlin* 1752. maxima 8.) sex septimas partes virium

rium motoris absumi in effectu edendo, seu vim morricem esse ad effectum editum, ut 7. ad 1. & *Alph. Boerllus* in homine immenso tantum robore parva pondera moveri demonstravit; *propof. 8. lib. 1. de motu animal.* Ergo Animalium sententia experientie & rationi congruit; Machinistarum vero opinio a mechanicis peritis falsa demonstratur.

49. Convulsivi morbi dividuntur in tonicos & clonicos. *Tonici* dicuntur illi in quibus constans est, & sine alterna agitatione pars, musculi contractio, ut in crampo. *Clonici* vero in quibus est alterna partis convulsæ agitatio, ut in eclampsia; prout enim natura forti contractione materiem morbosam alterare, vel agitatione eam excutere nititur, diversill conatus requiruntur. *Hippocrates* tonicos morbos *Tetani* nomine, clonicos vero *Spasmi*, seu *convulsionis* nomine designabat, ut patet ex *aphorismis 57. sect. 4.*

50. Dividuntur convulsionis in idiopathicas & sympathicas. *Idiopathica* sunt illæ quæ referuntur ad eandem sedem, ad quam refertur earum principium progredientis, ut procacitæticum, ut convulsio tendinis Achillis ab ejus vulnere, aut frigore. *Sympathica* vero vocantur, quarum sedes, & principium referuntur ad diversas partes, ut si convulsio referatur ad jugulum, & principium ad uterum, ut cum a suppressis catameniiis oriri judicatur; illius itaque divisionis fundamentum est hypotheticum, cum juxta diversas theorias eadem convulsio, quæ uni sympathica videtur, ut epilepsia a vicio cerebri, alteri idiopathica censetur: aliis idiopathicus deficitur morbus, ille qui primario in parte a sua causa producit, & ibi permanet; verum cum causa nunquam agat ubi non est, omnis morbus producit a sua causa in parte ubi est; & sive protopathicus sit, sive deuteropathicus, sive fugax, sive permanens, non minus idiopathicus est.

51. Non minus est erronea divisio morbi in essentialis & symptomaticus; juxta nos symptoma essentialis morbo est illud ex quo cognoscitur, & ab aliis distinguitur tum genus, tum species; *accidentalæ* vero quod solum individuum determinat; juxta Scholasticos, convulsio essentialis, seu per se, est quæ ab alio morbo non fuit producta; symptomatica vero, quæ alterius morbi est effectus, ut febris. Verum cum quisque morbus a sua causa, non vero ab altero morbo producat, falsa est illa definitio; supponit enim convulsionis causam esse febrem, quæ tantum ejus principium potest esse; cum enim convulsio possit existere sine febre, nec effectum sine causa sua unquam exstat, febris non est causa illius, nec proinde convulsio est febris, nec alterius morbi effectus.

52. Scholastici fingunt ad convulsionis explicandas alios nervos esse sensorios, alios vero esse tantum motores, & sensus expertes; quod cum millenis vivisectionibus falsum evincatur, admittendum non est; nulla enim in corpore est fibra nervæ quæ non sentiat.

53. In theoria morborum Scholastici ita theologiam contemnunt, ac si nulla foret in universo relictæ Providentia, nulla quæ eventus dirigeret sapientia, nec proinde morborum scopus aut finis ulla foret; cum tamen ipsa mala physica non solum in hominis probationem & perfectionem moralem permittantur, verum ipsæ convulsionis, morbi omnium periculosissimi, ad materiei morbosæ correctionem & eliminationem tendant, & a causis peioribus nos liberent, quod cognovit *Sydenham*, & experientur qui tussi, sterntatione, vomitu, pandiculatione a causis morbosicis liberantur. (34. 38.)

54. Omnis convulsio est motus muscularis; sed omni motus muscularis sit ab impetu fluidi nervi in musculum ab anima immisi, sive libere, sive naturaliter, sive labenter, sive eandem agat illa motrix potentia; ergo convulsio sit ab impetu fluidi nervi in musculos convulsis immisi; nec quidpiam est in cerebro quod huc fluendo vim & directionem requisitam possit imperiri, præter illud idem principium quo scintillus, vivimus, & loco movemur.

55. Qui impetum fluidi nervi tribuunt causis, ut ajunt, mechanicis, illi mechanicis legisbus contradicunt, asserendo a parvis viribus magnos effectus produci, aut fingunt virtute explosivas & pulveres pyrios ubi non sunt. Qui vero naturæ humanæ hosce conatus tribuunt, supponunt esse in anima faciliorem morricem, de qua nemo dubitat, & eam etiam coacte agere, quod in pathematis fieri videtur; de cætero mechanicis legisbus non contradicunt; ergo potior est eorum opinio.

56. Causa itaque convulsionis est conatus naturæ, mediante impetu fluidi nervi ad musculos immisi, quo materiem morbosam corrigere, vel a nervis removere, aut molestem & intolerabilem situm mutare contendit.

57. Principis vero convulsionum sunt vel progymena, vel procatactica. *Progymena* sunt quæcumque nervos irritant, vel dolorificæ, ut puncturæ, dilacerationes, erosiones, distensiones partium sensu acuto prædicarum, ut membranae, tendinis, vel partium irritabilium, quarum obscura est sensibilitas, ut ventriculi, intestinorum; vel demum organorum obscurissime sentientium, sed quorum integritas ad vitam maxime est necessaria, ut cerebri, cerebelli; sunt itaque illa principia vel mechanica, ut ossis fractum quo meninx vellicatur, lumbrieus in testina terebrans; vel physica, ut venenum ore susceptum, miasma intus genitum, &c. quæ omnia, etiam si acuta & pungentia non sint, loco tamen suo, & necessitate partis affectæ gravissime nocent, ut patet ex tempore gutturæ aquæ in gloriæ tussim excitantis. Illa itaque principia materialia reduci possunt ad stimulos & ad obices, eo differunt quod in morbis febrilibus stimuli & obices sint in vasis sanguiferis: in convulsivis vero morbis nervosæ partes, cerebrumque potissimum afficiuntur; arterias autem vix



fenfibles esse prænervis docet vivifectio, probat illi. Hallerur.

58. Demonstrari potest in Physiologicis, & ex propositionibus *Boerlii* 123. lib. 1. & 67. lib. 2. pondus quod musculus contractus attollit esse sexdecies saltem majus proprii musculi pondere, & ex hydrodynamicis (*Mem. de l'Acad. de Berlin* 1762. par M. Euler, maximè 7.) quod vis requisita in fluido machinam moventem sit septies saltem major pondere quod machinæ interventu attollitur, ergo vis fluidi musculos moventis est saltem 112. vicibus major vi ponderis a musculo elevati: moles & ventriculo cordis sinistro mota est columna sanguinis, cujus ne centesima quidem pars tendit in eos carotidis ramos, ex quorum finibus nervi cardiaci oriri censentur; ergo ex hydraulicis vis sanguinis a corde impressa fluido nervo, interventu ultimarum arteriolarum ad cardiacos nervos desinentium, non est centesima pars virium ventriculi cordis sinistri: sed illa ipsa vis fluidi nervi a sanguine procedens in nervis cardiacis vix est 112. virium ipsius ventriculi, dum sanguinem propellit; ex dictis ergo vis sanguinis in origine nervorum cardiacorum non est 11200. pars virium quæ cordi movendo, aut convellendo sunt necessariae. Errant itaque illi qui ex arteriolarum cerebrali infarctu & pulsatione mechanica deducunt palpitacionem sympathicam cordis, aut alterius cujusvis musculi convulsione.

59. Ex simili infarctu ad convulsione musculi non valet consequentia mechanica, ut vidimus; verum maxime valet consequentia physiologica; quippe cum natura invigilet conservationi corporis, nec possit hunc live cerebri, sive cordis, ad quod sympathice refertur, statum morbosum mutare, nisi per vim motricem, adeoque per imperium fluido impressum, illa juxta leges sympathicæ debet fluidum nervum vi solito majori impellere, quod convulsiones induciturum est.

60. Ex simili infarctu ad convulsione musculi non valet consequentia physica; ultimum scilicet Machinistarum ad incitas redactorum periculum; ajunt liquidem, ex levi scintilla magnus pulveris pyrii accensus accenditur, & effectum multoties majorem vi scintillæ excitat; ergo potest excitari consequenter ad illum infarctum vis explosiva fluidi nervi, quæ convulsivos illos motus procreat, seu valet consequentia physica.

61. Exoletam & dudum ab ipsis Machinistis confutatam hypothesim frustra ipsi recoquunt, 1. quia demonstratum est effectus suis causis non esse majores (*Voss. meth. prop. 72.*) (*Bergolin. Mem. de l'Acad. de Berlin* 1756.) 2. Quia pulveris illius pyrii in nervis existientia est fictitia. 3. Quia etiam si existeret, non intelligitur cur a grano nigritianæ pulveratæ rariis inditæ accenderetur ille pulvis ad sternutationem. 4. Multo minus quæ ratione in determinatas, & ab invicem distantes partes potius quam in alias quasvis serperet hæc explosio, 5. Denum cum ne-

cesse sit ad animam hominis motus, excitantem & dirigentem (30. & 39.) in hac ipsa hypothesi confugere, frustra sit per plura quod fieri potest per pauciora; ergo vanum est illud periculum.

62. *Sympathica* dicuntur convulsiones, quarum symptoma est id una parte, ut diaphragmate, & principium illas excitans refertur ad aliam, ut nares in sternutatione, secus vocantur *idiopathica*: qui vero has convulsiones mechanice, ut ajunt, explicant, illi in multis erroribus fundamentales labuntur (ut patet ex n. 30. & 31.) verum psychologia & anatomia hoc phaenomenum facile evolvunt.

63. Sola anima percipit in corpore jvamen, quod prostant diversæ partes, ad effectum quemdam edendum, sola eligit organa quæ in hunc effectum debent conspirare (*Psychicæ method. 1-5.*), sola musculos statim inspiratorios, dein expiratorios, ea sine potest contrahere, ut sola sternutatio ad rabacum & naribus eveniendum necessaria inter, millenos alios motus quæ possibiles sublequatur (*Dissert. sur l'action des mouvements* 27.) adeoque cum convulsiones sint conatus in scopo salubres ad statum machinæ in melius mutandum, (24.) nil mirum, si natura eas excitans, utatur organis, sive proximis, sive remotis, isque solis, quorum concursu finis intenta potest obtineri. (11. & 12.) seu si convulsi conatus aque ac liberi omnes sint sympathici, seu a multis organis conspirantibus percipiantur, quod machinistæ per verba tantum apud eos sensu vacua frustra explicare conantur.

64. Notum est molestatis nervorum principii in medulla cerebri sublequi imaginationem, seu perceptionem, illi similem, quæ irritatis organis externis, quibus prospiciunt illæ fibræ medullares, sublequi solet; pater ex amputatis, ex insomniis, &c. verum ex perceptione molesta imaginaria iidem conatus ad statum corporis mutandum sublequi debent, ac ex sensitiva sequerentur; ergo ex vitioso statu cerebri convulsiones, æque sublequantur in diversis partibus, ac ex ipsis irritatis partibus sublequantur; unde difficile est sympathicas convulsiones ab idiopathicas distinguere, sed falsum est omnium convulsionum principium in cerebro latere, ut putant plurimi.

65. Principia convulsionum præcaturifica sunt diversa animæ pathemata; cum etenim pathemata sint vehementes & irrationales quorundam objectorum cupiditates, aut aversiones (*Proleg. 218.*), adeoque causæ coarctum saepe anomalorum, ad hæc objecta removenda, vel illa admovenda, si objecta illa fuerint imaginaria, conatus vehementiores, nec tamen objectis externis correspondentes erunt, adeoque convulsiones; unde non mirum si convulsiones hysterice apud eas sint frequentissimæ, quarum animæ pathematis est semper exagitatio, & a pathematis, ut curis, sollicitudinibus, ærumnis exacerbentur. Non mirum si viri adulti mascula educatione, robotati minus in morbis convellantur, quam quærit.

perit debili, delictaque animo præditi, & mulieres ingenio vivo, turbulento, & pathematis vexato donatæ, ut mercurialis, risiole, anxie.

66. Nullum est animi pathema, quod convulsiones vel pluribus communes, vel sibi proprias non exciet, si morbos a viscerum violentis causis oriundos convulsiones annumeremus. *Terror* horrorem, frigus, cordis palpitacionem, epilepsiam excitat; *avertio* cibi nauseam, vomitionem, gutturi Ariduram; *radium*, excitacionem, paniculationem; *terrificum*, tripudium (spasmodicum) eclampsiam.

67. Quoniam vero nihil est tam efficax ad suppressendum quoddam animi pathema, quam alterius pathematis excitatio, nihil etiam est aptius ad conatos convulsivos priori pathemati annexos suppressendos. Sic apud vulgus notum est quod superstitiosa fiducia in amuletis & variis verbis, sicut & gravis quædam contumelia singulorum suppressit, rursus suspendat, aculsum febrilem retardet, illsertutionem arceat, quamdiu levissimè afflicta anima ab horum symptomatum principis morbofis, quam a novis pathematibus obiectis.

68. Sunt millena animi pathemata, quibus affici multos pudet, tum quia eos in loco tali constitutos, vel maturam vitæ adeptos dedecet; tum quia hisce pathematis cedere omnibus torpe videtur. atque licet illorum phenomenæ externa reprimatur, & æger hæc caute dissimulet, non minus ab eorum effectibus interius divexatur, immo fortius excrucietur; quam si non coerceret, simulque difficillimum est Medico horum effectuum causam, vel principium attingere, aut divinare quod celatur; cum vero ignoto morbi principio, curatio specialis dogmatica nulla inflicti possit, difficile est morbis a pathemate oriundis mederi, hinc fit ut hysteris, & hypochondriasis; ac mania & melancholia, sive erax & opprobrium Medicorum.

69. Verum & alia longe major difficultas in his morbis dignoscendis & sanandis est, quod pathemata continuo mutantur, & contra ipsam imaginationem & naturam, a qua foventur, inlicitur ratio vel religio, ita ut pathemata inde oriunda multifariam sint complicata: hæc animæ turbas maris fluctibus in tempestate seminatæ subvertentibus conferunt Poetæ, & notant quicumque; dum pathematis vexantur, paulo attentius eam facultatem suam pugnā examinauerunt; sit tamen tantum a philosophia sua sibi leve. Cum itaque in hisce casibus, qui apud juvenes frequentissimi sunt, homo si bimetipsum ænigma sit imperferutabile, nec seipsum cognoscat, quanto difficilior erit Medico motiva adionum naturalium alterius divinare, seu diversa negotationum illius motiva introrsere.

70. Huc pertinent symptomata morborum quamprimum cum a sanis, tum ab ægris, quod vix olim credidissimæ, simulata & ficta. Vidi non semel puellasque, ut matri vel patri ipsas

nimium diligenti durum negotium facerent, non solum morbos graves simulabant, sed & amarissimæ remedia, phlebotomias, emetica per bene multos dies experiri non recusabant: vidi moniales, vidi libidinosas in Monasteriis detentæ epilepsiam, maniam, hæmatemesim, syncopem, hemiplegiam per menses integros fingere. Et quis dubitat quin ad suum parochum Grandierum perdendum Laudunenses obsessio nem per duos annos simulæ se sint moniales: quin millenæ Fansticæ Gabenensis se similes religionis gratia comedias olim egerint; quin milleni nostris temporibus ab *Isa. Berquet* descriptis convulsionum larvas indigerint. Quæ quidem simulationes morborum, etiam in ægrorum fabris veris, odii, amoris, vindictæ gratia erga maritum, socerum, forem, privignam, socrum; &c. quotidie; ni fallor, tactæ possunt observari, maxime apud hysterics.

71. Si quis vero parum expertus existimat quosdam morbos non ita simulari posse, quin facile traus a Medico detegatur; si judicet syncopicum v. g. flatum, palpitacionem, singultum non dari simulatum, quia motus cordis, ventriculique liberi non sunt, ille vim imaginationis non perspectam habet, & ignorat eos qui perhelle personam in theatro induunt tragædram non minus commoveri, quam si verè iis pathematis laborarent, quibus repræsentandis incumbunt; qui oscitationem & pandiculationem simulat, ipsi non raro inviti oscitant & pandiculantur, ut.

*Qui simulatur amare,*

*Sape quod incipiens finxerat esse, suit.*

Ita & qui fingit morbos, in eos etiam incurrit; ut ex terrore sincero, ita ex simili pathemate bene simulato cor palpitat.

72. Principia moralia pathematum, adeoque convulsionum sunt irritabilitas, seu sensibilitas, passivitas, debilitas & consuetudo, hæc ipsa sunt convulsionum principia progymena, quæ ideo moralia voco, ut distinguantur a materialibus, scilicet a materiæ morbosicis tum irritantibus, tum obstruentibus.

73. *Sensibilitas* ab educatione molli, effeminata dependet; fovetur a vita stultitia, umbrellis, solitariis, auctur ab æraminis, a sollicitudinibus; qui semel operationem chirurgicam experti sunt, ad scalpræ aspectum trement, & convelluntur.

74. *Passivitas*, seu timiditas valde ad convulsiones disponit, ut eam sensibilitatem exquisitiorem, summam debilitat & vitium exsolatio, quæ mortis aut summi mali periculum committit, ad convulsiones etiam disponit, non secus ac *conjuratio*; sunt siquidem convulsiones levidenses, quæ si negliguntur initio, successu temporis convellunt. Sic vitio educationis sunt qui in cœnibus oscitant, & indecore pandulantur, aut allos motus initio epocypiles, deinde

vero longo usu necessarios & involuntarios edunt; ideo autem omnes actiones dudum assuetæ evadunt naturales, seu sunt independentes a ratione & libertate, quia consuetudo est facultas agendi propter motiva olim percepta, quorum sumus oblii; olim ob levem oculi stimulum aliquid levamen perſentit homo a repetita nactatione, & nactando assuetus est; dein absque stimulo nactare perrexit, ut omnes actiones assuetæ sine consilio & liberatione sunt; sic tabaco assueti, licet ab eo abstinere decreverint, etiam cum studio acius incumbunt, propoliti sui immemores perulas perſcrutantur, ut pyxidem tabacariam inveniant; consuetudo itaque altera ideo natura dicitur, quia sine motivo externo præſente actiones, velut invitas & irrationales, exſequitur.

75. Convulsiones quasdam comitatur anæsthesia, seu sensuum omnium exteriorum obſcuratio, ut videre est in epilepsia, eclampsia, hysteris infalibus, aliisque gravissimis paroxysmis; huius vero duplicis symptomatis causam, scilicet convulsionis & anæsthesiæ, putant esse inæqualem cerebri compressionem; quippe ut influxum fluidi netvei in partes convulsas explerent, alios nervos a compressione immunes fingunt, alios vero in origine compressos, ut anæsthesiam intelligant. Obstat itaque necessitas convulsionis explicandæ, quominus æqualem in toto cortice cerebri compressionem admittant, qualem in apoplexia admittunt.

76. Verum hæc hypothesi non felicius est cæteris; quippe cum fluidum nervum per liberos nervos influat ad convellendas partes, quidni ad sensiferos motus non refluxit? quidni sensus in quibusdam partibus saltem convulsis viget? Si ea fit causa, quorū tot dantur casus in quibus est inæqualis compressio? mirum enim si unquam ea æqualis sit in vulneribus, fracturis, in quibus sæpe nulla est epilepsia? Dudum repugnat hydrodynamica hæc opinio (53).

77. In eclasi, catalepsi, magnisque animæ pathematibus, sensuum omnium exteriorum sensationem observari docet historia medica. Ex

magno gaudio, metu, mœrore animam in somni speciem, quæ vulgo animi deliquium, incidere notum est omnibus. Mouacbus Hippo-nensis, teste & autopta diro *Augustino*, illud habebat in organa sua imperium, ut quoties vellet gravi contemplatione abreptus, visum, tactum, auditum suum suppresserit. Vidi ex gastrodynia supervenisse gravem animi deliquium, a quo ægra subito a doloribus liberata a priori morbo convuluit.

78. Cum animæ attentio limitata sit, non potest ea ab statu cerebri interno valde affici, quin minus ad organa sensuum attendat; verum in insarctu cerebri duplici de motivo tota animæ attentio intus detinetur; primo quidem, quia ab insarctu illo gravissimum immi-nere sentit suo domicilio periculum, cum ex eo insarctu non raro mors apoplectica, abscessus, sanguinis effusio, lethaliaque alia mala in cerebro subſequantur; secundo quia ab origine nervorum compressa dolores atrocissimi (docente vivisectione) ideæque conterritum, tulſurum, simulque gravissimarum sensationum terrificarum exoriantur, quibus ita mens percellitur, ut ne minimum quidem ad clamores, puncturasque exteriorum partium queat attendere. Quis in medio domus suæ, dum incendio conflagrat, vel summo fragore fracta in ca, ut illabitur, quæ in vicis aut plateis clamant vicini, potest capere, aut auscultare?

79. Verum hie terror ille fit panicus, ut cum spectra dormientium oculis observantur, & a rinnta strepitus terrifici aures percellunt; siue legitimi, non minus sympathicæ convulsionis exoriri debent, siue inconcinni & perturbati conaris, quales in tressactis, iracundiis, furiosis, deserrandis observantur; nec necesse est ad hunc statum inducendum, ut sit in cerebro materies morbifica, cum non minus a diro dolore aliarum partium anima commoveatur, & epilepsia a punctura tendinis, a pnoneurolis laceratione, ventriculi & intestinorum torminibus, lumbricorum terebris, venenorum erosionibus subſequatur, in quibus casibus vitium in cerebro gratis fingunt Machinistæ.

## CLASSIS QUARTA.

### SPASMI,

#### S E U

### MORBI CONVULSIVI,

**R**ECTIUS *Cacocinesia*, seu motus depravati musculorum motui locali destinatum. E loco moventur tantum artus superiores, inferiores, caput, oculi, lingua, maxil-

la, cor, penis; pectus enim tantum motu dilatationis & constrictionis agitur, ut arretitæ, cæterarum vero partium motus, ut pulmonis, ventriculi, intestinorum, vesicæ, uteri, sub sensus non cadunt, & ex voce, excretis, aliisve phœnomenis inferuntur.

Hinc differunt morbi spasmodici a *dyspnœia*, seu *anhelationibus*, in quibus diversæ pectoris constrictiones ac distensionis alternatæ observantur; motus vero lingæ ad pſellendum atinent.

Omnis spasmus propriè dictus est motus muscularis; sed omnis motus muscularis tribuendus est vi fluidi

fluidi per nervum in musculos affluens, ejusque impetui proportionalis est motus illius intensitas; ergo causa motus convulsivi est impetus fluidi nervi in musculum ejus inertiam vincens; motus vero fluidi nervi non circulationi, non explosioni, non mobilitati tribuendus est, cum ad quemcumque musculum movendum requiratur vis in fluido nerveo notabilis, demonstrante *Borelli* quæque possit ipsi fluido velocitatem soni velocitate multo majorem impertire, ne evicimus *Dissertation sur la cause de la fièvre à la suite de l'Hémorrhagique*: ergo a vi circulationis fluidi nervi velocitas sufficiens minime deduci potest; explosi vero *VVilliana* est mere fictitia.

Omnis fluidi nervi vis movendis musculis par & sufficiens, vel a libertate, vel a natura imprimitur, docet *Physiologia*; verum convulsiones non sunt motus liberi, cum nobis in scitis & invicis peragantur; motus vero a nobis instituti, qui liberi non sunt, naturales evocantur: ergo a natura imprimitur fluido nerveo velocitas ad convulsionem requisita.

Natura determinatur ad agendum, vel ab irritatione, ut se a molestia liberet quo modo potest, vel a pathemate, ut terrore, metu, ira; immo a motivis quæ intellectui sunt impervia, ut ipsæ actiones morales in hysterisis, morosis, facuis, ebriis; ergo similia motiva convulsiones determinant.

Spasmi improprie disti sunt *contractura*, quæ a rigescencia tendinum & musculorum dependet, abique aucto fluidi nervi in eos influxu, & *remuli motus*, qui ab irregulari eo influxu, non tamen intensiori dependeat. Hinc liquet cur aptius hæc classis *Cacocinesia* titulo deberet insigniri.

Classis hæc a dyspnoeicis separata quibuscumque valde affinis est, in quatuor ordines dividitur, quorum duo continent *spasmos tonicos*, seu in quibus muscoli constant & immobiliter contracti remanent; & alii duo *spasmos clonicos* amplectuntur, in quibus pars convulsa exagitat. Sæpius tamen consoci commixtæ observantur clonici cum tonici, sed eos clonicos accensimus in quibus sæpius & constantius vigent motitationes & reciproce.

## ORDO PRIMUS.

### SPASMI PARTIALES TONICI;

*Conductions Cæli Aureliani; Convulsiones tonica Gorteri, Ettmulleri.*

**I**LLI sunt in quibus præcipuum symptoma est invicia, violenta & constans partis rigiditas, cum motus impedimento, vel saltem ejus immobilitas. Unde differunt a generalibus in quibus plurimæ partes, plures simul arcus immobiles sunt.

Ea immobilitas differt a paralytica, per sensibilitatem & rigiditatem, vel saltem sensibilita-

*Sauvages Nosologia Methodica, Tom. I.*

tem musculi immobilis; differt ab ea quam dolor arthriticus, vel rheumaticus excitat, quia voluntaria est in dolore immobilitas, involuntaria in spasmus. Qui dolent aliqua parte propter ejus inflammationem, vel infarctum, ab ejus partis motu abstant, ne dolorem intendant; alii spasmus detentam partem nequidem movere possumus etiam si velimus.

Differunt spasmi tonici a clonicis per constantiam partis immobilitatem, quæ est inconstans & alterna in clonicis, seu motibus convulsivis.

Immobilitatis causa est in musculo resistentia solito major, tum ex parte musculi rigidioris violentius contracti, vel ex parte organi movendi: illa autem resistentia, vel absolute major est, vel respectiva: absolute ut cum tendines, ligamenta musculi duritiam nimiam conceperunt, aut cum musculi ab influxu fortiori fluidi nervi rigescunt; respectiva major est, si musculi antagonistæ ob ulus defectum, ob debilitatem nativam vel accidentalem minori vi quam par est contrahantur.

### I. STRABISMUS, *Strabismus, Ægri Strabones.*

Est affectus tonicus alterutrius oculi, quo fit ut cum altero ad visum non convergant axes optici. Axis opticus est linea recta, quæ centra vitrei, crystallini, & globi oculi conjungit, & quæ ad obiectum usque extensa censetur. Ad visum requiritur ut axis oculi dexteri ad idem obiecti punctum concurrat cum axe optico sinistri; ex angulo ab his axibus intercepto obiectorum magnitudinem & distantiam inferimus: ergo si divergant axes, ut in strabonibus, ex visu nec de distantia, nec de magnitudine obiectorum judicare poterimus. Ideo obiectum simplex percipimus, licet duobus oculis aspectrum, quia convergentibus oculis imago obiecti incidit in polum opticum utriusque oculi, & assuevimus in his circumstantiis experiri ab obiecto unico illam sensationem excitari; verum divergentibus oculis præter consuetudinem, imagines ejusdem obiecti cadunt in loca oculorum non sibi correspondentea, & cum ea duplex sensatio inassueta sit, eam appercipimus, non inveniamus ambas ad unum, sed ad duplex obiectum referimus; unde visus duplicatus apud eos qui recenti strabismo laborant; qui tamen error assuetudine, mediante tactu, corrigitur.

1. *Strabismus a luscitate Boerhaave de morb. ocul. num. 174. Porterfield. Essais d'Edim tom. 3. L.*

Luscitas est qui alterutro oculo non directe, sed oblique, & limis oculis obiecta adipiscere cogitur, ut distincte videat; si iraque unus, oculus tantum oblique videre potest, alter oculus non convergit cuneo, & strabismus adest. Vide *amblyopiam luseorum*.

Luscitas seu visus obliquus fit, s. ex eo quod medius retina locus non bene sentiat, unde recte conspecta obiecta obscure videntur, oblique vero posita distincte: hinc assuevimus oblique

aspicere ob vitium retinæ, quod curatur ad amaurosis paralytica; 2. vel ob mutam corneæ convexitatem lucis radii refracti non tendunt ad medium retinæ, sed ad alterutrum latius, & illud vitium vix acce corrigi potest. 3. Si ob concussionem oblique positum ut crystallinum, idem subsequitur vitium, non magis emendabile. 4. Vidi puellam cuius pupilla non apparebat, nisi versus magnum oculi-canthum ob leucam corneæ, unde strabo erat. Hoc vitium resolventibus mendicaminibus corrigi potest, ut felle bovis, myrrha. *Porterfield, Essais d'Edimbourg. tom. 3. 289. & 296.*

2. *Strabismus vulgaris; Vici a la Monturency. L.*  
Ille est in quo, propter pravam consuetudinem alterum oculum unam versus partem continuo dirigendi, amittitur facultas ambos axes opticos pro lubitu huc & illuc convergendi; sic infantes, qui in cunis degentes candelam vel lucem fenestræ ex uno tantum latere respiciunt, strabones evadunt, necnon qui in naso vel punctum respicere assuescunt.

Infantes recens nati oculum unum seorsim ab altero movent huc & illud ut chamæleontes; at successive observant objecta distinctius, vel clarius cerni ambobus oculis, & sic eorum axes opticos simul ad idem objectum dirigere addiscunt, quæ directio dei naturalis evadit, ut a voluntate vix mutari queat.

Illa species facile præcavetur, facta vero curatur perspicillis concavis, conoideis, apice tantum pertusis, (gallice *maquis a louchete*) vel apud adultos attentione, & minorum ante speculum lectione.

3. *Strabismus Buffoni* Mem. de l'Acad. des Sc. 1743. quinta species *Porterfield Essais d'Edimbourg tom. 3. pag. 298. L.*

Ille est qui pendet ab alterius oculi debilitate, seu quod cum inæqualis sit distantia ad quam visus amborum oculorum pertingit, fortiorem oculum ad objectum dirigere assuescimus, & debiliorem omitimus, quia ad objecta cernenda inutilis est, quoties ea ad distantiam alteri necessariam remouentur; sic oculus dexter non videat ultra semipedem, & sinister ultra pedem, objecta unico dextro respiciamus, unde strabismus, qui curatu difficilis est. Nomen habet a D. de Buffon Acad. Reg. Paris. Socio, ejus speciei Auctor, Mem. de l'Acad. des S. ann. 1743.

Debilitas alterius oculi est vel nativa, & tunc incurabilis; vel a paralyti, epileptiæ insultu dependet. Vide *horum verborum hystorias & curas.*

Varietates strabismi sunt strabismus *convergens*, qui adest oculorum axibus se decessantibus; strabismus *divergens* oculorum axibus non convergentibus, sed ad libellam compositis; strabismus *inæqualis altitudinis*, cum alter oculus sursum, alter vero deorsum tendit, is aspectu ingraticissimus.

4. *Strabismus spasmodicus. L.*

Ille est qui producitur ab alterutro musculo innius vel amborum oculorum convulso, ob in-

solent eclapsæ vel simplicis convulsionis quoddam prægressæ, quæ factum est ut musculus ille mobilitatem suam amiserit; tunc oculus rigidulus est, & digito resistit, atque constanter est sinisterior, dexterior, deorsum, vel sursum versus, quod deforme & incommodum. Vide *remedia contractura.*

5. *Strabismus a paralyti.*

Si alteruter ex musculis rectis, paralyti, vulnere, ulcere, quavis de causa laxatus & resolutus fuerit, tunc antagonista convulsus manet immobilis, ut accidit ori in hemiplegia; aut totus oculus paralyti potest affici, & tunc immobilis, fixusque manet, nec convergit cum sano; distinguitur ille strabismus ab spasmodico, quod oculus facile versus musculum relaxatum verti queat: cura eadem est ac paralyticos.

6. *Strabismus catarrhalis. B.*

Est ille qui a congestionem dolorificam, catarrho, vel alterius similis indolis inalterutro musculo dependet, ita ut dolor impediatur ne ille musculus libere moveatur.

Ille strabismus facile curatur per phlebotomiam, fomenta resolventia, & auodyna; sed cavendum ne narcotica oculis opponantur, junde enim amaurosis timenda est.

7. *Strabismus symptomaticus; Strabismus craniæ* Boerhaave. A.

Est oculi conversio sursum, quæ in morbo gravi sub finem accedit; & infantibus in hydrocephalo interno, in eclapsis, febribus, &c. paulo ante mortem supervenit; vulgo dicitur hos tenellos suam patriam respicere; quare musculus elavator, non alter convulsus maneat, ita ut solum oculi lagum appareat, ratio me latet.

8. *Strabismus lagophthalmicus* 488 de libere. L.

Est retractio constant palpebræ superioris ad superiora, ita ut oculus ea parte nudus, etiam inter dormiendum, appareat, ut leporibus solenne dicunt.

Hoc vitium propter affinitatem ad strabismus reducitur; hujus vero principia non satis ab Auctoribus sunt delineata.

9. *Strabismus myopum* Vici *Frangoise. L.*

Myopes sunt illi qui proxima tantum distincte, remota vero confuse cernunt, seu in quibus visus extensus est brevissima, ut duorum tantum pollicum; ita ut cum quid distinde videre volunt, illud objectum prope oculum alterutrum ponant, & tunc ut sibi lucem non eripiant, oblique e regione fenestræ objectum uno oculo respiciunt, alter vero oculus utpote inutilis non convergit.

Sunt etiam strabones qui propter myopiam, quando alios homines alloquuntur, cum non positi sint ad eam proximitatem, quæ alloquendum faciem distinguant, eos directe inspicere negligunt, & tunc oculi divergunt.

10. *Strabismus squinialis* Bartel. Voyage en Asie. L.

Gens *Juggas* dicta, ad septentrionem Abissiniæ degens, necnon *Loangoenses*, seu *Albini* Lucitavis dicti, vulgo *Nègres-blancs*, qui habitant

inter 28. 40. longit. & 5. latitud. meridian. in Asia; strabismus sunt obnoxii; ambo vix distant 5. vel 6. gradibus a linea aequatoris: jagasses sunt proceri & deformes, ferro cadente sibi faciem virgant, album oculi tantummodo ostendunt, pupillam interdum sub palpebra recondentes, ne a radiis solis, quos arenosum solum reflectit, laedantur. Mulieres ut placeant, quatuor incisorios superiores, & dentes duos inferiores avelli sibi crant.

*Loanguenses* albi nascuntur, sed intra biduum nigrescunt, irides sunt griseae, capilli fulvi, oculi strabones, & nyctalopes, interdum nil vident, noctu optime; a Mochissis seu idolis suis, omnes morbos inmitteri putant.

#### 11. *Strabismus caligantium.* L.

Caligantes sunt illi qui propter vitium sensibile, & externum non clare vident, ut propter leucomam, hypopymn, pannum, pterygium.

Si itaque opacitas corneae sit in pupillae regione, tunc aeger cogitur videre lateraliter ex spatio inter leucomam & nares, vel inter leucomam & angulum externum posito. Vide *curam caliginis*.

#### 12. *Strabismus a crystallino.* L.

Hæc species est, quæ, forte hiditia, pendet a crystallini laxatione, seu quod crystallinum sit oblique ad pupillam locatum, cum enim in hoc casu quæ coram aspiciemus, dimittant radios qui a crystallino oblique refracti incident, non in medium, sed in latera retinæ; æget ut clarius videat, cogitur aspicere oblique objectum, ita ut conus lucis refractæ ad medium retinæ incidat, ubi clarius cernat.

### II. TRISMUS, *Tic.*

Est morbus cujus præcipuum symptoma est convulsio vel tonica vel clonica maxillæ inferioris.

Trismus est sæpe aliorum morborum symptoma evidensius, ut Epilepsiæ, Tetani, Carintherici, &c. estque convulsio musculorum masseterum & crotaphitarum, necnon pterygoideorum internorum & externorum, demum etiam digastricorum qui soli maxillam depriment. Nervi his partibus prospicientes sunt, 1. maxillares superiores; 2. maxillares inferiores qui sunt quinti paris rami; 3. sympathici minores, seu rami auditorii pars durior, quæ a septimo pari oritur; musculi octo maxillam elevantes sunt longe fortiores duobus depressoribus, & pondere maxillæ eam deprimentibus; itaque nisi imperio animæ laxentur elevatori, sola eorum elasticitas illos contrahit, & os clausum retinet, quod in aliis partibus locum non habet; hæc est illa oris clausura quæ in syncope, in cæro, apoplexia & cadaveribus recentibus observatur: sed præterea facile convelluntur, elevatori ut a frigore matutino, & cum contracti remanent, trismus est tonicus; si agitentur, trismus est clonicus; non ideo in dno genera dividendus.

1. *Trismus nascentium* Heister de maxillæ spasmo in infantibus, Medic. Compend. pag. 337.

*Trismus Balaenarum* Cleghora, de morbis infusæ Minoræ, *Tetanus maxilla in infantibus* Hofar. Ad. Helvet. Tom. I. pag. 75. Gallico la *Sarrete*. A.

Hic morbus dudum Obstetricibus ubique fere cognitus, ut in Occitania, Gallo-Provincia, Helvetia, Minorica, &c. Medicis hætenus fere ignotus, apud recens natos a die ortus tertia ad duodecimam est frequentissimus, & ita funestus atque incurabilis censetur a mulieribus, ut ne Medicos unquam accerant.

Symptomata; sicut insolito obscurior morbum declarat, oris apertura minor, gingivæ duabus circiter lineis a se distantes remanent, sine rupturæ periculo immutabiles; labiorum motus fere nullus, deglutitio tamen in ore contentorum facilis, at lactatio fere impossibilis, alvus constipata, flatibus distensa, pulsus sanus intra duas dies, absque ulla symptomatum mutatione; sæpe necat infantulos, licet antea vegetos & felici partu editos, quandoque sensum collum totiusque truncus & artus etiam tetano obrigescunt; muscularis quadratus labii inferioris duritie lignum emulatur.

Hic morbus hieme & cum aura humidâ sæpius advenit quam sicca æstate.

Quo oclusas ortu suo prehenduntur hoc morbo infantes, eo periculum majus; quo angustior est rima inter gingivas, eo funestior eventus; quo debilliores etiam, eo facilius obeunt. Tetanus trismo junctus non facit morbum graviores. Si morbus quintam diem attigerit, bene ominandum est: hic valde alagium; qui temperat lucratur, omnia lucratur.

*Cura*: Emetica & cathartica ægrotulos prima die e medio tollunt. 1. Omni opera cutandum est: ut antiantur infantes qui papillam nutriticis fugere nequeunt; cochlearibus lactis infusi sunt suffocandi vel pulmenta fluida bis in die infundenda in os. 2. Spasmodum vehementia est temperanda per nervina & roborantia blanda; sunt mixtura ex aquis florum tilia, herbæ paralyticos, borraginis, buglossi, ex syrupo de pæonia, de althæa, florum tunicæ, pulvere de Guttæ, & pauxillo nitri, ex exiguo cochleari identidem ori instillantur.

*Recipe* pulvis de Guttæ, gr. iv. æquumervi philosophice preparati, cinnabaris, ana, gr. iij. ambra grisea, gr. i. sacchari rosati, gr. v. misce, sint pulvis dividendus in tres vel quatuor doses, singulis sex horis in syrupo de pæonia sumendus.

Externe partes convulsas oleo rosaceo, vel liq. aliorum alborum inunctas calido linteo reges, clysmata ex lacte vaccino tepido bis per diem iniicienda, vel suppositoria ex butyro recenti. Calore debito foveantur hæc tenera corporcula; ab spiritibus, quæ *Lewinsius* valde laudat, cavendum esse docet *Hoferus* qui sua methodo quartam vel tertiam partem infantum servavit.

Hic morbus quandoque adultos etiam aggreditur, cujus vide historiam & curam in *Adis Helveticis* Tom. xi.



2. *Trismus Traumaticus* Heister; *spasmus maxilla a vulnere*, Compend. Med. cap. 15. Chirurg. cap. 57. a luxata *sesamoides pedis*, Pouteau de la rage, p. 34.

Hoc accidit a vulnere musculorum maxillæ, aponeurosis crotaphitæ, punctura nervorum hic densissimorum, aut ab acris vitriolicis similibusve, vulnere harum partium applicatis, nec non a brachio aut pede amputato, cum nervi a ligatura sunt contracti, aut cum aliunde nervi sunt puncti.

In his casibus; 1. si acre aut peregrinum quid vulneribus inhæret, illud caute inquirendum & removendum, frustra secus omnia nervina & sedantia adhiberentur; 2. si nervus sit punctus, illum, si mortis periculum imminet, penitus rescindere opus est; 3. si nervus distingui nequeat & vires sinant, tunc pedem aut brachium, in quo latet iste nervus, citissime abscindere opus est; 4. caustica si sint, ut vitriolica, quæ nervi læsant, ea simul eluenda, tollenda; 5. si nihil peregrinum sit in vulnere, irritatio est sopienda decoctis emollientibus ex radice althææ, foliis malvæ, violæ, floribus chamæmeli feminibus lini, papaveris; cataplasmata ex his applicanda; 6. si inflammatio accesserit, sanguinis impetus phlebotomiis temperandus, nec non diætâ tenui, potu refrigerante, nitroso averteendus; 7. vulnus, si ab scopeto inflictum sit, dilatandum & aponeuroses internæ distractæ scalpello scindendæ, ut strangulationes solvantur; 8. si tendo vel nervus sint puncti, antequam ad excisionem horum deveniamus, oleum terebinthinae calidum, purum, vel cum aqua Regiæ Hungariæ mixtum, vel balsamum peruvianum vel copaivum identidem infundenda sunt; si magna hæmorrhagia spasmos inducat, vide *convulsiones in clemis*.

3. *Trismus inflammatorius* Hister. Chir. c. 57. A. Si musculorum maxillæ vel tonsillarum inflammatio impedit quominus maxillæ ab invicem diduci queant, ista inflammatio repetitis phlebotomiis, potu diluente, cataplasmatibus emollientibus & resolutivis est discutienda. Interea cum æger ob maxillas clausas cibum non valet assumere solidum, iuscula rimis, vel ubi dens quidam deficit, infundenda, aut clysmatis forma injicienda in intestinum.

4. *Trismus scorbuticus, genarum rigiditas* Sennett. de scorbuto, pag. 744. Salomon Alberti de scorbuto. G.

Est rigiditas tendinum & ligamentorum maxillam inferiorem in articulo suo connectentium, cum dolore, scorbuticis quandoque, sed raro, accedens, in malicatione atque oscitatione dolorem majorem excitans. Curatur ut contrafactus scorbuticus.

5. *Trismus verminosus. Stridor dentium a vermibus*. A.

Frequens est ille effectus, in quo inter dormiendum aut vigilandum strident dentes, convulsione scilicet pterygoideorum, quos forte ciet vapor acido-dulcis e ventriculo exhalans, vel

irritatio ventriculi ejus tunicæ mediante æsophago cum faucibus sunt continuæ; quandoque trismus ille synochum verminosum comitatur & vermifugis curatur, in variolis etiam observavi illum trismus.

6. *Trismus equinus* Soleyse, Gallice. le Tic. Sic dicitur, quia equi hoc affectu laborantes dentibus præsepium impetunt, & sonum sic reserunt.

7. *Trismus crepitans, claquetter des dents*. Est symptoma febrium intermittentium, & tremore comitatur.

8. *Trismus hypochondriacus. Cacothès Juvenalis*. L.

Novi hominem melancholicum qui, etiam dormiens, a pueritia stridet dentibus, ita ut dentes sint admodum detriti, nullo alio sequente a multis annis incommodo.

Huic referri potest distorsio masclorum genas, oculos, & maxillam moventium involuntarie & pravo usu assueta, quæ vulgo Tic dicitur.

9. *Trismus arthriticus; podagra dentium* Storbelbergeri. L.

Est difficultas maxima & valde dolorifica aperienti odore rigiditatem musculi crotaphitæ aut masseteris, per menses quandoque excrucians, cum uberrimo pyralismo, pervigilio & muscularum vicinorum continua agitatione.

Atrocem illum morbum quem ab odontalgia oriri suspicabar, extractio dentium non mutavit, irrigatio aquarum Belliucanarum sedavit, sed narcotica singulis diebus magis profuerunt. Mane recrudescobat prius sopitus quoties ægra os aperire volebat.

10. *Trismus febrilis; stridor dentium in morbis acutis*. A.

Stridere dentefve collidere, si cui a puero familiare non sit, fanaticum atque mortiferum; si quis vero delirans id faciat, omnino fœnulum. Hippocrates in Coacis.

11. *Trismus capistratus. Brediffure*, Hazon Journ. de Med. Mars 1761, pag. 249.

Ægri dicuntur vulgo capistrati, Brediff.

Est impossibilitas diducendæ maxillæ inferioris a superiore, propter agglutinationem interioris partis genarum cum gingivis.

Illa agglutinatione frequenter accidit illis qui pyralismum mercurialiorem uberem passi sunt sine cautela; ulcuscula siquidem genarum exsiccata adhærescunt gingivis, unde maxilla diduci non potest; hinc fit ut vix aut non nisi liquida guttati deglutiri possint alimenta.

Curatio exigit operationem Chirurgicam, id est, excisionem partium adhærentium, earum sectionem, quæ initio per turundas interpositas in dies crassiores, deinde per laminas ex plumbo vel ex subere factas, absoluitur, quæ proportionem cicatrix efformatur. Vide l'Observation singulière de N. André Chirurgen à Versailles pag. 383.

12. *Trismus Occipitalis* André observ. 4. pag. 335.

Presbyter dudum laborabat doloribus & convulsionibus, quæ caput collum & humeros discrucia-



ciabant; nunc ejulabat misere clamando sibi cranium avelli, nunc adesse in capite malleos & folles agitados, nunc deprecabatur adstantes ut onus molendinariae molae aequale a se eximerent; paroxysmi a nucha incipiebant ubi olim idem passus erat. Cuius ibi loci cauterio, sublevatus est, eo vero relicto, reversus est morbus.

13. *Trismus maxillaris* André Observat. 2. 3. pag. 343. &c.

Vir a quindecim annis maxillae inferioris dolorem atrocem nocte, dieque experiebat, ad insaniam usque, mallicare & loco stare non poterat, deglutiendo cibos distortionem horrendam edebat; paroxysmi frequentes erant. Menstrum continuo contra corpus durum firmabat, nec loqui, nec negotia sua obire valebat; incipiebant paroxysmi a doloribus querulis, desinebant in accentus gradarios, interruptos & respirationem nasalem praecipitem, cum extensione & distortionem nasi, labiorum, oris, faciei totius; tempora & parietale ejusdem lateris sinistri sibi avelli putabat. Nervus maxillaris inferior laborabat, nec is poterat attingi nisi in foramine menti; is canthico destructus fuit, & aeger sic sanatus.

14. *Trismus dolorificus*. N. André observations sur les maux de l'urethre, Paris 1756. p. 318. nomine *Tic douloureux*. An *pedagra dentium* Scrobelbergeri tract. Lipiae 1630. *Trismus arthriticus* L.

Est difficultas maxima & valde dolorifica os aperiendi aut movendi cum uberi ptyalismo, pervigilio, & musculorum vicinorum continua & convulsiva agitatio.

Atrocem illum morbum semel observavi, ante decem annos. Eo laboravit per plures menses Mad de Gasc; mane modo os aperire quomodocumque caveret, pacata erat; verum si ad verbum proferendum, quidpiam edendum, aut etiam ridendum, maxilla moveretur, illico doloribus circa tendinem masseteris & viciniam excruciebat per totam fere diem cum motibus convulsivis, risum caninum unius lateris referentibus, aliisque distortionibus, quae ipsi vitam miseram per menses reddidere. Suspicabar odontalgiam a cariosis dentibus quos ideo extrahi curavi, sed sine successu; dein viru arthriticum, quod suspicabar, diversis remediis aggressus sum. Irrigatio ex aquis Bellilucanis paululum profuit, dein malum recruduit, & solo laudapo sedari potuit, post annum circiter evanuit hic morbus.

Demum nuper inveni observationes plurimas Chirurghi André Versalensis, quibus historia hujus morbi, ejusque curatio multum illustratur, quibus compertum est a nervis maxillaribus, infraorbitariis, aliisque faciem, collum, maxillamve pervadentibus irritari, pendere hunc diurnum morbum, & nervi affecti ultione, excisione sanari, ipsos etiam nlicibus nervum non attingentibus a cauterio inustis, sublevari.

Mulier idem passa circa oculi canthum nasalem, inde fistulam contraxit in maxilla superiori, quae evulsis tribus dentibus anticis sanata est, verum siccata oculi fistula, supervenere

convulsiones dolorificae, pluries in hora, nocte dieque recurrentes; agra libere manducare, tussire, exspuere, nares emungere non poterat, quin dolores atroces & spasmodicas agitationes faciei pateretur; levissimi faciei tactus hos faciei & frontis dolores redintegrabat, immo ipsi videri pericranium ea toto capite avelli; frustra antispasmodici, antiecorbatici, balnei, lacticiis diuissime usurpatis, vesicatoriis repetitis sine levamine, celebrat Chirurgus *Marschal*, ut nervum orbitarium inferiorem excideret, scalpello incidit inter gingivas; & os maxillare musculos caninos incisores, maxillarem usque ad orbitam, ea vero nocte agra pacate dormivit, verum intra paucos dies morbus recruduit, tandem post biennium André ope lapidis caustici ad nasum inustus, aquae mercurialis supra scapham affusa, incisionis ad os producta, post duodecim dies quibus haec operationes instituitur sunt, eam sublevavit, quae denique omnino sanata fuit; nervum vero illum cum Chirurgo initio denudatum stylo attingebat, paroxysmum trismi pro lubitu excitabat; cicatrice obdusa, agra sana vixit.

15. *Trismus catarrhalis* L.

Vidi Aquis-mortuis Majo 1759. militem recens huc advenam, qui cum rori vespertino inafuerat se exposuisset, maxillae inferioris musculos, dolore, subtamere, rigescere sensit, cum ejus partis ad posteriora retractione, & immobilitate ac clausura, quae per 3. vel 6. dies perseveravit, invitis cribus phlebotomis, fomentis anodynis emollientibus, quibus sensum impugnavit morbus cathartico cessavit.

16. *Trismus cynicus*, *spasmus cynicus* Bontii Med. Indos. observ. 1. A. P.

Labia versus alterutram vel utramque aurem trahantur, oculi, faciei que rubent, aut livescunt, dentes frident, murmur incoincidentum edunt & obscurum, ut vox subterranea videatur, deglutire nequeunt; plebs aegros demoniacos judicat. Vide *Rachalgiam arthriticam*.

Cura. Mittatur sanguis ubertim, frictions adhibeantur, inungantur maxillae oleo macis, caryophyllorum, anethi, terbinthinæ, &c. Cervici cucurbitulae affigantur; si deglutire possint, emeticum cum sudorificis, uterique, bezoardico, est propinandum; secus clysmata cum vino emetico injicienda; aeger oleis supra dictis inungatur; demum ad narcoticam deveniendum est.

17. *Trismus cynoglossi*, *Spasmus cynicus* Auditorum, *risus caninus* vulgo *Ris canis*. A. P.

Est conatus naturae ad deprimentum diaphragma & anhelitum cohibendum, ut in conata ad egerendum, parturiendum, mingendum, cum maxima ad obices superandos requiritur visum intensitas. Hanc faciem durum deficientis tangit *Martialis in epigrammate* adversus Crispum.

Cum talis morbosus est ille conatus & involuntarius, verosimile est eum pendere a simili fine, quem intendit natura, nec posse diaphragma vehementer depressum retineri, nisi, sic contractis faciei musculis, chordae vocales, per musculos laryn-

laryngis commodius contractos, glottidis rimam claudant, & sic aeris inspirati exitum præpediant.

Si tribuatur hic spasmus fortuitæ convulsioni horum muscularum, nulla videtur ratio, cur hi musculi potius quam alii convellantur, quod in læsione diaphragmatis fieri scribunt. Vide *dispositionem de risu sardonico Heidelbergæ 1683.*

18. *Trismus Sardonicus* Sardonius Celus Græcis; *Spasmus Sardonicus*. Sardiæ Ill. Linnæi. *Ris Sardonique*. A. P.

Qui inter edulia utuntur ranunculo scelerato Linnæi, qui herba sardonica *Dioscoridi* vocatur, in Sardinia & Occidentia. vulgaris, hunc morbum experiuntur; qui differt a simplici per delirium, cardialgiam, vomitum atque symptomata hujus ranunculi corrosioni tribuenda; ægri ridendo moriuntur, unde *Aspinum risus* cognominatur hic ranunculus.

Indicantur lenia & prompta vomitoria, aqua mulsa & hac assatim hausta, addit his *Dioscorides* irrigationes, unctioes calidas, oleosa calida cum frictione & unctione. Videatur hilloleia spasmii cynici a *Freindio* relata in *Philos. Trans.* Tumor & dolor stomachi paroxysmos antecedeant; deinde oris & gutturis convulsiones accedebant; ab usu croci, daturæ, acociti etiam risum Sardonicum prodci notat C. *Francus differt. de risu Sardonico*. Cutam vide *Journ. de Med. Oct. 1699.*

19. *Trismus Diastropho*, *Diastropho* Galeni, *Oris tortura paralytica*. L.

Est distortio oris versus alterutrum latus ob oppositi lateris hemiplegiam, unde musculus zygomatice & buccinator lateris sani os ad se trahunt & tractum delineant, paralyticos aut apoplexiæ prodromos aut sequela; eandem curam exposulans; hujus speciei curam ope kinæzæ factam vide *Journ. de Med. Octobr. 1759. pag. 312. D. Olivier.*

III. **OBSTIPITAS**; *Caput obstipum*, *Mauchartii* differt. 1742. *Torticollis Ægypti obstipi*, Græce *Laxoi*.

Est tonica capitis inflexio in unam alteramve plagam, adeoque lateralis antica vel postica, pronæ, vel supinæ: ultima species est clonica.

Caput erectum & pro lubita mobile detinetur æquilibrium virium contrarientium; pollice tunc erectores seu extensores, scilicet plenius, complexus, & laterales simul agentes; antice pondus capitis; hinc fit ut dormientes, sistent laxatis omnibus musculis a somno, nutant capite; nativa tamen, illæso somno, caput identidem restitit; similis mutatio in syncope, apoplexia, &c. accidit, sed constans.

Laterales musculi sunt sternomastoidei, quorum dextro agente solo, facies versus latus sinistrum vertitur, & recipere sinistro agente facies dextrorsum vergit; hos musculos adjuvant mastoideus lateralis, major & minor, reclus, obliquus superior, reclus anticus longus

& idem brevis, & transversarius anticus primus, qui omnes vertebres colli annexi ad caput tendunt; verum eorum minus adjuvant & caput flectunt, qui vertebres colli trahunt alii vertebres annexi, ut secundus transversarius anticus, & obliquus inferior, sacrolumbaris, &c. hinc lateralibus dextris contractis caput & collum dextrorsum flectitur, & vice versa illis laxatis sinistrorsum nutat, hinc obstipitas duplicis ordinis.

1. *Obstipitas veniens* L.

Est illa in qua facies extrorsum versus humerum versa remanet ob vim lateralem muscularum, scilicet sternomastoidei oppositi & lateralem posticorum ejusdem lateris, nimiam; vel quod eodem recidit ob horum muscularum decurtationem constantem & involuntariam; altera tamen datur obstipitas veniens resoluta seu paralytica; in qua facies extorsum versus latus dextrum vel sinistrum converfa remanet invite propter resolutionem musculi sternomastoidei lateris ejusdem, vel etiam muscularum aliorum lateralem lateris oppositi, in quo ultimo casu caput etiam nutat.

2. *Obstipitas annuens* L.

Est ea in qua caput ad anteriora vel recte vel oblique nutat; & pronum remanet; ob laxitatem muscularum posticorum. Conveniunt sotos aromatici, embrocationes ex aquis Balneucanis, pauci fumo spirituosus imbuti.

3. *Obstipitas catarrhalis*.

Est ea in qua dolent & leviter tument, immobiliaque sunt organa collum moventia, ob frigus, calente corpore, susceptrum; unde sæpe coryza, tussis, anginosi affectus.

Exigit initio unam phlebotomiam, potus theiformes calidos, dietam medicam, aerem calidum, pannos siccos laneos cum cineribus calidis collo circumvolutos, aut fumo sacchari imbutos, linimenta adonynæ, & resolutiva.

4. *Obstipitas gibbosa*.

Ea est quæ fit vitio ossium, scilicet ob exostosis aut distortionem, inflexionemve vertebrarum colli, tunc flectitur caput sursum, deorsum, ad latus alterutrum, & in eo fixa constanter remanet. Malum autem illud immedicabile vulgo est.

5. *Obstipitas lateralis*; *musculi sternomastoidei dextri strictione* Boerhaave consule. pag. 220. *Tulp. lib. 4. cap. 57. Boneti Mercat. Compilat. pag. 130.*

Syndicus Genevensis sexagenarius; vir rebus publicis diu intentus, incidit in obstipitatem lateralem; caput ipsi, velle, nollet, dextrorsum vertebatur, sine inclinatione, adeoque ab oppositi lateris sternomastoideo musculo trahatur fortius, & ab antagonista debilis; in utro horum foret vitium robotis aucti, vel imminuti vix cognosci poterat; hæc tamen alterutrum musculi id satis indicabat. Præscripta incassum multa remedia, ut apud nos aquarum thermalium affusio, & fuserat *Boerhaave* legentia; 1. desuper aquæ calidæ in nudum caput

mane

mane & vespere ad septem minutorum spatium quotidie per sex septimanas, cum frictionibus moderatis; post has embrochas; 2. locum dextri musculi sterni mastoidei mane & vespere inuogendum dia unguento althææ composito; 3. totam plagam sinistri sen antagonizæ eodem tempore fortiter confricandam pannis siccis, succini accensu fumo penetratis, ut ejus robur invalescens parem faceret æquilibrio cum antagonista obtinendo.

6. *Obliquitas spasmodica* Bonet. Sepulchret. de convuls. obs. 33. *Symptoma episthotoni, & emprosthotoni* Tulp. lib. 4. cap. 57. Boneti Mercur. Compilat. pag. 130. Ill. Lorry de Melanch. p. 115.

Parochus quinquagenarius ab studio aciori incidit in motus spasmoidicos æternos & laterales capiti, quos reprimere vel suspendere vix poterat interdiu, caput in latum inclinatum manu suscitendo, sed qui oculi lumine urgente compesciebantur; morbus per plures menses perseverabat, cum præscripti fomenta emollientia occipiti applicanda, oam convellebantur musculi qui a parte colli politica ad caput tendunt; præscripti etiam narcotica, fuscula pulli, oleo lac animum, balnea domestica; &c. a quibus melius habuit.

#### IV. CONTRACTURA; *Contractura, ankylosis.*

Est in artubus, ut brachiis, cruribusve, immobilitas ob partium rigiditatem sensum superveniens aut saltem coarctatur permanens.

Differt ab ankylosi per rigiditatem tendinum & ligamentorum, cum in ankylosi tantum ossa immobilia sint circa articulos.

Differt ab spasmis legitimis, quia contractura diuturna est, & non subito, sed sensim accidit.

1. *Contractura hypochondriaca* Boneti Polyalthæa. L.

Melancholicos hæc sæpius afficit cum extremorum rigiditate, stupore, fornicatione. Huic speciei laqueinia conveniunt.

2. *Contractura dolorifica*, Occitanis *Gambaret*.

Notum est ex veteri podagra aut rheumatismo mire conrahi & contergeri extremos articulos, atque immobiles evadere cum sensu vel doloris acuti, vel stuporis, & debilitate partis, quæ species præter linimenta exigit focus ex aquis thermalibus sulphureis, ut *Lamaion* juxta Biterras, *St. Laurent* apud Helvios, & *Bagnan* juxta Mimatem. Profunt etiam iterata electrificationes & longus laevis ulus.

3. *Contractura scorbutica* Sennert. de scorbuto; Etmuller. pag. 448. L.

Apud nautas non raro, ait *Eugalenus*, tendines poplitis indurantur, ut crura plane rigida evadant, quod sensim accidit; quandoque crescente malo omnes articuli hoc affectu laborant, nullumque artum extendere possunt, ita ut agri in orbem vel globum tori contrahantur. Idem observat *Lind* cum tumore & dolore genium in secunda scorbuti periodo, unde ad gonagiam hic morbus accedit. Vidi contracturam scor-

buticam cum amborum extremorum rigiditate & extensioe tonica, diuturna; atque maculis flavis violaceis illorum, ac demum nigredine & duritie, quibus tibias numime perficte æmulabatur æger, *Bernard. Belpv in Miscelan. Curios.* asserit le 60. ægros sanasse contractura scorbutica genium affectos sequenti remedio solo.

*Recipe* sadi acris, massipulos viij; bulliant in vase clauso in vasis cerevisia lb xvi ad dimidii consumptionem; hujus decocti sumas æger quos quovis mano uncias iij: ex follis fiat estaplasma applicandum. Vide *Lind* de scorbuto.

4. *Contractura paralytica* Schroder. *Phylogal.* L.

In paralyti ioveterata, quam præcessit & fovit rheumatismus, quæque frequens est, manuum digiti, carpus, cubitusque contractura laborat, seu rigescunt ita flexorum musculorum carnes & tendines, ut diduci non possint sine metu fracturæ, uode discrepat hæc hemiplegia species ab aliis.

Insanabilis hæc species sublevatur repetita electrificatione per 25. dies, singulis diebus per horæ quadrantem, additis deinceps aliquot fulminationibus. Vide *differtat. de Hemiplegia per electrificationem curanda. Monfclii*. In hac specie non raro remanet sensus, amissio motus, & flexilitate.

5. *Contractura rachialgica* Totanus; *metallensis* D. Lorry; seu a colica Pidonom; vide Opus Cistelli, D. Astruc, D. Dubois & D. Tronchin. Laqueæ sulphureæ & lac indicantur.

6. *Contractura Bohemica* Schenckii obs. van Swieten aphor. 1057. pag. 335.

Pessima mala fieri ab usu vini austeri ex urvis non satis matoris pressi quotidiana observata docent, & forte inde sunt contracturæ in Austria sætis frequentes, dum ligamenta, quibus ossa articulata nectuntur, obrigescunt *Van Swieten*.

Profunt hic diluentia alkalica fixis juncta, sed alkalina ad grana pauca cum aqua potenter, ut oleum tartari per deliquium ad gatt. xii. in aquæ uncias quatuor.

Aquæ Selterangæ apud Germanos, aquæ Montis aurei apud Arvernos, continent salem alkalium huic concreto resolvendo aptissimum, ita & aquæ de *St. Laurent*, in *Puissac*, balneo, fottu, laconico applicandæ, potu præmissio.

7. *Contractura arthritica* Etmuller. Tom. 1. pag. 377. L.

Hanc lacte curavit *Tackini*; dolorifica varietas est.

8. *Contractura catarrhalis* Ballonii L. Vide *Catarrhus*.

9. *Contractura ankylosis*. L. *ankylosis*. L.

Est rigiditas geniculi vel articulationis orta a nimio & intimiori contractu ossium, hujus varietates sunt multiplices. Alia pendet a defectu synoviae articularis, qua ossium extrema lubrificari debent: hac deficiente datur affricus major, quandoque cum ossium inter moveodum crepitatioe; aut quod eodem recidit, hæc ankylosis pendet a synoviae viscositate sine illa viulencia: in hoc casu thermæ, aquæ sulphureæ, potissimum irrigatæ cum frictionibus profunt;

sunt; oecnon articuli alternæ flexiones synoviae uberiorem excretionem promoveant; juvant etiam fomenta emollientia, litus ex oleis expressis, pinguedine fusa.

Alia pendet ob ossibus callo invicem ferruminatis post fracturas articuli ipsius, & ea species insanabilis est; astispiens accidit ex nimia harum partium quiete & vincula assidua post fracturas.

Datur etiam ankylosis ab exostosi rachitica aut simplici ossium in articulo, quæ curationem exostosis exigit; ast vix unquam sanatur.

Ankylosis vero quæ ab infarctu & rigescencia teodinum ac ligamentorum articuli a materie arthritica sequitur prognosim & curationem arthritidis & rachitidis.

#### 20. *Contractura syphilitica: Ankylosis vërolique. L.*

Ea est quæ a viru venereo pendet; virus autem illud vel glandulas synoviales infarcit & synoviae excretionem impedit, vel simul exostoses, arthroaces inducit; & curatur hæc species litu mercuriali, aut remedio Svvieteniano, maxime si detur tantum infarctus, non vero perfecta exostosis: vide *Lecborem*.

#### 21. *Contractura spasmodica. L.*

Ea species a vehementi influxu fluidi nervi io partem producat, & est veluti crampus, sed coilians & assiduus, qui affectus concomitatur convulsionem raphaniam Suecis familiarē, ac necrosim tum ustilagineam, tum epidemicam; in utroque casu lipatur stupore vel etiam sensatione ulla nisi dum pars exterior frigit, livescit; & si calida lintea applicentur, dolor atrocius vexat quam antea. Vide *seu Convulsionem, & Necrosim*.

#### V. CRAMPUS, Spasmus flutulentis Auctorum; Anglis Cramp. Italis, Græcibus Occidentis Rampe; Gallice Crampe.

Est musculi unius vel alterius subito accedens, & subito recedens rigiditas cum dolore sæpe atroci in artubus vel in collo.

##### 1. *Crampus idiopathicus: D.*

Est ille qui musculos foræ, crurum, aliove subito afficit, dum natus in frigida, aut dum frigori oeduroo tibie exponuntur, aut dum ex vicio situm musculi distrahuntur, huic etiam obnoxii sunt musculi digestrici, dum aëri frigido collum nudum exponitur; dolor est intolerabilis, sed intra minutum unum aut alterum sponte recedens, maxime calefactus aut frictis, & commodius collocatis partibus.

##### 2. *Crampus sympathicus: A.*

Est ille qui in cholera suram potissimum afficit, cum valida tibiarum distensione & atroci dolore, unde irrequieti crura movent, clamant, & quoties vomitus supervenit, gravius torquentur ægri.

Optimum auxilium est, præmissa vomitione ex aqua pulli, laudatæ ad guttas viginti propinatæ.

Si simili spasmo afficiatur pectus, exoritur pleurodyne fugax, sed atrox, cum metu suffocationis; si guttur, fatetur angina spasmodica.

#### VI. PRIAPISMUS, Priapismus.

Priapismus est morbus brevis, cuius præcipuum symptoma est penis ingrata, & sine libidine sæpius revertens erectio.

Differt a satyriasi, quod in priapismo deficit veneris appetitus, seu libido.

##### 1. *Priapismus dysuricus.*

Dysuria calculosa lipatur sæpe penis tentigine, sed dolorifica, atque hoc inest singulare quod non intumescat penis, ut in erectione libidinosa, sed tantum rigescat & indurescat sine voluminis augmento; præterea non sursum vergat, sed deorsum; adde dolorem acrem in extremoglande, qui solus intumescere videtur.

##### 2. *Priapismus gonorrhoeicus.*

Est ille qui io gonorrhoea recenti observatur, quippe injucundus est atque dolorificus, sæpiusque pene incurvo propter ulcusculam in tractu urethrae disposita, quæ uniformem penis extensionem præpediunt, unde contorquetur in arcum; hinc dicitur *gonorrhoea chordata* Gallis.

3. *Priapismus a frigore.* Vid. Zacuti Lusitani Prax. lib. 3. obs. 216. Rarissima est penis virilis convulsio.

Belga cum vigente bruma horæ spatio in flumine stetisset, tam contortum & tensum penem habuit, ut quoties mingeret, vultum lotio spargeret.

Sanatus est fomento ex decocto rutæ, salviæ, ocymi, & linimento ex oleo anisi, terebinthinæ, lumbicorum, cum aqua vitæ, & generoso vino: sensim in primum statum virile membrum redactum est.

##### 4. *Priapismus a caustaridibus.*

A cantharidum pulvere intus sumpto, etiam exigua dosi, supervenit dysuria, hæmaturia, nec non Priapismus dolorificus cum convulsione variarum partium, pro dosi veneni & subjecti sensibilitate. Huic infortunio & vitæ periculo se exponunt gæones, qui hoc philtro se ad venetem parare suscipiunt. Curatio exigit remedia generalia, præsertim leucotia, ut decoctum radicum althææ pro potu, nec non usum internum camphoræ qua venenum illud specificè obtunditur, & convulsiones sedantur; datur vero camphora ad aliquot grana in oleo amygdalarum soluta.

Urethrae tensio in fure suspensis, post mortem etiam perieveras, designat sanguinem in corpore cavernoso cumulatam, & a contractione spasmodica radicis penis retentum coagulari. Vide Morgagni *Epistol.* XIX. 20.

#### ORDO SECUNDUS.

##### SPASMI GENERALES TONICI.

Illi sunt qui artus & truncum simul afficiunt, vel totum fere corpus rigidum immobileque detinent.

## VII. TETANUS; Tetanus.

Est morbus acutus totius trunci & corporis rigiditate insignis, cum respiratio sæpius laboriosa, & sensuum integritate.

Musculorum totius corporis rigiditas videtur pendere, vel ex influxu constanti fluidi nervi in partes, vel ex sanguinis musculis alluentia coagulatione; vel ex utroque simul.

Homo totali vitium extinctione moriens relinquere suum cadaver generali tetano tensum; aut ubi violenta abripuit morte, ejus cadaver est flaccidum. *Helmstadius* qui hæc pronuntiat, si macella adivisset, contrarium in pecoribus vidisset; ea enim primum jugulata & cruore fere vacua vivunt; aut addito intra colli vertebrae cultro, illico tetano generali correpta pereunt; idem in ranis capite truncatis & illico intra canalem vertebralem addito observavit *Waltb. v. s.* desiderantur posteriores vespillonum aut pollinchorum hæc de re observationes; cadavera eorum qui febribus malignis, dysenteris castrensis obeunt, flaccida remanent æstate, ob impedimentum cruoris coagulationem, recalescens mortuis familiarem.

## 1. Tetanus tonicus Sennerti. A.

In ea specie totum corpus a capite ad calcem rectum est; & ita rigidum, ut si pedes attollantur pæneti, occipite tantum insistant non sedens ac statua; facies rubet intense, oculi protuberant, respiratio est valida & frequens, pulsus febrilis, plenus, calor intensus; sudor dein accedit, quo perseverante omnia remittuntur, & intra septem dies terminantur.

Vidi hortulanum adolescentem hac specie correptum, postquam calente corpore pæcum ro-tatorium descendisset, & frigus humidum ibi passus esset; ille diæta tenui & potu usus est, ut in pleuritide, plures primis diebus phlebotomias passus, decocto cichorii calido multum sudavit, dolores & pervigilium narcoticis compescuit, & sic intra septem dies convaleuit.

Tetanus multis phlebotomiis, dein oleis & emollientibus, tandem balneis demulcentis sanatum vide *Journ. de Med. Avril. 1764. p. 335.*

## 2. Tetanus emprothotonicus Sennerti, Bontii de Med.; Tetanus anticus Bontii de Medic. Indori; Emprothotonus Anticorum. A.

In hac specie, apud Indos familiari, corpus ad anteriora flectitur, ita ut mentum pectori affigatur, genua antrorsum vertantur; dolores atroxes, difficultas respirandi, & deglutendi, cynogelos, seu risus cynicus, faciei livor, tristis stridens, murmur & rauco vocis hanc comitantur, accedente non raro levis dysuria. Egri apud Indos pro demoniacis habentur.

Curatur ut tetanus repetitis phlebotomiis, deinceps laudano, & extracto eroci; sed præterea Bontius ligaturas artuum, frictions, actiones spirituosas, cæuebitulas, clysteres adhibet, quæ si maturo adhibeantur, felicem forebantur effectum.

3. Tetanus spiphotonicus; Raptus posterganeus Cælii Aureliani; Tetanus dorsalis Epiphotonus Græcorum Jouto. de Med. Od. 1761. p. 325. ubi est hujus varietas hysterica. A.

In illa specie caput versus occiput inflexum remanet, & corpus in arcum postice incurvum tenditur, cum difficili respiratioe, aliisque tetani symptomatis; discrimen est in principiis: illa enim species venenis delectatis, ut cicuta, phellandriove intus assumptis tribuitur, unde curatur ut cynogelos sardonicus.

A glande plumbea fodicato achilleo tendine similem ortum vidit *D. Serano* pater Professoris, uxoris meæ frater, Draconum Sereniss. Delphini Capiteanus, cum glandem plumbeam in obidinne Parmæ intra pectus excepisset, quæ infra cartilagineum xiphoideum serperat, dolores atroxes experiebatur, ac nunc atrox, nunc postice per vices convellebatur, nisi summa cura reititudinem corporis servaret; si enim sicus constantia defatigatus paululum antrorsum se flecteret, illico invitus emprothotonum patiebatur: glandem plumbeam extraxit *porius Chirurgus D. Bernard.* & post repetitas phlebotomias æger convaleuit: tendinibus fodicatis utile est terebinthinam calidam, vel ejus oleum affundere. Similes species a morfu canis tendunt Achillis infiduo notatur *Wæfferus, Venetus, &c.*

Tetanus Carolinæ describitur *Journ. de Med. de Vandermonde Nov. 1759.*

4. Tetanus holotonicus; Peruvianus, Pasmo, quasi, Spasmus; Pasmo du P. Feuillée, *Journ. pag. 474. A.*

Cacicus ex Cusco Limam accessit, ibi vero sudoribus diffuens ex lecto exsilivit, & pedibus nudis aeri frigidissimo se exposuit, a quo ipsi incolæ multum cavent, peristomatibus pavimento instructis utantur, & non nisi post horæ quadrantem, a quo tempore e lecto surrexerunt, se aeri exponere audent; quibus cautelis neglectis Cacicus toto corpore obriguit, exceptis oculis, qui scintillabant; altera die os clausum fuit, & oculi ipsi immobiles cum toto corpore lætarent, a vulsione dentis præscripti Medicus; sed hæc Chirurgum impossibile fuit; dolores interea atroxes urgebant cum inedia, unde mors, quæ raro in hoc morbo vitatur.

5. Tetanus Indicus; Spasmus Bontii de Med. Indor. cap. 2. *Journ. de Med. Nov. 1759. A.*

Est vel emprothotonicus, vel b. anticus. Crudele malum Indis epidemicum ac familiare, quod sanis patribus vitalibus ac naturalibus cum summo cruciatu intra brevissima temporis spatium miseris e vivis ad mortem rapit, dum nihil nec esculentis, nec potale t deglutire valent. Hoc malo aff. & tr. c. lente admodum adstantes inveniuntur, præsertim interveniente, quod sæpe fit, spasmus cynicus, seu convulsione, quæ utraque æna aures versus retrahitur, ruber ac viridis color ex oculis & facie oritur, dentibus strident, ac murmur inconditum vocis huma-

humanae edunt tanquam ii qui e cella subterranea loquuntur, ita ut imperitis vere demoniaci appareant: morbus subito invadit; homines rigidi ut statuae permanent.

*Cura.* 1. Copiose sanguis mittatur. 2. Frictiones ac ligaturae valide adhibendae. 3. Inunctiones fiant oleis macis, caryophyllorum, anethi, rosarum, terebinthinae, specie indicæ. 4. Cucurbitae amplae cum multa flamma, sine scarificatione, cervicis lumbis, humeris, mammis apponantur, ut serosus & biliosus humor a nervis educatur. 5. Si deglutitio fieri tum possit, cietur vomitus, ex gummi-gutta, antimonii hepate, quam citissime, nam periculum in mora. 6. Tunc sudorificis materiis morbifica ac diureticis ejiciatur, ut lapide bezoard, theriac, mitridato; sal pruella multum valet. 7. Si deglutitio impossibilis, tunc acerrimis clysteribus alvus evacuanda. 8. Deui aeger a capite ad calcem inungatur oleis aromaticis, & balnea subeat facta ex decocto herbae lagondi, seu ligustri Indici ad dolores sedandos optimi, & si desint, ad narcotica audierit recurrendum, ut laudana Quercetani, philonium, extractum croci. 9. Jucula ex gallinis, hædis, vitulis, si possit, hauriat. Angli hunc morbum opio & balneis curant.

6. *Tetanus lateralis* Fernelii, Pathol. lib. 5. pag. 372. *Conte. Crampe* Fernel. A.

Phylodes (Fernelius ait) insolis proflus speciei sese mihi nuper obtulit; ille quatuordecim hieme duntaxat, sed bis, terve quotidie affligebat: caput primum in accessione vibratione quadam ex intervallis contorquebatur, hinc sensim malum per cervicem frigidis sensu devolvebatur, cumque inter scapulas irrueret, illa mente, integrisque sensibus episthotono corpus rigebat; cum vero in alterutrum latius, aut in brachium, aut in crus excutiebatur, ita arte id protinus contrahebatur, ut nulla adstantium vi exporgiri posset, dum prorsus conquisceret accessio.

*Tetanus syphiliticus*, *Rara convulsifans* spec. Rivet. obs. X. D. Aymar. A.

D. Bolloo militaris abscissionem brachii ex iuq tormenti bellici vulnerati passus erat: effugisse obducta convulsiones experiebat, quibus caput versus partem dextram & mandibulam frequenter agitabat, ita ut linea continuo intra dentes habere cogeretur, quæ identidem mordebat ac dentibus conterebat. Suspicatus, est D. Aymar ex male sanata olim gonorrhoea virus syphiliticum in ejus sanguine latere, ita ut cum irrita fuissent cætera auxilia, immo iterata amputatio, demum adhibito lixo mercuriali, & psyllismo excitato æger ab illis convulsioibus immunis evasit.

8. *Tetanus verminosus* Barrère obs. anatom. pag. 167. edit. 1753. *Inseffins percé par les vers* D. Barrère. obs. anat. pag. 167.

Adolescens Indicus niger per intervalla convulsivos motus experiebat, cum colica; deum incidit in tetanum Indis familiare; at

tuum rigiditas erat convulsiva motibus interpolata, decima die æger occubuit.

Aperto cadavere nil vidi læsum in cerebro, in intestinis erant glomeres lumbricorum, quorum quipiam colum periorabant, & foramen obruant.

In hoc morbo scordium pulveratum pro optimo anthelmintico laudat Professor clarissimus, quem nuper extingui desiderio prosequor.

9. *Tetanus hemiplegicus* Boneti Sepulchret. & Schenckii observ.

Rara species eo quia dimidium corporis longitudinaliter sumptum tetano corruptum est & dolet, altera medietas, paralyti & sensus privatione laborat, adde febrem acutam, delirium, dyspnoeam, &c. Principium censetur abcessus in cerebro.

10. *Tetanus febriculus*, Storck Ann. Med. II. pag. 163. A.

Puer novennis quotidie eadem hora convellabatur, & inde tetano universali rigebat, post octo minuta sequebatur sudor profusus & tranquillitas. Extractum kinkinae ad drachmas sex tempore intercalari distributum convulsiones & tetanum abegit.

11. *Tetanus traumaticus*. A tendinitis Achilleani punctura, vulnere.

D. Serani illum observavit in viro Monspensulano, cujus ille tendo vulnere sclopentario latus fuerat; ab operatione sarcocoles ortum vidit Clariss. Lientauda a vulnere sclopentario thoracis, vide *Tetanus* 3.

*Curatio* exigat vulneris dilatationem ut medicaminibus ingressus, & ichori vel puri cæsario egressus pareatur; dein nervo vel tendini puncto oleum terebinthinæ calidum est assundendum, cavendo ab unguentis oleicis rancidis; suader etiam *Parvus* si dolor non remiserit, ut fervidum hoc oleum infundatur, si demum tetanus his resistit, nervus aut tendo punctus est transversim secandus. Vide *Parvus* Libr. VIII. cap. 9. & Lib. IX. cap. 37. 38. ubi celebris historia puncturæ nervi quam Carolus IX. Gallia Rex passus est.

12. *Tetanus hystericus*, Journ. de Med. Oct. 1761. pag. 327.

Hæc varietas est episthotoni. Monspelii mulier hysterica singulis diebus tetanum hystericum patiebatur cum sensuum feriacione & monnassi; ipsi per tres menses profuere grana xv. foliorum aurantii bis in die sumpta, dein nil proderant; tunc grana iij. camphoræ cum saccharo per quindecim dies sumpsit cum successu; æstare a balneis tepidis pejus habuit, a frigidis optime, vires restituit & paroxysmi imminuti; verum moschi grana iij. cum melle pauillo cæteris omnibus magis profuere: *Contas*.

13. *Tetanus mirandus*, D. de Plaigne Journ. de Med. Nov. 1765. pag. 436.

Puella, quam catalepsi delirans sæpius detinebat, tanta sensibilitate gaudet, ut si quisque delirio contradicit, aut verbum quoddam ipsi odio-

volūm coram proferat, hoc verum est gallie perungue, latine casaries, aut etiam dum calepti deprehensa, omni sensu orbatā, si pulvisculum tabaci oculis illabatur, ea illico mitis convulsionibus primū exagitata ululans, linguam exferens tetraheoque, in tetanum potterganeum cum veloci capitis agitatione succidat, dein tetano holotonico consistit, tanquam statua marmorea, rigescat, oculis fersum conversis, ut in strabismo orante: dixi sensu esse orbatam in caleptico insultu, aut non hoc perpetuum est, immo in paroxysmo tetani dum sensu omni orbatā videtur, acutissime audit, utur rigida & trunco inflexibilis; erecta, perniciet & quasi machina progreditur, oblato obilaculo circa talam gyrans aliorum pergit: post horā quadrantem scena mutatur, caleptis accedit, corpus ceterum evadit & paulo post sensum omnium compos facta a morbo immunis videtur: vide quid simile in *caleptis dolirans* & in *caleptis hysterica*.

## VII. CATOCHUS; Galeni.

In eo discrepat a tetano cuius rigiditatem finitur, quod vel 1. chronicus sit catochus & duraturus; tetanus vero acutus est; vel 2. in catochu nulla peioris vehemens agitatio, & respirandi difficultas observetur, quæ magna in tetano.

1. *Catochus holotonicus* Galeni Comment. in Proreptic. 1. Hippocratis. Mich. Fehr. Collect. Acad. tom. 3. pag. 456.

Hæc est species quæ a tetano differt immobilitate peioris ab ecclasi vero & calepti, inflexibilitate corporis. Galenus primis est qui eam speciem memorat, aut observaverit jacebat, ait, studiosus quidam, veluti lignum, rigidus & extensus, oculis apertis immobilibus, obscurè audiebat, & aphonus erat; hic morbus periclitæ recurrit ex M. Fehr.

2. *Catochus cervinus* Hippocratrorum; *Elaphia Græcorum*; *Mal' de corf.* Soleisel. Storck. Ann. med. 1753. pag. 9.

Morbus est equis & cervis familiaris, in quo cutis durities est lignea, cum cordis palpitatioe; & oculorum circumgyratione.

Juvenis, post dolores lancinantes omnium artuum, subito sine causa evidenti, doloribus cessantibus toto corpore rigidus & inflexibilis fuit, brachia trunco appressa, crura extensa, rigidissima, abdomen lapidis instardurum, tactu non dolens, collum immobile, maxillæ invicem appressæ, mæculus masseteres & tempora illi, tumidis, lingua tamen volubilis, oculi videri, mens & respiratio libera, pulsus sanus.

Balnea ratione loci adhibere non licet, iterum equinum maxillis calide admotum: per aperturam a dentibus incisoriis effractis iucula & mixtura sequens cohibeat: affumebantur.

Recipe spiritus salis ammoniaci, drachmæ unam, aceti rutæ, quantum satis ad saturationem; aqua rura, uocata res, syrupi de kermes 9. un-

ciam unam. Bis in die spica dorū perfricata & inuncta fuit oleo verbalci cum vigesima parte spiritus salis ammoniaci; quarto die maxillam movit, deglutire coepit; humeris & spinæ dorū cœntrabitur: sicca alternis diebus admotæ, clysmata injecta; octavo die movit manus, deinde pedes, trigesimo ambulavit.

Differt catochus a tetano respirationis libertate.

3. *Catochus cutaneus*, vide Zacuti prax. pag. 398. obs. 96. *Tetanus rheumaticus* mirandus Cornax lib. 2. cap. 27. Isbrand. Diemerbroeck. Anatom. pag. 747. *Rare a straganeus morbo* Carol. Curzii Neapolitan. ann. 1753. Li.

Adolescens Neapolitana anno 1752. cutim colli, deinde faciei, demum totius corporis sibi indurari sensit, ita ut, observante clariss. Curzio; cutium siccum, vel corticem ligneum firmitate æmuletur, anno ætatis decimo septimo nondum erat menstruata, cæterum sana.

Sanata est longo usu feri lactis, dein lactis ipsius, neonon balneis tepidis, vapore aquæ calidæ, hydrargyro crudo ad grana pauca cum bolo cassie diu usurpato, demum fonticulo tibie iusto.

Catochus siccus Galeni lib. finitius, mirandus, & catochus hystericus ejusdem ad eum attinere videntur; catochus ejus phreniticus ad typhomaniam; catochus vero verminosus Schenckii, vel ætans erat, vel caleptis.

4. *Catochus scorbuticus* D. Vandermonde Jour. de Med. Juil. 1758. pag. 51. Huc pertinet officinæ musculorum fere totius corporis quæ memoratur in *Novellis Anglicis mensis* Novembris anni 1760. nisi species d. Rindla sit. C.

Clar. Martens de Grandvilliers vidit hanc speciem in muliere quinquagenaria, rheumatismo fortè scorbutico, dein anasarca seu phlegmatia prius laborante; supervenit cutis, tædium, musculorum totius corporis rigiditas coriacea, qualis in mumiis Ægyptiacis observatur; motus genium, carpi, digitorum, cubiti impossibiles, aut valde obicuri erant, cutis ita dura ut lanceolans rueret, musculi artuum erant veluti cartilaginei, pulsus tamen in carpo percipiebatur, inde cephalalgia, quam narum hæmorrhagia identidem sublevabat; Phlebotomia vix institui potuit, inde scorbuti signa clariora apparuerunt, gingivarum inflatio, lividitas, fortè intolerabilis, vomitiones fetidæ, pyralismus seroso-cruentus ex palato exsudans, demum mors.

Memini me vidisse in Alefensi Nosocomio anno 1745. virum per aliquot annos lecto fluxum; ex eo quod pedes, tibie, & crura indurarent cum maculis exiguis, flavis, lividis, cutis & musculorum summa duritie, inflexibilitate, quæ pedes mumie satis apte referebant. Vide *Arthritis scorbutica*, & *Rheumatism scorbuticus*.

5. *Catochus scillius*, Collect. Acad. tom. 3. observ. 61. Ephemerid. German. Andrea Cnoessio observante.

Monsi rursus infans cutim habebat corio porcelli tosti simillimam, flavam, quæ percussa sonitum ede-



edebat, rimis pertusam; cætera loco citato videantur.

6. *Catechus diurnus*, *Missa Journ. de Med. Fevr. 1755. pag. 94.*

Mulier 50. annos nata, temperamenti melancholici, singulis diebus, ab ortu solis ad occasum, per aliquot annos, ita alto sopore sepulta jacebat, ut nullis stimulis excitari posset; interea totum corpus erat rigidum & immobile, ut in *Catecho Galeni*: ea vespere ad se revertens convulsionibus exagitabatur; lacrymis effusus, alvo exonerata, cibum sumebat; vino & biscocto pane utens; vigilabat per noctem, sequenti mane in soporem relapsa, unde vocata fuit *la marmette de Flanères*.

## ORDO TERTIUS.

### SPASMI CLONICI PARTIALES.

*Spasmi dicuntur Hippocrati Motus convulsivi Riverii; Convulsiones clonica Ettmulleri, Gorterii. Clonici dicuntur a Clonus commoveo.*

IN tonicis spasmis naura materiem nervos musculis immixtos molestantem forti & continua pressione terere & corrigere contendit ut plurimum; alii in clonicis eam excutere & eliminare nititur, unde *Rivarius*, *Hernius*, omnesque Veteres hos motus expultricis naturæ facultati materia morbifica sæpius irritatæ tribuunt.

Difficile est eos a motibus naturalibus insanæ, delirantium, rabidorum, phreniticorum distinguere, nisi attendamus ad motivum, quo illi motus determinantur.

### IX. NYSTAGMUS, *la Serris*, *Distion. de Med.*

Est vel oculi, vel palpebrarum, immo irisid seu uvæ alternus motus spasmodicus, vel oculorum instabilitas. Vide *Distionar. Medicin. Gallicum*.

1. *Nystagmus epilepticus*, Vide *Mich. Fehr. obs. in Collect. Acad. tom. 3. pag. 455. P.*

Vidi in duabus mulieribus morbum epilepsie sætis asinum, in quo per paroxysmos accidebat omnium sensuum feriatio, cum respiratione oblucra, & placidissima, pulsa pacatissima, oculis clausis, & omnium artuum quiete, flexibilitate, sed attente aspecta palpebra utraque superiori, tam velociter nictabant sola cilia, ut vibrationes numerare foret impossibile: intra horæ quadrantem ægra sponte velut e somno revertebatur ad se, motum, sensumque recuperabat, atque capitis gravitatem, qua antea laborabat, non amplius experiebatur; illi vero paroxysmi a stomachi læsione ortum ducebant, & rarissime revertentibus. De *Nystagmo simplici* vide *Galenum* qui *Hippum* hunc vocat, & *Cassell. Equum*.

2. *Nystagmus bulbi*, *Hippus Galeni libr. deſign. Medic. & Mauchartii, L.*

Est instabilitas, non palpebrarum, sed ipsius bulbi oculi: vidi in *nydalope* continuam, sed pacatam atque involuntariam utriusque oculi ab uno cantio ad alium versationem, ita ut nunc ad dexteram, nunc ad sinistram continuo oculus converteretur.

*Mauchartius & Vissolignus* etiam *hippum pupilla* memorant, seu alteram & continuo repetitam pupillæ dilatationem & constrictionem. Vide *Disser. D. Mauchartii de ulceribus cornæ*.

3. *Nystagmus catarrhalis*; *Tic douloureux de l'œil*, *André observations sur les mouvemens convulsifs*, pag. 374.

Consistit in doloribus spasmodicis fugacibus, quorum paroxysmi tres, vel quatuor horas durabant, periodici, recurrentes, ut in febribus intermittentibus, & ter circiter in die repetentes; dolores erant lancinantes in globo oculi, infra & supra orbitam; ægri huic oculo semper manum admovebant, ibi pulsonem validam, clanculationem, distractionem, succussiones, & palpitationem experientes; pulsus initio erat contractus, febris exigua, cephalæ gravis, coryza, rheuma; nulla vero vel spūta vel muci narium excretio.

Iosæmus membranæ pituitariæ, in sinibus congestus mucus nervos orbitarios comprimebant supernos, medios vel infimos.

Indicationes erant hunc infarctum tollere, muci & salivæ excretionem promovere, quod præmissis duabus vel tribus phlebotomiis, diætâ resolvens, diaphoretica, iussumigia, & dein cathartica intra quatuor vel quinque dies præstabant.

### X. CARPHOLOGIA; *Crocidismus* = *crocis*, *flocos*, *Crocidixen*, *flocos avellere*; *a carphos* palea, & *logo* colligo: *Sombrosus*.

Est motus velut convulsivus manuum, quo flocos & vestibus evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videtur, quo tendinum subultus referri potest.

Longe differt a singulari consuetudine cachetorum sibi e labiis lamellas crustaceas curiose avellendi, quam *Montpelienſes* *bechie* nuncupant; carphologia enim est vel vere spasmodica, qualis subultus tendinum, vel ab hallucinatione oculorum dependet, scilicet a suffusione myode; (*Vide suffusionem*). Vidi enim maniacum qui similiter e libro ritualis Sacerdotis, ipsi extremam Unditionem administrantis, flocos & capillos, quos ibi adesse dicebat, avellere conabatur, sed quoniam in phrenitide, & potissimum in cephalitide, ita quandoque sunt irregulares illi motus, ut in quem hñem dirigantur non percipiant Medici, ideo spasmodicis annumerantur.

1. *Carphologia delirantium*; *Crocidismus* *Auctor*.

Vel ortum ducit a suffusione muscas, festucas referente, vel ab anxietate manuum, ut loco citare nequeant; vidi in puerulo vivo, fanissimo, etiam cum somno pacate indulgeret, motum illum in tendinibus & digitis continuam, qualis est in pede.

pedibus quandoque vespere, & in quietando pedum dicitur.

2. *Carphologia spasmodica Subultus tendinum, vulgo le febvre sans des tendons.*

Est motus palpitans ant tremulus, vel digitorum, vel simpliciter tendinum, iuxta carpum potissimum observabilis, qui in febribus malignis, phrenitide, similibusve morbis acutis delirio slipatis apparet.

Quam funestis sit omnis in fine morborum acutorum utraque carphologia norunt omnes; verum ejus theoria adhuc tenebris est involuta. Hic tendinum subultus, seu pulsus convulsivus, in quibusdam morbis, ut tritophya Americana, prænunciat delirium imminens, quod praevertitur veficatorio amplo protinus nuchæ applicato.

3. *Carphologia simplex.*

In hysteriis, hypochondriacis, arthriticis, alterner ex musculis digitorum identidem palpit, vel motu involuntario agitur, sine ullo alio symptomate, ac sine ullo incommodo; in nyctagno palpebræ vel musculi oculo vicini subsiliunt illæsa sanitate.

XI. *PANDICULATIO. Scordinismus Græcis; item Scordinema Hippocrat, cordinema quibusdam; Tiralloment.*

Est symptoma levidense, quod consistit in diffensione coacta plurium, vel omnium successivemembrorum, ut plurimum cum oscitatione.

Motus est contractivus musculorum extensorum in brachiis, trunco, cruribus, fugax, transitorius, periodicus, qui parum a libertate, partim a natura dependet, eoque sine videtur inhiitui, ut perspiratio excitetur, torpor corporis & animæ discutiat, musculique ad agendam aptentur.

1. *Pandiculatio torpidorum; P.*

Est ea quæ desidiis, tædio torpentibus, somnolentia gravatis accidit, nulliusque est momenti, immo ut oscitatio naturam jucunde sublevat, & aliquæ voluptate afficit.

2. *Pandiculatio febrilis; P.*

Est symptoma invasionis febrium intermittentium, ex quo etiam morbos ad intermittenti latente producos dignoscimus.

3. *Pandiculatio hysterica; P.*

Est symptoma hystericiis familiare, quod vulgo torpori sanguinis, seu ejus retardationi & spissitudini, tamquam principio, tribuitur.

XII. *APOMYTOSIS; Ebrement Furetiere.*

Est spasmodica capitis, & quasi tremula succussio lateralis cum expiratione sonora, & trunci agitatione, eo fine ut mucus narium excutatur, aut ut quid noxium e cute expellatur.

Symptoma illud apud jumenta familiare tantum est, aut in homine non satis observatum, & æternationis sine a quo tamen discrepat per expirationem veluti sterorosam enaribus fidam.

*Sauvages Nosologia Methodica, Tom. I.*

XIII. *CONVULSIO. Spasmus Græcis; Metus convulsus Riverii; Convulsio clonica Etymologi; Convulsio Boerhaave Aph. 230. Convulsion;*

Est morbus spasmodicus clonicus acutus, vel brevis in artubus, superfluit in paroxysmis nimis functionum exercitio.

Differt itaque hoc genus ab epilepsia & eclampsia per sensuum exercitium superfluit; ab hysteria, ex eo quod convulsio non sit morbus habitualis vel diuturnus; a pandiculatio, apomytosis, quod voluntas ad convulsionem minime concurrat, nisi sit simulata.

Partes quæ convellantur sunt artus, unde a trismo clonico, priapismo, palpitatio, singultu, &c. discrepat; artum convulsionem artum, non raro diversorum organorum, ut laborium, oculorum, agitationes junguntur, ut in eclampsia puerili.

1. *Convulsio ab inanitione Hippocratis; A.*

Est ea quæ a morbo, potissimum acuto, aut evacuatorio, exhaustis & morti proximis insupervenit; sic quotidie saniones experimur ea animalia fortius convellente mortem, quæ robore majore pollent, ut fues, quam quæ debiora, ut agni; & vix nullum est quod jugulatum non convellatur.

Veteres Physices igneri indicabant has convulsiones fieri per nervorum excitationem, ut charta pergamenæ ad ignem admodum retrahitur, cum humidum exhalat; qui crassus error vix refutationem meretur. Pseudo-mechanici felicius divinare se putant, & existimant ideo convelli exhaustos, quia languente in cerebro circulatione, dum in quibusdam arteriis cessat motus sanguinis, ille in aliis perseverat, adeoque respective celerior est, atque ex celeriori sanguinis per arteriolas minimas cerebri fluxu celeriore fluidi nervi in nervos influxum, & ex eo convulsionem deducunt; ex hac inanitione & debilitate summa convulsionis theoriæ mechanicæ se deduxisse putant.

Hujus theoriæ principia ruinosa sunt omnino, cum in physiologicis probetur vim fluidi nervi ad muscolum v. gr. cordis movendum requisitam esse millies majorem quam est vis, quam hoc fluidum a circulatione, seu a corde mutuatur. Vide *Dissertation sur la cause de la fièvre jointe à l'Hamorrhagie*.

Illustris Medicus urbis Cæte consuevit ad rheumatismum chronicum sanandum viginti libras sanguinis bidui spatio ex ægri vena mittere: Vide *Observation intéressante sur la Goutte, à Paris, 1747. pag. 334.* Cum hæc therapeia adhibetur, non raro accidit, maxime si verminosa putredo in primis viis, aut æger phlebotomiam timeat, ut cardiægiæ, syncopes, & demum fortes convulsiones ipsi superveniant, cum vomitione, sudore frigido, faciei mutatione, quæ omnia mortem præ foribus adesse significant; interea æger aqua frigida adpersus, vel cardiaco potu relictus, eadem die uberrimas iterum phlebotomias experitur cum incessanti

T

Cum

Cum *Illustr. Hales* ex equa pintas sanguinis quatuordecim successive extrahebat; successive vis sanguinis, seu ejus altitudo in tubo vitreo verticali carotidi aptato decrefcebat dimidia sui parte; cum vero animal fere sexdecim libras sanguinis amisisset, sudor frigidus mortem proximam intendebat: verum in his angustiis fataliorem mortis horam procrastinabat natura, excitatis convulsionibus, quarum interventu vis, seu altitudo sanguinis in tubo verticali major evadere, quippe convulsionum ope magna pars crurior qui in textu carnis hærebat, ad vitam actuali inutiles, expressus in cor affluebat, & ipsius motum sustinebat, cum demum octodecim sanguinis effluxissent libras, quarum viginti sex in corpore supererant, illico sanguis in tubi verticali fundum præceps ruebat, & animal mortem subito obibat.

Hinc patet convulsiones in extremo mortis periculo vitalem cursum sanguinis paululum sustinere, & ad aliquot minuta vitam prorogare, secus illico elapsuram. Sequitur ex experimentis Medici Cæcensis maximam partem terribilium symptomatum, quæ a profusa hæmorrhagia sequuntur, ab animæ terrore, magis quam a sanguinis jactura, procedere, cum illi ipsi qui a prima vel secunda phlebotomia convellebantur, resumpto animo, ubiores eadem & sequenti die tolerabant sine ullo infortunio.

2. *Convulsio a nervi punctura* Heister Chirurg. cap. 2. A.

Ea est quæ a nervi, tendinis, aponeurosis, membræ punctura exoritur; illæ enim partes ætenuis dolent & convelluntur, quia nervi quibus sciat puncti sunt, nisi nimis depressus cerebri cortex his convulsionibus ansam præbeat.

Quibus in phlebotomia e brachio puncta est aponeurosis, vel punctus tendo bicipitis, dolor in vulnere non statim sentitur, sed duodecim horis post phlebotomiam, isque non in loco puncto, sed altius versus ubi dolor se figit, & ex brachii extensione recrudescit: pars læsa tumorem avellanæ magnitudine contrahit, ex orificio ichor quidam jugiter distillat, quod est præcipuum puncturæ tendinis signum. Vide *Parrei Chirurg. lib. 9. cap. 38. Boneti Mercur. compilat. pagin. 230. & 247. Sydenham de pleuritide*, qui hoc cataplasma præscribit.

Cogne radicem lili tibi unciat quatuor in lallie libris duabus; misce farina lini & avena, ana unciat tres prius in lacte coctas: fiat cataplasma: mane & sero renovandum.

A punctura nervi, quam in Carolo Nono Franciæ Rege vidit *Parvus*, illico dolor vehemens oritur, brachium tonice convellitur, & intumescit: laxata ligatura, lintea oxycrato imbuta brachio applicata sunt, & emplastrum ex basilicone vulneri admotum, quod ipsius agglutinationem remoretur; dein oleum terebinthinæ coctum cum aqua vitæ vulneri infusum est, toti vero brachio emplastrum diachalcitico in aceto & oleo rosaceo solum inodurum est obvoluta insuper fascia expulsiua: his post trime-

stre spatium Rex sanatus est, dolor vero brevi mitigatus; decreverant autem, si dolor his remediis relictisset, vel oleum servens in vulnus infundere, vel nervum ipsum transversum rescindere, potius quam lethiferæ convulsionis periculo exponere. *Parvus lib. 9. cap. 38.*

3. *Convulsio febrilis*, Boerhaave aphor. 720. A. P. Ea est quæ accidit in augmento, vel statu febris tum continuæ, tum inflammatorie; quæ enim in agone supervenit, est convulsio ab inanitione.

Si febris sit verminosa, maligna, convulsio solet accidere, quoties phlebotomia celebratur, licet ea phlebotomia in vigore febris fiat, & a pulsus vigore indicetur; convulsiones enim quæ a phlebotomia in febribus accidunt, designant materiem verminosam, vel malignam in primis viis, ut monet *Barbeyracius*, & expertus sum. Convulsio illa febrilis dependet ab infarctis vasorum cerebri, sanguinisque stasi & inspissatione, quibus obviam ire natura contendit; nec magis mirum est tunc temporis convelli manus aut pedes, quam ad eas partes jam dudum amputatas referri dolorem; molestiæ enim quæ sunt in nervorum principio, ad partes quibus hi nervi prosunt, referri solent: convulsio febrilis peior est apyretica; si post crassam urinam sequatur urina aquosa, limpida, in acutis malum est: significatur enim convulsioni delirium aut soporem accessurum esse; si viribus jam exolutis convulsio accidat, ea mortis est prægnantia.

Curatur hic morbus ut febris ipsa, scilicet erigit victum ex liquidis, phlebotomia e pede, collo repetendam; deinde cathartica; si vero pulsus non vigeat, hirudines temporibus admovendæ; laudantur etiam vesicatoria dorso applicata, maxime si febris sit typhodes; aut æger ad soporem vergat: palli medio secti calde applicantur per doram capiti raso; sedata febre guttæ minérales anodynæ Hoffmanni decem vel quindecim identidem offerantur.

4. *Convulsio a capitis ictu* Boneti Sepulchret. de convulsione, observ. 23. A. P.

Ea est quæ tribuenda videtur ictui, contusioni, vulneri, commotioni diversarum capitum partium, ex quibus serius, oculis superveniunt diversarum partium, etiam e latere ictui opposito sitarum, ut brachii, cruris, digitorum convulsiones.

Invenerunt in cadaveribus saniem, pus, serum effusum, plexum choroideum cruro tergidum, meningem piam inflammata, pus in cerebri substantia inter meninges, ipsas meninges tumidas, &c. prout citius vel serius post acceptum vulnus æger perierat.

Si æger ab ictu concidat, vertigine, vomitione biliosa, aphonia laboret, etiam nulla frustra sit, metienda est convulsio, eclampsia, paraphrosyne, apoplexia, &c. unde operatio trepani indicatur.

A largis phlebotomiis & victu liquido ordinanda curatio; auxilia chirurgica ex *Heistero* & *Dionis* repetenda.

3. *Convulsio ab hydrocephalo* Bonetti Sepulchret. de convulsione; passim Villilius Patholog. cerebri, Carol. Piso de morbis a colluvie serosa, &c. A. P.

Infantibus hic morbus familiaris est; in horum cerebri sinibus, aliisque in locis post mortem seram effusum reperitur. Novi familiam, cujus infantes circa sextum ætatis annum omnes perire ex hoc morbo, scrophulis huic effusioni anam præbentibus; febricula inconstans cum alterno faciei rubore & pallore, necnon cæcitas & fastidio omnium vivebat; subito dein convellebatur vel gena, vel oculos, & post paucos dies e medio tollebantur: idem observavit Villilius. Convulsione etiam primo aut secundo ab octo mense infantuli corripitur in facie, præcordiis & artubus, forte propter molliorem & serositatem in cerebro, in quo casu pulverem de Gutteta bis in septimanam per annos præscribimus, & leves cathartes ex syrupo de eichorio, de floribus persicorum, callosi essentiam ad gutt. xij. essentiam succini ad gutt. ij.

6. *Convulsio nephalgica* Helmont. de Libiati cap. 7. A.

Duas observationes habet Helmontius convulsionum lumbalium, quas adscribit calculis in vena & uretere post obitum repertis, comitante nephalgia.

Si in una parte irritatur visexpultrix naturalis, ea surgit in alia, nec semper proxima, sed etiam in distita parte, ut totum corpus tantum concutitur. Schneider. de casarthis.

Motus convulsivos pluries in die exacerbantes sanavit Franklinius repetitis electrificationibus, quos nulla alia auxilia sedare potuerant. Vide historiam Journal de Med. de Vandermonde O. 7. 1739. Hunc morbum a decennio durantem absolute electrificatio oclies in die repetita; prima quidem commotio paroxysmum excitabat, alia altera anserat; supererat crampus quem trimestris electrificatio etiam sanavit.

7. *Convulsio raphania* Hl. Linnæi Gen. Morb. 143. *Dracunculus* Sueci; *Cranchkeir* Germanis; Vide Dissert. Illustr. Linnæi de Raphania, Amœn. Acad. T. VI.

Raphania dicitur hic morbus ex raphanistro, cujus semina, at plurimum scabino uberius mixta, crudelem hanc Epidemiam apud Suecos & Germanos passim inferunt.

Huius characterest contractura artuum cum agitatione convulsiva & doloribus atrocibus per periodos recurrentibus. Duratio morbi a diebus decem ad menses tres.

*Initium.* Artuum lassitudo, frigus & horripilatio vaga, capitis dolor, anxietas præcordiorum. *Augmentum.* Subtusulsi spastici digitorum & pedum, immoderatum & musculorum, sub cute visibiles, febris, æstus, stupor, delirium, pectoris restrictio, dyspnœa suffocatoria, aphonia, convulsiones simul horrendæ in artubus, præeunte fornicatione. *Status.* Paroxysmi convulsionum & dolorum atrocium vehementes, cum domitione vel diarrhœa, vermium reiectione,

æti, & in juvenibus balimia. *Declinatio.* Circa undecimum, aliis vigesimum diem sudores copiosi, exanthemata purpurea, in quibusdam tabes, in aliis stupor capitis, artuum rigiditas.

8. *Convulsio ab usitagine* VVeffer. Ephemer. natur. curios. observ. 120. *Convulsio causata par la saignée ordée*, *Convulsio Saloniensis* Hiflor. de l'Acad. des Sc. P. A.

Videtur eadem ac Suecana: Incipit a formicatione pedum, manuumque; sequuntur convulsiones in artubus, dorso, capite deinde dolores atrox cum aliqua mentis perturbatione, & pyrexia symptomatica; doloribus evanescentibus, eclampsia, apoplexia vel inflammatorii morbi superveniunt. Vide *Atti. Acad. Curios.* vol. 7. obs. 45.

9. *Convulsio Jodica*, Morbi familiares in Insula Bourbon, vel Mascarina. Vandermonde Journ. de Med. A.

A quovis vulnere, quavis punctura, vulnere sanato, si æger aeri vel aquæ frigidæ se exponat, is corripitur crampe partis affectæ, qui spasmus inde dorsum & caput impetit, mox trifidus maxillæ a sapore incipit, & totum denique corpus convellitur, atque nisi succurratur, misere perit æger.

*Cura* ex cardiaca, sudorificis, frigidioribus cum linteis calido; ligaturis artuum perficitur; verum si hæc frustranea sint, ferro candenti vulnus aperitur, quo remedio plures evadunt.

In hac regione frequentissimi, & diri sunt morbi convulsivi, a levi vulnere; & colica recens nam plures convulsi moriuntur; adulti a convulsione evadentes deformati vel paralytici remanent; epilepsia, hysteria, hypochondriasis, ubi frequentissima sunt. An usus testudinis, an vinum mellis, vinum sacchari seu Taffiat & Arac, quo abutuntur incolæ regionis calidissimæ ad 20. grad. latitud. meridional. in aere quem numerosi vulcani sulphureis, bituminosisque vaporibus insciant, huic morbo occasionem præbeant?

10. *Convulsio ab aluminis*, Baglivi p. 202. Prax. medic. lib. 2. B.

In quadragenario muscoli abdominis ingenter sublebant & convellebantur, quod rarissime accipit; sanguine per hæmorrhoidas emissio, injecta clysteribus lactis, & hausto oleo amygdalarum; & de syrupo papaveris rheodas in longo brodio dissolutis, postredie convaleuit.

11. *Convulsio universalis*. *Maladie sacree*, *Hieranostris* Patholog. methodicæ, & Illustr. Linnæi Gen. Morb. A.

Hæc species notatur continua noctu & interdiu facta agitatione omnium & singularum corporis partium, violenta & coacta, cum functionum animæ integritate.

Hanc speciem olim observavi Alesia in puella pubere nondum menstruata, quæ fascinata putabatur, quæque per octo dies continuè capite, oculis, lingua, collo, trunco, brachiis, digitis, cruribus, &c. agitabatur, noctu tamen quandoque paululum quiescebat, ad interrogata respondere conabatur gestu, & loquela;

T 2 quæ

quam tamen convulsiones intercipiebant; cibum & potum avide, sed ob convulsiones difficulter, assumbat, sensus omnes & aliarum functionum in ea viabant.

Insultis tribus phlebotomis & catharsi cum emetico, convalescit.

Similem morbum deinceps observasse scripserunt D. Duplex Med. & Tardus, D. Senten Med. & Goudem. D. Molard, Med. Massiliensis, ita ut non ita rara species sit. Dicitur hieranosus, seu morbus sacer, quia a fascino vulgo creditur inducta aut divinitus immissa, & reapse omnibus qui hanc observare tum Medicis tum idiotis admirationem movet.

12. *Convulsio habitualis* Convulsiones infrequentes. Schenckii obs. de spasma pag. 128. *Convulsio admirabile* de Marcel. Donat. P. L.

Differt a priori quod sit particularis, ut capitis vel pedis, sed habitualis, ita ut menses & annos perseveret, quotidie repetens vel per intervalla revertens cum functionum animæ integritate.

Mulier, quinto graviditatis mense tonitruo perterrita, incidit in convulsionem, quæ nunc hanc, nunc illam partem exagitat, quæque adhuc dum a novem mensibus quotidie data hora recurrit, scilicet hora sexta vespertina sæpius incipit, & ad dimidiam noctem perseverat, salvis omnino aliis mentis & corporis functionibus. Post puerperium & fluentibus lochiis paulo melius habuit: usu laudani sopienti aliquamdiu hi motus, deinceps reversi. balnea quinquedecim durante ipsa graviditate sine successu adhibita sunt; kinkina & martis usum suasit Ill. Hallerus: pulvis de guttæ cum juleiculis pulli & herbis cephalicis nihil profuit.

Marcellus Donatus vidit Monacham: quæ per plures annos convulsivas commotiones perpessa est, ita ut lecto cubare cogeretur sedendo; diu nocteque capite, collo ac scapulis commotis antrosum, retrorsumque incessanter, edendo, ac bibendo, concutiebatur, ita ut nec ipsa nec adstantes eam continere valerent, quominus id pateretur; quod si magna vi aliquando id prohibere tentasset, ea in animi deliquium inciderebat, maximeque affligebatur: ea nunc alternis diebus, nunc quarta quaque die, id patitur, quandoque per menses maxime æstate immunis est, immo cum somnum quandoque capessit, ab illo motu non vacat omnino; motus autem illi ab spina dorsii originem sumere videbantur.

Idem Donatus observavit mulierem, quæ continuo noctu & interdiu pollicem pedis sursum & deorsum alternis vicibus agitare cogebatur, quod invitis omnibus prædiis per annos ad mortem usque perseveravit. Vide Donatum hisser. mirabil. lib. 2. cap. 3.

Differt hæc species a Suecica quod chronica sine febre, sine dolore persistat, solummodo a convulsione universali ægri maxime opere defatigatur.

Ordo sacculus exigeret ut convulsio universalis ad alium ordinem dimitteretur, sed cum non deatur limites fixi inter convulsiones universa-

les & partiales, quippe in eadem ægitudine sæpe partiales abeunt in universales & vicissim, atque genus novum constituendum foret, satis est peccare contra ordinem sacculum; idem dictum esse de tremore partiali & universali, qui proinde ad idem genus attinent.

13. *Convulsio abominosa* D. Tissot, de morbis a Mistrupatione pag. 196. Quanius London 1752. P. A.

Penduli-faber adolescentem ex mistrupatione habituali quæ toties parvam epilepsiam inducebat, cum capitis retrorsum facta convulsione, gutturis intumescencia, sensuum obscuratione, intra annum maxime debilitatus a fœda libidine licet abstinens, sed serius, simili modo per horas plures vulgo duodecim convellebatur per diode cum doloribus dorsi atrocibus ita, ut ulularet, toto paroxysmo nil deglutire posset, pallidus, cadaverosus, inops, sibi misecus, macilentus, diarrhœa, pyralismo confectus, stupidus, oedematosus, sœtens, obijt. Vide Tabern. dorsalem, & Lumbaginem dorsalem.

14. *Convulsio Gravidarum*, Levret Art des Accouchemens pag. 224.

Præter eclampsiam Gravidæ sunt obnoxie convulsioni de qua silent omnes Auctores; paroxysmi terrorem incuriunt, & ad plures horas non raro perseverant, & nec cognitionem nec sensum obcurant, nec abortum inferunt, immo comaminibus partus accedentibus cessant. De eclampsia Gravidarum longe aliter se res habet. Vide Eclampsiam & Dissertationem A. Schæfenski de puerperarum convulsionibus Argent. 1763.

15. *Convulsio hemitonicæ*, Albrechtus Boonenii Collect. Francoen. Tom. 6. pag. 21.

Mulier, post lassitudinem brachii & truris dextræ, sensum fornicationis in toto latere sinistro patiebatur, deinde vero convulsiones in toto hoc latere, ne quidnon facie excepta, experiebatur; his subtilatis sequebantur dolor, tremor & debilitas brachii & truris ejusdem; phosphorus urinæ ad tria grana aliquoties sumptus hæc convulsiones sanavit.

16. *Convulsio intermittens*.

Centurio adolescens a quinque mensibus obnoxius est violentæ artuum convulsioni, quæ quotidie revertitur, & aliquot minuta, raro horam perseverat: animæ functiones, salve sunt, interea tamen ejulat, licet non doleat: cessa ante convulsione brachium dextrum flupet; & si vel leviter tangatur, dolet acerrime: manus dextra pendula manet, & si sinistra leviter prematur, quæ aliunde bene se habet, ipsa dolor atroci afficitur; hic æger ante annum multum caloris & famis passus erat in Lusitania, glandibus victans per aliquot dies; hæc ab ægro accepit Ill. Fices, qui diluentia & edulcerantia ipsi præscripsit.

#### XIV. TREMOR, Græcis Tremor & Tremblement.

Est motus depravatus artuum, capitivæ, in quo per brevissima spatia eunt, & redeunt, involuntario non.

non impedito tamen omnino motu libero eorumdem artuum, sine sensu acuto frigoris.

Ex his ultimis circumstantiis tremor a convulsione differt, nec enim debilitas motus est tremori essentialis, cum detur tremor vehemens, quem coactum aut convulsivum dicunt, nec in omni tempore pars libere elevata alternis vicibus proprio pondere deprimitur, cum tremor etiam vigeat in artu sustentato, adeoque independentem a gravitate. Differt autem a rigore febrili, catarrhi, quod non stupetur sensu summi frigoris ab interno principio oriundi, nec cutis constrictione & corrugatione subita, ut in rigore accidit; huius vero aetiologia adhuc dum in obscuro latet.

1. Tremor a debilitate Sennerti 1. Species; ut a venere, morbis evacuatoriis, inedia. C.

Ille est qui convalescentibus familiaris est; qui eos etiam afficit, qui equitando, laborando, dura instrumenta tractando, se defatigaverunt, his laboribus non assueti; illa species videtur pendere a debilitate facultatis motricis, quæ non nisi interjectis morulis artus gravitatem superat, adeoque alternatim attollitur a facultate & deprimitur a gravitate pars movenda.

Ille species distinguitur ex eo quod artu sustentato cesset tremor; hæc autem curatur quiete, somno, passu, analeptis, & moderato exercitio.

Omnis tremor, si coactum excipiamus, cessat, cum conatus voluntarius artus movendi definit, aut pars sustentatur; revertitur vero cum artum movere volumus, unde tremor distinguitur ab omni alio genere spasmodum.

2. Tremor senilis, Sennerti de tremore. L.

Ille species præter debilitatem habet etiam conjunctam tendinum musculorumque duritiem, quibus sit, ut fluído nerveo forte sint minus pervia hæc organa; sed intaabilis est.

3. Tremor temulentus, Placneri. P. L.

Ille species a longo & immodico liquorum fermentatorum usu sobolescit, adeoque vinosus familiaris est, & non minus insanabilis si inveterata, maxime vero vinum jejunio stomacho potatum tremorem inducit; oritur etiam ab opio, hyosciamo, aliisque inebriantibus, in quo casu oxycratum, acetumque ipsum optime contocant præmissis generalibus: qui in officinis tabaco parando destinatis operam navant, hoc tremore tandem laborant.

4. Tremor a Caffe, Baglivi pag. 76. a siccatate, &c. P.

Qui potu caffè utuntur immodico; maxime si sicci, Audiosi, melancholici, illi in manuum tremorem incidunt, qui abstinencia a caffè, alisque salis, piperatis & longo usu lactis, sanantur.

Vide curam 2. speciei D. Lazermi.

5. Tremor Metallurgorum, Sennerti spec. 2. &

4. Mill-reck, Essais Phys. d'Edimbourg. Tom. 1. V. Wilson. C. P.

Huic speciei singulari obnoxii sunt vulgo qui in plumbi, hydrargyri, aliorumque metallorum sodinis habitant, nudo corpore laborant, vel

Savvages Nosologia Methedica. Tom. 1.

etiam incaute se exponunt aeri frigido; post licus mercuriales aut diu tractato hydragyro, ut speculorum confectores, qui sumum plumbi, aliorumve metallorum sulforem excipiunt, ut aurifabri. Curatur electrificatione observante Ill. de Haen, nova curandi methodo. In gradu secundo Rachialgie Saturninæ, maxime si jejunus spirituosos liquores bibat, prætergalgodyniam, colicam, adheniam, stuporem artuum, accedit constipatio, colica rodens, febricula, cephalalgia vertiginosa, insensibilitas, delirium, rabies, extremum tremor, pulsus intermittens, mors.

Laudantur in hoc tremore decocta sudorifica ex radice acori, arctii lappæ; lacte cum decocto buxi, chinæ radicis; thermæ sulphureæ. Vide V. Wilson Essais Phys. d'Edimbourg. Requiritur initio cura rachialgieæ.

6. Tremor coactus, Sylvii de le Boe Prax. lib. 1. cap. 42.

In illa specie partes tremulæ, etiam sustentatæ, subsiliunt & veluti vibrantur, ita ut nulla laxitas locum habeat; hic tremor quandoque subsequitur, quandoque præcedit convulsionem, adeoque ab eodem principio pendere videtur, scilicet ab irritatione nervorum, tum in sua origine, tum in partibus, atque inde influxu fluidi nervei in musculos moderatores inordinato. Hic tremor etiam melancholicos & hypochondriacos aggreditur.

Curatur aquis sulphureis quales sunt Montis-aurei, Barregienfes, Bagnaulenses, inde usu jusculorum refrigerantium &edulcorantium, oleis blandis.

7. Tremor vertiginosus Boneti Sepulchret. T. 1. p. 67. Cephalalgia a verme in cerebro obs. 116. A.

In Marca Anconitana ann. 1571. epidemice grassabatur hic morbus cum cephalalgia quasi perterebrante, tremore convulsivo, vertigine, per paroxysmos redeuntibus & intra paucos dies occidentibus. Nulla profuere remedia; inventum est in cerebro insectum vermiforme, rubrum, digito longius, ore acuto, collo piloso, vivum, latens in cerebri sinibus; Saxonia Pauthei lib. 1. vertigines inter signa præcipua vermium in cerebro refert. Vermes quidem in sinibus frontaliibus non rari sunt; verum in cerebro, ipsove cranio soli testatur Bonetus Gemma, Ballonius, Roslincius, & Thomas Bartholinus. Vide Cephalalgiam verminosam.

8. Tremor ab Hydrocephalo Guid. Patinii; Boneti Sepulchret. de tremore obser. 7. & 9. ab humiditate D. Lazermi, curat. 3. C.

Hydrocephali voce intelligi fluidi ferofi, saniosi, vel similis copiam in ipsa cerebri cavitate. Gasp. Patinius in cadavere cujusdam Campani qui insolito tremore fuerat correptus, cum febre, hoc extincto invenit in cerebro serum multum subvirescens, cujus pars in medulam spinalem delapsa erat. Idem testatur Ignat. Thiermair; verum in vini potoribus hoc fere tantum observatum est, adeoque hic est tremor temulentus.



9. Tremor tendinum, subsultus tendinum, subsultus tendinum, subsultus tendinum.

Est symptoma febrium malignarum, phrenitidis, & aliorum morborum acutorum capitis: Vide Carphologiam.

10. Tremor scrobiculus, Sennerti, est tremor metallurgorum. C.

11. Tremor paralyticus Juncker. Conspect. de tremore ab infarctu cerebri & medullæ spinalis. C. Affinis est tremori ab hydrocephalo.

Coratur ut paralyticus; huic superueniens, boni ominis est; cathartica, iuscula diuretica, calida ex cancris, asellis, radicibus antiscorbuticis; aquæ thermales, iuscula sudorifica, opiatæ cephalica ex rheo, cascariis, karabe; fumus aromaticus ex thymo, karabe, &c. conducunt.

12. Tremor a saburra. B.

Quadragesarius, ætate præterita, tremore universali spasmodico correptus subito, sine febre, cum linguae sortidie, adivit me: præscripta phlebotomia, melius se habuit; sequenti die assumptis ipecacuanhæ granis quindécim & mannæ unciiis tribus, ano & cæto purgatus est; tertia die iterata phlebotomia, quarta iterata catharsis, & sanatus est.

13. Tremor a plethora, Hippocrat. 2. Epid. S. 4. de Scymargi ancilla. B.

Ex faciei rubore, arteriarum plenitudine, mensium, lochiorum, hæmorrhagiæ assuetæ suppressione, visu lautiori & otiosa vita cognoscitur; & phlebotomia, diæta tenui, potu infusi salviæ, melissæ curatur.

14. Tremor a pathemate, metu, ira, gaudio, libidine &c. Ill. Lorry de Melanch. T. 1. p. 92. B.

Qui vulnera in præliis passi sunt, aut chirurgicas operationes diras experiantur, non raro tremore per horas perseveranter laborant; ab ira etiam sæpius nec non a gaudio, a libidine idem accidit, immo quandoque periodice revertitur sine pyrexia. Mulier gravida, quæ maritum subito peremptum exhorruerat, genuit suum tremore miserando correptum.

15. Tremor Asturiansis. Vide Leporam quartam.

16. Tremor palpitans, Preysinger Classes morborum. Palmos Galeni.

In tremoribus vulgaribus, æqualibus temporum intervallis, non musculus, sed artus ipsemet alternatim attollitur aut deprimitur, aut in oppositas partes ite atque redit per minima cætera spatiosa; in palpitante vero sine ullo ordine musculi unus lacertosis subito sublevis, nec regulariter conspicuoque movetur, sed punctum semel aut bis, nunc minime intra idem tempus sublevis; An causa irritans in sensorio communi, an in musculo ipso palpitante querenda sit, ignoramus. Platali cuidam exploso & pastem attolenti hunc motum tribuebant Veteres ob velocitatem motus, & ob affectus huius fugacitatem: ne confundas itaque hunc motum cum pulsatione arteriæ vel aneurysmatis, nec cum motu respirationis in quavis parte pectoris vel abdominis, qui regularis est & rhythmicus.

17. Tremor traumaticus, M. Hoin Journ. de Med. Août 1753.

Est ille quia contusione capitis accidit, cum cephalalgia & asthenia universalis. Videtur pendere hæc series symptomatum ab erectissimo pericranii aut aponeurotica capsulæ totum caput cingentis, & fluidi nervi influxum in partes minuentis, unde asthenia & tremor universalis; his symptomatibus in observatione citata accessit pyrexia cum delirio nocturno crescens. Ast incisio crucialis loci contacti ad cranium quæ laxitatem hisce membranis conciliavit, unde illico fere cessant omnia symptomata.

18. Tremor rheumaticus Ill. de Haen. Tom. 3. observ. 19. C.

Est manuum utrumque tremor, cum harum partium dolore rheumatico, agrypnia, &c. morbus est diuturnus quem Ill. de Haen elestratione feliciter abegit.

19. Tremor typhoides Ill. Oringel & van Swieten de Malad. des Armes. A.

Est ille manuum tremor qui typhum carcerum ab initio comitatur, & illam speciem a synochis distinguit, maxime si a phlebotomia superveniat delirium & summa asthenia: Pringle tom. 2. cap. 6.

XV. PALPITATIO; Palmo Græcis; Caphora Serapionis; Cardismus Galeni in Aph. 65. Sect. IV. Formido Holerii; vulgo Cordis palpitatio; Palpitation. Du Cœur.

Est major cordis pulsatio quam ex arteriæ pulsu expectandum-esset, seu cum pulsu debili, sæpius intermittenti.

Cor ideo pulsus, vel versus costas ardet, quia dom ventriculi coarctantur, auriculis tunc turgescitibus & ab hac pressione resistentibus, basis cordis impellitur, unde motus ejus conversus eradit fortior, & quoniam in hoc motu aorta paululum inorquetur aut partem via sanguinis obstruitur, impetus sanguinis in arterias, adeoque pulsus minor evadit.

Ideo vero cor resilit vel a, quia fortius contrahitur ab influxu fluidi nervi, quam exigit copia sanguinis ejiciendi, ut in palpitante hysterica, a pathemate, &c. vel a, quia ob impedimentum sanguinis per cor transitum plus sanguinis solito congeritur in auricula, quæ proinde a corde contractio fortius premitur, fortiusque illud proprio elatere repellit.

In febre pulsatio cordis est fortior, sed pulsatio est palpitatio, quia pari passu fortior est arteriarum pulsatio; in syncope debilis est arteriæ pulsus, sed debilius pari ratione est cordis pulsatio.

Causa est conatus cordis obices circulationi oppositos, quos sensit, per fortiores pulsationem, superandi; unde principia palpitacionis duo sunt; 1. conatus cordis violentus ad augendas illius vires, ut in hysterici, hypochondriaci, in terrore; 2. obices in corde, auriculis, arteriis majoribus, pericardio, cum ex-

guit



gis cordis conatibus. Iude enim collisio crescit, minus tamen quam ubi conatus cordis est fortior.

2. *Palpitatio ab aneurysmate cordis* D. Senac. Malad. du cœur pag. 414. Lancisi de aneurysmat. P. C.

Frequenter dilatatur ventriculus, auriculaeque dextra, quam sinistri lateris receptacula.

Has dilataciones aneurysmata cordis voco, quæ hæmoptyses, orthopnoeas, asthma, phthysim, hydrothoracem sæpius inducunt.

Causæ efficientes sunt impetus sanguinis absolute auctus ab exercitii immodicis, unde curesores, bajuli, veredarii, crapulosi his sunt obnoxii; impetus vero eo major est in parietes cordis & auricularum, quo magis ipsi antrorsum resistunt ob valvulas rigidas, concreta polyposa, terrorem, pathemataque varia, a quibus cor, arteriæque confisidæ manent; unde coagulum sanguinis, polyposa concretio. Hinc mortes repentinae, suffocantes palpitaciones, ruptio aneurysmatum.

Signa pathognomonica sunt magna palpitacionum vis, & frequentia vel recrudescencia a levi occasione cum leipthymia, sensu molis majoris collas vel xiphoideam cartilagine mtegentis, & quod mirum est, quandoque pulsus vividus & plenus; cum scilicet auricula dextra sanguinis transiit obstitit, liberique simul sunt ventriculi, atque tunc temporis palpitatio levis est, virque manu percipitur, adde situm palpitacionis in latere dextro.

In paroxysmo phlebotomia, narcotica, absente leipthymia, diæta tenuis, quies corporis, & animi mortem proteclant.

3. *Palpitatio a corde officato* Ill. Senac. de corde p. 431, 437. Ill. Morgagni Epist. XXIV. 17. P.

Viginti plures extant Observationes officacionum in diversis cordis partibus cum pulsu debili, inæquali, palpitacione aliisque symptomatibus; aut morbi nulla datur adhuc certa & constans diagnosi; aortam maximam sui parte osseam videtur apud Bonetum, Vieussenheim, &c.

3. *Palpitatio calculea* Schenckii Libr. 2. de Corde pag. 297. P. C.

Ubi sex Auctores testantur se invenisse in ventriculi cordis calculos, & duo alii callos; plurimi ex his ægris palpitacione cordis laboraverant: tres observationes calculorum in corde, unam in pericardio tescunt Ephemer. Nat. Curios.

4. *Palpitatio tremula*, Tremor cordis vulgo, Cardilogos Galeni & Erotiani; non Hippocratis; Mal de la Lame, Pedemontani L. I. de Secr. Schenckius de Verm. cordis L. 2. Obs. pag. 296. P. C.

Character obscurus est. Galenus dicit esse motum quemdam cordis palpitacioni similem. Meo quidem iudicio est motus quasi tremulus pectoris cum pulsu inæquali & intermittenti, cui ille motus respondet, necnon cardialgia ad levissimum corporis motum recurrente, & dyspnoea. Ille morbus procedit ab aneurysmate auricu-

larum cordis, aut cordis ipsius dilataciones notabili, quæ sit ut vera palpitatio, seu impetus cordis in sinistram latus non percipiatur, sed motus quidam tremulus in regione cordis, quo pectus ipsius, sive inter inspirandum sive inter expirandum, exagitur, quasi a cordis palpitacione subsiliret.

Ex illa mole nimia cordis impeditur respiratio, ita tamen ut æger horizontaliter decumbe queat, nisi hydrothorax comitem se adiungat, quod in fine morbi accidit; premittitur etiam anæsthusus, unde dysphagia, immo nausia, venter etiam forte ventriculus, unde nausia, vomitio, & cardialgia; maxime cum æger erigitur.

Vidi in augmento morbi supervenire tussim & sputum sanguinis nigricantis, anxietates, oedema pedum, tibiærum, hydrothoracem tunc polypodipha, urina paucam, rubram, & difficultatem respirandi, quæ pectus & caput erigere cogit, ad inter dormiendum: is morbus videtur descriptus & observatus a quibusdam Auctoribus, quos citat Illust. Arabiarum Comes D. de morbis cordis, cap. de volumine cordis aucto.

5. *Palpitatio a polypo* D. Senac. l. 1. c. 10. P. C. Signum præcipuum est variabilis pulsuum inæqualitas, prout sedem aut figuram polypus mutat; dolores cordis quasi divulsorii. Signa dilatacionum in ventriculis si ductus arteriosi polypo obstruantur, in auriculis si ventriculi polypo obstruantur, pondus scilicet in parte, anxietas incredibilis, pectoris oppressio, a morte corporis crescentes moles.

Polypus in auricula vel ventriculo sinistro majorem dyspnoeam inducit quam qui in dextro.

Præcaveat polypi efformatio, si post magnos terrores vena tundatur, violenti horrores calido potu curentur, si in magnis morbis acutus pulmonum phlebotomia repetatur, potus diluens non negligatur; si in chronicis, ut melancholia, aquæ ferrugineæ & martialia usurpentur.

Dato polypo sobrietas, quies animi & corporis; phlebotomia conveniunt; inter dissolventia polypi sal tartari & sapo atque demum aqua calcis tentanda videntur.

6. *Palpitatio polyposa, a polypo in cordis sinistra parte* D. Senac. P. C.

Ille morbus inducit symptomata quæ sanguinis congestione in pulmone majorem sequuntur, ut dyspnoeam, asthma sine tussis, aut anæsthusm materiam pituitosæ, phlegmæ sive præter symptomata antecedenti speciei communia, ut dolores in regione cordis, anxietates, suffocationem a corporis animæque motu velociori, syncopes, lipothymias, asphyxias.

Observandum autem est maximam partem, polyporum, qui in cadaveribus reperiuntur, in agone mortis ortum duxisse, conglata & concreta sanguinis lymphæ, ut sanguis pleuriticus in pasella coagulatur: multos aperiunt phthysicos, hydrothoraces, asthma mortuos, quorum cor concretiones polyposæ, ramosæ obstruebant; plures extraxit funiculos polyposos ex aorta ad crura & brachia extensos.

7. *Palpitatio aneurysmatis* a Lancisii de aneurysmate lib. 1. prop. 5. P. C.

Vidimus inauratorem qui cordis palpitazione & dyspnœa laborabat, credebaturque aneurysmate tentatus; non allevatus a phlebotomiis repente obiit. Abfessus inventus fuit liquore melicridis turgidus, ad basim pericardii, inter omnia, alteramque ejus tunica.

8. *Palpitatio ex aorta aneurysmate* Baglivi pag. 403. P. C.

Nobilis vir de Venenobre sexagenarius lapsus ex scaula suae Bibliothecae ante duos annos passus, angores in præcordiis, palpitaciones, dyspnœam patiebatur; metuens ne pro vaporoso derideretur a suo Medico, morbum suum silentio premebat; demum flans & natam suam alloquens in ictu oculi mortuus incidit. Medicus ordinarius accurret & apoplexiam incusat; alter catarrho suffocanti mortem repentinam tribuit; ego rupto aneurysmati juxta cor illam adscripti, & præfagium meum confirmavit cadaveris sectio; aperto thorace magnus saccus lividus conspectui sese offert, erat pericardium cruore densum; aorta quadruplo crassior solito in suo exortu lamellis ossibus intus erat obducta, extus rimas nigras ostendens; ex illi rimis cruor effluerat in pericardium; hæc Alesiae triginta abhinc annis circiter.

Puella passa est per duos annos ingentem palpitacionem, vertigines, frequentes syncopes, dyspnœam, pulsus inæqualitates, aliæque aneurysma aortæ indicantia, & eventus docuit partes ab arteria aneurysmatica sanguinem accipientes sæpe corripit formatione, roripola, impotentia ad motum, necnon paralyti: Baglivi ibidem; ubi videre est quod pronunciat Lancisius in magnis aneurysmatis, progressu temporis supervenire leucophlegmatiam, vel alitem: Lancisii de aneurysm. prop. 140.

In aneurysmatis aortæ majoribus & sphericis non raro accidunt concrectiones polyposæ, lamellatæ, ut vidit idem Lancisius, & D. Marcei Hist. de l'Acad. R. des Sc.

D. de Senes Societatis Reg. Monspell. Geometria illustris lapsus erat in dorsum a duobus annis, exinde conquerebatur de dolore pectus transdientem usque ad quartam dorso vertebra cum levi dyspnœa & palpitacione, ast maxime cum pulsus periodica quovis minuto intermissione; obiit hæmatemese, cadaver ostendit mihi aortam descendentem facci instar pollicis diametro dilatata (vide hæmatemese s.) Mirabatur Chirurgus Girard cum perferutando pectus cadaveris inveniret quæ ibi inveniendæ fore prædixeram.

9. *Palpitatio ex aorta angustia* Lancisii de aneurysm. prop. 53. VVillisi to. 1. pag. 145. Vieussens observ. tract. de corde. P. C.

Palaggius Canonicus hypochondriacus reverenda palpitacione, pulsus inæqualitate atque intermittencia, necnon asthma ac vertigine vexabatur, maxime ex vehementi corporis motu vel animi pathemate.

Cadaver ostendit valvulas aortæ offas, vel cartilagineas, inde angustatam aortam, unde auricula dextra, vena cava & ventriculus dexter, minime vero sinister, ad pugni magnitudinem erant dilatata, quippe civitates dextræ longe molliores & tenuiores sinistris; non mirum itaque si a renixu sanguinis dilateatur.

Senex cerevitiæ & vini potator assiduus palpitacionem pati crebro solitus erat; cadaver aortæ truncum mox a cordis exitu ossum, eoque latera valde compressa ostendit: VVillisi de palpiti. pag. 145.

Domina de Castres orthopœica palpitacione & pulsus inæqualitate dudum laborabat; cadaver exhibuit aortam totam, necnon arterias iliacas, spermaticas, trachæam, &c. ossificatas: Vieussens de corde observ.

10. *Palpitatio a pancreate* Storckii Ann. Med. I. pag. 245.

A violenta vomitione in muliere subito suppressis catameniiis supervenit præcordiorum anxietas, cordis palpitatio, frigus extremorum; successu temporis perseveravit palpitatio, pulsatio in epigastrio, & sub paulo fortiori corporis motu animi deliquium; accessit tumor sub stomacho; tempore catameniorum crescebant symptomata. Post mortem pancreas fuit saccus credidim grumosi sanguinis libris farsus.

11. *Palpitatio arthritica* D. Lazerme, Profess. Monspell. P. C. a scabie repulsa Fr. Hoffmann, III. 76.

D. Rouzier septuagenarius arthriticus Senator nullo insultu arthritidis biennio passus, post curas graves vertigine fuit per tres menses confectus; successerunt palpitaciones cordis; suppressa vertigine, sanguis caput per intervalla impetebat, sese suffocabatur in palpitacionum paroxysmo, pulsus evanescebat, de polypo cordis vix dubitabant Medici; pulsus intermittens maxime; post hoc temporis intervallum, sen 18. menses, doluerunt pedes arthritide, & illico sanus evasit.

12. *Palpitatio chlorotica*, P. L.

Quæ chlorosi laborant; suppressis catameniiis, habent paucum cruorem qui densum thrombum copioso sero inundante relinquit; magna debilitas a fibrarum laxitate oriunda hujus principium est; stipantur femora gravitate, spontanea lassitudine, dyspnœa ad lestem cursum, ad scalarum ascensum, sæpe pica; curantur longo usu martialium.

13. *Palpitatio hysterica* Sydenhami, P. L.

Cognoscitur ex igitur hysterice, spasmis internis, magna pusillanimitate, pathematum tristitum concursu, & ex eo quod ex levi occasione, ut terrore, gaudio, accedat atque recedat.

Magna insensibilitas animæ, & corporis debilitas huic anam præbent.

Curatur quiete corporis & animi, liquorum spirituosorum odore, & cardiacorum potu; secus ad fortida, antihysterica deveniendum est.

14. *Palpitatio melancholica* Rhodii lib. 2. observ. 40. P. L.

Junior medicus fusci coloris, & melanolicus animi pathematis diu vexatus, & cibis acidis, acerbis abusus, cordis palpitationem, cum sonitu & arteriæ carpi vehementi pulsatione, atque convulsiva constrictione seu tensione, palpus est; ischalybe, cardiacis, purgantibus morbum suum exasperat, verum consilio *Lancisi* succo pomorum per duos menses sumpto convaleuit: *Lancisius* de aneurysmat. prop. 44.

Ex arteriæ aortæ vel pulmonalis constrictione spasmodica, ex inducitur; illa vero constrictione excitatur a majori systematis nervi sensibilitate, & aliquo vicio in textu illius arteriæ ob visum acrem. Vide D. *Sennæ* malad. du cœur lib. 4. cap. 9. §. 3.

15. Palpitatio febrilis. Storck Ann. Med. t. 75.

**XVI. CLAUDICATIO;** Colores ac Colera Græcis, ac Cholera Castellis; Agri Claudi; Gallice Boiteux, qui cloche, qui saint, ou boite.

Est vitiosus gradiendi modus, quo truncus singulis passibus huc vel illuc inclinatur, & cras indecore movetur, vel dissculter trahitur.

In statu sano cum pedem dextrum antrosum promovemus, centrum gravitatis corporis leniter loco mutatur, & incidit in basin pedis sinistri; rursumque posito pede dextro sinistram attolimus, & cum centro gravitatis, axis trunci sibi semper parallelus incidit in basin pedis dextri, & sic vicissim, verum apud claudos axis trunci minime suam parallelismum servat, sed nunc sinistrorsum, nunc dextrorsum inclinatur, ut æquilibrium servetur, & lapsus præcaveatur.

1. Claudicatio a clorre.

Ea est quæ excitatur ab ischiade, arthritide, vulnere, contusione, phlegmone, erysipellate, aliove quovis affectu, aut morbo cuiuscumque partis, cujus dolorem intendit gressus; tunc enim accidit ut non libere & expedite possint agere musculi artus inferioris, quæ sequatur dolor; unde ab extendendis aut contrahendis hisce musculis abstinemus; unde artus alter altero brevior evadit aut rigidior, inde vero claudicatio, quæ tamdiu perseverat, quamdiu ipse dolor, immo quandoque sedato dolore parva inducitur consuetudo, aut musculi non sufficientem flexibilitatem recuperant; quamvis vero auxilia in his casibus indicentur, cuique obvium est.

2. Claudicatio rachitica. L.

Apud infantes, claudicatio anatina, seu utriusque lateris, quæ valgo tribuitur lumborum debilitati, procedit ex eo quod collum femoris angulum fere rectum cum axi femoris constituit, unde crura divaricantur; & major evadit distantia unius pedis ab altero; proindeque ut centrum gravitatis transferatur ex uno latere ad alterum, necesse est truncum per majus intervallum transferri a dextris ad sinistras & a sinistris ad dextras, ut æquas inter gradiendum solent propter majorem pedum a se invicem distantiam; ea vero claudicatio sponte corrigitur ætate progrediente, modo tamen in-

fantès illi non cogantur progredi maturius quam par est.

3. Claudicatio a fractura. L.

Ea est non quæ ob dolorem fracturæ recentis, sed ob brevitetem artus inde sequentem accidit, cum fractura non fuit ulla tenus aut rectè reposita; quippe si in eo situ v. g. femur repositum fuerit, ut sit rectum, cum debet esse incurvum, totus artus erit longior quam antea, unde claudicatio; quippe inter gradiendum centrum gravitatis corporis, quod in statu sano horizontaliter transferretur, jam oblique nunc descendet, nunc ascendet; si callus fracturæ coalitæ accrescens musculum distrahatur, inter gradiendum musculum illum laxum retinebit homo, ne nova contractione alterius distrahatur, & doleat, unde claudicatio. Si vero fractura restitui nequeat, ut cum caput femoris fractum est, tunc femur, in viciniam tota musculorum & ligamentorum vi retractum, decurabit artum, unde claudicatio initio dolentissima, successu temporis indolens ob occallecentiam loci in quem extremum ossis fracti se recipit.

4. Claudicatio a luxatione. L.

Quæcumque pars luxationem passa sit in artu inferiori, sive femur, sive tibia, sive tarsus, sive iocrotorium, sive dextrorsum, tunc adductores, vel adductores elasticitate non æquilibrata artum inflectunt, adeoque decurrant, quippe longitudo cruris & tibie est maxima, cum recta protenduntur ossa in una linea, quam cum alterum os cum altero includit angulum, idem fiet si antrosum, vel retrorsum facta luxatione superveniat inflexio coacta, unde claudicatio ob artuum inæqualem longitudinem.

5. Claudicatio a contractura. L.

Artus decurrantur, cum tendines contracturam patiuntur, ut in Rachialgia, hemiplegia scorbutica, arthritica, aliisque, quippe flexores musculi tortius contrahuntur quam extensores, unde artus flexus remanet, unde claudicatio sine dolore.

6. Claudicatio mutilorum. L.

Quibus amputatum est vel crus, vel tibia licet artu ligneo in ejus locum utantur, necessario claudicant; quippe cum nullus in tarso, metatarsi, & digitis possit servari motus proprius, non potest successiva digitorum metatarsi & tarsi inflexione leniri, & gradatim fieri progressus uniformis, qualis apud sanos integros; sed coguntur artum ligneum extrorsum circumrotando transferre; & humi talum subito figere, unde radis sit descensus centri gravitatis; hinc vero claudicatio.

7. Claudicatio a debilitate. L.

Si alterutrum crus debilitate paralytica, seu etiam vera hemiplegia labore, oritur claudicatio; immo in utroque affectu, ut in paralygia imperfecta, accidit modus autem progrediendi in utroque morbo est diversissimus, sed vix verbis describi potest.

## ORDO. QUARTUS.

## SPASMIC. LONICI UNIVERSALES,

Quibus addenda sunt species quadam convulsionis & tremoris.

CUM cerebrum sit origo communis omnibus nervis, verosimile est ipsi inherere principium proximum morborum hujusce ordinis; in spasmis partialibus, sedes materiam morbosam sapient est extra cerebrum, ut in corde si sit palpitatio, in crure dum est claudicatio, &c. non mirum proinde, si sæpius quadam animi functiones lædantur in morbis universalibus spasmoticis, ut epilepsia, eclampsia, &c. quæ sæpius intactæ remanent in partialibus.

XVII. RIGOR; *Phorcasmus* & *Phrisia* Dioscoridis; *Phrisiasia* Gorræi; *Græcis* *Rhiger* ac *Phrica*, *Horror*, *Horrillatio*, *Algor* ac *Frigus* Latini; *Erissen*, *Refroidissement*.

Est successio tremula, coacta, cutis cum sensu frigoris; unde differt a tremore, qui quandoque frigus febrile aut catarrhale comitatur; nam in tremore artus etiam succutitur; in rigore vero cutis corrugatur & excitari videtur.

*Rigor febrilis* Jonstoni idea medicæ. *Frigus febrile* Boerhaave Aphor. 621. *Erissen de la Fievre*. P. Duplicis est indolis, nam vel adest frigus vel nullum est, illiusque loco vel spasmotica vibratio fortior, partium dolor, aut aliud symptoma spasmoticum; vel frigus adest, quod rursus est vel adstantibus ad palpum sensibile, ut accidit in tertiana vulgari; vel frigus est ægrotanti soli sensibile cum calore nativo in eadem parte quam Medicus palpo explorat, & hoc accidit in remittentibus malignis, ut amphimerina, epiala; immo quandoque dum frigit & horret ægrotans, cutis ipsius paulo calidior est ad sensum Medici quam in statu sano; distinguendum est itaque frigus reale a frigore sensitivo quoad solum ægrum.

Rigescencia valorum minimorum sensum frigoris in ægro excitat. Vidi in amphimerina, epiala, corpus totum vehementissimo tremore concutatum cum trismo tridentem, suffocativa dispnoea, cum simul æger calebat toto corpore; pulsus vero erat rarus, mollis, inæqualis, & sedato illo rigore, pulsus rarior, minor, magis inæqualis evaderebat, ita ut cardiacis opus esset, nec calor increfcebat. De hac tarditate & raritate pulsus in accessu febrili & remittentium paroxysmis videatur *Mortonius de proteiformi febriæ intermittentiæ genere*. Vide *amphimerinam algidam, febrem algidam Tertii*. Dividitur rigor febrilis in criticum & morbosum. Criticus seu salubris censetur, si die critico accedat, si corpus ad ipsum incalcescat, aut aliqua dejectione sequatur. Insalubris est febricitulosus.

1. *Rigor catarrhalis*. P. B.

Qui amphimerina catarrhali, simplici rheu-

mate, coryza, angina catarrhali corripuntur, in invasione per intervalla frigus subcutaneum cum rigore pariuntur, huncque motum tremulum spasmoticum per vim coherentem, si anhelum comprimant, & locum in lectulo non mutant, secus frigore & tremulo motu concutuntur; frigus vero sæpius a dorso & medulla spinali, quandoque e nucha, procedere videtur, ita ut per nervos hæc sensatio & agitatio serpere videatur.

Erigori febrium intermittentium simplicium succedit calor huius intensitati respondens; in malignis vero nulla pyrexia aut exigua succedit; pyrexia in simplicibus sudore terminatur, non vero semper in malignis; ad rigori catarrhali nec notabilis pyrexia, nec sudor succedit.

3. *Rigor a purulentia*. P.

Post morbos inflammatorios, ut pleuritidem non solum, superveniunt rigores anomali sæpe vespertini, quos sudatiunculae & pyrexia excipiunt, quippe suppurationem sentiem designant; desiderantur huius rigoris signa characteristica ex pulsu, proprio gradu frigoris, aliisque circumstantiis.

Rigorem cum tremore universali observavit *Baltonius* in ægro, cuius sanguis totus albus erat, quasi chylus aut pus. In summo frigore febrili observavit *Illde Haen* gradum caloris realis descendisse tantum a 99. ad 97. therm. Fahrenheitii.

4. *Rigor a pishematis*. B.

Nonne terrori tribuendus est rigor cum tremore summo quem passus est vir qui in digito ab scorpio paucis fuerat? Is quidem simul doloris ptingit vos quasi formationem in toto corpore pariebat; ac applicato ad locum læsum scorpionis sanatus est; sed ea non me inducunt ad credendum hos affectus veneno scorpionis tribuendos esse, cum in Lusitania, ut in Occitania, veneno careant hæc insecta. Vide *Amati Lusitani observ.* 31. centur. 6.

5. *Rigor a frigore*.

Est ille qui ab aere frigido, mora in nive, aqua frigida, ventro gelido, nudo corpore, &c. accidit. Particulæ igneæ quæ se continuo dissuntunt & corpore calido in frigidum continuum, eo uberius exeunt et calido, quo majus est discrimen temperaturæ, majorque contigui frigidi densitas, utique quo æqualis sit sub eodem corporum pondere particularum ignearum in utrisque quantitas, ut patet experimentis in animalium statica factis. Vide *eximiam Ill. Hambergi differt. de frigore*.

Cineres calefacti supra corpus hominis submersi & frigidissimi recens ex aqua extracti calorem vitalem ipsi reddidere: panni calidissimi, quibus involta est puella e puteo extracta, & pro mortua habita, marmoris instar frigida, eam ad vitam revocaverunt. Vide *Aphysiam*.

6. *Rigor tertianarius*. Communicabar Ill. D.

Ghapal. D. M. Monfp. P.

Mulier sexagenaria per duos annos aeternis ut plurimum diebus corripiebatur universo rigore, in quo frigus potissimum eminebat, quo per viginti quatuor horas albebat cum pulsu parvo & ra-

& raro; hoc elapso tempore per diem integrum sana erat, & vegeta usquequo alter accessus eam frigore congelaret.

Tentata sunt incaalum diversa a periculis Medicis remedia, quibus tantummodo quædam identidem per aliquot dies obtinebantur induciæ, & typi mutationes; verum post duos annos sumpto quotidie infuso foliorum ribesii nigri, vulgo *cassia* dicti, sensim convalevit.

7. *Rigor febriculus, Algidæ febris* Torti de febribus; P. A.

Est algor horridus, periodicus, a veneno febris intermitteas, vel remittentis procedens, cum pulsus depressione, exilitate & frequentia, tamque pravis aliis symptomatis, ut æger in agone constitutus videatur non autem a quavis febris genere, sed ab intermittente tertiana duplici, eaque maligna aut amphimerina phricode pendit ille perniciosus algor, e quo potissimum ætate proceßi ægri e medio tolluntur. Vide signa & curam phrenitidis, pleuritidis, cholerae, aliorumque morborum, quos febriculos indigitamus. Est enim eadem cura.

Consultatur *Anonymus de recondita febrium natura*, cap. 19. pag. 106.

XVIII. ECLAMPSIA, *Convulsio dei infans*, *Insultus epilepticus*, vulgo *Mouvement convulsif*, *Eclampsia* Gorræi definit.

*Eclampsia* vel *eclampsia*, agitatio qua pueri exiliunt & calcitrant propter membrarum cerebri morsum vel dolorem, vel incipientem convulsionem, qua voce usus est *Hippocrates lib. 3. coactar. aphor. 35.* Gorræi definit.

*Eclampsia*, vulgo *epilepsia puerilis*, differt ab epilepsia vulgari quod sitacata, quandoque remittens, aut omnino continua, ut patebit ex speciem historia; definiti potest morbus convulsivus, clonicus, æctus cum sensuum in paroxysmo feriatio.

1. *Eclampsia typhodes*. Vide Sennert. de febribus lib. 4. cap. 14. *Febris magna cum spasmo* Sennert. An. *Convulsio Suecica*, seu *Rephania* Linnæi? P. A.

Hic morbus in Colonienſi Episcopatu & VVestphalia grassatus est anno 1795. convulsionibus vetrico, delirio, ac mentis alienatione, nunc cum febre, nunc sine febre, homines gravissime affligens. 1. Invahebat sub forma vellicationis, formationis & suporis in pede, vel manu, nunc in uno, nunc in utroque latere. 2. Dein digiti affecti convellebantur contractione vel extensione. 3. Serpebat convulsio ab extremis ad truncum e cubito in humerum, ex genubus in coxendicem: 4. Tunc æger instar globi convolutus vel recta exteotus procumbebat. 5. Aderant simul dolores qui elamores horrendos ciebant. 6. Sæpe convulsio nec opinantes subito invadebat, vomitumque excitabat, atque hic affectus non nisi post multos dies caput afficiebat, si remedia apta adhiberentur. 7. Sæpius ægri epilepsia & sensuum amissione laborabant, & a paroxysmo immoti veluti mortui diu jace-

bant; aliqui amentes, aut veterinosi, aut delirii per aliquot dies erant. 8. His peracidis bouimia cum diarrhoea accedebat, plerique pedes & manus intumescabant, aliis pemphigus accedebat. 9. Morbus contagiosus habebatur, epilepsia subinde recrudebat, delirium in stuporem insanabilem abibat, & sanati ab his morbis quolibet anno mense Decembris aut Januario aliquid mali sentiebant.

Eadem symptoma peste infectis supervenire solent, teste *Cardano l. 2. de subtilitate, Palærida loc. comm. 4. 3. c. 17. Petro Salio Diverso de peste lib. c. 5.* Hæc epidemia sequebatur annonæ caritatem, adeoque visum ex pravis cibis, fructibus corruptis, fungis, &c.

Curabatur ex præscripto Academiæ Marpurgensis, 1. cathartici, 2. antispasmodici, 3. liu nervino, aromatico, &c. Videtur idem esse affectus qui alias a *Vitellio*, *Buddæ* visus est.

1. *Eclampsia verminosa*, *Insultus epilepticus a verminibus* P. A.

Apud infantes vulgaris hæc, & a convulsione non potest distingui, quia hæc ætate functiones animæ facile obcurantur, a gravi quocumque morbo, & infantes facile somnolenti evadunt.

Curatur vero eodem modo quo convulsio a verminibus in paroxysmo, ab ætate 5. ad 10. annorum. Sic ægerbat *Riverius*, salis vitrioli drachmam semissem præscribebat, præmissi, si opus esset, enemate purgante; vomitione excitata convulsiones sedantur, & si revertantur, cathartici instituntur; deinde vero olei succini, & spiritus vitrioli, ana guttæ quinque, præscribuntur; sequenti die, fit julepsus ex aquæ cardui benedicti & scordii, ana uncia una; confectiois alkermes, drachma una; salis cardui benedicti, scrupulo uno, cum aqua theriacali, vel aqua naphæ; vermifuga vero minime negligenda sunt, Vide *River. observ. 28. & 39. centur. 2.*

Vix ullus est morbus qui plures infantes e medio tollat.

3. *Eclampsia parturientium* Mauriceau chap. 28. liv. 2. *Accouchement accompagné de convulsion*. Baglivi p. 336. Nic. Puzos: *Spec. 3. Levret p. 224.* Shafonsky de puerperarum convulsionibus, Argentor. 1763. P. A.

Sæpius ab eclampsia tum mater parturiens, tum foetus, ac uterque perit, nisi promptissimum feratur auxilium; motus scilicet convulsi per intervalla redeuntes superveniunt, sive ab incrimis naturæ periculo commotæ conatus, cum scilicet ob immodicam hæmorrhagiam accidunt, sive translatione vividioris sanguinis ad cerebrum, ob vehementem quam in molimine partus patitur commotionem, & ob plethoram, sive demum ob acriorem uteri distracti dolorem.

Parturientes vero vel in intervallis convulsionum mentis suæ compos est, vel somno sepulta, spumans ore jacet. In hoc secundo casu nulla spes est salutis superest, in priore vero unica spes est in embryalicia, seu prompta fetus exclusione, quam natura sola rarissime, ve-

rum obstericantem Medico-Chirurgum adjuva, potest exsequi.

Periculum autem est in mora, maxime si menorrhagia simul vires auferat, & quanto citius more solito manu butyro illira, in uterum, si paulisper hiet, immissa, foetus pedes adducendi, & partus accelerandus.

Si vero minime hiet uterus eclampsia superveniente, nil aliud tentari potest præter phlebotomiam e brachio vel e pede, (si eclampsia a menorrhagia non exciteret, sed a plethora, agitatione, aut dolore,) atque clysmata ex decocto fennæ, cum catholice, eo fine, ut tormina uterum apertientia ciantur, non neglectis linimentis os uteri lubricaturis, ex oleo, adipos, butyro: in hoc vero casu emeticum præscribere inconsultum est; quippe docente experientia, hæc eclampsia abalterutro ex prædictis principiis procedit, quorum nullum tolli potest, sed potius augetur ab emetico; perniciosis itaque illud medicamentum ablegatur, nisi ex oris sætore, linguae spurcitie, nausea indicetur, & absit menorrhagia.

Sunt mulieres quæ eclampsia in omni partu afficiuntur, sive ante, sive post exclusionem foetus; docet autem observatio Mauritanæ eas ab hoc morbo evasisse, quæ bis terve in decursu graviditatis, semelque instante puerperio sanguinem sibi detraxi curaverunt.

In partu etiam facili quadoque mulier subito conqueritur de suffocatione & marmarigis, de gravi cephalalgia frontali, vel occipitali, de subita amaroſi, quæ sunt proximæ eclampsie prodromi; illico una vel duæ largæ phlebotomiae instituendæ sunt, nec ad extraxionem foetus properandum, si his præmissis parvis rite procedat, tormina revertantur, & mulier sui compos evadat; verum si recurrant convulsiones, cum spuma oris & signis anginae convulsivæ, aut cessantibus convulsionibus sopor urgeat, tunc post phlebotomias clysmata injiciendum est cum lenitivo, diaphœnico, in infuso foliorum matricariæ, artemisiz, & si uteri os non magis ac magis hiet, ad foetus extraxionem recurrendum est.

Non tamen notabile matris levamen a foetus extraxione illico supervenit, ita ut ægra perquam alteramve diem convulsionibus, sed quidem rarioribus concutitur, aut raro obruta obdormiscat, sed symptomatum immutatio optimi est augurii: si vero, extraxio facta, symptomata illa non remittant, de muliere actum est. Vide D. Puzos Traité des accouchemens pag. 172.

4. Eclampsia a delirio: Helmontii de lichiaſi cap. 7. Epilepsia nephritica Frid. Hoffmann. de epilepsia; Eclampsia ab odontalgia, odontalgia Hoffmann P. A.

In Comie & in morali vidit Helmontius eclampsiam lethalem; alter habuit in renibus calculum adunatum & acutum; altera in uretere; uterque post diros dolores nephralgicos crudelibus convulsionibus obiit.

a. Eclampsia rachialgica, Cl. Bonté Journ. de Med. Jan. 1782. pag. 21. P. A.

Est varietas eclampsie a doloribus & frequens est apud rachialgicos, hystericos; gravior si rachialgici sunt robusti & vegeti; Curatur ope laudani cum castoreo aut camphora, facilius tamen si emetica præmissa fuerint ratione rachialgiæ; si præmissa non fuerint, narcotica cathartici sunt maritanda; si vero pertinacia eclampsie inducat ad suspicandum vitium seu infarctum in cerebro, a phlebotomia e pede ordiendi est curatio.

b. Eclampsia ab œstalgia, Jour. de Med. Fevr. 1764. pag. 130.

Larvæ quatuor conicæ, in aure purulenta genitæ, dolorem atrocem & dein convulsionem excitabant; frustra oleum injectum fuerat; M. Bertrand has larvas extraxit & ægra convulsi.

c. Eclampsia a dentitione, Convulsion causée par la formation des dents. P. A.

Infantuli minorem, canini majorem, molares maximum dolorem inferre censentur; an quia obtusiores? dolor miome a gingivis perforandis oritur, sed a nervo in dentic radice compresso; gingivæ sine dolore secantur.

Quo accessus eclampsie frequentiores, eo pejus; quo in intervallis minus valet, magis stupet infans, eo pejus; si frequentes sint accessus & in intervallis papillam recuset infans aut sopore tenetur, fere semper lethale.

Curæ. A phlebotomia inendum est, nisi æger debilis sit ab inactione; clysmata iteranda, nec enim convelluntur in dentitione quibus alvus est laxa, dein semigrammæ kermes mineralis identidem in aqua tiliz ipsi præbetur, ut alvus laxetur. Interea nutrit refrigeretur aqua pulli, oryzae, hordei, sero lactis, immo purgabitur, ut infans inde purgetur; alumnio oleum amygdalarum dulcium perutile est; debilitato dein præcribuntur antispasmodica, ut spiritu cornu cervi guttæ aliquot, pulvis de gutteta grana aliquot, in julapio cephalico.

5. Eclampsia a saburra Boneti Sepulchret. de epilepsia puerili, obs. 9. Eclampsia humoralis Levret. P. A.

Si nutrices ira, vel terrore graviter commotæ statim ubera præbuerint alumnis suis, hi sæpius haud ita multo post, epilepsia corripi observantur: Hoffmann.

Hodie infans sexennis summo mane subito corripitur convulsione continua totius corporis cum anæsthesia sine prodromo, pallidulus, macer, asphyctus erat; præscripsi potonem cardiacam & antihelminticam; in primo cyatho tartari sibiati granum; post duas horas syrupi Glauberiani gutt. vi. deiecit, vomuit virides mucus, & statim eclampsia recessit, superstitæ febre, & lassitudine; cras purgandus est.

6. Eclampsia ab ischuria. Schneiderus de catarrhis pag. 244. P. A.

Quibus urina supprimitur per aliquot dies, febribus ardens, subitus tendinum, delirium, sopor, & varii motus convulsi superveniunt, uri-

na sanguini remixta; quippe si injiciatur atramentum per ureteres, illud facile in venam e-mulgentem transit, ut expertus sum, adeoque simili via urina sanguinem inficit.

In hoc casu si phlebotomia repetita, clysmata, irrigationes emollientes, potus nitrosi nihil præstiterint, tumetque hypogastrium, acus tricusplis cannula inclusa immitti debet per peritonæum in vesicam, si catheter immitti non poterit, & urina eliminanda est.

7. *Eclampsia plethorica* Schneideri de catarrhis pag. 234. *Eclampsia a plethora* Drelincourii apud Bonetum obs. 6. Levret pag. 224. P. A.

In illa specie a phlebotomia pedis repetita larga, a sanguisugis ano appositis, victu tenui salus expectanda est.

8. *Eclampsia ab inanitione* Galen. Levret des Accouch. P. A.

A sanguinis profluvio convulsio & desipientia malum: *Hippocr. aphor. 9. sect. 7.*

Ea eclampsia est conatus naturæ quo se vertat nesciæ, & præsentem statum intolerabilem quovis alio matore cupientis; extremo autem huic periculo obviam eundem est cardiacis, a-motacis, & anæplexis.

9. *Eclampsia traumatica* Bonet Sepulchret. observ. 23. tom. 1. pag. 329. P. A.

Quatuordecim casus recenset Auctor convulsionum, cum sopore, delirio, sensuumve obscuratioe, ob percussum, fractumve cranium in quacunque parte, inventis quandoque pure, sero effuso, sanie, abscessu, meningē inflammata, cerebro depresso, fragmentis cranii, &c. intra cerebrum. Vide *Dianis, Heisteram, &c. de vulnerib. capitis.*

Idem accidere visum est ulcere diaphragma rodente *observ. 24.* carie vertebrarum spinalem medullam denudatam vellicante *observ. 26.*

10. *Eclampsia exanthematica, a variolis* Sydenham pag. 80. & 662. a *retroessione potchiarum, variolarum, rubola, purpura, ab achoribus suppressis* Fr. Hoffmanno. de Epilep. a *miliari* Allioni de Miljari. P. A.

Quæ variolæ prælium supervenit boni est ominis, licet aliquot dies perseveret, atque eruptionem pusillarum discretarum præcedit.

Epilepsia symptomatice differt ab epilepsia exanthematica ratione acutici eclampsia & morborum quibus debetur.

11. *Eclampsia ab atropa* P. A.

Anno 1750. mense Augusto puer septennis manducavit in horto regio Monspelienfiali quædam beccas Belladonnæ, (atropa Linnaei, melanocephala, vel solani furiosi) paucis post horis effecit ruher, scarlatino rubore, sine calore, rubedo universalis erat, deinde convulsionibus totius corporis per 12. horas fuit divexatus, cum febre notabili & delirio læto. Mane sanguis missus est, uude symptomata imminuta; oleum amygdalarum sumptis, & vespere multum deiecit per inferiora, deinceps sopore ab hora sexta vespertina usque ad nonam matutinam detentus fuit, & sanatus est intra 40. horas a morbis initio.

Decocto atropæ levissimo diu continuato, & hausto carcionoma mammæ sanatum videtur *in observ. Vandermonde 1753. & in ill. Halleri disputat. morborum tem. 2.*

12. *Eclampsia ab ananache* P. A. Journal de Medecine Novembre 1752. pag. 430. observante D. Richard Chirurgo Bellinfulæ ad mare.

Ananache crocatae *(Linn. spec.)* radices, carotis similes succo lacteo, dein croceo, sapore acris, ingrato, usitatae sunt a pluribus milibus.

Hocce venenum latuit aliquot horas in vetriculo, sine ulla, aut dein in intestinis strages edidit maximas, quippe intestina post mortem sola continebant succum flavum radices, & tenui sola erant purpureo-nigra, maculis lividis gangranosis repleta, cetera vix mutata.

Symptomata; horrendi vomendiconatus, dolores atroces præcordiorum & cordis, convulsiones violentæ in oculis, facie, maxilla, ita ut nihil omnino deglutire possit æger, & quasi in eclampsia mente captus videatur; intelligo autem ex imperfecta hac historia verum risum sardonium ab hoc veneno excitatum fuisse cum constititione spasmodica œsophagi & maxillæ.

Quibus os per vim aperiri potuit, emetico magna aque copia diluto & deglutito venenum ano & cato rejectum est; clysmata, potiones in usum advocatae; oleola, lacticia, mucilaginosa pingua adhiberi debuissent; imminuto paroxysmo, quid sentirent prius ægri eloqui potuere, supererant tamen vertigines, cardiacæ, syncopes, aut demum omnes evasere.

13. *Eclampsia a cicuta* V. Vespfer. de cicuta aquatica.

Pueri duo & sex puella mense Martio comederunt radices cicutæ Linn. quas pro carotidis habebant; omnes autem serius, acius, intra paucas horas correpti sunt eclampsia, qua intra horæ dimidium duo obiere, ceteri opo vomitionis brevi evasere, ejecit radicum manipulis. Cum autem maxilla convulsa esset, dentes quibusdam effracti sunt, & theriaca aceto soluta, aliis infusum tabaci has vomitiones salubres concitaverunt. Jacobus Mæder sexennis de cardiacis querebatur, vix verbum effatus, humi prostratus, urinam ad viri altitudinem eminxit, mox terribili aspectu cum omnium sensum abolitione convulsus fuit, os arctissime clausit, ut nulla arte aperiri valuerit, dentibus stridentibus, oculos mire distorquebat, sanguis ex auribus promanabat, circa cartilaginem xiphoideam quoddam corpus pugni virilis magnitudine patris manum validissime feriebat, vomiturus quandoque videbatur, nihil tamen ore clauso ejicere valuit, artus mire scabebat & torquebat, sæpius caput retrorsum abripiebatur, totumque dorsum incurvabatur in arcum; cessantibus convulsionibus per momentum matris opem imploravit, mox patri ferocia illis redeuntibus, nullatenus excitari potuit donec viribus deficientibus expalluit, & manu pedinis admodum expiravit. Post obitum abdomen & facies



eies ingruerunt absque livore nisi pauco circa oculos conspicuo; ex ore cadaveris usque ad horam scripturæ spuma viridis largissime emanavit, licet sæpius deterla.

Catharisa Soror ejus adultior eadem fere symptomata dein passa est, sed vomuit, immo sumpta theriaca aceto soluta, iterum radices eiecit, deia contigit, jacuit sine voce & quasi mortua per horas novem; postridie ad mentem rediit, diu de gasterodynâ querebatur, per quadriduum delasiata, obambula vit, convulsiit omnino. Qui parcius radicem comederant, levius afflicti fuerunt. In puero bienni eadem symptomata, palpitatio vehemens, singultus, faciei rubor, oris stridura, artuum jactatio, sumpta theriaca manipulum dimidium radicem evomuit, intra octo horas omnino convulsiit.

Puer octennis tardius afflictus fuit, sed vehementius, initio quasi temulentus vacillavit, cecidit convulsus, ore stricto, corde validissime palpitante; sumpta theriaca ex aceto non vomuit, nec minxit, brevi obiit: omnia in cadavere eadem ac in Jacobo Mædero, spuma viridis ex ore, corporis intumescencia, livor circa oculos.

14. *Eclampsia a coriaria*, Memoir. de l'Acad. R. Paris. ann. 17... P. A.

Vir quidam sibi commotus baccas coriariæ comedit, quæ gustui minime sunt injucundæ, nigæ, striatæ; post horæ quadrantem cardialgiæ expertus, vertiginosus, in paroxysmum convulsionum universalium cum omnium lésuum teratione incidit; accessit Chirurgus emeticum propinavit, nuda baccas circiter decem evomuit, nec inde sublevatus est, sed paulo post iteratos paroxysmos expertus est, & in Nosocomium devectus & lecto in solum lapsus facie livida obiit. Aperto cadavere inveni maculas exiguas rubras in tunica villosa stomachi, & undecim coriariæ baccas, sanguinem fluidissimum, cetera bene se habentia.

Baccae a D. Lefèvre Medico Uctienfi Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiæ, amico, chymico agregio fuerunt examinatæ, in illis verum gustum tum analysi chemica nil acris, nil corrosivi deprehensum est.

Idem ac ille vir infortunium passus esse alios sex homines diversæ ætatis circa Alesiam diversis temporibus compertum habui.

Capræ annosiores, utcumque fame pressæ, ab arbutulis illis sibi cavent: at juniores imprudentes folia juviora carpunt, & inde velut temulentæ, vertiginosæ, interdum humi procurrent & convelluntur, sed non minus convalescunt; minor itaque energia foliis videtur inesse, quam baccis. Oves si folia edant abortiunt.

15. *Eclampsia Nephrotyrum* Vandermonde Dict. de Santé. Enfant. p. 56. des Convulsions. P. A.

Recens nati ideo quodque convelluntur quod in partu laborioso nimis debilitati fuerint, quod non sufficienter nutriti sunt; hanc debilitatem ex pulsu exiguo, molli, ex oscitatione repetita, ex vagitus defectu cognoscitur. In hoc ca-

su præscribendum vini cochlear cum aliquot guttis elixirii proprietatis, vel præscribatur potio cathartica coactilem sumenda.

Infantes natu majores, ablactati v.g. eclampsia verminosa, a dentitione, a saburra acida &c. sunt obnoxii, quæ singulæ species singularem medelam expostulant.

16. *Eclampsia ab hydrocephalo* vulgo des éaux dans le cerveau. P.

Morbus est frequentissimus, & qui magnam partem infantum tollit & medio: certis etiam in familiis gentilibus; quem etiam prævidere possemus, nam cum lemel factus est, nullate saluti spes est.

Accidit infantibus trium, quatuor, quinque annorum, maxime illis qui scrophuloso viri sunt infecti, quorum parentes syphilide laboraverunt, quorum mesenterium glandulis duris est oblitum; incipit ab inappetentia & fastidio omnium rerum, etiam crepidulorum; morosi sunt, seu voluntatibus & aversionibus contra morem, & rationem addicti, pallidi, cum pulsu parvo, languido; alterutra gena per intervalla rubet, althenia accedit, capite nutant, languent, dein subito os distortetur, oculi, ve uterque fixus & nubilus evadit, vel faciei quædam pars, manus agitatur, convellitur, mente obscurata, stupida, & intra paucos dies cum pulsu frequenti debili & inæquali, pœunt. Secto cadavere ferum in ventriculis cerebri copiosum observatur, idque frequentissimo, monente Villiffo.

Puer sexannis Noscomiæ generalis videtur somnolentus, naribus digitos continuo admove, febricitat, facies alternatim rubet, & pallet, purgatur cum vermifugis, deinde pulverem de guttata cum vermifugis, & alternis diebus aequilam albam cum cathartici sumit quinquies, nulli vermes exeunt, licet videretur interdum velut a vermium strangulari, deiecit viridia, toto corpore convellitur, tunc hirudines temporibus admoveatur, hinc pejus habet, post duodecim ab initio morbi dies moritur. Medicus, qui, me absente, hirudines præscripsit, febrem malignam incussabat.

Sectio cadavere, nullum in abdomine vitium, cerebrum vero molle, pulsatum, ejusque ventriculi sero distenti. Verosimile est a materie verminosa inspersatum sanguinem in cerebro hæsisse, inde serum delapsum esse, sed nulli vermes unquam visi sunt.

In aliis subjectis simili morbo peremptis inveni etiam ferum in ventriculis cerebri; & glandulas mesenterii tumidas, parum crooris in vas, viscera mollia, carnes laxas, pallidas; indicantur itaque tonica, martialia, rheum, pulvis de guttata, potus roborans, ut vitium, ad hunc morbum præcavendum, rara cathartica quæ vires non infringant, amara si ætas illa vellet admittere: ut plurimum pulvis de Guttata diu frequenterque in prophylaxim usurpatur.

17. *Eclampsia febricula*, vide Morton pyretol. cap.

cap. 9. hitor. 24. & 25. Journ. de Med. Tom. XXI. p. 224. T. 8. Art. 6. P. A.

Sunt insautum, juniorum ut plurimum, cœrotici affectus, in quibus pallidus, attoniti, suspiriosi, aulseli, subfrigidi sunt, & juxta *Morisonum* alicubi convulsi, qui statim per paroxysmos more febris intermittens reveritur, licet ex pulsa febris dijudicari non possit.

Cura incipit a vesicatoriis, linctu pectorali, pulvere de guttata in potu-cardiaco, & dein paulillo kinkina in julpio cephalico.

Circa curam hujusce Clasis plura excogitare egregii Opiferi, incomparabilis Archiatri *G. van Swieten* usus & exemplo incitati, & quidem in Epilepsia spontanea, præmissa cathartici & phlebotomia, dedit *Clariss. Lecher* sero & mane per longum tempus pulveris foliorum aurantii drachmam, vel manipuli unius decoctum in aquæ fontanæ libra una factum ad mediocriter consumptionem, cujus colatura mane bibitur pro una dosi; ex quatuordecim ægris sex sublevati sunt, quatuor nullum effectum experti, & quatuor sanati: ego vero in epilepticis duobus adhibui sine successu.

Idem camphoræ drachmam semissem; sacchari & gummi Arabici, ana scrup. unum; aceti unciam semissem; aquæ florum sambuci, uncias duas; syrupi florum papaveris rhœados, unciam unam miscuit, hujusque mixturæ cochlear quavis hora isdem epilepticis propinavit, additis nunc laudani liquidi guttistriginta, & nunc vero insulo contrayervæ & decocto febrifugo cum spiritu vitrioli acidulato, quod etiam in malignis morbis profuit. Ausus est idem, & quidem feliciter, epilepsiam aggredi mixtura ex opio, quod quidem in epilepsia vel eclampsia a nervi punctura oriundis, vel hysteriis tantum, ausus essem. Kinkina quidem, ob vim antiperiodicam & forte sedativam, plures antea adhibuerunt.

De usu olei animalis Dippelii in Epilepsia parum proficuo scripsit *J. C. Baumer* in *Actis Acad. Moguntinae*, Tom. 1. pag. 297.

In Eclampsia febrili cum delirio & subsultu tendinum, moschum magna dosi cum aqua vitæ sumptus profuit, sedorem & somnum conciliando: moschum vero unodum expertis ad grana xij aut xx præscribere tutum non est, quippe grana iv quandoque stomachum irritant & calefaciunt maxime; consultius est a granis ij incipere: ea vero dosi mirum quantum exhilararent, sopiantur & sublevantur Hystericæ. In eclampsia variolosa idem remedium ad grana viij feliciter adhibuit *Clariss. Keid*, in hysteria ipse & moschum & extractum hyosciami albi incipiendo a semi-grano cum successu adhibui; vidi etiam Hystericam unica electrificatione sanatam. In scotolythe, chorea S. Viti, *Illustriss. de Haen* & *Clariss. Marteneux de Grandvilliers* electrificationem feliciter adhibuerunt, quæ in Epilepticis pluries a me adhibita vix quidquam effectit.

Phalater, experiundicaua, fabarum S. Igna-

tii grana x sumptera, incidit in convulsionem cum cardialgia: *Illustriss. P. de Jussieu* ipsi præscripsit alkali volatilis guttas vii omni quadrante horæ in vehiculo convenienti sumendas, quibus convulsi.

Aqua destillata Lauro-cerasi suo oleo essentiali onasta, si intus sumatur, eclampsia lethali sopore terminata creat, nisi adhibeatur alkali volatile; *Journ. de Med. OB.* 1760. p. 320.

XIX. EPILEPSIA, ab *epi lambanestai*, de super deprehendi, non ab *epi* & *lads* ut Latino-barbari putaverunt; *Merbus Divinus* Platonis, *Hepentolis* Aristotelis, *Comitalis* Plinii, *Sacer* & *major* Celsi, *Sentius* Auli Gellii, *Caducena*, *Viridellus* Paracelsi, *Analepsia* Iperii, *Mater puerorum* Schneifleri; dissellendo *subito* Germanis; *Gallus Epilepsie*, *Mal caduc*, *Mal de la terre*, *Mal S. Jean*, *Vapeurs Epileptiques*, *ham-mal*.

Genus est morbi spasmodici clonici & chronici intermittentis, cujus accessus subita interceptione sensuum, variorum musculorum agitatione & dyspnœa notantur.

Distinguitur ab eclampsia ex eo quod morbus sit chronicus; a *Tertane* quod sit etiam chronicus & clonicus cum sensuum seriatione; a *Catoche* quod agitentur partes, & respiratio in paroxysmo sit frequens, interturbata, sæpe peritosa; ab *Apoplexia epileptica* ex eo quod periodice recurat; ab *Hysteria* per animæ extra paroxysmum habitalem securitatem, cum sint in hysteria meticulositas, in paroxysmo strangulatio, globus abdominis, alique differentie.

Est morbus clonicus universalis, chronicus & periodicus, cum sensuum seriatione in paroxysmo, & antea totum oblivione.

Sunt qui spumam oris, qui pollicis fortem contractionem symptomatis pathognomonici annuerant, verum illi unicam speciem epilepsie dari præsumunt, licet omnes auctores idiopathicam a symptomatica distinguant, & utramque a principiis omnino diversis oriri quandoque consentiant. Naturæ perterritæ & turbatæ conatus subitaneus & vehemens ad expellendam vel corrigendam materiem morbosam, ut plurimum cerebro insidentem, aut partibus nervosis insensam & irritantem, videtur paroxysmorum causa; quorum principia sunt sæpius materialia v. g. glandulæ in cerebro, vasorum varicosorum, aut aneurysmaticorum cerebri insarctus a plethora, insecta sinus narium pungentia, meningibus intumescens infixa; calculi renum, lymphæ acris, & viscida, semen acre, &c. Alias mega animi pathemata, somnia potissimum terrificæ, in subiectis valde sensibilibus hysteriis, teneris, videntur paroxysmorum principia; ex quibus labefactatur cerebrum, & ad novos paroxysmos disponitur.

Nihil magis repræsentat furorem bruti, ut canis, ab œstro, vel tabano in auribus vel naribus irritati, quam epilepticus, ut patet ex clā-

clamore, mugitu, oculorum truculentia, dentium frigore, oris spuma, pugnorum confligione, vehementi totius corporis contractione, ita ut niser epilepticus videatur atrocissimam in cerebro lationem experiri, & desperabunde exagitari.

Hoc suadet exquisitissima quæ est in origine nervorum sensibilitas, si quis stilo acuto cerebrum denudatum persodiat, nullus sensus in cortice; verum cum ad originem nervorum, seu medullam oblongatam stylus pervenit, illico animal epileptice insultum patitur; & si ad originem medullæ spinalis deveniat stylus, illico toto corpore convulsus dicto citius moritur, ut pluries sumus experti.

In aures & nares intrusa corpora eo majorem & acutiorem excitant dolorem, quo altius & altius intruduntur hæc corpora etiam mollissima, ut plumula, seu quo magis ad originem nervorum acceditur; nec dubium est quin sensus in labyrintho sit multo exquisitior quam in tympano, & hic quam in auricula &c.

Si dolor atrox a principio inconspicuo, & quod removere aut a quo nos liberare nequeamus, nns urgeat in partibus ad vitam quam maxime necessariis; homo, quantumvis stolidus, (nisi penam meritam virili fortitudine expectet) eum non sine involuntariis conatibus, clamoribusque sustinet. Vidi nobilem Genuensem paroxysmos convolutionis quos præsentebat, magna animi contentione prævertisse; viderunt & alii alios, verum exigua erat irritatio, gravioribus autem succumbebat; & demum maniacus evasit.

Stultam naturam vocat *Heisterus*, quæ vero novum sit & inauditum hominem in vehementi pathemate ratione destitui & delirare. Neone delirat ille, qui hominem in simili casu rationis suæ semper compotem affertit? Novi adolescentulam quæ bis vester in anno epileptice paroxysmus experitur; interrogata quid experiatur in eunte insultu, respondit se inter dormiendum somniare, & ipsi præ oculis obversari phantasmata terrificæ paulo ante huius morbi in vationem; dein vero quid factum sit non reminiscitur; adstantes vero eam tanquam terrore percitam & a lecto exilire conantem retinent, ne te præcipient deiciat; ab eorum vero manibus ægrota se expedire, oculis torvis & minacibus, brachiis & cruribus convulsis, per duas vel tres horas nititur.

Cum vero accessio appropinquat, ait *Arriani*, splendores purpurei aut nigri ob oculos versantur, ut in cælo iris prætenta videatur, aures sonant, secundum odorem sentiunt, iracundi sunt, bilis præter rationem accenditur; his porro fragor quidam redditur perinde ac si lapide verberentur aut ligno; eumque ab humo surrexerunt, commemorant quædam tanquam si ex insidiis vapulaissent; hinc in insultu adiutores inclamant, futuramque calamitatem præspiciunt; obsecrant quoque, ut membra unde morbus oritur collingant, reflectant, dirigant, quin etiam ipsimet sibi ipsa membra, tanquam inde morbum eximentes, tra-

hant, velluntque; atque ita subimet auxilium nonnunquam & nos ad ægritudinis noxiam impulerunt; nonnullos utique cæci invadente fera pavor corripuit, aut phantasmata imaginatio incessit. Epilepticus tauri jugulari similis est, caput varie & horretur, corpus cæci arcus inflectitur, supercilia nonnunquam, ut in illis qui ad iram concitantur, in glabellam attrahuntur, vel ad tempora vehementer revelluntur; eorum vox nihil nisi gemitus & suspirium est; respiratio vero suffocato quædam est, velut in iis qui laqueo strangulantur. Ceterum quum a morbo quo eicunt, ob initio segnes sunt, capitis gravitate premuntur, languidi, palentes, animo consternati; ob lassitudinem, morbiq; verecundiam constillantur.

Quare vero sensus sentitur seu objecta præsentia non apperipere videantur, ita ut clamoribus non respondant, hoc neminem hæcenus explicuit; nec enim hypothesis falsa de nervis quibusdam minime sensiferis quidquam explicat; nervus nullus est in homine qui punctus non sentiat; cum anima sensationis recipientis capax est; verum anima summo quodam pathemate percussa sensationis alterius est incapax, ut docet observatio; multi in ira paroxysmo vulnerati sunt, nec vulnus senserunt, nisi deserviente pathemate, aut cruore conspecto; in summo terrore, vocem adstantium non audiunt perterriti; ad apperipiendas impressiones objectorum requiritur animæ attentio, vel saltem tranquillitas. Qui delirio, somnio, ebrietate, catalepsi afficiuntur, oculis apertis nihil vident, auribus patulis nihil audiunt, puncturas artuum, quos strenue movent, vix perentiunt, monent *Galenus*, & ex præcedi vix aut obscurissime eorum quæ peregere reminiscuntur, ita & epileptici.

Symptomaticam epilepsiam vocant Auctores eam quæ initium sumit a symptomatibus, quæ ad caput non referuntur, ut a dolore, anxietate, frigore alterutrius pedis vel manus, quas partes ipsimet trahunt, & distrahi jubent, adstantesque eas etiam stricte ligant, unde paroxysmi sæpe prævertuntur.

Verum ea symptomata originem habent in ipsomet cerebro, ut dolores imaginarii eorum qui, tibia dudum amputata, digitis pedis acciteri dolent, quia cum anima affluet sit referre objecta tactus ad cutem, licet extremum alterum in cerebro latens afficiatur, sensatio semper ad cutem refertur, ut in suffusione, affecta retina, objectum seu musica refertur ad aërem. Sympomaticam epilepsiam etiam vocant Auctores, cuius principium in aliam partem refertur, quam ad cerebrum, v. g. epilepsia uterina, quæ cœsetur oriunda primis ab utero obstructo, unde sanguis superfluus caput impetie & infarcit; epilepsia crapulosa, quæ a saburra stomachi primis deducitur. *Hippocrati* & *Galeno* repletioni & inanitioni convulsionem tribuebant; sed *Averroes* dicit theoriam convulsionum suo tempore receptam esse potius verba libellæ æneæ tium

tium quam demonstrantium. Deinceps Sennertus & tota Medicorum schola dixit causam esse iritationem facultatis motoricis, quæ utcumque alias libera sit, & non nisi imperante voluntate motus exsequitur, tamen a summa iritatione contra nutum voluntatis agere cogitur. Motus muscularis, ait Sennertus, numquam sit ciera appetitum aut rationalem aut sensitivum; cum itaque voluntas seu appetitus rationalis non jubeat motum, illum a cupiditate seu appetitu sensitivo juberi manifestum est. Hæc Sennertus de convulsionis causa.

In veterata & habitualis epilepsia idio insaniabilis est, quia ob repetitos infarctus cerebri meningis & vala materia morbosæ discutiendæ destituta, debilitata sunt, quæ hereditaria; quæ ultra 25. ætatis annum perleverat, insaniabilis.

Definit in amarorism, multitiem, facitatem, seu morosum, oblivionem, paralyfim, ac lethalem apoplexiam.

Epilepsia perfecta est vel imperfecta.

Brendelius & Pitcrnaris videre epilepticos qui senserant atroces capitis & dorsi dolores intra paroxysmum.

Votum Avershois & Gratonis ut nocent epilepsie causam & remedium, adductum est votum Medicorum.

Quæ in corpore vivente sunt operationes ab anima, ejusque facultatibus proveniunt, unde hoc etiam inordinatus motus naturæ solam excitare extra omnem dubitationis alæ est *Scneider de epilepsia*.

Causa. Accurrimus facultatis naturalis ex pulticis, contra molestias irritantes, in universo musculorum genere excitatum certamen: *Schneider*. Qui noiam a morbo impressam semel habuerit, ille amplius morbo hoc non corripitur: *Hippocrat. de morbo sacro*. Grandiore natu neque interficet, neque contorquet (artus.) Senes vel interficit, vel paralyticos reddit; morbo jam affluet paroxysmos præsentiant.

1. *Epilepsia plethorica* Boneti Sepulchret.; *Epilepsia symptomatica* Fr. Hoffmanni; a sanguine crasso, polyposo Fr. Hoffmanni, a catamenio hæmorrhoidibus, quæ retentis a crapula, ebrietate habitualibus. P. C.

Sanguis grumulosus, viscidus in sinibus cerebri reperitur, teste Frid. Hoffmanni; obs. tres referent, Bonet. Sepulchret.

Hæmorrhoidarii huic etiam obnoxii.

Potus vini vaporosi, cerevisiæ nimis lupulæ; aer vaporibus narcoticis, carbonum fumo inquinatus; usus allii, cape, porri, aiumi; quæ caput tentant & calefaciunt, ac narcosim inducunt, ut carnes nigre, leporinæ, indigestæ, hanc excitant. Solvitur in puellis circa pubertatem, quæ impuberes aggressa est.

Quæ a cephalæa, vertigine, capitis plenio obstruunt & defectum electricitatis in aere ortum ducit, curatur sponte regionis & loci mutatione ut docet *Hippocrates*. Quæ a sanguine spisso, crasso, viscido, quartana superveniente solvitur.

Adolescentes peregrinis dudum laborabat epilepsia, pluries quavis septimana tepetente, cum malitissimo Catili Anagnini, frustra per annum

*Sanguis Nephrologia Methuica. Tom. I.*

adhibuit usitata auxilia; at dein sublevatus, non sanatus, usu valerianæ sylvestris, adiit celebrem Medicum & qui repetitis phlebotomiis eum perfecte sanum dimisit. Alter Epilepticus suavis Medicorum passus est quilibet septimana phlebotomiam per duos menses, & semicupia; pedum oedema evanuit, accessuque epileptici retardati & imminuti admodum fuerunt.

2. *Epilepsia catbolica* Frid. Hoffmanni. *Serap. ejusdem*; *Serap. Carol. Pison. S. 2. p. 2. cap. 7. Ballon. consil. I. 12. P.*

Est quæ etiam recens corpora pallida, chlorotica, obstruata aggreditur, & a sero acris, fallo, superfluo, ob menstruum suppressionem rocento oritur, ab ulcere manuum, pedum, Plateri.

Ab scorbuto Boneti Sepulchret. obs. 7. 24. Ex lientis, pancreatis, hepatis obstructions Blasii, Tilingii.

Indicantur cathartica quibus via sternatur opiatis, juscisque aperientibus martialibus, tonicis, & cephalicis.

3. *Epilepsia hæmorrhica* A ventriculo Jonston. idea; *Analepsia Riverii P. C.*

Est quam foret & excitat crapula, cardialgis, ructibus, anorexia, dyspepsia, nausea, vomitione prægressis, quæ tribuenda videtur sanguinis inspissationi ob chylam crassam, crudum, ratione cuius hæret & congeritur in vas cerebri prædispositis, indicantur cathartica, emetica, dein vero quæ stomachum roborant, ut aque Belliucanæ per triduum haultæ; præmissa phlebotomia, pitulæ ex rheo, kinkina, onula campana, Symplo absinthii, aloë.

4. *Epilepsia uterina* Sena. Ab utero Jonstoni universa Med. Tissot Epist. ad Hallerum P. C.

Distinguatur 1. sexu ægrotantis, 2. prægressis aut intermixtis insultibus hysteriæ; 3. insultus sequuntur tempus menstruationis quoad periodos; 4. aut a terrore similive patemite excitantur; 5. obscurissimæ sunt in paroxysmo sensationes; non omnino suppressæ.

In hysterica epilepsia insolitas vires exerunt æger, incondita interrim & inarticulata quædam vociferant & pectus feriant. Femina huic magis obnoxia sunt temperamenti pluvium solet sanguine, & habitu viraginum gaudent *Sydenham*.

Præter remedia quæ a catameniorum emanatione, aut dolorifica excretionem indicantur, juvant in paroxysmo quæ sanguinis fluiditate, & flido nervo robur restituunt, ut spiritus, volatilis, simulque antihysterica. Spiritus sunt succini preparata varia, liquor mineralis anodynus Hoffmanni ad guttas duodecim aut viginti, æther Frobenii; inter antihysterica eminent tinctura & pulvis castorei, oleum animale Dipellii, aqua Lucis, spiritus cornu cervi &c. camphora & moschus ad grana tria.

Puella, 30. annos nata, a terrore in Epilepsiam lapsa, a quinque annis accessu epilepsie uterinæ pluries in die patiebatur, pallida, oedematosa, vix menstruata, sumpsit per duos menses extra quin cicutæ, tæ catamenia redierunt, vomitus habitualis, quo prius laborabat, a prima dosi subscit, color rediit nativus, hodie viget & valet. *D. Cular.*

3. *Epilepsia simulata* Hecquet Naturalisme des convulsions; Brueys Histoire du Fanatisme. P. Fanaticos Gebennenses initio hujus seculi comitabantur quædam canidiæ fatidicæ, quarum prophetiis cohortum omnes actiones dirigebantur; illæ vero, quasi numine afflatæ, tremebant, humi procumbebant, aque anhelitu cohibito; abdomine inflato, spumantes & mirum in modum exagitæ, demum ad se reversæ vaticinabantur.

Puella septennis epilepsiam simulabat tam apoplectica, ut nemo in Nolocomio generali dolum suspicaretur; interrogata num sentiret auram ex manu ad humerum, inde ad dorsum & femur, ea annuit; præscripti usum verberum, quo auditio sanata est.

6. *Epilepsia pedisymptomatica* Boerhaav. consult. 2. P. C.

Adolescens studiosus, phlegmaticus corpore, ingenio mobilis, a frigore pedum pariebatur spasmos, doloreque in pede, tendine Achillis, sensim ascendentes ad crura, femora; periodicæ per duos annos, bis vel ter in anno paroxysmo adduas vel tres horas perseverante; deinde similiter a pede, dorso orti spasmi, & dolores. altius ad latus dextrum & caput ascenderunt, unde paroxysmi epileptici, sensibus omnibus abolitis, toto corpore exagitato, succedente sterore, spuma oris, &c. initio paroxysmi, frigus in dextro crure, frictionibus cedens; ætate pejus, hieme flante borea melius habebat; præstigiabatur certo insulcus ante horas plures, aut diem ex mutatione inexplicabili quam æger in dorso metatarsi perfricabat, colore ejus lutescente, nullo sensu auræ frigidæ; ligaturæ cruris dextri paroxysmum retardant.

Curatio Boerhaaviana. 1. Vespere per semihoram balneum ex calida aqua ingreditur æger ad crura usque; partes siccatæ fricentur pannolano, siccò, calido, rudi; tunc plantæ & dorso pedum applicantur emplastrâ nocte, dieque gerenda, excepto tempore balnei, ex gummi ammoniaco, bdellio, galbano & oxycroco. 2. Mane & vespere sortis extensio tarsi, ut in luatione restituenda; interdiu moderata deambulatio. 3. Bis in mense, triduo ante novilunium & plenilunium, purgetur haustu qui recipiat cinnabaris gr. x. resinæ guaiaci gr. v. rhei, drach. semissem; scammonii gr. viij; sibi diaphoretici gr. xv. in Syrupi de cichorio composito drach. vi; & aque cichorei unc. ii. iisdem diebus & pridie paroxysmi post balneum vesperinum inungantur pedes oleo spicæ. 4. Cæteris vero diebus mane bibat jejunos haustu infuso theiformi radicum caryophyllatæ, pæoniæ, valerianæ silvestris, ana, scrupulo semisse; rutæ recentis drach. ii: die vero purgationis hora 6. vespertina paregoricum sumat ex Syrupi diacodii drachm. vi. tincturæ opii gutt. viij. in aqua Alsatia papaveris rhæados.

7. *Epilepsia a pathemate* Frid. Hoffmann. §. 13. ex melancholia & hypochondriaca ejusdem, nec non Joann. Bauhini.

Vidi puerulum ex denegato quodam quem præfractæ petebat cibis, instantanea epilepsia affectum.

Non rarum est quod infantes, si matres gravidæ pathematis sævioribus commotæ fuerint, primis ætatis annis hant epileptici: Frid. Hoffmann. maxime si nutrices ira vel terrore percitæ illico lac præbuciant alumnis. A libidine vehementi suppressæ epilepsiam provocant plura testantur exempla. Qui a visu epileptici vehementer perterriti sunt, quidam in epilepsiam incidere; unde recte mos institutus est, ut in templis coincidenti epileptico facies velo tegatur. Intemperantia in studiis, quæ cordis palpitationem, ecclasiū, melancholiamque excitat, epilepsiam anam præbet.

Vivit adhuc a Langogne apud Helvios mulier quæ a 20. retro annis, quoties templum ingreditur, toties epilepsia paroxysmo percellitur, ita ut cum per menses annosque successive plures a templo abstinisset, non minus epilepsiam pateretur cum iterum templum subiret, minime vero si præ foribus staret; ea ad oppida vicina se contulit, sed incausum; jam sex anni sunt a quibus præ templi foribus eucharistiam sumit, sacrisque interest, & sana vegetaque vivit.

A titillatione, imo a titillationis metu, epilepsia paroxysmo excitatos vidit Ill. Baro. vian Societatis.

8. *Epilepsia sympathica*. P. C.

Est ea quæ initium sumit a symptomatis quæ ad caput non referuntur ab ægris, ut a pedis vel manus dolore, anxietate, frigore, aura ascendente; unde partem affectam ipsimet distrahant, ligant, fricant, inde etiam paroxysmi leviores prævertuntur.

Ea vero symptomatica originem habet in cerebro seu initio nervorum huic parti prospicientium, uti dolores imaginarii, quos experiuntur in pede illi qui dudum cruris vel tibie amputationem passi sunt, ut affecta in suffusione retina musca ad aerem refertur, non vero percipitur macula vel infarctus retinæ, cujus tamen interveniu oritur hæc hallucinatio.

An epilepsia sympathica sit mera differentia pluribus speciebus communis an vero species, non inquiram; sufficit quod hoc auxilio externo, scilicet ligatura frictione, discutiat quandoque humus accessus, id autem accidit quia a forti illa partis irritatione divertitur naturæ sensatio ac proinde conatus a cerebro ad artum irritatum, unde prævertitur accessus; nam infarctus cerebri non necessario aut mechanice determinat conarum epilepticum, & natura vero urgentiori occurrat. Sic licet quis ad sternutandum se accingat; si illico gravis nuncius, vel contumelia accedat prævertitur sternutamentum.

Epileptico, qui ante paroxysmum spasmodicum in cubito dextro sentiebat, præscriptis Ill. Luchæus vesicatorium cubito applicandum; hoc quamdiu fluxit flebat morbus, qui vesicatorio sicato revertiebat; vesicatorium a pertum servavit per mensem; interne datum est kinkina cum camphora, & æger convaleuit, Lother de Epile. pag. 42.

Ubi

Ubi spasmi a dolore oriebantur, opio dolores componebantur, & his sopitis Epilepsia siluit: idem ibidem. Epilepsiam tempore somni stertorosi recurrentem opio ipso sanavit Ill. de Haen.

9. Epilepsia febricosa de Bournainville Journ. de Med. Janvier. 1758. pag. 43. P. A.

Vide *Quotidianam speciem quartam*. Est ea species quæ a veneno febris intercurrentis latente producit. Ferrari apud Tertii Lib. 4. c. 4. Hist. 3. Boneti sepulchre. de febr. Lauter Hist. Med. Vienna 1761.

Miles intercurrenti febre laborans sumpto valido emetico in epilepsiam incidit, quæ intervallis incertis, sed quotidie pluries repetitis, initio ad plures dies, dein ad horas plures extensis affliciebatur sine ullo pyrexia indicio; in paroxysmo convulsionibus horrendis agitabantur omnes corporis partes, in declinatione pedus solis instar violenter agitatus movebatur, mente stupente, in intervallis gravamen in stomacho & anxietas circa cor. Adhibita fuere incassum antispasmodica, narcotica, laudinia, balnea; demum præmissis generalibus ad kinkinam deventum est, quod ad drachmam quater in die, nunc purum, nunc sub forma decocti & apozemate temperatum, morbum hunc ab anno inceptum radicibus sanavit.

10. Epilepsia a dolore Illust. Delii Amæoitati dec. 5. lo præfatione. P. A.

Miles quem fustigatum pedibus calcaverat tribulus, atrocissime dolebat hypochondrio dextro; accessit quotidianus epilepsia paroxysmus cum susurro dentium conjunctus, duratque ejolatus foetoris acrem replet & tumore hypochondrii digitis ita fricat, ac si pressor vellet, deinde paroxysmi cum emetibus vomitionibus, & cardialgia atroci recurrunt; tertio morbi anno ægrotus perpetuo de ulcere & tumore interno latente loquitur, cultumque identidem expolit, quo tumorem dissecet, & si non opem, saltem dolorum finem sibi conciliet. Sub paroxysmo pedibus, manibusque parietis calces, lapidesque, si forte proxime decumberet, deradebat, alvus pertinaciter erat obstructa, febris nulla.

Sædo cadavere prope pylorum erat in ventriculo foramen oris callosi, floreni magnitudinis.

11. Epilepsia exanthematica: Epilepsia cachectica Frid. Hoffmanni; symptomatice a rotaprolifia scabie, a fistulis reventis, ab achoribus & sineis repressis, Fr. Hoffmanni III. 12. P.

Differt ab eclampsia exanthematica, quod epilepsia succedit exanthematicis affectibus chronicis, leprosis; eclampsia vero acutis.

12. Epilepsia syphilitica Bonet. Sepulchret. Guarizonii consult. 13. a luo venerea Astruc lib. 4. cap. 2. §. 9. P. C.

Epileptico syphilitico, cui topus insignis in cranio reclusus, dicit Clariss. Lecher spiritum astringentem, æget sæpe convellabatur. In usu remedii; dein topus exulceratus & apertus cessavit Epilepsia; vulnere consolidato a syphilide fuit etiam immunis: Lecher de Epilepsia c. 1. pag. 41.

Differt ab eclampsia quæ hydrargyrosi vehementiori supervenit & fugax est. Epilepsia a

siru syphilitico procedit, & hydrargyrosi methodica curatur.

Vide methodum medendi apud Astruc, l. 4. cap. 6. n. 4.

Tribuitur gummati, exostosis cranii.

13. Epilepsia traumatica Borelli de epilepsia diff. Haller. Disput. Tom. 1. pag. 72. 74. P. C.

Puella decennis & adolescens 17. annos natus epilepsiam patiebatur itum in capite passus, & sœvam habentes a cranio depresso. Sanati sunt omnino admotis dropacibus parti affectæ; quorum ope cranium extorsum duclum & elevatum fuit.

Puella vero, antequam epileptica fieret, per multos dies singulari paraphrosyne laboravit, spectrum scilicet horreodum præ oculis sibi obversari putabat, totumque domicilium stellis illuminatum videre sibi videbatur; præcesserat dolor capitis, cardialgia, visus obscuratio.

Hac observatione patet, quam absurda est opinio, in omni epilepsia arcanis fidendum esse; optimum arcanum esse cognitionem principii a quo species dependet.

14. Epilepsia rachialgica. Clariss. Bonet Journ. de Med. Nov. 1761.

Est secundaria, & rachialgiam melancholicam sæpius terminat quam alia species; culcumque vero superveniat, ea dolores aufert, non secus ac paræsis. Epilepsiam arthriticam, seu quæ lente arthritide recurrebat, ea redeunte recedebat, bis observavi.

XX. HYSTERIA; Passio hysterica vulgo; Malum hysterico-hypochondriacum Stahlia; Melancholia nervosa Ill. Lorry; Splen and Vapours Anglis; Hysteria Cochi Bagni de Pisa; Gallia Vapours, Passio hysterique Mal de mere, La Mère, l'Amarré &c. Occitanis.

Est syndrome symptomatum convulsivorum fugacium sine causa evidenti, & subito mutabilium; cum summa animæ sensibilitate, passivitate, a pathematis & causis debilitantibus ingravescentis.

Symptomata convulsiva sunt globus abdominalis, angina vel dyspnoea strangulans, dysphagia, carus, frigus extremorum, ætus & cachinni, occitatio, pandiculatio, delirium pulsus depressus, stridus, urinx copiosæ, aquosæ. Morbi hysterici sunt symptomata hysterica constantia, & permanentia insubjecto huic syndrome assueti, unde differunt ab hysteria; sic carus hystericus, dysuria hysterica, colica hysterica, ab hysteria proprie dicta differunt, quia sunt symptomata permanentia.

Nomine vaporum abusive alii morbi vel indicantur, ut vertigo, palpitatio, melancholia; vel dissimulantur, ut epilepsia, maia, &c.

Sensibilitas animæ tanta est ut levissimus januæ strepitus, dum clauditor vel pulsatur, illas convellat hystericas, si inopinato accidat, levissimum malum quod sana non perciperet, hystericae anxiam, moestam, insomnem detinet.

I a mutabilia sunt & fugacia symptomata, ut intra pauca minuta, ætus, ejulatus, mox risus

ad cachinnum, deliria, convulsionones, furor sopor, visus obscurati, marmaragæ sibi succedant & fumo chartæ foetidæ, vel uberi urinæ limpide proventus evanescant.

Puissanimitas patet ex animi dejectione, ex saluti recuperandæ desperatione; frequenter Medicum mutant, quem querelis continuis, dissidentia sua, remedium inani successu difficiant; si securitatem & animi fortitudinem simulat, mortem tanquam inevitabilem & imminentem reputant.

Principia huius morbi sunt mollis, effœminata constitutio, educatio in vita sedentaria, voluptuosa, otiosa; dum corpus otio indulget, animæ negotia, facessunt pathemata, ira, invidia, zelotypia, amor, tedium, lites, ærumnæ, debilitaverit mœrores, parvus prægressus, morbi, hæmorrhagiæ, cathartes repetitæ, inedia; sæpius præcepit menostasia, seu catameniorum suppressio, & caute celatus animi dolor, vir mœror.

Morbus hic cum hypochondriasi valde affinis est; aut sexus fœmineus, gulæ strictura, globus abdominalis, invasio post menostasiam, umbilici retractio, frigus lumborum & occipitis, effectus suffutuum fœtorum hysteriam determinant, ut ex flatulencia, inflatione, & dolore hypochondriorum in viris hypochondriasis designatur; raro viri hysterici sunt.

Hic morbo sanando profunt quæ corpus roborant, animum recreant, & a morbi idea averunt, ut exercitatio, itineratio, rusticatio, ut cupitorum obtentio; virgini libidinosæ matrimonium; conjugii zelotypiæ vir fidelis; post ærumnas fortuna prospera, si ex his cupiditas expleatur; nihil magis noceat quam repetita exænantia, quæ debilitant; quam medicus humorista, qui bilem, mucum, continuo cathartici abraderet, & expellere tentat, eoque magis debilitat & irritat, ubi tantum sedandum & roborandum.

Principium proximum hysteriæ est summa phylautia, seu amor effrœnis vitæ & voluptatum, unde minimorum incommodorum intolerantia, exagération, propositi instabilitas, summa sensibilitas, irritabilitas; ex parte corporis systematis nervi teneritudo, iuxta nostrates tensio, quæ in nervis nulla unquam observata est; iuxta Chelsum laxitas, iuxta Sydenhamum fluidi nervi instabilitas, seu spirituum ataxia, quales ipso morbo obscurior.

Pauca sunt genera morborum quos hic protiformis affectus non mentiat, hinc tot morbi hysterici dicti; quod commune est syphilidi, febri putridæ, scorbuto, &c. ita ut si morborum genera a principis & causis peterent, immensa foret classis hystericeorum morborum.

1. *Hysteria vermiformis*. Delii Amœn. Acad. p. 341. casus 3. *Vermis malum hystericum mentientes.*

Muller 46. annos nata, in mensibus inordinatis, leucorrhœa, colica, cardialgia, vomitu identico exacerbat; ichthys ossis sacri, pectoris angustia, tumor abdominalis; inde concluditur ab ipsa, & a Medico hysteria; adhibentur carmi-

nativa, castoreum, balsamica, temperantia, sed frustra; tandem adhibito purgante glomus vermium ejicitur per anum, quo facta sanitas redit.

Duo alia exempla hysteriæ a vermium lumbricis & ascaridibus excitatæ refert *M. Delius*.

Cardialgiam, dolorem, ileumque pro hypochondriacis syndromæ habuerit Medici, & omnia vermium alvo excretis cessare, *idem* p. 341.

2. *Hysteria chlorotica* Raulin. cap. 13. Sydenham. process. integr. P. L.

Hic catameniorum retentio ansam præbet; verum hæc retentio in virginibus quandoque hysteriam plethoricam excitat, antequam chlorosis accedat, immo cum plethoræ signis, ut faciei rubore, pulsus plenitudine, vertigine, dyspnœa; & in hoc casu a largis phlebotomiis vidi hystericas sanatas, & phlebotomias non merito reprobat Sydenham in hysteria, quæ tantum quibusdam hysteriæ speciebus nocent; in plethorica vero repetitæ profunt.

Cum vero pallor faciei, laborum livor, pedum œdema, inappetentia, lassitudo, dyspnœa ad levem scalarum ascensum, cardialgia, cephalalgia, crurum gravitas accedunt, tunc præmissa una phlebotomia, & una alterave cathartici, martialis usupanda sunt, vel mitia in juscula cum radicibus aperientibus atque nodulo rheii & limaturæ martis ana drachmam unam continente, quæ juscula per novem dies iteranda, dein limatura ferri ad grana octo intra ossam per mensem est repetenda, & si virgo sit temperamenti calidi, siccæ, biliosi, aquæ ferruginæ æstate per novem dies ad libras quatuor vel sex tunc assumendæ, præmissa & subsequente cathartici.

Si vero chlorotica sit mollis, laxa, frigida, tunc juscula fortiora, pilulæ emmenagogæ, opiæ martiales sunt adhibendæ, aquæ thermales etiam autumno vel vere per triduum bibendæ, si salinæ sint, aut sæpius repetendæ, si sulphuræ.

Jusculis incoquantur radicem ruscæ, rubiæ, dentis leonis, ana, uncia una, rheii & limaturæ ferri in nodulo, ana, drachma una, quovis triduo renovanda, folia cichorei, borraginis, flores chelidii, calendulæ cum cinnamomi frustulo.

Æolum ingrediuntur croci martis grana decem, pulvis fenæ, rheii, salis absinthii, jalappæ, diagyridii, myrrhæ, croci, cinnamomi, ana, grana duo; castorei, assæ fetidæ, ana, gran. 1. cum syrupo de cichorio, vel de floribus persicorum, fiat bolus quovis mane per novem dies sumendus superbibendo jusculum salis cichorei alteratum.

Simpliciter est ex limaturæ martis & cinnamomi pulveris, ana; gran. x. ac myrrhæ vel galbani aut castorei pulverati gr. rv. ac alterius diebus additis scammonii granis tribus parare bolum; his succedant aquæ Bellilucanæ per triduum potæ ad libras sex.

In declinationemque sulphuræ calidæ, ut de *Canterbury*, *Bagnauli*, *S. Leonardi* possit bibi per triduum ad libras quatuor, dein quarta die ingredietur balneum; ex illis aquis iterum bibat, iterum bal-



balnea usurpet, & sic alternis vicibus per mensem aut ultra.

3. *Hysteria a menorrhagia* Raulin: a partu digressis Sydenham; a morbis acutis, repetitisque phlebotomiis ac cathartici. P. L.

In hac specie robur est quantocius restituendum ope victus fortiori, aromatizati, eupepti, usurpentur gelatinae, ova sorbilia, ossae ex carnis gallinae, bovis, &c. quibus restituerent vires, missis longe cathartici, phlebotomia, immo clystima, usque quo aegra possit lac intergrum caprinum vere, asinum autumnum, aut vaccinum quavis tempestate assumere servatis servandis; diæta vero lactea non solum abigit hysteriam, sed etiam si a longis menorrhagiis immineat, ascitem sugat & vires rescit; sitamen ventericulus huic ferendo impar foret, praemitteretur decoctum ex raphanico vel myrobalanis cum syrupo de cichorio composito & manna atque paulo ante lac, bolus absorbens ex terra catechu, oculis cancerum, crera, corallii, & conserva rosarum ingereretur.

4. *Hysteria a leucorrhœa* Raulin. cap. 14. tom. 1. P. L.

Si leucorrhœa hysteriae fomes pendeat ab humorum acrimonia & viscositate, quam siccitatem vocant, praemissa unica phlebotomia, cathartica mitia sunt usurpanda, maxime ex aquis mineralibus acidulis dictis, ut de Vals, & Alais, Lodève &c. dein juscula pulli refrigerantia cum nodulo seminum frigidorum, solis, pimpinellae, agrimoniae, radicibus pentaphylli, fragariae, & pugillo fumariae, vel nasturtii aquatici, sunt usurpanda; inde ad serum lactis deveniendum extincto prius lateris candentis frustulo: & ante haustum seri lactis praestat bolum subadstringentem & absorbentem praebere, qualis in gonorrhœa veteri usurpatur; si vero sit pruritus vaginæ, fœtor fluoris, siccitas, pervigilium, aquae acidulae per novem dies aestate sumendae, & dein balnea domestica vigelies iteranda.

Verum si leucorrhœa pituitosa fuerit ab obstructionibus frigidis, & vasorum atonia pendens, tunc praemissis cathartici, tonicis adstringentibus ad duas vices, & jusculis aperientibus, cum limatura ferri, rheo, cancris Huviatilibus, radicibus aperientibus, foliis hederulae, pimpinellae, nummulariae, &c. pilula ex levissimo camphoratae infuso, deveniendum est ad bolos stomachicos, tonicos ex theriaca, aurantiis, zinzibere, nucis moschata conditis, discaordio, oculis cancerum, malicorio, radice angelicae, terra lemnia, bolo Armena, corallii rubris, gummi Arabico, quae excipiantur syrupo de rosae siccis; sumat electuarii hujus drachmam semel vel bis in die per mensem superhibendo vini absinthii aut enulati pauxillum; vinum Hispanicum gentiana, angelica, absinthio, centauro, corticibus aurantii, cinnamonum infusus medicatum, ad aliquot cochlearia ter in die usurpetur.

Convenient & martialia, ut vinum tenue, album, intra quod ferrum, vel lapis medica-

*Sanguis Nefologia Methodica. Tom. I.*

mentosus, vulgo *globus chalybis*, infusus fuerit, aquae ferrugineae Vallenenses, Alesienenses, modo non ea dosi sumantur & repetantur, ut hystericae vires imminutas ulterius infringant; docum ad lac etiam confugiendum est.

5. *Hysteria emphrastica; ab obstructionibus viscerum abdominalis, ut hepatis, lienis, pancreatis*, Raulini cap. 5. P. L.

Differt a plethorica per pallorem cachecticum, phlegmaticam, pulsus debilitatem, frigus. Curatur per aperientia martialia, tonicis amarioris, stomachis juncta: si vero aegra sit temperamenti simul calidi & sicci, sen si humorum acrimonia, siccitasque adfit, ea sunt jusculis, sero lactis temperanda, additis millepedibus, croco, aqua ferruginea; huc pertinent aquae minerales spiritu rectore turgidae, caute tamen usurpandae martialis vitriolicae.

6. *Hysteria libidinosa; Hysteria a semine acris, retento, ovarii infarctis*, Frid. Hoffmann. L. P.

Monialis illico sensum amittebat, & convalescebat toto corpore cum dyspnoea, dein ad se revertens exiliabat, & per cameram saltando currebat, inde lactas & obsecnas cantilenas, verbaque similes farinae proferebat, vomitu bilis atrae pauxillum rejiciebat; mox fusi compos facta antea horum erat immemor; clitoridis titillatio a barbitonfore impudico instituta paroxysmum aliquoties solvebat: tales sunt plures hystericae quas matrimonium sanasse dicitur: statamenis supressis vel imminuentibus turgent genitalia, calentesque; unde salacitas major, major ad hysteriam proclivitas.

7. *Hysteria stomachica*. Vide Raulinum cap. 4. de hysteria ab obstructione & vicio vario stomachi. L. P.

In hysteria stomachum male se habere vulgatissimum est; hinc assinitas hystericae quam hypochondriaci; verum in specie, de qua agitur, praecessere vitia stomachi, & subsecuta est hysteria.

8. *Hysteria febricosa* VVedel Ephemer. Natur. Cur. Ann. 2. Obs. 193.

Dignoscitur ex syndrome symptomatum hystericorum, typo tertianae recurrentium, quae accedente alternis diebus apyrexia evanescunt; symptomata ea sunt frigus, oscitatio, suffocatio, abdominis tensio, animi deliquia, flatulentia, nausea, cardialgia, mortis timor; mictio urinae limpida, & post paroxysmum crassa, lateritiae, ætus volaticus faciei succedente frigore & pallore, leucorrhœa, &c.

In hysteria paroxysmo nihil est efficacius camphora, moscho, castoreo, extractum capiti papaveris rhœados; hæc spasmos, pervigilium, terrorem, dolores compescunt; datur potio quovis bihorio ad cochlear facta ex camphorae drachma semisse, cum sacchari & gummi Arabici, ana, drachma una; syrapi papaveris rhœados, uncia una; & uncis sex aquae florum sambuci; vel datur moschus mane & sero ad grana duo vel plura; extractum capiti papaveris rhœados ad grana tria vel plura.

XXI. SCÉLOTYRBE; *Scelotyrbis* Castelli-Lexic. *Daxse de St. Guy*.

*Scelotyrbis* Galeni *Isagoge libro finitien.*, quasi *cruris turba* & pectus, species est resolutionis, qua erectus ambulare homo non potest, & latus quandoque reclusum in finitium, quandoque finitrum in dextrum, vel vicissim circumfert, interdum quoque pedem non attollit, sed attrahit, velut il qui magnos clivos ascendunt: hæc *Galenus*: "qua descriptione idem expressisse mihi videtur quod Neoterici choream Viti nominant.

*Chorea Sancti Viti*, docente *Sydenham* convulsionis species quædam est puerorum, puellave a decimo ætatis anno ad pubertatem invadens; prodit se claudicatione, vel infirmitate alterutris cruris, quod æger post se trahit saturore more, manum ejusdem lateris vel pectoris vel alii alicui parti applicatam nequit continere in eodem sita horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquetur; quidquid æger contrahitur, antequam poculum ad os possit admove, mille gesticulationes circularum instar exhibebit, non enim recta linea erit admove, sed deducta a spasmo manu, huc illuc aliquando versat, donec tandem forte fortuna labris propius apponens, liquorem de repente in os injicit, & avide haurit, dedita tanquam opera, ut spectantibus risum moveret. Nullus est autem morbus hodie cognitus, qui ad scelotyrbem aptius referri queat quam chorea Viti Sydenhamiana, quæ multum discrepat ab specie tarantismi, cui hoc ultimum nomen aptius convenit.

1. *Scelotyrbis choreæ Viti* *Chorea Sancti Viti* *Sydenham*; *Scelotyrbis pituitosa* *Pereysinger*; *la Danse de St. Guy*.

Curatur jusculis leviter tonicis & cephalicis insusis theiformibus ex floribus gallii lutei, tiliæ, kinkina, calcarilla, pulvere de Gutteta, nec non aquarum thermalium embrochationibus; ægros quatuordecim observavit & sanavit *D. Chaput*.

*D. de Haen* plures hoc morbo laborantes repetita electratione sanatos vidit.

Curatio Sydenhamiana quoad phlebotomias & cathartes nimium repetitas minime conducit, saltem in pueris & puellis a me observatis, qui ab his fuissent exhausti.

Principium hujus morbi videtur in origine nervorum, & mentem aliquatenus non secus ac corpus debilitare; quas enim vidi puellas hoc morbo affectas cum aliquali artuum rigiditate, debiles simul & velut attonitas, aut mente imbecilles vidi.

Ad idem genus morbi altera species rarissima ab Auctoribus præter visa referenda videtur, quam non aptius nominari posse putem quam scelotyrbem festinantem, seu festiniam.

2. *Scelotyrbis festinans*; *L.*

Est peculiaris scelotyrbis species in qua ægri solito more dum gradi volunt currere coguntur, quod videre est apud *D. Caquet*, & ob-

servavit *Leydæ illustr. Gaubii Patholog. instit.* 751. & in loquela hæc *debilitas* dicitur qua lingua præcurrit mentem. Video adu mulierem sexagenariam hoc affectum morbo, siccitati nervorum tribuendo; laborat enim rheumatismo sicco, sen ab acrimonia sanguinis; dolores noctu a calore recrudescunt, a thermis non sublevantur; ei præscripti phlebotomia, & præmissis jusculis ex lactuca, endivia, & collo arietis, lenes cathartici, inde vero lactici.

Est affinitas cum scelotyrbis, chorea Viti; deest flexibilitas in fibris musculorum; unde motus breves edunt, & conatu seu impetu solito majori; cum resistit illam superare nituntur, velut inviti festinant, ac præcipiti seu concitato passu gradiuntur. Choreæ Viti pueros, puellave impuberes aggreditur; festinia vero senes, & duos tantum hæcenus observare mihi contigit. Quam multos autem videmus morbos, paucissimosque observamus. De theoria & praxi nihil habeo quod dicam; etenim sola experientia praxi cujusvis morbi determinat, & ex hac pro felici vel infancto successu theoria dein elicienda est.

Quid scelotyrbis commune habeat cum scorbutico non video, nisi hoc nomine scelotyrbis affinitatem scorbuticam quis velit intelligere.

Pictor quinquagenarius id habebat singulare, non solum quod inter progrediendum festinare cogeretur, verum etiam quod nec a dextris, nec a sinistris iter posset deflectere, nisi cum in repagulum impigisset, tum vero eidem loco inhaerens corpus sensim convertebat, & iterum properans recta via progrediebatur.

3. *Scelotyrbis infabilis*; *Journ. de Med. Janvier 1761.* & *Mars 1758. L.*

Monspeli puer, duodecim annos natus, vino, caffè, & liquoribus spirituosissimus, arthride rheumatica recens sanatus, incidit sensum in infirmitatem totius corporis, ita ut per duos menses inficiis, & invitatus brachium, pedem, caput, vel aliam partem continuo extra somnum motitaret tanquam nugans; unius tamen lateris motu non fuit major, quam alterius, dein mens & loquela debilitabantur; dolor pedem aggressus est, sed levis; sanabatur hic puer phlebotomia & dein repetitis catharticis.

*D. Ruamps Journ. de Med. 1758.* tribuit morbum faburæ. *D. Sumey Journ. de Med. 1761.* hunc tribuit lentori & vapiditati sanguini; morbum tamen in puella decenni tres tantum phlebotomias absteruerunt.

In Scelotyrbis chorea laudatur tanquam specificum quinta essentia mineralis *D. Comitès de la Garay ad guttas XXX. Le Monnier Hist. de l'Acad. R. des Sc. 1755. pag. 34.*

4. *Scelotyrbis intermittens*; *L. P.*

Hanc speciem alternis diebus redeuntem in puerulo observabat *Nemausi Clar. Didier Med. Doct. Monsp.*

5. *Scelotyrbis verminosa* *Gaubii Celebr. Leyden. Prof. Pictoris, Pereysinger Classi. Morb. P.*

**XXII. BERIBERIA.** *Beriberi* Jacob. Bontii Medic. Indiarum Orientalium lib. 2. c. 1. Tulpii observat. lib. 4. cap. 5. Mangeti Biblioth. pract. ubi Erasistrato hunc morbum fuisse cognitum asseritur; *le Beriberi*.

Genus est morbi spasmodici, ideo *beriberii* seu *avis dicti*, quia aegri genibus retractis elevando crura tanquam oves progrediuntur.

1. *Beriberia Indica* Bontii libr. 2. de Medic. Indorum. C.

Cognoscitur ex motu tremulo manuum, pedum, & quandoque totius corporis, simulque stupore quodam dolorifico harumque partium, cum tactus obscuracione, aut hebetudine: dolor vero est similis formicationi quam apud Europæos frigus in digitis excitat. His adde vocis exilitatem & raucitatem, ut vix prope affidentes ægram loquentem intelligant; accedit non raro pectoris musculorum crampus, qui anhelitum, ac vocem intercludit.

Hic affectus lethalis non est, sed chronicus & curatus difficilis, principium procatarcticum

est frigus susceptum calente corpore, si pectus adoriatur, lethum non raro infert.

Curatio exigit ut lymphæ frigore inspissata resolvatur & discutiatur. Cavendum, ne aeger se lecto affigat; exercitio, quantum & cui potest, indulgeat; frictionibus utatur, fomenta ex herbis resolutivis adhibeat; ex oleo chamæmeli, meliloti, potissimum petroleo litus instituat; intus vero præmissa catharsis, sudorifica ex ligno guayaci, salaparilla, china radice, theriaca, mithridato adhibeantur. Vide curam in Europa a Nicol. Tulpio institutam observ. libr. 4.

2. *Beriberia spuria* Thom. Bartolini; *Beriberi spurium* ipsi dictum.

Hic affectus non satis distincte descriptus invaluit mercatore ex India Orientali rediunt, eumque dimidii corporis a diaphragmate ad pedes stupore; ac debilitate, forte tremore conficiavit cum enuresi, alvi constipatione & doloribus abdomen & pectus molestantibus. Si dedit in hoc morbo motus tremulus & anomalos extremorum, is ad paraplegiam dimittendus videtur.



## CLASSIS QUINTÆ SYNOPSIS.

## ANHELATIONES.

ORDO I. ANHELATIONES SPASMODICÆ. Sunt insultus fugaces, sed sæpius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum expiratione sonora.

- I. **EPHIALTES**, *cœhemar*, anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico.
- II. **STERNUTATIO**, *Eternuement*, concussio violenta pectoris, cum expiratione velociori narium interiora everrente & sonora.
- III. **OSCEDO**, *bailllement*, repetita, lenta, profunda inspiratio, ore hiante, sæpius cum paniculatione.
- IV. **SINGULTUS**, *hæquet*, concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta sonora.
- V. **TUSSIS**, *teux*, concussio sonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

ORDO II. ANHELATIONES OPPRESSIVÆ, *difficultés de respirer*. Sunt non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi; sine metu suffocationis.

- VI. **STERTOR**, *ronflement*, respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, sæpe cum alterno sibilo.
- VII. **DYSPNŒA**, *contre halaison*, est difficultas respirandi chronica, ut in asthma, & non intermittens, unde ab asthma differt.
- VIII. **ASTHMA**, *asthme*, est morbus chronicus vel diuturnus, cujus præcipuum symptoma est perinde recurrens respirandi difficultas.
- IX. **ORTHOPNŒA**, *suffocation*; est præceps ut plurimum & acuta respirandi difficultas, unde ab asthma & dyspnœa discrepat.
- X. **ANGINA**, *angine*, differt a præcedentibus per sensum angustiae in gutture.
- XI. **PLEUODYNE**, *douleur de poitrine*, est anhelationis genus, cujus præcipuum symptoma est dolor pectoris, & ut plurimum lateris, sine febre acuta, unde a pleuritide differt.
- XII. **RHEUMA**, *rheuma*, cognoscitur ex difficultate respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel præcedunt coryza, sternutatio, rauco, &c.
- XIII. **HYDROTHORAX**, *hydropisie de poitrine*, differt a dyspnœa faciei pallore, manuum & pedum oedemate, symptomatis ephialticis, decubitus horizontalis difficultate, &c.
- XIV. **EMPHYEMA**, *emphyème*, differt ab hydrothorace per febrem hecticam magis evidentem, maciem, & prægressam pulmonis inflammationem suppuratam.

## CLASSIS QUINTA.

*Morbi Dyspnoici, seu Anhelationes.*

1. **D**IFFICULTATES respirandi, vulgo morbi anhelosi, asthma Græcis ab *anxos* anhelo.

Ægri *Dyspnoici* Græcis, *Anhelosi* Latinis dicuntur.

„ Singultus, tussis, ructus, oscitatio, &c.  
 „ motum illegitimum pro genere habent. *Galenus*.  
 „ *ten.* „ qui dyspnoicos morbos cum spasmodi-

cis ejusdem esse classis existimat: nec enim multum abluunt.

*Riverius* etiam difficultates respirandi refert ad motus depravationes, a quibus tantum differunt, quod musculi respirationis nunc libere, nunc naturaliter noctu & interdiu agant, quod ultimum artuum muscularis non accidit.

Ubi natura nullo ad respirandum conatus exierit, pectusque praeinde velut immobile videtur, nihilque ex parte gestuum aut nutus respi-

respirandi conatum designat, ut in syncope, catalepsi, asphyxia, nemo jure illam *apnoeam* inter respirandi difficultates reposuerit, cum ibi nulla sit difficultas motus, ubi nullus est conatus nec ullum desiderium movendi apparet.

2. Respiratio est motus pectoris, quo alternatim dilatur, & aerem admittit, dein coarctatur, & aerem emittit; prior motus *inspiratio*, alter *expiratio* vocatur.

In respiratione constanti, quantitas inspirati aeris est aequalis quantitati inspirati; verum non aequalibus temporibus illi motus in sanitate absolvuntur, nam inspiratio breviori, expiratio longiori perficitur.

Inspiratio itaque est. velocior expiratione, eadem tamen organorum seu pectoris, & pulmonis moles movetur; ergo si ad vires æstimandas temporis ratio habeatur, vis ad inspirandum impensa major est, quam quæ ad expirandum impeditur.

3. In sanitate respirati aeris quantitas in levi respiratione est 40. circiter pollicum cubicorum, mensurante *Borello*: aut in profunda & forti ad 220. pollices affurgit ex *Jurino* æstimatione.

4. PROPOSITIO I. Quantitas aeris inspirati non est proportionalis magnitudini respirationum.

5. Quantitas enim respirationis est ut augmentum triuæ dimensionis pectoris inter inspirandum, & illius decrementum incremento æquale inter expirandum.

6. Quantitas vero aeris inspirati est directe ut illud pectoris incrementum, & inverse ut pulmonis moles. Verum pulmonis moles sensibilibus variat in sanitate; nam in exercitiis validis corporis, & in pathematibus vividis, sanguis in pulmone colligitur, & tantum abest, ut aeris inspirati quantitas sit proportionalis capacitatis pectoris augmento.

7. Si liceat *insarctus* nomine designare pulmonis illam intumesceniam, quæ pendet a sanguine, lymphæ, alioque fluido acre densiori, vel viscidiori; aeris inspirati ac proinde expirati quantitas tanto minor est cæteris paribus, quo major est pulmonum insarctus.

8. Ad insarctum referri potest omnis intumescencia interna claustrorum pectoris, viscerum abdominis, in quantum diaphragmatis descensum impedit; corpus etiam extraneum in pectore collocatum, quod expansionem pulmonis inhibet, ut lymphæ, cruor, pur, &c.

9. PROPOS. II. Insarctus pulmonum crescit inter inspirandum, decrescit inter expirandum.

10. Pro quatuor circiter cordis pulsibus, una datur respiratio, vel parum abest; nam observante *Robinsonio* in *Oeconomia animalis*, quibus omant pulsationes cordis singulis minutis 65. 72. 77. 6. erant respirationis vices in illis 17. 19. 30.

11. Post *D. Schlegling*, observavi venas omnes, saltem majores, detumescere & complanari durante inspiratione, intumescere vero & rotundari durante expiratione, atque tempore inspiratio-

nis pulsuum arteriarum ex aorta proficiuntium paululum minui, inter expirandum vero paululum augeri; quisque potest experiri, si paulo altior, & diuturnior sit ille pectoris motus.

12. Ex his vero attendenti patebit sanguinem tempore inspirationis uberius ingredi pulmones, parcius ex ipso & cordis sinistro ventriculo egredi & contra vero tempore expirationis sanguinem uberius in venis cavæ continuis collectum parcius ingredi pulmones, uberius per cordis sinistrum ventriculum in aortam immitte.

13. Atqui sanguinem uberius ingredi, quam egredi, est colligi, ac proinde pulmones aliquatenus insarcire: ergo inter inspirandum datur insarctus pulmonum *ingressus*, qui expirando solvitur.

14. Cum autem circulatio periret interea, & quatuor pulsus patiantur arteriæ, sequitur inter inspirandum arterias pulmonares plus transmittere in sua tum diastole tum systole quam in hisce motibus dum expiramus, venas vero pulmonares & contra.

15. Inter expirandum cava cordis dextra tumet, & sinistra detumet; verum cava cordis dextra sunt ampliora, aut magis expansibilia quam sinistra, docente anatome & iterata iniectione. Cum autem illa cava intra tempus integræ respirationis eandem transmittant sanguinis molem, necessum est ut plus temporis impendatur in liberandis sinistris cavis cordis ab insarctu quam in dextris liberandis; cum liberentur sinistra cava ab insarctu mediante expiratione, dextra mediante inspiratione, requiritur ut expiratio sit diuturnior inspiratione.

16. Colligitur sanguis in pulmonibus per totum inspirationis tempus, quod etiam tempusculum exigit circiter: solvitur vero insarctus pulmonum intra quinque tempuscula hæc æqualia, & sic per cordis ventriculum sinistrum, qui summi rhythmum contrahitur quo dexter, sensum superfluum in pulmone cruor aortæ erogatur toti corpori distribuendus. Non secus ac si per infundibulum tertia parte angustius altero transfundi debeat eadem fluidi quantitas, tempus impendendum esse debet tertia parte majus.

17. PROP. III. Respiratio motum & fluxilitatem sanguinis adauget.

18. Inter inspirandum & expirandum, vis motrix muscularum intercostalium, quorum motus noctu & interdiu fere vigetis quovis minuto repetuntur, sanguinem in suo textu contentum undique comprimit, atterit & exprimit. Cum autem attritus corporum inter mortarium & pistillum, si fas sit ita loqui, felicius succedat, quæ actio unius & reactio alterius majores sunt, attritus sanguinis inter musculos & vasa ossibus sustentata, aut alios musculos, felicius succedit, quam in quocumque viscere musculus molliore, ut pulmone, cerebro, &c.

19. Interea cum, data vi sanguinem premeante, velocitas a resistentiis sublati generatur, generatur etiam velocitas a sublati per inspirationem, resistentiis, quas sanguis pulmones ingressus experiebat inter expirandum, dein vero vis

major musculorum expirationi pulmones contrahit, & cursum sanguinis accelerat per venas.

10. Aft sanguis majoribus viribus pressus magis incalcescit, resolviturque, proinde fluxilior evadit; ergo respiratio motum & flexilitatem sanguinis adauget. In animalibus frigidis, ut serpencibus, testudinibus, respiratio rarissima est, quandoque per dies, ac menses suspensa, ita & circulatio tardissima, ac fluida viscosa, tardigrada.

11. In hominibus, a vibus, quadrupedibus sanguis est calidior, fluxilior, velocior: respiratio in nobis vix potest per duo minuta cohereri sine mortis periculo; actiones in genere majores, vividiores, somnus longe paucior, vita longe aduolior. Hinc veteres pronunciantur a respirazione calorem innatum, seu vitæ principium, ut credebant, intendi, dum calor actualis in pulmone minuitur.

12. PROP. IV. Quo sortius sanguis in pulmones appellit, eo infarctus pulmonum est major.

13. Infarctus pulmonum est effectus pressio- nis lateralis vasorum a sanguine injecto in arteriam pulmonarem; verum ex demonstratis Bernoullianis, pressio lateralis vasorum cæteris paribus est major, quo vis fluidum permens, vel impellens major est; & quo minus est emissarium ipso immisario; tum itaque arteria pulmonaris multo flexilior, aorta, ab aucta vi cordis dextri multo magis dilatur, quam orificium arteriosum cordis sinistri (15), emissarium est minus immisario. Cum vero simul ob exercitia, vel pathemata vis sanguinem impellans in pulmones intenditur, necessum est ut pressio lateralis tantumdem adaugetur.

14. In exercitiis immodicis, ut cursu, vociferatione, ponderum gestatione, musculis validius contractis, sanguis sub prælo positus nititur quoquo versum æqualiter; verum cum retro urgeatur in venis ab arterioso accedente, & retineatur a vulvulis, fortius ad cavam, & cor dextrum accedit, quam in quiete; ergo cor dextrum magis dilatur, & ad majorem contractionem coactum fortius impellit sanguinem in pulmones; verum ille impetus adaugetur concurrens cum inspiratione: infarctum addit infarctui; ergo & magis pulmones aggravat.

15. Hinc fit ut in hisce circumstantiis pressio lateralis sæpe vineat tenacitatem arteriosam, & his rupis vel distractis effluit sanguis in cavum pulmonis, hinc hæmoptyses. Similes effectus procreat gaudium effræne, maxime cum cacinno, item ira immodica, furor suppres- sionis quæ omnia tantam impressionem vas- infirunt, ut inde fiant & quandoque crepent aneurysmata in his organis; unde mortes repentina, quas suffocatio & palpitatione præcedunt.

16. Circulatio in vas facilis est, cum sanguis subsequens non velocius progredi nititur, ita ut neuter in alterum agat; talis facilitas nunquam datur in arteriis quandiu pullant; datur in venis, animæ & corpore quiescentibus, ab-

sente plethora; verum accedente motu, maxime cum plethora, datur pressio lateralis in venis, & tollitur circulationis facilitas, itaque toties pressio in pulmonum vasâ major est.

17. Hinc sequitur quare ubi arteriæ vix pullant, ut in syncope, catalepsi, cataphora, debilitate senili, in caro a frigore, submersione, suspensione, hysterica cataphora, vel apnoea hysterica, respiratio sit ita lenis, ita placida & exigua, ut obscura & fere incofpectua evadat, quod etiam indicat respirationem vix ullam esse, ubi pressio lateralis, vel infarctus pulmonum nullus.

18. Virum & ejus conjugem ambos forecentenarios mortem senilem obeuntes olim observavi; eos autem senium frigescentes, magis immobiles videbam, pulsum sensim rariorem, ita ut vix quadragesies, dein trigieses intra minutum arteria pullaret; respirationem debilem, rariorem & minorem pari passu, ita ut per aliquot horas dubius hæcerem num adhuc viverent, an jam obissent.

19. Hominem fure suspensum, & tortoris manibus vis ereptum in scullo vitæ signo, phlebotomis tribus intra horam institutis, in vitam revocare ipse facebam; aft cum redivivus in tuto se collocatum esse putabam suspensum, collum intumuit, sensus obscurati sunt, respiratio sensim rarior, pulsus vis quadragesies in minuto pulsabat, uterque motus sensim obscurior, demum incofpectus, ægrum letho reddidit. De submersis idem est judicium; cum circulatio debilissima est, respirationis necessitas evanescit, quæ videtur proportionalis infarctui pulmonum. Ergo ille infarctus in suspensis & submersis non semper datur.

30. PROP. V. Respirationis necessitas est proportionalis calori pulmonis & aeris inspirati.

31. Aer inspiratus est semper frigidior expirato in statu sano, calorem enim sanguinis pulmones alluunt hieme ad 28. gradum, cum aer temperatus calet ad 10. grad. Ergo cum calor diffundatur in continua corpora, utque ad æqualitatem temperaturæ, aer inspiratus calefit à sanguine & sic calidior effluat. Et si supprimatur respiratio intra minutum, crescit duobus gradibus calor sanguinis ex Halesio. Patet ergo recte sensisse Veteres, cum dixerent respirationem interire refrigerio sanguinis.

32. Ex triginta tribus circiter uncis quas quotidie perpiramus, viginti duæ e pulmonibus avolant (teste eodem Halesio incomparabili ad experimenta physico-medica viro), ergo cum vapor ille fumidus expirando tanto uberius avolet, quanto frigidior est aer inspiratus hisce vaporibus, ut docet hydrostatica, (nam levia eo velocius ascendunt intra fluida, quo radices gravitatis specificæ leviores superant radicem gravitatis densioris) ergo respiratio est ad fuliginum pulmonis evaporationem utilis, si aer sit frigidus.

33. Quo aer itaque inspiratus est calidior, minor est differentia gravitatum specificarum inter inspiratum & inspirandum, ergo minor vaporum.

porum excrementitiorum excretio, major noxa, major molestia pulmonum, major pressio, ac proinde cupiditas aeris novi, puri, frigidi major.

34. Quo minus libera, magis coacta circulatio in pulmonibus, seu major attritus obactionem & impulsu fortiori sanguinis subsequenter, & reactionem aut tarditatem antecedentis (19), eo calor intensior in pulmone & in aere contiguo, infarctus signum, & effectus: ergo eo major molestia, major cupiditas aeris copiosi, frigidi, qui infarctum & fervorem tollat.

35. Respiratio dicitur moraliter necessaria, cum sine ea vix vivere possit homo, absque anxietate mortifera aut intolerabili; argui quo major est fervor pulmonis, & aeris inspirati, eo intolerabilior est molestia, sine refrigerio & lavamine novi aeris; ergo eo major respiratiois iterandæ, accelerandæ necessitas.

36. In febre, potissimum ardente, in peripneumonia, maxime si durante ætatis tempore accederet, crescit necessitas respirandi pro ratione infarctus pulmonis, fervoris ejus & caloris aeris; unde tanta aeris frigidissimi cupiditas, quæ licet nomen proprium non obtineat, ut fames & sitis, non minus tamen urgens est & expletu necessaria.

37. Bonum dicitur, quod nos statimve nostrum perfectoris facit; sic alimenta in fame, potulenta in siti, inter bona merito numerantur, & eo major est eorum cupiditas, quoniam major videtur ad vitam necessitas, licet qui famem & sitim prævertunt, quid hæc sint, vix nisi per auditum, cognoscant: ita & cupiditas aeris, asthmaticis tantopere cognita, Physiologicis ita parum est nota, ut nullam ejus mentionem injiciant.

38. Cupiditatem aeris sic descripsit *Aretæus lib. 3. cap. 11. de Asthmaticis*: „Multum & frigidum aerem cupiunt, sub dio ambulantes; quælibet enim domus ipsis ad trahendum spiritum parva & angusta est; erecti spirant, tanquam omni aere attracto potiri cupientes; præ aeris autem cupiditate, & os aperiunt, patrescuntque, tanquam eo ampliore indigentes.“

39. Voluptas est intuitiva perceptio perfectionis nostræ, unde cum bonum dicitur quod nos perfectoris reddit, e possessione boni percipitur voluptas, & expletur ejus cupiditas; cum itaque aer inspiratus infarctum & molestim pulmonis tollat, nostrumque statum sic perfectiorem reddat, non mirum si ranam voluptatem excitet asthmaticis, dyspnoicis, aliisque præfocatis, & ut cum *Galeno* loquar, votum cordis expleat; & contra vero impotentia respirandi & præfocatio tanto mortore, ad desperationem & furorem usque, animam divehat, ut quidvis experiri mahat homines in his angustiis, quam aere carere.

40. Hos experiri placuit in cane, cui more *Halsii*, vesica füllia plena circa os alligata erat; is per multa minuta alacer & tranquilluserat;

verum cum successu temporis aer vesicæ destrueretur, vesica inter inspirandum multum excavaretur, canis inspiratione profundiori majorem aeris copiam quærebat, immo per frequentiores inspirationes, quod deficiebat in singulis, recuperare conabatur; demum respiraciones frequentiores fuerunt & minores, quod debilitatem continuo crescentem comitabatur, & canis decumbens post anxietates, inquietudines & conatus varios, cum sudore & vesicæ vacuitate perstante, mori tandem videbatur.

41. Tunc vero rubo infra ligaturam immisso, & novo aere insufflato, canis per gradus reviviscere, magis respirare, revaldescere videbatur, sicque restitutus, eum eodem rubo magna vi insuffillabatur aer, aut vesica plena manu fortiter premebatur, canis eadem suffocationis indicia præbebat, accum aere destituebatur, impedito scilicet sanguinis per pulmones transitu.

42. PROP. VI. Facultas motrix quæ viventibus inest, respirationem diverso modo intendit, remittit, accelerat, retardat, prout urgentior vitæ necessitas exigit.

43. In somno pacato & phantasmatis non turbato, respiratio est placida, sibi æqualis, tarda, regularis. Aut si somnium phantasmata terrificæ, delictantia, aliæ animæ repræsentet, dormienti respiratio est ut vigilant! similibus pathematibus affecto, inscio tamen, & circumstantiarum omnino ignaro.

44. In vigilia actiones liberæ naturales interturbant; & ut pulsus a labore, cursu, ira, clamore, major & frequentior, ita & respiratio: ut a cursu studii, quiete mentis, corporis longiori pulsus cordis, minor, ita respiratio.

45. Somnus & quies ad virium reparationem, actionum liberarum seriationem jubet; cum autem ad respirationem vires requirantur, hæc frustra impenderentur in respiratione celeriori, frequentiori; facultas itaque tardam & regularem debet, cum nihil urgeat, respirationem instituere, ut virium reparationi tunc temporis necessariæ incumbat.

46. Verum si occurrat invigilia necessitas agendi, musculos contrahendi, aut si easdem ideas, & cupiditates inter dormiendum imaginatio repræsentet, cum cor velocius impellit sanguinem, musculi fortius contracti sanguinem immittunt velocius in pulmones, inde infarctus (Propos. V) pulmonum, & necessitas est ut ille tollatur per expirationes audas & frequentiores, ac proinde per totidem inspirationes.

47. Aut si nulla boni, urgentive mali offeratur idea, nulla cupiditas urgeat, tunc quiete potiuntur corpus & anima, ut in somno, & tranquillitas respirationis revertitur, nec incassum vires impendantur; ergo facultas motrix, dum respirationem accelerat aut retardat, urgentiori prospicit.

48. Dum bronchitis inhæret quid noxium, aut larynx molestat, quoniam experientia docuit illud incommodum furti & sonora expiratione *nussi* dicta sæpius amoveri, nec ad hoc liberi motus



motus manuum, pedumve quidquam suppetant; facultas motrix tussim repetitam ciet, usquequo illud noxium ejectionem fuerit.

49. Dum propter tedium, somnum aut quietem longiorem, torpet pulmo, is ineptus est ad vocem, sanguis cessat; & quoniam ad hunc statum corrigendum nihil est apriori forti, gradaria, longa inspiratione, quæ *ofeivatio* dicitur; facultas motrix hanc excitat, & cupiditatem cum aliquali voluptate explet.

50. Pater itaque ab illa facultate respirationis motus variis modis mutari; prout exigit circumstantiarum diversitas, animæ cupiditas, & vitæ aut sanitatis utilitas.

51. PROP. VII. Facultas motrix, quæ respirationem exsequitur, est eadem quæ omnibus necessitatibus vitæ consulit, sive consentiat, sive dissentiat voluntas.

52. Cum quis ad hostem viribus superiorem vitandum, jubente timore, licet ratione & voluntate renuente, salutem in fuga querit, nemo dubitat quin potentia, quæ musculos movet, sit in eodem principio, quod timet. Cum quis fame vel siti pressus cibos appositos ipsi ratione veritos rapit, manducat, invitusque & veluti phreneticus vorat, nemo dubitat quin eadem facultas quæ motus illos exsequitur, pertineat ad idem principium quod alimenta appetit, cupit, videt.

53. Cum autem in homine nihil aliud sit præter animam & corpus, & cum omnis materies per se iners sit, resistat motui, cupiditatis, sensus, motusque sit incapax, nemo dubitat quin principium quod movet, sentit, cupit, metuit, in nobis sit anima; ergo nec dubitandum puto quin facultas motrix, quæ respirationem exsequitur, sit eadem quæ urgentiori vitæ necessitati occurrit, sive consentiat, sive dissentiat voluntas.

54. Principium illud per quod sentimus, intelligimus, & loco movemur, dicitur *anima* juxta omnes veteres Medicos & Philosophos: ergo idem est principium in quo est facultas motrix organorum respirationis.

55. Neminem terreat nomen facultatis quo tantum intelligimus potentiam agendi; quo vero modo agat in musculis movendis, non melius ex hoc nomine perspicitur, sed nomen illud ab omnibus Veteribus acceptum nihil erroris continet, & hujus omittendi nulla est ratio sufficiens.

56. Facultates animæ triplicis ordinis sunt, & aliæ in aliarum usum sunt constitutæ, ut omnes ad eundem finem, id est hominis felicitatem confpirent, quantum possunt, & motivum quod harum actiones omnes excitat præcipuum est *philantia* seu amor sui ipsius. Aliæ ideas objectorum nobis exhibent, sive confusas, ut *instinctus*; aliæ distinctas & universales, ut *intellectus* seu ratio: aliæ bona his ideis cognita appetunt, maleque averfantur, sive *instinctu* duce, & consuetudine præside, ut *cupiditas*; sive intellectu, aut ratione auspice, suadente, ut *voluntas*: de-

mum facultas motrix vel cupiditati obtemperat vel voluntati & rationi; si cupiditate regatur, dicitur vulgo *natura* a pluribus Antiquis & Neotericis; si voluntate, dicitur *libertas*. Hinc actiones a *Vulso*, aliisque Philosophis dividuntur in naturales & liberas, seu involuntarias & voluntarias.

57. In statu perfectio quod bonum expetit cupiditas, idem appetit voluntas; quod sedatur natura, idem libertas prosequitur, consentiuntque omnes facultates.

58. At in statu imperfecto, sæpius aliud suaderatio, & voluntas, aliud probat cupiditas, ut patet exemplo appetituum, qui dicuntur famem, sitim, libidinem, cum versantur circa objecta vetita: nihil itaque frequentius est quam actiones ejusdem hominis invicem facultatibus animæ repugnare, & unam prosequi, quod altera averfatur.

59. In statu itaque tantum sano corporis, libera simul & naturalis est respiratio, ita ut illæ facultates, philantia gratia semper agant; & cum respiratio quædam sit ad vitam necessaria, non vero ille vel iste respirandi modus in sanitate sit necessarius, respiratio quædam semper a natura instituitur, sive jubeat sine neget voluntas. Verum respirationis mutationes pro diversis usibus variæ libertati sunt permixtæ; sic voluntarie tussimus, sternutamus, ridemus, clamamus, & in his nunc expirationem, nunc inspirationem prorogamus, contrahimus.

60. In statu vero morbofo, cum sine dolore, vel vitæ discrimine non potest mutari modus respirandi a circumstantiis præscriptus, soli naturæ est imperium in respirationem, libertateque nullum in eam jus est derelictum; ut cum hostis, districto gladio, nos insequitur, natura cursum brevissima via accelerat, & nullus libertati choream agendi, aut eleganter, & graviter ambulandi locus est, quia urgentiori occurrendum. Et si in his paulo fusius hæserimus, hujus ratio est quod *Galenus* observavit, cognitionem facultatis quæ respirationem regit, esse Medico pernecessariam, ita ut neotericos sui ævi Medicos increpet quod eam facultatis & utilitatis, seu motivi cognitionem neglexissent. *Galen. de Dyspnæa, lib. 1.*

61. De cætero objectiones Neotericorum validissime refutat idem Medicus-Princeps. Si enim ipsi objiciant quod respiratio nobis dormientibus & inscisi fiat, atque proinde ab animæ facultatibus non pendeat; ille respondet *millenno motus ab anima pendere, dissentiente nemine, ut ambulatio, loquela, situs corporis, mutatio, &c.* quos inscisi, & dormientes exsequimur; somnus enim non omnes actiones animæ tollit, sed tantum pacat, obscurat.

62. Si iterum objiciat respirationem nobis etiam inscisi procedere, reponit ille, quod anima actiones coactas æque exsequatur ac arbitrarias & jucundas, ut auxilium invocare, fossam vitandæ mortis gratia transilire.

63. Si insint multa obscura esse in ea sen-

ten-

tentia, pluraque dubia nondum soluta remanere, v. g. quod semper in aliis actionibus memores, & concilii nos hos motus appetivisse, non vero in respiratione coacta; reponit *Galenus* etiam motus aliarum partium nullam iustionis animæ relinquere memoriam, aut conscientiam, cum in magna cupiditate, seu vehemēti pathemate facti sunt, aut a dormientibus, ebriis, mente captis instituti, non minus tamen animæ iussu ipsi facti sunt.

64. PROPOS. VIII. Facultas quæ respirationem exsequitur in morbis argentissimis, vitæ necessitatis occurrit, & licet inerudita, quæ expedit videntur, efficit.

65. *Natura*, ait *Hippocrates* sexto *Epidemiorum*, morborum est curatrix; ipsa licet inerudita, quæcumque opus est facere efficit. Idem in morbis exsequitur illa facultas, quæ motus respirationis exsequitur, etenim licet artifex & operarius minime eruditus, solo instinctu duce, opera sua exsequitur aptius, quam doctissimus & inexpertus Mechanicus, ita ut velle in extremo, non vero in medio apprehendat, ut commodius eo utatur, licet, quid sit velle & ejus theoria ignoret; ita natura, organorum suorum omnino ignara, de viribus suis non erudita, organa ad cupiditatis scopum, viribus necessitati & suo robori proportionatis rite movere. Insciti & inviti dum progredimur, centrum gravitatis corporis, nunc hic, nunc illic, versutus oppositum transferimus, & æquilibrium ne nomine cogitamus micere veramus.

66. In infarctu pulmonis periculum est ne circulatio hæreat, unde mors; remedium præsentissimum hujus infarctus est inspiratio & exspiratio fortior; nam ab inspiratione fortiori vasa pulmonum, prius rugosa, adeoque angustiora explicantur, elegantur, ergo capaciora sunt; angeli, quos invicem constituunt, augentur, & sic vis sanguinis liberior, & spatium pectoris majus evadit, ergo pulmones a pressione molesta liberantur, & infarctus minuitur; dein vero cum pars sanguinis inspirando transfuxit, exspirationis vi residuum fortius in venas & in auriculam exprimitur; & sic omnino tollitur infarctus, & molestia.

67. Verum ad respirationem adaugendam major virium impensa requiritur; virium vero impensa, jactura est, adeoque debilitatem inducit, si diutius duret: ex virium omnium jactura, mors certissima; datur itaque medium tenendum natura inter prodigium virium impensam, & nimiam earum parcimoniam, quarum altera debilitatem, altera suffocationem induceret. Illa virium inovementum distributio, quæ sola sæpius morbos pectoris status corrigit, & sanitatem redintegrat, visa est *Hippocrati* ab Ente sapiente & iusto instituta, quo nomine naturam compellat; hujus providentiam extollit *Galenus*, per quam animalia in secunda valetudine servantur, & ægrotantia morbo liberantur; *Galenus* in *Hippoc. Epid. VI.* Illa principii nocivi intensitati, adeoque periculo vires suas ita ad-

pat, ut si urgeat, continuo & acriter illi repugnet; sin minus, resumptis viribus per intervalla in eum invehatur.

68. Ars quidem medica experientia & ratione, seu ideis boni & mali munita, valet erroneos naturæ conatus dirigere; verum sine naturæ concursu insufficiens est, cum natura sola sine artificio adjumento, ut in rusticis, brutisque sufficientem sæpe operam ferat, & Medicus naturæ minister & interpret, si naturæ non obtemperat, naturæ non imperat; *Baglivius* pag. 7.

69. Vis est causa actionis, facultas vero est principium virium; cum actiones naturæ in morbis, ejusque vires nosse sit maxime necessarium, quippe illæ indicant & morbifici principii intensitatem, & remedium energiam, de viribus in respiratione morbofa impensis præmittenda sunt quædam lemata ad totius artis medicæ theoriæ utilia.

70. Pectus solibus in eo simile est, quod valvis elevatis per vim motricem, aer in ipsius cavum ingreditur, iisque depressis egreditur per orificium constantis fere magnitudinis; de solium itaque motu quæ a Mechanicis demonstrantur, respirationi possunt applicari.

71. PROP. IX. Facultas motrix quæ sollem, vel pectus datæ magnitudinis agitat, tam inspirando, tum expirando, tanto majorem vim exercit sub eodem orificio, quò velocitatis aeris ingredientis vel egredientis quadratum majus sit; demonstravit *Mariotte*.

72. Id enim certum est de omni fluido quod vis ad illud certa velocitate movendum sit, ut illa velocitas quadrata; ita ut si velocitas sit dupla, vis sit quadrupla; si sit tripla, vis novies major requiratur.

73. PROP. X. Si dato eodem orificio capacitas, seu sectio transversa, tum solis, tum pectoris diversa sit, vis adhibenda ad aerem certa velocitate expirandum, vel inspirandum est eadem. Verum vis adhibenda ad valvas certa velocitate deprimendas, vel attollendas, est tanto major, quo quadratum sectionis transversæ solis, vel pectoris majus est.

74. Si Syringæ sectio transversa, vel basis ejus emboli ipsi æqualis, sit decies major orificio, evidens est quod ejus velocitas erit decies minor velocitate fluidi per orificium expressi; si vero dato eodem orificio basis emboli foret tantum ejus orificii quintopla, seu prioris subdupla, velocitas fluidi esset tantum quinquies major velocitate emboli; unde patet quod velocitas fluidi in orificio sit tanto major respectu velocitatis emboli, quo basis emboli major est respectu orificii, adeoque ut basis emboli.

75. At vires fluida moventes sunt ut eorum velocitatum quadrata; ergo vires necessarie ad embolum, seu sollem data velocitate movendum sub dato orificio, sunt ut quadrata sectionum transversarum solis, seu basium emboli.

76. Sic si dato eodem laryngis orificio, sectio transversa pectoris sit duplo major, ut in adultis respectu puerorum accidit, vis necessaria ad-

to ad pectus eadem velocitate movendum, ac puer movet, est quadruplo major: quoniam vero in magnis inspirationibus sectio transversa pectoris majori ratione crescit, quam tracheæ orificium, in magnis inspirationibus vis necessaria ad pectus eadem velocitate movendum, est tanto major, quo quadratum amplitudinis pectoris majus evadit.

77. Hinc etiam sequitur quod in magnis respirationibus, si eadem vis motrix adhibeatur, velocitas pectoris tanto minor sit, quo sectio transversa pectoris major est, & e contra; sed velocitas aeris remanet eadem.

78. PROP. XI. Vires requisitæ ad respirationem frequentiam adaugendam, sunt ut respirationum intra datum tempus numeri intra sanitatis limites.

79. Aucta pectoris magnitudine, vires requisitæ ad duplam majorem aeris quantitatem, dato tempore, respirandam, sunt ut quadratæ quantitates (76); verum ad augendam duplam illam quantitatem sufficit dupla frequentia, ergo & vis dupla tantum.

80. Frequens dicitur respiratio, quæ pluries fit intra datum tempus quam fieri consueverat; at cum eadem vis in qualibet respiratione similis impendatur, summa virium impensarum est ut numerus respirationum, seu ut earum frequentia, modo, tamen velocitas cujuslibet respirationis eadem sit, quam in respiratione ordinaria.

81. PROP. XII. Quantitas aeris inspirari, vel expirari intra datum tempus est in ratione composita frequentiae & magnitudinis respirationum.

82. Etenim si data mensura aeris inspiretur una inspiratione, duæ in duabus, tres in tribus similibus inspirabuntur; si vero inspiratio sit duplo, triplo major, sectio transversa, seu amplitudo pectoris duplo, triplo major erit; ergo & aeris inspirati quantitas: verum frequentia non impedit magnitudinem; ergo si duplo frequentior, & triplo major sit respiratio, quantitas aeris respirati sexies major erit.

83. Dato eodem laryngis orificio, quantitati aeris respondet ejus velocitas; verum vires sunt velocitates quadratæ; ergo vires respirationi exsequendæ impensæ, sunt ut quantitates quadratæ aeris respirati, si cætera paria sunt.

84. PROP. XIII. Vires requisitæ ad augendam quantitatem aeris inspirari, aucta pectoris magnitudine, majores sunt, quam aucta frequentia.

Dum crescit magnitudo pectoris in magna inspiratione, vires requisitæ ad illas inspirationes exsequendas, sunt ut quadrata incrementorum pectoris.

Inveni diametrum mei pectori io minima in spiratione 120. linearum, in mediocri 124. in maxima 128. Incrementa capacitaris in his casibus, respectu auctæ diametri, erant inter se, ut differentie inter quadrata harum longitudinum; quæ quadrata sunt, ut 14. 17. 16. proxi-

me; ergo differentia sunt o. 1. 2. seu ut differentie diametrorum.

Vires requisitæ ad elongandas fibras circulares vesicæ, cui comparari possunt sacci bini pleuram confluentes, inventæ sunt & traditæ, *Glass. 1. Theor. n. 73. Gr.* Vesica premebatur diversis aquæ intra ipsam infusæ altitudinibus, vires elongantes erant ut illæ altitudines. Cum ad altitudinem 6. pollic. aqua in rubo ascendebat supra apicem vesicæ, periphæria ejus crevit 19. lineis; cum vero ad 24. pollices aqua ascendebat, tunc periphæria crevit non quadruplo, ut vis premsens, sed vix duplo; immo requirebantur 30. pollices altitudinis, ut periphæria cresceret 38. lineis. Ergo vires requisitæ ad producendas fibras circulares sacci membranacei corporis nostri, sunt ut quadrata harum productionum.

Jam vero in casu allato differentie voluminum pectoris, sunt inter se ut ipsæ productiones fibrarum, ut mox vidimus; ergo vires requisitæ ad respirationes solito majores exsequendas, sunt inter se, ut quadrata quantiarum quibus pectus urgetur: quod erat probandum.

85. Ex Propos. X. si crescat magnitudo pectoris, nec crescat glottidis orificium, quod verisimile est, vis requisita ad pectus eadem velocitate contrahendum, vel dilatarandum, crescit ut quadratum magnitudinis, vel sectionis transversæ pectoris. Verum glottidis orificium aliquantum crescere debet, cum tunc temporis urgeatur ab aere velocius prætereunte; adeoque si supponamus, quod probari facile potest, glottidis orificium crescere in multo minori ratione, quam cavum pectoris, semper verum erit, quod vis requisita ad pectus in majori respiratione solita velocitate movendum sit major, quam quæ respondet quadrato incrementi pectoris.

86. Virium ergo parcimonia duplo major est a dupla frequentia, quam a dupla magnitudine; triplo major est a tripla frequentia, quam a tripla magnitudine: parcimonia enim est, si minori virium impensæ eadem aeris quantitas obtineatur: seu est directe ut effectus quæsitus, inverse ut vis impendenda.

87. Ex hac propositione magna lux affunditur in theoria medica; jam enim apparet, quod adhuc laucatur, quare decrecentibus viribus, ubi aeris respirandi necessitas urget, natura frequentiorē, non vero majorem edat respirationem.

88. PROP. XIV. Angustato laryngis orificio, & aucta pectoris amplitudine, vires requisitæ ad pectoris motus diversos edendos, sunt in ratione composita ex duplicata tum angustia laryngis, tum amplitudinis pectoris, tum velocitatis motus pectoris.

89. Sit larynx duplo minoris orificiū, ut dupla solita aeris copia transeat, requiritur vis quadrupla aëri imprimenda; nam quantitates illæ sunt in ratione composita velocitatis directæ, & angustia orificii inverse.

90. Ergo vis sexdecupla requiritur sub pari amplitudine pectoris. Ergo ut subdupla angustia, dupla pectoris amplitudine, velocitas pectoris duplo major evadat, requiritur vis quæ sit. 64. vicibus major.

91. Ex hoc intelligitur exemplo quanta virium lactura sit necessaria, cum respiratio est intendenda quoad magnitudinem, etiam si detur angustia laryngis, & quantum naturæ labor in hac angustia.

92. Robur facultatis motricis est limitatum, & juxta experimenta Bernoulliana, operarius qui quotidie per horas decem laborat sine lassitudine, quovis secundo temporis, vel pondus 70. librarum ad pedis altitudinem attollit, vel opus huic æquipar exsequitur.

93. Hujus roboris pars cordi, altera pectori, residua partibus movendis destinantur, & forte decima pars respiratori impenditur. Si itaque respiratio decies majores solito vires absumat, cito omnes alios musculos languere, & hominem prostreri, ac debilitari necessum est; si cantus per horas paucas continuatus lassitudinem interat, quanto majorem respiratio laboriosa noctu, diuque divexans?

94. Cum vero motus vitæ necessarios, ut respirationem, pulsus intendere cogit necessitas, tunc ut viribus parcat, moribus arbitrariis suppressis, vel imminuatur, natura fluidum nervum superfluum ad meliores usus reservat; hinc lassitudo ad motus liberos, dum motus naturales fortiores sunt.

95. Robur facultatis est tanto majus, quo per longius tempus, sine lassitudine, majores vires potest exercere.

96. Robur itaque magnum esse potest, cum vires æquales sunt minimæ, quod paradoxum videtur illis qui facultatem cum ejus viribus confundunt.

97. Robur facultatis potest conferri cum promptuario, vel receptaculo aquæ, quod quotidie novam aquæ copiam accipit, superfluumque effundit. Ea quantitas certos limites non transgreditur à receptaculi magnitudine determinatos; verum potest esse minor & minor, usquequo receptaculum exhaustum sit.

98. Cum receptaculum plenum non est, quantitas aquæ est in ratione directa aquæ per immisarium continuo accedentis, & inversa ejus quæ per emissarium effunditur.

99. Cum roboris magnitudo integra non est, facultas est in ratione directa acceptæ, & inversa copię impendit. Robur accipitur, vel reparatur somno & pascu; impenditur superfluum actionibus naturalibus, & liberis, & necessariis iidem actionibus violentis.

100. Cum facultas integra non est, quo minus accipimus, & plus impendimus, eo magis depauperatur robur.

101. Sed quo majores vires exerimus, eo plus impendimus virium; ergo in morbis quo actiones sunt majores, eo facultas debilior evadit.

102. In morbis febrilibus vires coëdices lan-

guent, docente experientia; ergo minus appetunt ad cibaria in chylum & sanguinem convertenda, seu ad robur reparandum; ergo roboris acceptum minus est, dum majus est impensum; hinc debilitas.

103. Ad vitam sustinendam robur minimum sufficit, quippe videmus ægros fere omnino exhaustos, & pro moribus derelictis revalescere; e contra vero moribici principii violentia alios cum integra fere facultate e medio tolli; cum autem non nisi agendo, adeoque vires impendendo possit natura se a moribicis principii liberare, secus moriem passura, vires morte accedente inutiles ad meliorem usum vertere non potest, quam ad morbi principia evertenda, etiam si eventus non semper sit fastus; quippe fatium est dubium ex petiri remedium, quam nullum.

104. Hanc theoriam morborum, quod scilicet sit lactura naturæ cum materia morbifica, ab omnibus Græcis, Arabibus & Latinis acceptam, evertere conati sunt Neoterici, qui corpus humanum pro mobili automatico habere, & ex legibus, ut aiunt, Mechanicis, sine scopo, sine providentia, cæco impetu, sine animæ concursu activo dirigi pronunciarunt, ut Pitcairnius, Bellinus. Verum in primas Mechanicæ leges impegnerunt, & Patrum Medicinæ dogmata scripta ipsi contraria flocci fecerunt, inutiliaque reddiderunt, utpote quæ novæ theoriæ clave referari non possint. Sed hæc de secula Chemicæ & Mechanicæ dicta sunt.

105. Roboris facultatis integritas æstimatur ex similitudine actionum & qualitatum cum sanis & consuetis; in sanitate scilicet robur facultatis magnum plerumque est; & vires, seu actiones naturales minimæ, regulares, pacatæ; ceteræ liberiores, arbitrariæ cū voluplate exercitæ.

106. In morbofo statu robur facultatis parvum est, & continuo descrevit, & vires, seu actiones vitales magnæ, difficiles, & irregulares, coactæ; ceteræ vero impeditæ, languidæ; interruptæ, molestæ.

107. Natura in sanitate sui roboris conscia, ab injuriis externis & internis cuncta, motus v. g. respirationis lenes, regulares, pacatos, parvos, debiles instituit; libertas vero in hos magnum imperium retinet, & viribus pro lubitu utitur, motusque respirationis pro lubitu mutat.

108. At in morbis pectoris natura ad materias morificas impugnandas, majores & fortiores conatus exercit, viresque sic magnas impendit; atque cum lactu diuturnitate debilitata est, conatus irregulares, inconstantes, molestos, precipites, interruptos exercet; motus vero liberi ut loquela, cantus, sunt impediti, suppressi, minimi.

109. Respiratio *notabiliter* frequenter dicitur in praxi, quæ constanter pluries absolvitur dato tempore, quam in sanitate consueverat. *Rara* vero quæ rarius, *magna* quæ maiorem solio pectoris ampliationem, *parva* quæ minorem infert.

110. PROP. XV. Respiratio *notabiliter* frequens significat urgentem respirandi necessitatem, & infirmam facultatem.

stant, illi supponunt eandem esse semper vim pectoris ad respirandum, quod experientia repugnat; multo etenim maior est in athmatico, quam in sano dormiente; etiam si facultas sit minor. Supponunt iterum pulmonibus, infarctu distensis majorem esse vim ad contrahendum, quod etiam falsum est; nam elasticitas non est causa motus pectoris; & etiam si corpus elasticum majori infarctu, seu pondere sit inflexum, non ideo le resistit, sed tantum resistere conatur, & non potest: vis enim aequilibratur nullum effectum inducit; equilibriatur vero elasticitas ab infarctu, cum distensu supponatur elastum ab eadem vi; illi demum ad stimulum, vel ad imaginacionis vim, adeoque ad principii sentiens confugere tenentur, ut nosmetipsi inephialite, similiterque affectibus.

124. PROPOS. XVIII. Respiratio frequens & parva malum morbi eventum prænuuntiat, nisi a dolore parvitas pendeat.

125. Omnis morbus acutus est lucta naturæ cum materia morbifica, teste *Hydeham* post *Galenum*, cæteroque Medicinæ Patres. Hæc lucta salute terminatur, quoties vires naturæ superant tandem resistenciam, & destruant vim nocivam illius materiæ morbificæ: si vero vires naturæ infiores evadant viribus materiæ, & tamen non remittant ejus conatus, immo intendantur, ipsius robur exhaustum nocellum est; ergo malus est expectandus morbi eventus.

126. Dico autem quod respiratio frequens, & parva significat, & materiæ morbificæ vires resistere, & robur facultatis decrescere; etenim frequens respiratio significat vires impendi tantum majores ad respirandum; sed respiratio parva significat simul facultatis robur esse imminutum; cum autem facultatis robur est imminutum, & tamen impensio virium major perleverat, eo proximius imminet totalis exhaustio, seu mors (100. 103.) ergo patet propositio.

127. Ne forte quis existimet quod respiratio frequens & parva minores virium impensas supponat, monendum est illam respirationem infarctum gravem supponere, & pertinacem (126.); atqui in infarctu respiratio magnas vires exigit, etiam si motus pectoris parvus sit, quod sequentibus propositionibus enucleabitur.

128. PROPOS. XIX. Augmentum capacitatis pectoris in inspiratione, quod fit per collarium elevationem, aut diductionem a mediastino, minus est illo quod fit per descensum diaphragmatis.

129. In inspiratione media, quæ fit inter dormiendum in statu sano, 40. circiter pollices cubiti inspirantur, & in fortissima 120. (3). In inspiratione media diameter pectoris est ad ejus diametrum in inspiratione maxima, ut 124. lineæ ad 127. horum quadrata sunt inter se, ut 15. ad 16. proximè. Verum 120. est ad 40. ut 11. ad 2. cum autem pectoris capacitas media sit ad maximam ratione diametri adaucta, ut 11. 15. ad 16. 2. quicuplo maior est incrementum pectoris a descensu diaphragmatis, in hoc casu, quam a collarium diductione; quandoquidem augmentum illud est in ratione composita

ex duplicata diametri pectoris, & simpla altitudinis, seu descensus diaphragmatis.

130. Iam vero si supponamus in minima omnium inspiratione unum pollicem cubicum aeris duci, in quo casu inveni diametrum minimam pectoris æqualem 120. lineis; quoniam quadratum illius diametri minimæ est ad quadratum maximæ ut 14. ad 15. proximè, & volumina aeris inspirati sunt in hoc casu ut 1. ad 120. augmentum capacitatis pectoris in minima respiratione est ad augmentum in maxima ut 1. ad 120., & augmentum ratione diametri est ad augmentum ratione altitudinis ut 1. ad 105. ergo patet propositio.

131. Memini me mensurasse volumen pulmonis vacui in aqua meris, deinde volumen ejusdem pulmonis aqua turgidi ad usque laryngem, & invenisse volumen posterius plus quam decuplum prioris.

132. Ex his intelligitur in maxima inspiratione multum intumescere posse pulmonem, licet volumen ejus ratione diductionis collarium quam minime crescat. Crescit itaque quam maxime per depressionem diaphragmatis.

133. PROPOS. XX. Respiratio in resistentibus est facilius quam stantibus, & cruribus flexis quam extensis in decumbentibus.

134. Etenim in resistentibus capacitas abdominis majore vadit quam in stantibus, quippe cum muscoli recti in sedentibus laxantur, qui rigent in stantibus, illi facilius extorsum flexuque ab aere inspirato, aut diaphragmate descendente, ergo cavitas abdominis sub eadem peripheria ex cylindrica abit in sphaeroideam; sphaera autem omnium solidorum ejusdem peripheriæ est capacissima. Hinc fit ut ægri difficile respirantes sedente lubenter, cum ut alicuius mediocantur, tum ut facilius respirarent. Eadem est ratio cur dum in iacimus, ut facilius evadat respiratio, crura flexamus; & cruribus enim flexis muscoli recti facilius arcuantur extorsum.

135. Infarctus visceris est ejus intumescencia facta a fluido intra ipsius vasa congesto & viribus ordinariis illud premeantibus resistente. Non potest autem magis resistere, si vasa sint more solito patula, nisi vel quia gravitate specifica majori gaudet, salvat fluiditate, vel quod visco sitate majori polleat: unde difficilior scienditur in columellas vasa præteritura, aut fortius parietibus vasorum adheret.

136. Fluida gravitate specifica diversa gaudencia resistunt viribus ea propellentibus in ratione suæ densitatis seu gravitatis specificæ; & velocitates, quas ab illis viribus concipiunt, sunt in ratione subduplicata densitatis eorum. Sic si solis nunc aere, nunc aqua repleatur, & eodem pondere prematur velocitas aeris erit ad velocitatem aquæ ut circiter 1. ad 17. quia aer est 676. vicibus levior aqua.

137. PROPOS. XXI. Itaque si loco aeris sit in bronchiis aqua ejusdem cum aere visciditatis, sed 676. vicibus densior, vis requisita ad absolvendam respirationem, æque amplam & æque

frequentem ac dum respiratur aer, debet esse 676. vicibus major.

133. Et quoniam est idem labor eandem resistenciam superare intra unum tempus, ac ejus duplam intra duo tempora, vis eadem applicata pectori aqua infarctus, si duplo majorem instituat respirationem, duplo longiorem vel tardiozem instituet.

139. Verum si eadem vis intra idem tempus instituat unam respirationem, illa respiratio, his positis, erit duplo minor, & si respiratio sit diversae magnitudinis, & diversae frequentiae, vis requisita ad eam exsequendam, cum brochiae aquam contineant loco aeris, est ad vim in casu respirationis mere aëreæ, in ratione composita ex simpla densitatis aquæ ad densitatem aeris, duplicata magnitudinis & simpla frequentiae.

140. Portentose major est illa vis, quam consueta apud eos qui aquis immersi easiōspirant, & tamen pro aliquo tempore, pectus velox & frequentius exagitant; non mirum si cito exhauriatur vires & pereant immersi.

141. Fluida diversae viscositatis resistunt viribus illa præmentibus in ratione visciditatis suæ. *Viscosum* dicitur fluidum illud quod sub æquali densitate magis resistit partium suarum separationi; sic cruor viscidior est aqua, lymphæ viscidior urina, &c.

142. PROPOS. XXII. Infarctus vasorum vel bronchiorum a fluidis diversae visciditatis retardat aut minuit respirationem in ratione visciditatis.

143. Ergo ut pulmones æquali velocitate moveantur cum sunt infarcti a fluido duplo vel triplo viscidiori, requiritur vis duplo, triplove major.

144. Et si fluidum infarciens sit simul densius & viscosius quam est fluidum in vasibus ordinario contentum, respiratio erit difficilior in ratione densitatis, & viscositatis simul.

145. Follis impletur aqua, & æquali velocitate, ac æquali vicium numero moveatur, ac dum plenus erat aëre; sequitur ex dictis vim, quæ eum follem agitat, esse 676. vicibus majorem quam in primo casu.

146. Ergo si polmo, non obstante infarctu densiori, æquali velocitate, & frequentia respiceret, ac in statu sano, necessum est, ut toties vis major illum agitet, quoties densitas fluidi infarciens est major densitate fluidi in sanitate ipsum implentis.

147. Ergo licet pulmones asthmaticorum non moveantur velocius frequentiusve quam sanorum, evidens est quod vires ad eos movendos impensæ sunt maximæ, quod valet etiam de illis qui pus, lympham, cruorem habeant in pectoris cavo, loco aeris thoracici.

148. Sed si fluidum sit simul viscidius ipso sanguine, quoniam pulmones debent expandi & contrahi, ut respiciamus, & vasa eos componentia tanto difficilius secluntur, quo viscidioribus fluidis sunt plena, evidens est respi-

rationem difficiliozem fore in ratione visciditatis fluidi.

149. Ergo si concurrat visciditas simul; & densitas infarctus, v. g. duplo major quam in statu sano, & tamen respiratio sit consueta: similis quoad magnitudinem & frequentiam, vis impensa est sextuplo major, scilicet quadrupla ratione densitatis duplæ, & dupla ratione visciditatis duplæ.

150. Si vero visciditas, & densitas sint duplo majores, atque simul magnitudo respirationis sit duplo major, vis ad eam exsequendam impensa est 32. vicibus major.

151. Cum maxima pars respirationis fiat per ascensum & descensum diaphragmatis (Propos. XIX.) pectus potest considerari tanquam antlia, cujus embolus est diaphragma: quæ itaque de aortia demonstrantur, de pectore valebunt.

152. Si embolus antliæ, cæteris paribus, diversâ velocitate moveatur, vis ad eum agendum requisita est in ratione duplicata velocitatis. Ergo si diaphragma duplo triplove velocitatis moveatur, cæteris paribus, vis impensa est quadrupla, noncupla prioris.

153. PROPOS. XXIII. Respiratio, quæ minor & rarior est quam in statu sano, si nullus sit infarctus, vim quidem minorem impendit quam in sano; sed in statu debilitatis summa magis potest defatigare quam cum facultas est integra.

154. Si enim ex receptaculo ferme exhausto detrahas dimidium, id plus accidit ad exhaustiōnem, quam si dimidium, pariter ex pleno detrahas, atqui tamen dimidium ferme exhausti receptaculi potest esse decies & centies minus quam dimidium pleni.

155. Ergo & a pari si viribus sere exhaustis respiratio proportionaliter minor & rarior non evadat, vires ulterius exhauriuntur & mors iostat: vero si proportionaliter minor & rarior evadat, tunc robur acceptum quotidie per somnum & pastum potest hanc iacturam reparare, & vitam diutius sustinere, vel restaurare.

156. Non mirum itaque si in illis, qui senio confecti sunt, natura instituat respirationem & minorem simul & tardiozem, ut vires converteret, maxime cum ob frigoris pulmonis, rotiusque sanguinis, & ob circulationis tarditatem (28. ad 37.) minus urgeat respirandi necessitas.

157. PROPOS. XXIV. Respiratio in febribus acutis frequentior & major boni ominis est, frequentior & minor pravi ominis.

158. Respiratio in acutis frequens & magis sit ob urgentem utilitatem & facilitatem robustam, ait *Galenus*; sed quamdiu facultas est ita robusta ut ad parcimoniam virium non confugiat, sanum est cum esse materiæ morbificæ viribus superiorem, adeoque bene ominandam est.

159. Cum & contra frequentior simul evadat & minor, quoniam illud accidit in cursu febribus, adeoque viribus jam a morbo sumptis, & præ-

& præterea signum est naturam suam debilitatis conficiam esse, id est hominem confuse suam debilitatem sentire; cum vires majores ad vincendam materiam morbosicam non sufficerent, timeendum est ne minores deinceps non sufficiant: ergo male ommandum est.

160. Materies morbosica duplici modo impugnatur, scilicet mechanicæ & physice; ope naturæ & ope artis medicæ materies viscidior corrigitur vel eliminatur; corrigitur potu diluente, quæsticis, vel æri imperat calore, quem febris, aut medicamina augent; ea vero physica est actio. Corrigitur autem mechanicæ per attritus repetitos vasorum, pectoris motus, per exercitia, frictiones olim in febribus intermittentibus adhibitas.

161. Materies morbosica eliminatur vi naturæ & artis, per eruptiones sanguinis, sudores, aliaque evacuationes; inde patet quod etiam vires mechanicæ respirationis & pulsus, quæ debent corrigere, vel eliminare materiem morbosicam, minuantur non tamen salus æger sit omnino desperata, cum actio physica omnibus fluidis propria possit crescere successu temporis, seu il a materies possit successive resolvi, matescere, ad crisum perfectum præparari; sed cum illa via non ita tuta & brevis sit, a periculo æger non est immunus.

162. PROPOS. XXV. In hydrothorace & empyemate respiratio est faciliior residentibus quam decumbentibus.

163. Facilitas respirandi est ut facilitas arguenda cavitatis pectoris, adque recipiendi aeris copiosioris: dum aqua, pus, cruor effusa sunt in cavo thoracis, & pro volumine succorum pectoris minuant, & tantumdem aeris ingressuri copiam detrahunt, hinc molestia & difficultas respirandi. At plus minuitur cavum thoracis in jacentibus quam in stantibus, vel residentibus; nam in stantibus ipsum pondus aquæ magis adjuvat diaphragmatis descensum, cum columna premens sit altior; in decumbentibus premens columna minus alta est, & ejus pondus in pectoris dilatationem non impenditur.

164. Si hydrothorax alterutrum lateris occupet, facilius est jacere in lateris ægrum quam in sanum: quia in priori postura pondus aquæ sustinetur a claustris osseo-musculosis pectoris, & non nocet; in posteriori vero nocet expansioni lateris sani aggravato mediastino.

165. Si hydrothorax sit in pericardio, flexo antroscum pectore, pondus aquæ minus agit in pulmones, magis in diaphragma, & ea positura respirationem adjuvat.

166. PROPOS. XXVI. In morbis inflammatoriis cum dolore pectoris vel abdominis respiratio frequens est & parva.

167. In morbis inflammatoriis cum dolore pectoris vel abdominis, est tumor aliusque partitis, ut in pleuritide, hepaticide, gastritide, &c. adeoque difficultas explicandi pulmones in statum a tumore occupatum, ergo respiratio difficilis: verum etiam adest febris acuta, adco-

que fervor major in pulmonibus cum aliquat eorum infarctus, unde iterum respirandi difficultas, & respirationis vel augenda, vel geminandæ necessitas; sed debet tantum geminari seu frequentior fieri tum metu impensis virium majoris, ut in decursu omnis febris acutæ, tum metu doloris, etiam initio, & licet robur naturæ sit maximum, quia scilicet plus distenditur pars dolens a magna respiratione quam a parva; ergo & ex ratione debet minor fieri seu cohiberi, quod observatio confirmat.

168. Optime observavit *Galenus* in dolore pectoris cum calore pulmonis adaucto crescere densitatem, id est frequentius respirationis, simulque decrescere magnitudinem; nam metu doloris natura minus dilatat theoricem; ait tunc non expletur votum cordis, seu non ducitur sufficiens aeris copia ad fervorem pulmonis temperandum; ergo necessum est, ut cupiditas aeris expleatur aucta tantumdem ejus frequentia; *Galenus de dyspnœa, lib. 5. art. 7.*

169. PROPOS. XXVII. In morbis acutis respiratio rarior & major solito delirium significat: *Galenus ibid. vari. 12.*

170. In delirio febrili datur infarctus vasorum cerebri, ex quo idææ objectis externis minime respondentes in anima exsurgunt, eamque totam detinent, cum objecta externa delirantes non percipiunt; delirantes etiam hi idæis phantasticis detentis minus percipiunt statum in corpore extra cerebrum, minus v. g. sentiant respirandi, mingendi, & bibendi necessitatem, adeoque circa illas necessitates negligentes sunt, & his, non nisi cum urgentiores sunt, satisfaciunt; non secus, ait *Galenus* ac qui inter ambulandum meditari, aut attendere ad suas idæas volunt, illi multumambulandi concitatione remittunt, & quandoque hærent, se nec hærent percipiunt; ita delirio detenti respirationem incipit retardant, usquequo aucta respirandi necessitate, ad infarctum crescentem minuendum, inspirationem instaurare coguntur, tanto majorem, quo suæ magis retardata.

171. In morbis itaque febrilibus, si respiratio, quæ frequentior debet esse quam in sanitate, non frequentior evadat; cum nulla alia ratio sufficiens hujus retardationis sit, quam animæ attentio ad idæas ad infarctum cerebri excitatas, & illæ idææ delirium, ut infarctus, quandoque motus convulsivos, similiaque mala excitent; merito *Galenus* post *Hippocratem* profert delirium aut convulsionem præagiri a respiratione rara & majori in morbis acutis.

172. PROPOS. XXVIII. In statu perfectior machinæ virium impensis minores exigunt ad majores effectus edendos, quam in statu imperfecto.

173. Effectus machinarum alii sunt utiles, alii inutilis ad scopum; sic motus pectoris frequentior, vel major evadit in dyspnœa eosine, ut major aeris intra darum tempus respiretur quantitas, & hic est effectus utilis; verum si



sunt resistentiæ priua superandæ quam hic effectus obtineatur, utur illas superare sic necessarium, arcum ad aeris quantitatem augendam inutile est; (quippe fatiua esset eandem quantitatem respirare sine resistentiis); ille effectus dicitur inutilis.

174. Quo vero majores sunt resistentiæ superandæ in machina ad eundem effectum obtinendum, eo minus ad scopum conspirant partes hujus machinæ, seu eo minus perfecta est machina.

175. Verum quo majores sunt resistentiæ superandæ, eo major virium impensa requiritur ad eundem effectum utilem obtinendum; ergo quo imperfectior est ejus status, eo minor effectus utilis ab eadem virium impensa obtinetur, aut eo major virium impensa requiritur ad eundem effectum.

176. Sic cum pulmo laborat infarctu, qui dimidium ejus capacitatem occupat, singulis vicibus non nisi dimidio minor obtinetur aeris copia; aut ut solita obtineatur, vires quadruplo majores requiruntur, nam velocitas duplo major est aeri imprimenda, & tamen effectus utilis non est major quam si perfecta foret machina pectoris, & quadruplo minores vires impenderentur.

177. Ergo in statu perfecto machinæ, ut pectoris, cordis, &c. effectus omnium sunt maximi respectu ad vires impensas, & in statu morbofo, seu imperfecto minimi.

178. Molestia est intuitiva perceptio imperfectionis nostræ; (40) quorities itaque imperfecta est quædam corporis humani machina, & illum statum percipimus, toties molestia afficimur.

179. Difficultas actionis est molestia oriunda ex perceptione hujus imperfectionis, seu insufficienciæ virium nostrarum ad resistentias huic actioni oppositas superandas.

180. Itaque difficilis est actio non in se, sed tantum respectu facultatis nostræ; adeoque difficilis est actio, quo robur nostrum minus est, & quo major est actio edenda, majoresque resistentiæ superandæ sunt.

181. Difficultas respirationis est in ratione composita, 1. sensibilitatis animæ, ratione cuius molestia majori vel minori afficitur; 2. infirmitatis suæ facultatis motoricis; 3. magnitudinis, respirationis, seu quantitatis aeris respirandi; 4. resistentiæ solito majoris superandæ.

182. Quo major est sensibilitas, eo magis anxii & inquieti sumus in conatibus edendis ad superandas oblatas resistentias, eo vividius molestia afficimur, & contra torpidi, deliri, somnolenti minus molestantur, minus difficultates oblatas percipiunt. (*Proph.* XXVIII.) Qui ni-

mis sensibiles sunt, vividius præcipitantur, & inconstanter agunt, sicque conatibus variis interruptis, aut mutatis operose nihil agunt, citiusque debilitantur; unde in morbis mente constare bonum ex *Hippocrate*.

183. Quo facultas motorix debilior est, eo maior est difficultas; quia cum nulla actio possit edi nisi per vires huic proportionales, & infirma facultas non possit exercere vires solito majores, quin vita periclitetur (nam vita a determinata virium quantitate pender); cum itaque adedendas actiones necessarias consule sentiamus vires non suppetere, molestia afficimur eo graviore quo nos infirmiores cognoscimus.

184. Quantitas aeris inspirandi eo magis necessaria nobis est ad vitam; quo infarctus & fervor pulmonum major est, nam tanto major est periculum suffocationis & herentis sanguinis lethiferæ; verum quo major est infarctus, eo ad eandem aeris copiam hauriendam majores vires sunt impendendæ, & ad majorem copiam iterum major virium impensa requiritur, (93) ex qua metus mortis impendit. Maxima ergo utrinque molestia.

185. Demum quo resistentiæ majores sunt superandæ, eo major pars virium frustra impenditur ratione effectus cupiti: nam resistentiæ non superare cupimus, nisi ut major effectus utilis, scilicet aeris quantitas, obtineatur: aut illa obtinetur tantum excessu virium impensarum ad pectus movendum, supra vires resistentiæ æquilibrandis adhibitis; ergo minor effectus obtinetur ab iidem virium impensis, quod imperfectionis est nota; hanc itaque imperfectionem dum percipimus, molestia afficimur.

186. Ex hæcenus dictis non difficile erit explanatio sententiarum, quas *divus Senex in Cæciliæ de respirandi difficultate*, c. 9. protulit: „Respiratio frequens & parva inflammatio-  
nem, & laborem significat partium spirabilium; at vero magna & rara delirium aut  
spasmus (171. 174.) Frigidus anhelitus est  
lethalis: tum magnus foras efflatus, intro  
parvus, & contra, foras parvus, intro ma-  
gnus, pessimus est, sane & mortis propin-  
quus, ut in *Heriote Agones*. Quinetiam tar-  
da, velox, obscura, duplex intro revoca-  
tio; qualis cernitur in iis qui super inspi-  
rant, id est: respiratio in acutis inæqua-  
lis, tarda in inspirando, velox in expirando,  
obscura, seu inconspicua, revocata duplex si-  
ve singulosa. Spiratio autem libera in omni-  
bus quæ cum febre acuta sunt, & in iis etiam, quæ quadraginta diebus judicantur, præ-  
clare ad salutem apparet, & facit.

## CLASSIS QUINTA.

## ANHELATIONES.

*Morbi dyspnœici, Effusio.*

**ANHELITIS**, ut vocat *Etmullerus*, vel *anhelatio*, ut loqui amat *Plinius*; est frequens & difficilis respiratio, seu agitatio pectoris pluries intra datum tempus reperita. Sic anhelant qui velociter scalas ascendunt, aut qui currunt, ita ut cum sani & quiescentes in minuto inspirant, si concurrerimus velocius, quadragesies eodem tempore respiratio iteretur.

Respiratio anhelosa est necessario difficilis, seu laboriosa; quippe cum vires motrices solent majores requirant, adeoque absumant, animaque a virium motricium impensa solito maiori metuat debilitatem, si paulo diutius perseveret, seu si coacta sit, hinc molestiam percipit: molestia autem percipit a resistentis motui cupido oppositis, aut a percepta necessitate motus, cui exsequendo vires non sufficiunt, vocatur *difficultas motus*; ergo anhelosa respiratio quæ a libertate non excitatur, simul difficilis est.

Difficultas respirandi crescit in majori ratione quam frequentia; sic si respiratio duplo, triplove frequentior evadat, difficultas major evadit, quam dupla vel tripla, quippe difficultas crescit ut virium impensa, si cætera sint paria; sed virium impensa crescit ut quadrupla velocitatis motus; cum itaque frequentior duplo non possit esse respiratio sub pari altitudine, quia motus velocitas sit dupla, seu quinque musculi respiratorii intra idem tempus bisidem spatium se contrahendo percurrant, omnino necessarium est ut vires impensè quadruplo majores sint; & cum respiratio sub pari altitudine triplo frequentior est, vires novies majores impendi necessarium est, quod summam secum imponat difficultatem.

Difficultas sub pari virium impensa eo major est, quo anima vel propriè debilitatis, vel periculi imminentiæ sive realis, sive imaginariæ, magis est conscia; nam cum difficultas sit molesta, & anima eo magis molestiam sentiat, quo magis propriè debilitatis, & simul agendi necessitatis est conscia, necnon quo magis est meticulosa, evidens est respirandi difficultatem ex hisce principiis intendi debere: ex hoc ultimo principio potissimum pendet dyspnœa hysterica & hypochondriaca, seu quam animi pathemata excitant ex levi ortha in organis respiratoriis resistentia; sic si somnium nos a corpore quodam, aut seculo, aut cæcæ demone opprimi, ut ephialticis accidit, inde exurgit difficultas respirandi maxima, quæ tamen evanesceat statim atque somnium illud discedat, cum difficultas a solo metu procedat.

Respiratio *velox* dicitur ea in qua magnum spatium in pectoris vel dilatazione, vel co-

strictione intra datum tempus percurritur, aut cum intra minus temporis intervallum major est pectoris dilatacio & contractio; illa vero tanto majorem virium impensam exigit, quo maius spatium percurritur, & quo minus temporis intervallum adhibetur, ejusque proinde difficultas crescit ut velocitatis quadratum.

Si itaque respiratio crescat quoad frequentiam, seu numerum respirationum in dato tempore, & simul quoad velocitatem angustis inspirationis vel expirationis, maximopere crescit virium impensa, proindeque difficultas; quæ quidem scrupulose attendenda sunt, ut intelligamus angorem, & miserissimam asthmaticorum molestiam, cum vel minimum, vel velocitatem, vel frequentiam jam nimiam magnam cogunt intendere, ut cum fiores ocluduntur, aut ignis accenditur, vel pectus stragulo ponderosiori cooperitur, aut pectoris cavitas sibi incommode vel minimum angustatur, illi non minus discruciantur metu, ac si animam illico exhalare se perciperent.

Asthmaticus in paroxysmo ita metu ne respirationem intendere cogatur, ut alta voce loqui non audeat, sed loqui coactus voces per anhelitas suos tantum exprimat, ac morulis interpolet; quippe ad tonos vocis exprimendos necessarium est velocitatem majorem aëri, adeoque organis respiratoriis imprimere, & ut presceloquamur, velocius respirandum est quam ut interpositis morulis verba proferamus: rauca est ejus vox, ob laxatum chordarum vocalium tonum; ideo autem laxantur chordæ vocales, ut glottis sit magis patula, adeoque ut respirari possit aer facilius, non adaucta ejus velocitate; quæ certe adaugeri non potest, quin vis muscularum respirantium augeatur, inde vox quidem tantum gravis est; sed in hac laxitate simul rauca evadit, quia negligenter laxatæ chordæ vocales uniformem tonum obtinere vix possunt, cujus defectu dissonant; vox autem gravis & dissonans rauca est.

Asthmatici expirare, nares emungere, deglutire metuant; quippe ad hos motus edendos necessarium est respirationem intendere; verum jam nimis est intentia præ robore superstitie potentie motricis, & si ultra augeatur virium dispendium, metus est ne facultas exhauriatur, proindeque nemors accedat, unde non nisi coacti ab alia necessitate, & ut majus malum fugiant, cauteque simul expuunt, nares emungunt, cibos deglutunt.

Si intra tracheam cadaveris aqua immittatur quantum pulmones capere possunt, mirum certe est quot aquæ urci infundantur antequam aqua regurgitet; verum pro diverso corporis situ major est, vel minor illa copia; nam sedenti cadaveri multo minor ingurgitari potest copia, quam stanti, quia sedenti

diaphragma multo minus deorsum delabitur; si exenterato abdomine & stante cadavere aqua repletur thorax, videbimus diaphragma, cujus positura erat antea in linea ambus mammarum papillas jungenti, non solum ad epigastrium, & ad costarum ultimarum finem diffendi, verum etiam ejus ambo latera, veluti magnas nates hemisphaericas, sensim deorsum protrudi, ita ut ultra umbilicum delabantur; si vero saniculo constringatur tunc trachea, & horizontalis situm cadaveri conciliemus, minus quidem deorsum protuberabit diaphragma; sed trachea multo magis erit distensa, adeoque iustus compressa.

Ex hoc experimento sequitur multo majorem esse pectoris ampliationem, quae sit a diaphragmatis descensu, quam quae a costarum diductione dependet, adeoque multo magis sublevari dyspnoicos a diaphragmatis libera depressione, quam ab alia causa; inde necessitas positurae corporis, vel saltem pectoris verticalis; quippe in situ verticali viscera abdominis deorsum proprio pondere delabuntur quantum fieri potest, & simul arcus abdominis, quantum maxime fieri potest, extrorsum eminet; hinc tanto majus diaphragmatis descensus spatium conceditur, hinc partim sit ut miser asthmaticus in lecto residere nequeat, & per multos dies, immo menses, erecto saltem trunco dormire cogatur, atque quandiu facultas constet, ut initio accessus, ster, & lecto exiliat, & usquequo robore deficiente jacere necessum sit, a decubitu ablineat, atque decumbens situm verticalem trunci sustineat.

In illo situ pulmones suspensi non magis premuntur ab uno latere quam ab altero per suum pondus, adeoque liberius ab aere expanduntur, seu plus aeris recipiunt; si vero aeger pectus inclinet, illico unus pulmonis lobus proprio pondere alterum aggravat, unde difficultas respirandi major; at omnium maxima est difficultas si pectus resupinetur, quia in illo situ horizontali supino, non solum proprio pondere pulmo versus dorsum gravatur, verum, quod majus est incommodum, abdominis pondus diaphragmati incumbit, visceribus hac illac proprio pondere distluentibus & diaphragma accellere potissimum prementibus: in illo scilicet situ diaphragma est planum inclinatum, cui pars ponderis incumbit.

Ex his intelligitur quare asthmatici somno victi, adeoque aliquo tempore inclinare coacti, antrosum inclinent, & in castris dormientes coram tabula, vel fulcro, caput antrosum supra illud sulcrum reponant; in hoc etenim situ non solum proprio pondere abdomen deorsum labitur, sed etiam pulmones suo pondere diaphragma deprimunt; adeoque, quantum fieri potest, maximum, sustentato corpore, conceditur pulmōni spatium; circa quod observare est naturam, a nullo Doctore instructam, indicationibus invicem pugnantibus, qualis est necessitas decumbendi ad somnum, & simul stan-

di ad respirandum, solertissime consulere, ita ut mechanices & anatomice petitisissimas nunquam commodiorem pro utroque scopo posituram a priori excogitare potuisset: sic & faber lignarius, licet ignoret quae de centro percussione detexere nuper Mathematici, in eo manubrii puncto a sciam manu corripit, quo manus maximum cum minimo incommodo istam incutere valet, solus naturae ductu directus, seu experientia confusa percepta, veluti manu ductus: sic canis qui fores aperire conatur, non juxta cardines eas pedibus & trunco apprimit, sed longe e cardinibus ubi vehe longiores, utens, opus suum felicius & facilius absolvit, quasi mechanicam edocuisse fuisset.

Ex dictis iterum patet, cur asthmaticus quietem pro viribus servet, & a motu ablineat, etiam vigilans, cum enim ambulare, aut se e loco movere vix possit, quia sanguis ex muscularum contractis expressus velocius ad cordis ventriculum dextrum, indeque in pulmones affluit, & quin illico celeriori influxu, vasa pulmonis distendat, aerique spatium paululum eripiat, simulque quin virium suarum novam partem impendat, ille novi & frigidi, copiosiusque aeris avidissimus, & virium suarum parcimonie studiosus, a motu minus necessario abstinere debet.

Quanta sit asthmatica, dyspnoeicis in genere aeris novi & copiosi inspirandi cupiditas, in theoria hujusce clasis fuisse exposuimus; illa autem aviditas aeris procedit ex perceptione confusa necessitatis ejus ad vitalem facultatem sustinendam, adeoque ex metu debilitatis cordis, quae in his circumstantiis imminet: hoc patet ex pulsu parvo, saepe intermittente, extremorumque frigore, quae in asthmatis accessu, si aliquandiu perseveret, & fortior sit, observantur; interea dum pulsus cordis frequentia omnino delituitur, & respiratio crebra & sublimis est. Novi quidem scolasticos hanc pulsum debilitatem repetere, ex eo quod sanguis parce ex pulmonibus in cordis ventriculum influit; verum minime illis attencior, dum existimant hunc parciorem sanguinis in cor influxum pendere a valorum sanguiferorum pulmonis angustia, quae si adesset, febrem, & peripneumoniam exciteret, non vero asthmaticum accessum; illa cordis debilitas ex eo dependet, quod natura vires in pulmonibus agitandis impendens parcius cordi movendo incumbat, & tantum exigua quae ad vitam sustinendam visufficit; si enim plus virium cordi impertiret quam ad vitam qualemcumque sustinendam opus est, cum facultas jam sit exhausta, ea ad pulmones excitandos non sufficeret, adeoque mors in promptu esset, cum eatenus sanguis per pulmones circulari possit quatenus sustineatur respiratio, atque ad eam in casu asthmatis sustinendam multum virium impendi necessum sit; non secus autem accu vasa sanguifera obstruuntur, natura cordis vires intendit, & vires avertit inutiles ab artibus, ut urgentiori necessitati occurrat: ita cum infardis bronchiis respiratio difficilis.

illis evadit, cum ea sit ad vitam necessaria, natura non solum motus artuum inutiles supprime, sed etiam motus cordis fortiores de- trahit, & exiguis contenta fere quidvis su- perest virum obicibus bronchiorum removendis impedit, ita ut asthma sit febris, si fas sit ita loqui pulmonum, ut febris est velut asthma cordis.

Quod autem natura hosce motus dirigat & excoquatur, illud evincitur ex effectibus narco- ticorum; & ex observatione asthmatici hysteri- ci. Asthmatici, ut docet *Wegnerus*, & experien- tia confirmat, tuta & prudenti narcoticorum dosi mire sublevantur, ita ut qui prius veloci- ter & frequenter anhelat, jam sopitus respiret lente & raro ut in sanitate, quia sensatione omni sopita, natura minus percipit necessi- tatem accelerandi respirations, & opus suum remittit: & contra vero hysterica vigilans, & ad minimum stimulum in pulmonibus expave- scens, a levi fumo, vel odore gravi, illico pec- us suam exagitat, ut hunc levem stimulum, obicem eliminat, & tanto impetu respirat, ut praefocari videatur; quod iam pendet ab a- nima, ut solum animae pathema insultum il- lum excitet. Sic observante *Helmontio* mulieres hystericae ex contumelia, vel jurgio saepe asth- maticum accessum incurrunt, proindeque sine ma- teriali principio, & pituita viscosa pulmones insariente, quam *Humoristae* Scholastici in om- ni asthmatico praefixisse supponunt; licet, observante *Helmontio*, *Anglio*, *Wegnero*, aliisque, in asthmaticorum, ut epilepticorum cadavere, nulla quandoque organorum, aut humorum la- bes reperiri possit, & hic uterque morbus in motu vitioso solum saepe consistit.

Fuse explicimus in theoria huiusce classis quid naturam sollicitet ad respirationem in su- facibus anhelantibus magnam & velocem, in diuturnis vero frequentem & parvam instituen- dam: majori scilicet virum parcimonie consul- ti, com facultas est imminuta, vires vero li- beralius expandit eum integra est; & simul quantum fieri potest, & opus est, aeris novis frigidiusculi, seu elastici copiam inspiratorem suppeditat; ea autem aeris frigidiusculi quan- titas tanto major esse debet, quomajor est pul- monum calor, & iterati debet eo saepius inspi- ratio, quo singulis vicibus minus aeris, aut minus elastici, excipitur.

Sive aeris spiritalis elastice cum sanguine mi- scendae sit, ut parat *Borellus*; sive fluidum ele- ctricum in aere elastico copiosum, & fluidi ner- vei veluti pabulum sit per pulmones haurien- dum, quod verosimile est; sive dergum ope aeris pulmones debite expandentis promovendus sit in cordis dexterae ventriculum, & sic con- servandus sanguinis circuitus; natura respira- tionis pro necessitate augende, vel iterandae est avidissima, quasi sensu quodam confuso ejus necessitatem perciperet, ut persuasissimum sum, & *Galenus* fuse docuit: cum nemo sit qui sta- tim ab ortu & millies in vita non sit expertus

quod a retardata, suppressa, immoluita respi- ratione in praecordiis nascatur mollitia, quae ab obice ultra pauca secunda perseverante cres- cit, & brevi tempore intolerabilis evadit, ut experiri quisque potest in animali, cui respi- ratio ultra aliquot temporis secunda praecledi- ditur: illud enim totis viribus ad hunc obicem removendum insurgit, quod certe machina in- animis nunquam faceret, & nullus mechanicus vel leviter gnarus onquam ex legibus motus sine principio sentiente & movente intelligit.

Abut ut quis judicet me in morbis contan- tibus, animae tantum conatus, & impetus, ex- ceptis morbis histericis, & similibusve leucatu- rum esse: quippe illi conatus naturae fere sem- per principium materiale & labem in organis, fluidisve supponunt, cujus occasione illi exci- tantur; verum non inde sequitur, ut Mecha- nistae contendunt, nullam hebeudam esse prin- cipii sentientis & moventis rationem, & tan- tummodo de restituendo fluidorum & solidorum statu cogitandum esse, cum ne quidem ileu- tismus scopus attingi queat sine principii sen- tientis & moventis concursu; natura siquidem prima, saepe sola, sed artis etiam auxilio ad- juta morbis medetur; ut febris est opus natu- rae materies morbificae & viis circulationis re- movere, easque corrigere conatur, ita & an- helatio est conatus ejusdem principii vitalis ob- icem respirationi & aeris susceptioni oppositos abigere fatigantis; nihil perniciosius est quam si febris deit ubi ob sarcinam materiae morbi- ficæ eliminandam per sudores & perspirationem requiritur, ut in pestilentialibus & graevioribus morbis; ita nihil est sanctius, quam ap- paret seu quies organorum respirationis, ubi circulatio sanguinis languet in pulmonibus & vivifici aeris inspiratio est necessaria; unde pro inaudito habetur apud omnes si oger apu- cia affectus & inde in syncopem lapsus, ac pro mortuo habitus quandoque revivixerit, quippe vix centesimus letham effugit, quia respiratio ad vitam ut signum; ita uti concausa, omni- no natis animalibus non amphibis est ne- cessaria.

Verumtamen observandum est respirationem aliqualem supere posse, quae tamen in sensus Medici non incurrat, ut jam dudum *Pitcairnius* ostendit; quippe cognoscimus respirationem po- tissimum ex spatio quo pectus dilatatur vel con- stringitur intra breve tempus; illud vero spa- tium est ad volumen aeris haulti in ratione subtriplicata, ita ut si spatium illud crescat duplo, triplo, octies, vigiesies saepies crescat volumen aeris aucti; ergo potest illud volumen crescere aut decrecere quam maxime, vel sal- tem sufficienter interezdum spatium, quod est iodex respirationis, ita exiguum est, ut in sen- sus non incurrat; praeterea sicuti mortui indi- cis in acu horarum horologii non percipimus, quia iotra longum tempus exiguum spatium percurrunt, ita si tardior fiat inspiratio, vel expiratio quaelibet, licet neque ampla ac in

statu sano, illa dum fit, nullatenus a nobis percipitur.

Contempletur hominem qui libere prius & expedite pectus suum amplius & confringens subito cessare vel catalepsi corripitur; illico ob nimiam animæ alio attendens diversionem, ita retardatur pulsus, & respiratio, ut vix pulsus, nullatenus vero respiratorius motus percipi possit: nec mirum perfillere vram cum respiratio tam exigua, quippe sanguis in illis casibus, veluti frigidus & coagulatus, lentissime circulator, adeoque frigeret in pulmone; cum autem sanguis frigeret in pulmone, vix ulla respiratio indiget animal; sic qui summum frigus in aquis immergi experiantur respiratio omnino desistit, possunt tamen aliquandiu vivere; & qua portione calor, & sanguinis velocitas restituuntur, eadem crescit necessitas velociter & frequenter inspirandi, ut clamantibus, currentibus accidit.

Hinc fit ut asthmatici a refrigerantibus juvantur, a calidis vero lædantur, ut expertus docet *Flegerus*; quæcumque enim calorem sanguini, eive velocitatem novam conciliant, ea pari passu novi aeris, ejusque copiosioris inspirandi necessitatem imponunt; sed difficillimum est inspirationem ultra certos limites accelerare aut adaugere, ut vidimus in theoria hujusce classis, seu magna virium impensâ ad hoc requiritur, ergo & periculum exhauriendæ facultatis, seu morris obviandæ imminet; quod patura mirum in modum horret & avertatur, hinc molestia & angor incredibilis. Interca tamen refrigerantia quæ sanguinem inspillunt, asthmaticis noxia sunt, quippe, si hinc juvent, aliunde nocent, moram sanguinis circulo inficiunt, cruorem inspissant; adeoque huic duplici scopo satis est faciendum, scilicet ut fervor sanguinis contemperetur, qui augeat dispersionem, ut accidit in febrilibus & phlegmatis omnibus acutis, & ut simul fluxilitas eius conservetur, vel augeatur, quod propria experientia docuit *Flegerus*.

Errant itaque illi in thesauris asthmatis quædam falsa theoria dæi nihil aliud existimant sibi agendum esse quam ut pulmonatum valorum laxitatem tonicis augeant, & ut viscosa phlegmata calidis & incidentibus resolvantur; cum e contra sæpius robur citi facultati & solidis detrahendum, & fervor sanguinis compescendus, & impetus quandoque fluidi nervi narcoticis refrænuandus; felices sunt ægri quod natura eos sapientius sæpe dirigat quam Medici falsa theoria imbuti; & etenim illi Medici felices sortiuntur eventus quateus empirici sunt in praxi, suæque theoriæ vel immemores, vel iterato errore eam ad proximam incedunt, ut qui non regulæ parietem, sed parietis regulam accommodat; cum tamen regula parietis constructionem dirigere deberet.

Theoria vera ea est quæ ex observatione repetita, accurata & solido inderatiocination tanquam corollarium deducitur, ut norunt mathe-

matici, qui theoriæ Astronomiæ, hydraulices, mechanices callent, & continuis observationibus scrupulose emendant; falsa vero est quæ non consultâ experientia nec adhibito rigoroso ratiocinio excogitatur, quales erant in physicis ferme omnes theoriæ Cartesianæ, in scholis Medicis exceptæ; paucillimorum morborum theoriæ veram possident, & tamen omnes morbos explicare temere præsumimus, ne coram ægris & lemidochis hæreæ aut ignorantiam nostram fateri cogamur; quanto dignius foret probò vero erroneum idem, ignorantiamque profiteri, ut de asthmate agens proficiebatur *Helmontius*: *Agnosco, ait ille, me larvas & palli morbis occidisse, sanasse neminem, delusisse vero quæque se me ignorantiâ confisi sunt, & impense dominatus sum, quod scilicet sanctorumque ingeniorum acumiâ falsissimum persuasissimum nostrum valedicere potuissent.*

Theoria Antiquorum, ut *Galenus*, *Sennertus*, *Risnerus*, in hac morbis multis simplicior & solidior, seu mechanices principiis magis erat consona quam Noværicorum; illi quippe ubi motus pectoris citatioris & vehementioris cercebant, ætiamque expellendorum, aeris frigidi inspiratione levare percipiebant, naturam in his morbis hocce conatus nobiliori, & in bonos fines diligere intelliebant. *Galenus* tria in respiratione considerabat, facultatem scilicet intrinsecam, quam a voluntate animæ non distinguebat, ita tamen ut eam a necessitate cogi putaret; deinde utilitatem seu necessitatem respirandi ad vitam; tertio demum instrumentorum seu organorum *dispositionem*.

Omnis motus, ait ipse, sic a facilitate animali, velox autem motus supponit eam facultatem integram, robustam, quæ ad agendum excitatur a perfecta utilitate, modo tamen instrumentorum dispositio non repugnaverit; si vero urgeat utilitas velociter respirandi, tunc si facultas paulo debilior fuerit, ea non magnitudine, sed in frequentia augeat respirationem, maxime si doleant organa, quia votum suum explet facultas per densam respirationem, nec tamen dolores citâ intendit ac per magnam intendere, & quod deficit ex respirationis magnitudine, numero respirationum adducto compensat. Vide ejus doctrinam libro *de dyspnœa & de pulsibus*, ubi clarissime explicat cur in dolore pectoris respiratio sit frequens & parva, in delirio & vacillatione mentis rara, & magna ac inordinata. *Flegerus* verum cum per viginti annos asthmatis sui curandi prævia consulisset tum Neotericos omnes tum Veteres, demum illorum præxi adherendum sibi esse censuit, tentatis prius singulis; quod offendit Medicinæ reformationem a Cartesianis in initium in theoria tum in praxi, artem illam potius retardasse, quam promovisse, quoad multos morbos.

Qui morborum classes a sede anatomica repetunt, morbos hujusce classis fere omnes pulmonibus tribuunt, ut asthina, dyspnœam &c. verum

verum sola theoria vera potest præcipuam morborum sedem assignare; & licet symptomata in morbis ejusdem generis conveniant, non certum est species ejusdem generis eandem sedem obtinere, quod exemplo asthmatis apparet; cum enim asthma humidum facile omnes pulmonum vitio, tanquam sedi principii morbifici, adscribant, asthma tamen spasmodicum, hystericumque musculis ipsius thoracis convulsis & irritatis tribuere non dubitant plerumque, ut *Vallisius*, asthma stomachicum ipsi stomacho, ut asthma nocturnum seu phialtem cerebro alii tribuunt; pluries etiam accidit ut pro asthma pulmonari habiti sint morbi quorundam principium post causa veris sectionem vel in cavo thoracis, vel in mediastino, vel in structura ipsius pectoralis cavæ adeoque extra pulmones inventum est; nihil itaque difficius est quam sedem morborum ante cadaveris sectionem determinare; ergo valde temerarium est morbos a sede conguessendo prætere.

Qui nam in dyspnoia notius frequens est, vel velex respiratio seu musculorum pectoris contractio, eaque involuntaria seu coacta, evidens est eatenus eos morbos ab spasmodicis discrepare, quatenus organa respirationis, non vero organa motus localis actum, afficiuntur; itaque illi morbia convulsivis non essentialiter discrepant; ergo indicatio classis eadem est, scilicet conatus naturæ, si effraenes sint, & inutiliter, ut accidit in anhelationibus hystericeis a pathemate animæ oriundis, illi compescendi narcoticis, si auxilia moralia & expectatio in his valde necessaria non succederint; si vero illi motus languant, utilesque cessantur ad corrigendam vel eliminandam materiem morbosicam, excitandi sunt & sustinendi per auxilia dietetica, & pharmaceutica; si vero inertes sint, ut cum a gibbositate, aut prava pectoris conformatione dependent, illi conatus sunt enollentibus, laxantibus, anodynis compescendi, maxime vero si effraenes simul & noxii sint, in quo casu phlebotomia, diæta tenuis & narcotica conveniunt; aut si moderati sicut & utiles, tunc juvandi sunt, in quo casu porus diluens, medicamentum materiem morbosicam concretam resolvens, viscosam diluens, potissimum bechica, tum incidentia, tum lenientia, conducunt.

## ORDO PRIMUS.

## ANHELATIONES SPASMODICÆ,

*Passiones spiritalium partium* Gordoni; *expirations vitia* Emulleri; Gallice *Souffles convulsifs*, *Leçons de l'Expiration & Effoufflement convulsifs*.

Sunt morbi seu potius symptomata minoris momenti, fugacia, sed repetita, quorum maxima pars consistit in sonoris & spasmodicis expirationibus; solus enim singulus sonitus edit inter inspirandum. Ambigunt illi morbi inter

spasmodicos & anhelosos morbos, atque plerumque, ut cussis, oscedo, stertor, stertuatio, alios morbos comitantur, nec proinde sunt symptomata horum præcipua.

Theoriam hujusce classis Hippocraticam & vere mechanicam tradidit *Daresius* in annotatione ad *Hollærium de Asthmate & de tussi*, quæ Neotericorum ætiologiam longe antecellit, & simplicissima est.

I. EPHIALTES, *Cochlear*.

Sic dicitur ab *epi* & *altemai* supra insilio, quia æger somniat quoddam animal supra seum pedes insilire.

Potius *Epithymia* & *Themisone* vocatur a suffocatione comitante, item & *Puigamon*, ut ab *Aureliano* *Epithymia* quasi jactum deluper; sunt enim qui se suffocari somniant a superius pedo pondere; a *Dioscoride* *Quodcumque apoplethia* *Plinio* *Ludibria Fænas*; quod cum Faunis tribuebant Romani, notitates quibusdam maleficis noctu vagantibus æstibus tribuunt, ut Antiqui demonibus lascivis, *Incubis*, succubisve adscriperunt, unde *Incubus* & *Jucubus* etiam hic morbus vocatur, Gallice *Incube*, *Lugduni* *Chaucheville*, aliis ut *Galieno*, *Epilepsia nocturna*, *Asthma nocturnum*, &c.

Genuus est morbi periodici, noctu vel dormientes afflicti, cujus præcipua symptomata sunt summa anhelatio con insomnio corporis cujusdam pedes comprimentis.

Illius morbi insultus potissimum aggreditur eos qui supini dormiunt, respiratione querula, gemebunda, anxia sese manifestat, & statim atque æger et somno excitatus est, somnium & morbus evanescent.

Anima, ait *Hippocrates*, dum homo somno indulget, vigilat & cuncta corporis munia obit; hoc apparet in ephialte; quippe non scens ac anima inter dormiendum admonita de seminis acrimonia in vesiculis hanc sensationem versans conjungit cum ipsis sociis sese eam sensationem concominari affluctis, nec non consequenter libidinem exple cupiens mentulam erigit & actum venereum exsequitur, ita statim atque est in organis respirationis quidam obex, quo respirationi resistitur, facile delinquit phantasia & conjungit cum hac sensatione ideam vel cacodemis insilientis, vel felis aut canis pedes opprimentis, aut maleficæ vetulæ strangulantis, unde excruciatu metu, somnians, sese exagitat, sudat, ejulat, quantum somnus gravis permittit, quo somno excussu errorem suum agnoscat ephialticus & convalescit.

In hoc casu obex pectoris motui oppositus determinat somnium, aut certum est a somno quandoque prævio determinari suffocationem; & memini me pluries somniasse, dum junior eram, selem lectulum meum conscendere, nec ullatenus me suffocari, aut postquam imaginatus forem illam selem a pedibus ad pedes meum insilire; adeoque ab illo somnio determinabatur ea suffocatio, non a suffoca-

locatione somnium, ut vulgo putatur; atque ex hac observatione sequitur imaginationem sine ullo vitio corporeo, in pectore sufficere ad gravissimam dyspnoeam inducendam cum febre, sudore, angore, multo majoribus quam si causa, quam imaginamur, reapse in nos ageret.

Illud etiam notatu dignum quod illis, qui nos suspensos diu detinent, & simul valde attentos per ambages sermonis quemdam gravem casum prænuntiantis, exprobrare consuevimus quod nobis ephialtes excitent, quia scilicet attentio animæ gravior ita respirationem in nobis cohibere aliquandiu, ut deinde anhelo & anxie respiciamus, cum pectus & attentionem laxemus.

1. *Ephialtes plethorica* Craanen; P.

Ea est quæ a plethora commota, calore lectuli, stragulorum pondere, austro potissimum flante, supine dormientibus accidit, maxime si a victu lautiori, & simul sanguifluxum suppressione, plethora intendatur; nihil enim est facilius quam quod sub illis circumstantiis sanguine cerebrum impotente excitentur somnia quæ in aliis panophobiam, in illis libidinofam gonorrhoeam, in istis ephialtem inducunt, maxime si propter debilitatem præviā pulmonum sanguis in illis stagnet.

Ea species phlebotomia, victu parciori, abstinentia a cœna, decubitu laterali, capite magis erecto prævertitur.

2. *Ephialtes stomachica* Riverii. *Epilepsia nocturna* pluribus; P.

Ea est quam pondus ventriculi, alimentis nondum digestis turgidi, diaphragmati incumbens, cerebrum simul per chylum crassum, copiosum, quo sanguis inspissatur infarctio, determinat; qui excitantur ab excessu ciborum linguam habent sordidam, ructus, nauseas, capitis gravitatem: illa accidit crapulosis qui statim a passu cubitum eunt, maxime si capite horizontali, truncoque resupino jacent; hic affectus pueris est magis familiaris quam adultis; potissimum vero voraces infestatur, quoad vero obiectum somnii, illud variat promoribus ægri, si quis enim ab ancillis exceperit fabulas quas de pravis genitibus, lemuriis & similibus narrare vetulæ, is a similibus monstris se opprimi, conculcari, aut libidinem expleri somniabit; qui de felicibus, fimiis, aliisque malignis animalibus simile metuebant in vigilia, ab hisce impeti se somniaturi sunt.

Cura exigit emeticum, catharticum, vinum parcum, abstinentiam a cœna, vino, carnis leporinis, liquoribus spirituosis; & si langueat vis coëtris stomachi, stomachica amara, kinina, rheum, aloë optime conducunt.

Illæ species ab ebrietate & voracitate, potissimum a vespertina epula procedens est omnium frequentissima, & pro diverso ægri characterē, variantur in somnia, & sedes symptomatum; Lascivi venereum actum; Militaris a Timore observatus ab hoste strangulari; amicus quidam meus in angustiis scalarum calle a parietibus comprimi, alique alia somniant; affectus

autem fugax est & tantum prophylacticam curam exigit.

3. *Ephialtes ex hydrocephalo* Lottichii observ. lib. 4. observ. 3.] Bonet Sepulchret. T. 1. p. 180. observ. 1. Lorry. de corde cap. 1. C. P.

Post nocturnos terrores, incubique insultus varios, juvenis melancholicus vertiginosus capite & visu debilis obiit, reperit cerebrum quoad venulas nigricans, sanie suffusum, & in sinu mucro surgidum; æger capite semper in latus sinistram inclinabat. Duas alias observationes refert *Benetus* de ephialticis in quorum cerebro sius aqua distensi erant; inde orta opinio sedem ephialtes esse quartum cerebri sinum in quem supino capite serum illud influens morbum inducit; verum rarissimum esse hoc ephialtes principium judico; nihil vulgarius quam serum in sinibus cerebri reperire, si longo post mortem tempore aperitur cadaver, quo longius, eo uberius inveioitur serum. Academicus Oxoniensis, quem memorant, hydrothorace simul laborabat & incubo, in quo casu signa hujus speciei facilius obtineri possunt. Hydrogoga autem, setacea, diuretica conveniunt; *Lorry* vero qui semper in ephialticis hydrocephalum suspiciat a vero procul abesse videtur.

4. *Ephialtes verminosa* Etmulleri de incubo. P. Illa species in ipso ventriculo sedem habet, quatenus insans, in cujus ventriculo vermes repunt, facile somnare potest adesse in epigastrio quidpiam quod ipsum perterrefaciat; terror autem vehemens a simili phantasmate verum ephialtem inducit; suffocantur enim qui subito terrore percussantur.

Indicatio curativa per se patet.

5. *Ephialtes tertianaria* Forelli l. 10. obs. 31. P.

Pavor & symptoma quoddam mirabile partim incubum, partim epilepsiam imitans, tertio quoque vespere recurrens, ab hora nona ad undecimam perseverans. Puellam novennis tertia quaque die febris instat corripiebatur paroxismo, scilicet totius ventris & thoracis constrictione cum respirandi difficultate, oculis manentibus apertis & in uoum locum continuo conversis; manibus quæ fortiter arripiebant, ut facilius respiraret; interrogatis non respondebat; interea mente constare videbatur, vigilabat, multum suspitiosis erat, venter attollebatur cum maxima thoracis angustia, difficili respiratione, anhelitu frequenti, oppressa, loqui non poterat.

6. *Ephialtes Hypochondriaca* Etmulleri. de aeris inspiratione; Vide Schenkium; *Incubus vigilantium* Rhodii centur. 1. observ. 34. P. l.

Familiaris dicitur ephialtes hypochondriacis, melancholicisque, & talem fuisse illum sacrificum, puto, qui minime suum errorem agnoscens, firmiter persuasum habebat se a veritate sibi cognita qualibet nocte adiri, & ad suffocationem usque comprimi. Affinem historiam & hanc ipsam satis curiosam vide apud *Forestem* lib. 10. In illa specie emetica nociva censentur, maxime si hysteria addit, si flatulencia & sicci-



fecitas intestinorum; illi quidem status possunt diaphragma premere, & in cerebro ad delirium prono, apud homines mediculosos, non bene mentis compotes, inducere delirium, quod noctu incipit & in dies extenditur. Illa species antiepileptica curatur, maxime semine pæoniæ, anisi, nec non cinnabari.

Hæc species, non semper tristis menti obicit phantasmata. R. J. Forstæ curavit puellam, quæ a viro minime ipsi ingrato comprimi se somniabat, sed ab hoc imaginatione concubina evigilabat, cum sensu ponderis in pectore, voce, respiratione interceptis, magna anxietate, madore faciei & cæcivis gravitate. Similem in viro casum narrat Cæcæna; de se ipsis Hænnius, Forstæ, &c.

Silvianus quidam narrat plurimos ex ista passione, veluti lue contagiosa, Romæ quondam fuisse cōfectos, ut refert Cælius Aurelianus de incubone quem inter tardas passiones recenset; hæc autem species non satis certa est.

## II. STERNUTATIO. Sternutment.

Violenta, sonora, & subitanea exspiratio in nares posticas immisso aere, quo nares everrunt, cum convulsa capitis & trunci concussione, Sternutamentum est, cuius interventu natura quidquid membranam pituitariam molestat excutere, & cum mucō narium eliminare contendit; sternutamentorum vero, tum intensitate, tum frequentia incommodum, series morbum constituit, Sternutationis nomine designatur.

Sternutatio plures varietates admittit.

1. Sternutatio catarrhalis, seu a cohibita interna narium perspiratione, ut a frigore. 2. Sternutatio rubefacta a pustulis morbillosis intra nares germinantibus. 3. Sternutatio a pruritis violentis, ut a succo elareri, quem rustici quandoque insausse attrahunt narium ad auriginem sanandam; unde visum est ad mortem usque cum hæmorrhagia narium sternutasse; pullulæ quandoque acres, & rodentes intra nares obortæ dirissimam sternutationem prouocant. 4. Sternutatio a vermicibus intra sinus frontales genitis etiam aliquando observatur, cuiusque ipsi vermes, aliæque peregrina foras excutuntur. Datur & 5. Sternutatio spontanea, cuius principium nos in praxi sæpe latet, ut patet exemplis ab Hildano, Amato Lusitano, aliisque relatis. Talis etiam 6. Sternutatio periodica, qualem videre est apud Mangrum in Bibliotheca prætica, apud Ephemerides Nat. Curios. Olim etiam viguit 7. Sternutatio epidemica ita violenta, ut homines & medio sæpius tollerent, unde nos sternutantes salutandis intercepti. 8. Sternutatio critica, seu salutaris, est in febribus malignis, teste Hippocrate & Riverio, acque rebus etiam desperatis salutem promittit. Hystericæ mulieri aut etiam difficulter patienti si sternutatio accidat, bonum ex Hippocrate, attamen quandoque præmaturum sortum excludit, & menorrhagiam, ciet importuna sternutatio, necnon

hæmorrhagiam narium. Sternutatio insulubris est in morbis inflammatoriis pectoris, cujus dolores intendit; raro sternutatio a pruritis excitata soporosis prodest, utcumque usitata sit.

Cura: In omni morbo primo, quantum fieri potest, removendum est principium, deinde naturæ conatus, si efficiens sit, ut in hoc casu, compelescendus est, vel alio divertendus. In sternutatione violentiori phlebotomia appime cōducit; vapor aquæ tepidæ, laetis tepidi inspiratio, lituxer butyro, decocto emollientis inspiratum, ut ex seminibus mucilaginosi, radice alrhææ, in usum vocanda sunt; prodest etiam plumbum usum narium intrusum quod aere absorbet.

Conatus effrænes compefcunt odor opii, narium exceptus, ipsius etiam tinctura narium inspirata, aut dosi sufficiens deglutita; in sternutatione periodica ad kinkinam, karabem, aliæque antispasmodica recurrendum est.

Divertunt vero naturam ab his conatibus vesicatoria alibi applicata, ut fermentum vetus karabe pulverato adiperum nuchæ applicatum, ligaturæ & frictions extremorum, graves nuncios supervenientes, si vero halitus acidi acres ex materie verminosa a primis viis in nares affurgant, antihelminthica conducunt.

## III. OSCEDO; plurimis Oscitatio; Græciæ Chasmodia; Baillement.

Est repetita oscitatio; oscitatio vero est diuturna, lenta, naturalis exspiratio cum magno oris hiatus convulso facta, & sæpius pandiculatione corporis & artuum stipata, quam brevis & ut plurimum sonora exspiratio sequitur.

De oscitatione fusc scripserunt Ill. Comes Buchner anno 1752. Michael Alberti 1737. Frider. VValtzer 1738.

Præcedunt corporis gravitas, lassitudo, pectoris languor, seu inertia, mentis ilupor, tædium, somnolentia; totius corporis torpor, & ignavia, quæ omnia lenta, profunda, diuturna inspiratione, seu oscitatione disentiuntur.

Inter oscitandum, profunda, amplissimaque inspiratione omnes vesiculæ pulmonares multum expanduntur, circulatio per pulmones acceleratur, viscera abdominis præmuntur, oculi ilachrymantur, ubi sit salivæ proventus, auditus gravitas cum aliquali bombo intra caput accedit, tuba Eustachiana diducitur, loquela impeditur, perspiratio uberrima cietur, quadam voluptate anima recreatur, ad functiones corporis & animæ homo expeditior redditur.

Mirum certe quod oscitationem simulantes, & pro lubitu incipientes, interea cum motum in progressu invitum, coactum, verèque convulsivum esse sentiamus; quod qui alios oscitantes cernunt, velint, nolint, insciti, conscii ad oscitandum determinentur: natura itaque sola oscitationem a libertate inchoatam exsequitur; ipsa tamen libertas eam vel paulum retardat, vel forti nixu prævertere aut coercere potest, immo animi pathema superveniens potest

potest eam omnino suppressere; hinc patet quantum motus convulsivi ab animæ facultatibus dependeat.

1. *Oscedo parvus* Roederer. dissert. de oscitatione in enixu 1759. P.

Exitiosum symptomata in parturitione superveniens, Cari funesti prodromus.

2. *Oscedo febrilis*.

Oscitationes repetitæ intermittentium febrium accessus prænuntiant, catarrhales & exanthematicas febres invadere designant. Sternutationem quondam Romæ epidemicam & funestam comitabatur etiam oscedo sæpe lethalis, unde mos accessit eo inter oscitandum signo Crucis communire ex *Polydoro Virgilio*; in morbis hæmorrhagicis oscitatio mercurii, & ut patet ex Canicidiis convulsiones lethiferas præfigit observante Illustr. *Buchnaro* post *Schroderum*. Hic conducat antispasmodica & kinkina.

3. *Oscedo stomachica*. P.

A largo passu somnolentia & oscitatio sæpe succedunt; cardiaci & colici effectus oscitationem sæpe prodromum habent; non pauci sunt tamen qui prius epilepsia & aurexia laborantes ex oscitatione se melius stomacho habere cognoscunt. Veteres oscitationem fieri per distensionem ventriculi & œsophagi a vaporibus credere; mirum quantum sola experientia in errores inducat. *Panlinus* observavit oscitinem & epilepsiam a vermibus stomachi, saburraque verminosa pendentes, & vermiculis sanatis; insensibilis recens nati multum & utiliter oscitant, stomachica, cathartica indicantur in hac specie quæ a vicio stomachi dependet.

4. *Oscedo hysterica*. P.

Paroxysmi hysterici fere semper præcedunt oscitationes repetitæ. *Hochstetterus* & *Riedlinus* memorant casus puellarum, quibus ob suppressa catamenia oscitinis paroxysmi quotidie per longum tempus data hora reperebant, tanta vehementia ut capite dolerent, ægrotarent, & altera mandibula luxaretur; ægrotans tum ob catamenia suppressa, tum ob malaciam & stomachi ægreditinem, tum ob hysterica dispositionem familiaris est oscedo: in hac specie antihysterica, in gravidis phlebotomia præcipua sunt auxilia.

IV. SINGULTUS; *Lygmon* ac *Lyngon* Græcis; *Hiccock* Anglis; *Singhiozzo* Italis; *Gallis le Hoquet*.

Est præceps, repetita, sonora & convulsiva respiratio.

Causa est conatus naturæ per repetitas diaphragmatis depressiones, quæ circa cardiacum molestant, excutere contentendæ; juxta Galenicum conatus facultatis expultricis ventriculi ejus causa est.

Principia sunt quæcumque ventriculæ, ejus potissimum cardiacæ, & œsophagi extremum, ipsum & diaphragma irritant, molestant, impediunt, vel cum rei sine dolore: in quibus etiam tantum

valet consuetudo, ut singultus voluntario excitatus possit deinceps naturalis & coactus evadere: nec major irritatio ad hunc citandum, quam ad pauculationem, aut oscitationem requiritur; & ut gravis nausea ab imaginatione, ita gravis singultus sæpe fovetur aut renovatur, unde patet quam obscura adhucdum sit ejus ætiologia.

1. *Singultus accidentalis*; *Singultus transiens* Frid. Hoffmann Med. Rat. Syll. de singultu; *Hoguet passager*. B. P.

Ille est qui (a) a cibo non satis masticato, avidius iugurgitato, a passu secundo seu in quo non satis bibitur; (b) a potu maxime frigidulo; (c) ab aura frigidiuscula; *Cl. Trallestius* *Opus salubris* & *noxius* &c. de singultu (d) a spiritibus vitrioli olfactione *Hequet* de singultu cap. 15. (e) a fletu *Haller Elem. Physiol. T. 111.* (f) a rictu; (g) a rictu &c. ortum ducit.

Debetur ea species causis levioribus, fugacibus; hæc vel sponte solvitur, vel cohibita aliquandiu respiratione, lenta aquæ uno anhelitu deglutitione, dolore in quadam corporis parte excitato, sternutatio inducitur, terrore ex improvviso incussio, sedula rei aliquid meditatione, ira subito accessit, mota singultuienti admiratione, verecundia &c.

2. *Singultus ab alimentis*; *Hoguet des gloutons*, B. P.

Ille est quem (a) alimenta copiosius assumpta *Frid. Hoffmann. l. c. Gorter Prax. Med. Syst. de Singultu*; (b) acriora *Hoffmann. Tralles, Gorter l. c.* (c) actu frigida *Timæus lib. cap. 5. Riverius de morb. infrequent. Osf. 1.* (d) in oesophago hærentia excitant *Hallerius Schol. de singultu, Taber p. 240.*

Varietatem primam incurrunt homines gulæ dediti, pueri voraciores, infantes lac copiosius exlugentes; accusanda venit esculentorum vel potulentorum quantitas, non qualitas. In varietate altera cibis potusve qualitate peccat, acedine scilicet, nequaquam vero quantitate; vitium tamen utrumque simul combinari posse nullus est qui non videat: singultum ex ceparum, allii, zingiberis esu pronatum observavit *Gastuaria*. Varietatem tertiam faciunt pulvere fructuum horæorum, necnon succi citri, grossulariæ, egestis, aqua diluti, si glaciæ adjecta magis refrigerantes reddantur, aqua frigida &c. quæ eo certius nocent, quo corpus offendant ex causis quibuscumque magis æstuosum, & majori donantur frigiditatis actualis gradu. Et si frigida ventriculo intus applicata singultum levem ac fugacem quandoque tantum excitent, sub aliis tamen circumstantiis exinde gravior ac diuturnus exoritur. Contumax fuit singultus qui a *Timæo*, vehementissimus, plurimistris qui a *Riverio* memoratur. Ita *Hallerius* de varietatibus quatuor casu: Puella assidue singultientis, nihil deglutiebat, dolore facto in œsophago: Anxia pulmonibus bubulis largiter ussa fuerat; huic gravitas in stomacho; nausea; vomitus: Eructulum pulmonis, quem ederat, in œsophago resistere; tandem

CEUNT.

*enervitulis & idoneis remediis rejectum frustrum, siquæ liberata est.*

Varietas prima & altera sæpius curatione vix indigent, malo sponte transeunt, vel natura, quæ sibi oneri sunt, excutiente; si tamen diutius perseverent indicantur in (a) aqua tepida copiose sumpta, vomitus digitis ori immixtis excitatus, clysmata acuta; inspiratio & expiratio vehementes per cursum, saltum, equitationem, vociferationem; derivatio arte producta, tandem leviora cathartica, lenissima emetica; additis cum stimulo aromatico in villos ventriculi agunt, & stomachicorum nomine veniunt: nec non ephemeratibus spirituosus & aromaticis. In (b) vero aqua tepida, decoctum hordei, pitana pulli, serum lactis, oleum amygdalarum dulcium, enemata emollientia, tandem mitissima cathartica; necnon anodyna. In varietate (c) comportunt calidum regimen externum; potus tepidus, aromaticus; balnea calida; vinum; epithemata calefactantia; confectioes opio scææ, ut theriaca, mehidatum, diafcoridium & similia. In varietate (d) cibi frustum œsophago impactum, vel in ventericulum deturbandum, vel vomitu evacuandum: Vide *Fel. Platunum*, & *Authores Chirurgici* (In primis *Mémoires de l'Acad. R. de Chir. Tom. I.*) de variis auxiliis, tum mechanicis, tum physicis, quibus cœtera œsophago hærentia foras educuntur, aut inferius traduntur: Valent etiam hic loci medicamina quæ epigastrio applicata vomitum ciunt. In varietatibus prima & ultima vix locus est anodynus, nisi forte ad motus superfluitas refræmandos, sublatâ materia nihilominus urgentes, aut ad tumultus a vomitorio dato consopios. Anodynum in hisce casibus purgantibus sociat *Erid. Hoffmannus*, quod *Class. Tralles* post evacuationem magis probatur.

### 3. *Singultus a cacochylia.* B. P.

Ille est quem (a) materia viscosa & viscida *Epiph. Ferdinand. H. S. Med. 43. Hoffmann. l. c. & Obs. 5.* (b) acris excitat *Tralles. l. c. Gorter. l. c.* (c) vel suppressa tertiana, & sicut æ periodicus est.

In hac speciem facile transit præcedentis varietas prima & secunda, quæ minori tantum vicii gradu ab ipsâ disceperant. Non unus est singultus hujusce modi, qui saburram in primis viis nidulantem exhibeat: viget hæc in singultu cachectico, in febrili, in verminoso, in flatulento, in eo qui diarrhæam aut dysenteriam maturius cohibuit excipit, &c. Hanc ergo speciem indignant signa saburralia, inortis, vel acrioris biliosæ, acidæ, salis, ex Pathologicis petenda; Febris nulla, cachexiæ, vermium, verba morborum singultus alios cacochylicos aspicantur desolus. Curatione Therapæia adversus varietatem (a) & (b) speciei præcedentis proposita intelligitur.

In tertia varietate periodicus est singultus, qui in modo memoratis erraticus observatur. Febris tertianæ, quæ non expurgatis primis & præmatura corticis exhibitione compref-

sa fuerat, cum successisse vidit *Hoffmannus*, febrique typum servasse, nulla insequente pyrexia. Cacochylia, cui debebatur singultus hic tertianarius, per clysmata & decentem cathartism educta, statim evanuit.

### 4. *Singultus a verminis*, Ramazzini *Confi. Epid. p. 127. Tralles. l. c. p. 103. Gorter. l. c. B. P.*

Vermes in stomacho & intestinis hospitantes, partesque præfatas, lacessentes singultum hujusmodi inducunt ac designant. Vermium primas vias incolement signa passim tradunt *Scipiores Medici*. Therapæia potissimum ex anthelminticis erulur. Cæterum circa hocce remedium genus, & cathartica hic loci etiam proficua habendus est selectus, habito respectu ad symptomatum concurrentium indolem, ægri temperiem, primarum viarum sensum, caloris gradum &c.

### 5. *Singultus a flatibus*, Sennert *Med. Pract. Lib. III. de singultu*, Riverius *de singultu*, *Tralles. l. c. p. 112. B. P.*

Hujusce speciei, quam designat flatulentia, duplex est facies; nunc enim observatur cum mæeria, & tunc de singultu cacochylico multum participat, quo in casu ante omnia evrenda est saburra, quæ status gænnie & singultum concitavit; secundas ferunt sedantia. Nunc vero exalat materia, & spallis primatum viarum constrictionibus rotas debetur tumultus; cum singultu a mobilitate maximam habet asinitatem casus hujusmodi: coratur liomentis exterius, blanda alvi constrictione, cucurbitulis applicatis; pannis calidis, theriaca, opio, ambro, mocho & similibus.

### 6. *Singultus a medicamentis*. A. P.

Medicamenta singultum excitantia sunt (a) vel emetica *Erid. Hoffmann. de singultu*, *Cl. Haller Elem. Physiol. To. III. de singultu* (b) vel cathartica *Hoffmann. l. c. Haller ex Portefaix ibid. p. 18. 19.* (c) vel acris, asperiora, exagitantia, *Baglivi Op. pag. 252. Sydenham T. I. pag. 43.* (d) vel refrigerantia *Schenckius de Singultu Curat. Obs. 2. Huj. Morb. Vratilav. 1700. p. 197.*

Remedia drasticæ, sive vomitoria, sive cathartica, dum primas vias stimulant, rodunt, inflammant, singultui anam præbent. Optima præsidia sunt quæcumque obtundunt, involvunt, demulcent & superficiem ventriculi & intestinorum obliniunt: In hoc censu habentur, pinguis, oleosa, mucilaginosæ, emulsivæ, hæc, serum ipsius ac eremor, pitana ac juscula pulli, vituli, &c. Calstrata remedium prætorum ope drastici vi aut si nihilominus motus effrænes perdurent, vel nimium insurgant, cum ab his grave periculum ægro imminet, anodynus pacandus est tumultus. Monemus tempestive, priusquam scilicet inflammatio locum occupaverit, adhibendum esse medicinam: Cæterum repletioni studendum est, si magnum fluidorum copia drasticum eduxerit. *Vide Singultum ab inanitione.* In febrili nimis ulapiorum refrigeranti usus monen-

monentibus *Lammie*, & *Helvichio*, singulti originem sæpe dedit, vino & carminativis fugando. Antimonium diaphoreticum singulum non semel induxisse testatur *Baglivi*: hunc frequenter turbis ac tumultu ab asperioribus medicamentis in ventriculo locisque vicinis excitato ortum duxisse observavit *Sydenham*; quo in casu frustra fuerunt anethi semen, alique pro speciei decupata; discordium vero larga dosi exhibitum primum rediit pacem.

Ex varietate prima intelligitur singultus, quem facit vomitus violentus & diuturnior, a *C. Tralles*, memoratus, & ex *Hippocratis* effato sæpe ominosus; neque labor est in invenienda hujus curatione, quæ in remediis vomitus prægresso congruis unice sita est.

7. Singultus a venenis. A. P.

Venena non solum (a) deglutita *Mend de Venen*, *Tent. IV. Haller. l. c.* ex *Bruningio*, *Timæus Lib. VII. Cap. 4.* & *J. Barbette Prax. Med. Lib. IV. Cap. 2.* verum etiam (b) vulnere suscepta singulum excitare queunt *Hoffmann. l. c. Sennert. de V. p. & Scorpione*.

Ex cœnanthe succo virolo singulum excitatum fuisse auctor est *Bruningius*; ex cicuta *Mead*; ex oëo vitrioli *Barbette*. Circa curam, quæ ex speciei præcedentis Therapæia debet intelligi, ut alios omittam, legi meretur *Cl. Mead*.

Symptomatum, quæ veneno *Viperæ*, *Scorpionis*, aliorumque animalium cuti immisso inferuntur, cohortem numerosam ingreditur singultus. Curationis huius loci superledimus, quam ex egregio de *Veneris* Auctoris prælaudati tenemus, & ex *nostra de Veneris Gallia Animalibus Dissertatione* peti volumus.

8. Singultus ab inanitione Cl. Tralles l. c. A. P.

Talis est qui oritur (a) a vomitu nimio *Hippocrat. Sect. VII. Aph. 3.* (b) ab alvi fluxu profuso, idem *Sect. V. Aph. 4.* (c) ab hæmorrhagia immodica, idem *Sect. V. Aph. 3. Hoffmann. l. c.* (d) a Venere nimia, *Tralles l. c. &c.*

Genuinam huius speciei indolem Authoribus non bene semper explicari dicat *Cl. Tralles*, quod certe verum est. Vapulat ipsi *Riverius*, quod vim inanitionis in relinquendo post se inæquali influxu lacris nervosi in miculos hauri perpexerit; pæcantanti viri dictum velim ipsum in assignanda convulsionis singultuosæ, quam inanitio facit, theoria non feliciorum.

Convulsio hæc ultimum est naturæ quo se vertat nescire conamen. Ridicula propterea est Veterum theoria, cum putant hanc convulsionem fieri eadem de ratione qua corum exsiccationem retrahitur; inde nervos ab inanitione retrahi se convelli dicunt: omnis convulsio a fluidi nervi in partes influxu violento procedit. Non minus est falsa & hydrodynamicæ legibus repugnans theoria, quæ hanc convulsionem ab inæquali vasorum cerebri pressione deducit.

Affinitatem alius speciei varietates nonnullæ cum speciei sextæ, namque & septimæ varietatibus prioribus, Vomitus nimius sponte vel ar-

te concitatos, diarrhœa, dysenteris, cœliacæ, melæna si profusæ sunt, hæmorrhagia immodica a causis internis & externis, coitus, manu-rupatio sæpius repetita, &c. singulum huiusmodi præcedunt, accerunt, & indignant. Ingenue fateor *Sydenham* se sibi ipsi de huius singultus causâ disquienti satisfacere non potuisse; nihil autem melius putat, quam largam discordii dosim, nempe drachmas duas præscribere; & saterur, se frustra anethi semen, aliaque pro speciei celebrata adhibuisse. Sic in singulu grana duo laudari feliciter præscripsit *Riverius*. Summa arte in cura opus est: primum tollenda causa inanitionem inducens, si adhuc persistet, remediis hinc vomitus, alvi fluxus, hæmorrhagiæ &c. Therapæia speciali petendis; dein adhibenda replentia, quæ sunt analeptica, rescitientia; interjecto opio, quod, si evacuationi sepiemur: vere competat, silentis nomine adhiberi etiam potest, immo excretionem urgente sæpius debet. De hoc singultu vide *Frid. Hoffmannum §. 17. & 7.*

9. Singultus febrilis. A. P.

Febres, quibus jungitur singultus, sunt vel (a) continuæ *Gonraignes de Febr. Cap. 2.* vel (b) exacerbantes *Hoffmann. l. c. & Obs. 6. Gorter l. c. & de Febre typho. vel (c) intermittentes Tralles l. c. Gorter l. c.*

Febres bene multas, tam leviores cum graviores, quarum decursus nulla apyrexia interpolatur, ita comitatur singultus symptomaticus, ut nunc identidem repetat, nunc vero cum ipsis permaneat, & toto decursu simul exacerbetur: singultuosæ vel lyngædes Veteribus febres hædicuntur. Non solum in febribus acutis, quæ putridæ, ardentes, malignæ sunt, de ætiopharum scilicet, hæmorrhæarum, amphimerorum, synochorum genere, verum etiam in iis quæ minus multo discernim involvunt, quales sunt synochi quidam pæres, synochæ, immo & ephemæræ cacochylicæ, observatur hoc symptoma; neque ipso immunes sunt febres intermittentes, in quibus hic etiam extra eadem paroxysmos modo affligit, stabiliante scilicet in primis viis cacochylia; modo frigoris tempore exoritur, aut paroxysmum comitatur, nunc mitior, nunc ut symptoma urgens, abiecit etiam in primis viis saburra, aut ex jam educta. Finem dicendi non facerem, si varias singultus in febribus observati historias hic loci vellem conscribere, Scriptores Medicos evolueris repetendus. Hæc species, si febris sit levior, & saburra indicia præ se ferat, distinguitur a singultu cacochylico præ prælorum febris, quæ in isto nulla est; si vero febris sit gravior, periculi plena, continua, aut exacerbans vel de genio intermittentium perniciosarum, hanc ab eodem febris acuta & symptoma terrificæ facile discernant. Discrepat singultus febrilis ab inflammatorio per inflammationis topicæ desquam: ex his quæ in specie 12. & 11. dicta sumus, patet ejusdem a singultu, quem facit materiei acris retrocessio, & a singultu critico.

ricodifferentia. Monet *Prosper Alpinus* singultum in febribus perpetuo timendum esse: equidem pestilenti omnis est in febribus gravioribus & mali moris; alii curationem satis facile recipi in febribus levioribus continuis, imo febricaccerbantibus, nec non in intermittentibus vulgaribus, sive extra paroxysmum, sive huius tempore affligat; oque in ipsis etiam intermittentibus symptomatolocus est, si probe nota sit adiectus symptomata ferat, quæ accessiones nonnumquam comitantur, Methodi Tortianæ efficacia. Curationem, quam hic fuisse tradere abs re esset, hoc duplici canone includimus: 1. Singultus febrilis semper est plus minusve de singultuum acrimonia familia; & si gravior fuerit morbus, partis affectæ inflammationem serius oculus, ac tandem gangrænam intendant: 2. huic genuina methodus febris, quæcumque illa sit, depellendæ apta competit. Legi merentur, quæ de methodo curatoria in singultu febre septemdecimæ & contagiosæ mali moris in principio comitante scripsit *Cl. Tralles*. Quando febris malignæ in statu confluentæ singultus jungitur, ex remedium proficuum cata logo abiecit Vir præfatus anodyna, etiam ipsum non lateat exempli felicitas anodynorum exhibitionis ab Auctoribus relata, & Prædicorum ea in re consensus, si singultus aliter ledari nequeat. Non is ego sum, qui ausum rari Viri placitis contradicere; interim in febribus mali moris sub nullis circumstantiis anodynus locum esse posse, adduci nequeo nec credam: quamobrem sequentem recitabo historiam. Laborabat Cuius Franciscanum Montipeliensem febre triætophy gravissima & smali moris, quæ per insulsum catarticum apoplectico fere similem invadebat, cuique profligando venæ sectiones, emeticum, energetice cathartes inflituebantur cum aliqua li capitis levamine: Mochi die quinto supervenit symptomatum excitioforum par, videlicet aurigo intentus, singultus pertinax; Perisana pulli, demulcentia, clysmata, cathartes miores, & remedium Riverianum, ex syrupo limoniorum & sales abinthii paratum, addito discordio & aqua liliorum, morbo præfato debellando paria fuerunt; porro observatum est ex remediis singultui adversis nullo alio magis leniri dicum hocce symptoma, quam ea portione quæ discidium recipiebat, cuius idcirco usui per plures dies cohecatum insistebatur. Circa singultum in febribus intermittentibus frigoris tempore accedentem, nemo non videt huius & frigoris eandem esse medicinam: si, ut symptoma urgens, expurgata etiam cacochylia, accessiones comes addatur, methodo Tortiana aut VVerlhofiana, exhibito scilicet mature & largiori dosi cortice peruviano, febris & singultus fugantur: immo si ferocet hocce symptoma, & citam ægro perniciem minitetur, cacochyliam nihil moratur una te repetat corticis liberaliter ingerendi cura. Cave ne dum febrem intermittentem, nondum probe elota saburra, citius

comprimis singultum inducas periodicum, de do quo in specie 3. verba fecimus.

10. *Singultus ab inflammatione*, Hoffmann. l. c. Tralles i. c. A. P.

Partes quorum inflammatio singultum quandoque excitat, sunt (a) oesophagus *Gorr. l. c.* (b) diaphragma *Barrere Obs. Anat. p. 173.* (c) ventriculus *Forstus lib. XXVII. Obs. 12.* (d) intestina *idem ibid.* (e) hepatis *Hippocratis Sect. VII. Aph. 17. Celsus L. II. C. 7. (f)* renes *Bonar Sepulchr. de singultu Obs. 3.* (g) vesica urinaria *idem Obs. 2.* (h) uterus *Gorrans Disquis. Med.* (i) Cerebrum ipsiusque meninges, *Hoffmann. l. c. Hæurnius in Asher. Hippocr. 3. Sect. VII.*

Cum specie præcedenti multam affinitatem habet singultus inflammatorius, in quem quotiescumque Præcticus incidit, hunc prudenter prognosticam suæ consulere jubet *Hoffmannus*. Signa singultus generica, & inflammationis partes memoratas occupantis notæ hanc speciem indignant; vide *Classen Morborum III.* Si curam varietati cuique competentem vellemus persequi, omnia fere morborum inflammatoriorum genera tractanda haberemus: In præsentiarum satis fir dixisse, hic non alia opus esse Medicinam, quam quæ a morbo inflammationis expellatur, itaque anphlogisticis omnigenis pugnandum, prout datum morbi inflammatorii genus, data species hinc vel illa requirit. Anodyna in inflammationibus viscerum propterea rejicit *Cl. Tralles*, quæ, an locum nunquam invenire possint, si cum castelis debitis usurpentur, Prædicorum esto iudicium.

11. *Singultus criticus* Tulpius Obs. Med. L. IV. Cap. 13. Hoffmann. l. c. A. P.

Singultus frequens, longus, febre continua declinante, indicat os ventriculi acri bile atque aphthis obideri. Hic, quantumvis minus periculi quam erroris habeat, excurrit tamen non raro ad duodecimum usque diem. Isaac Floriano sub finem febris continuæ tantum negotii noctu diuque successit indefatigabilis singultus ut piguerit vel loqui vel moveri, nedum bibere aut cibum capere, acerrima bile penitus in ventriculi tunicis incidente, quam ut vel infra expelleretur ante diem duodecimum, in quo tamen, etiamquam in præfinito termino, malam hoc tædii plenissimum ægrum hunc dereliquit: similia passi sunt ægri alii: hæcenus *Tulpius*. Signa huiusce singultus sunt, quod contingat in febribus ipso ipsarum declinatione & circa dies criticos, vigentibus bonis signis, maxime cœlionis in urina: cum prosperi ægri rebus prænuunciat vomitum aut diarrhæam insculturam, quorum alterutro tandem, die scilicet 12. ex Tulo accedente, penitus cessat, expulsa supra vel infra, quæ ventriculo simulabat, materia.

12. *Singultus a metastasi*, P.  
Debetur hic singultus materię acri, ut (a) erysipelacæ *Hoffmann. l. c.* (b) miliari *Porisæ apud Haller. El. Phys. l. c.* (c) purpuracæ *Tralles l. c. p. 110.* (d) arthriticæ *VVelsch, Hæurnius II. Obs.*

27. Obf. 54. (c) rheumatifimali feptum transversum aut ventriculum vellicant. Hoc autem fit modo duplici; 1. si præfata materies, quæ ad loca externa, fignobilia, deponi debet, intus partim aut penitus hæreat non satis vegete expulsa, vel perverfa medicatione, dum deponi incipiebat, intercepta: 2. si eadem, ad habitum corporis jam delata, sponte vel ægri aut mementis culpa, viam relegat, & ad interiora se propriat. Quod ad curam attinet, consulere Medicus debet morbo principi, & acre ad sua loca invitare: scopum posteriorem adimplent opiatæ, diaphoreticæ, immo, si nulla aut exigua febris, quæ viam vitæ intendere valent remedia: loca, quibus insidere materiam expediebat, topicis emollientibus, fotu tepido, balneo simili laxanda, vel rubefaciendis & vesicatoriis stimulanda sunt.

13. *Singultus ab Alui fluxu*, Hoffmann l. c. Cautelæ §. 11. & Obf. 21. Tralles l. c. A. P.

Diarrhææ & Dysentericæ nimis cito per opiatæ, adstringentia vel remedia alia cohibetæ accedit non raro singultus. Accusanda venit caecochylia improvido consilio intus retenta, cuius potius iuvanda erat excretio. Hanc speciem pessimi exitus esse, citamque opem exposcere Frid. Hoffmannus pronunciat; indicantur quæ materiæ acrimoniam demulcent, & quæ alvinæ excretionem restituunt: oleosa, pituitosa pulvis, carnis vitulinæ, serum lactis, clysmata emollientia, leniora cathartica absolvent paginam.

24. *Singultus a mensura*, Tralles l. c. p. 107. Hoffmann. l. c. Obf. 1. Schurigius Phartenol. p. 210. P.

Sanguis menstruus, si non fluat, cum jam tepus adest huic excretioni a natura destinatum; vel si ex causa quacunque, postquam huius fluxum scemina passa est, statâ periodo non permanet; tandem si sub ipso fluxu tempore sponte aut errore commissio supprimatur, satis frequens est singultus principium, sanguine excernendo ad ventriculum vel diaphragma regurgitante. Hæmorrhoidum anomalas in viris, qui regularem, ex podice hæmorrhagiam olim passi sunt, idem morbi genus sæpius secutum esse iterata constat observatione: hæc species breviori vel longiori periodo solet repetere: Indicantur potissimum quæ menstruam purgationem promovent, revocant, aut venæ sectiones in talo, pediluvia, vapores herbis emmenagogis incoctis exhalans & vagina exceptus, semicupia, balnea, frictions cum panno læno ad pubem, femora, perinæum, clysmata, aquæ minerales, remedia catamenis promovenda appropriata, inter quæ eminent radix hellebori nigri & aloë. Ad Hæmorrhoidum fluxum, si moretur aut supprimatur, restituendum analogæ opes medicationis non arduum est colligere.

Pater ex jam dictis hæmorrhagias quascunque, si jam in consuetudinem abierint & deficient, singultui ansam exhibere: harum per congruam methodum revocationi infundandum præ-

primis esse, nullus est qui non videat. Idem dicendum venit de evacuationibus serosis, quibus corpus tandem assuevit. De hoc genere insignis habet exemplum *Vandermonde ex D. Ha-zen* (*Journ. de Med. Juiul. 1756.*) verba sunt de singultu quodam periodico ex catameniorum emansione & excretionis serosæ e ventriculo provenientes, & per os abunde fluentis suppressionem pronato, omnibus immorigero & per excretionis serosæ restitutionem demum curato.

15. *Singultus ab ischuria*, D. Gloxio Diff. de Ischuria: Montpelii 1761. A. P.

Plurimis ischuriæ, tum spuriæ tum veræ, speciebus supervenire solet singultus. Non aliam hic accutandam venire causam materialem præter cohibitu locum intelligunt vel illi qui a limine Medicorum salutarunt. Variat singultuosæ convulsionis exitus pro diversa ischuriæ specie, cuius prognosim symptomata huiusmodi sequuntur. Numerosissima, quibus hæc debetur, principia sedulo rimatus est prælatos D. Gloxio: sub quolibet recensita leguntur prædicia ipsi tollendo maxime idonea.

16. *Singultus ab adipsosia*, Hoffmann. l. c. Thef. §. XI. & Meth. Med. §. IV. Riverius Cent. III. Obf. 41. Gar. Raygerus M. N. C. Dec. I. Ann. VI. B. P.

Auta frigida, obsoletatio inassuetæ nudis pedibus per pavimenta frigidiore, assidua pectoris denudatio præter consuetudinem, immersio in aquis gelidis, tempestas brumalis, rigidus aquilo, &c. dum perspirationem cohibent, & humores introforum versus ventriculum & diaphragma urgent, non raro singultum procreant. Vidimus supra eundem quoque ex frigidis intus ventriculo applicatis non semel succerisse. Io febribus acutis & exanthematicis, si via quancunque supprimatur perspiratio, cohibentur perperam sudores, id mali geous accessus cessantur Scriptores Medici: in eo versatur curationis cardo, ut laxetur strictura fibræ indurata, & revocetur humorum a centro ad peripheriam determinatio. Utrumque præstat remedia quibus singultus a frigidis epotis induratum supra profligavimus: Vide speciem 2. *variante* (c).

17. *Singultus a dolore*, vel *colicali*, Hoffmann. l. c. Tralles l. c. vel *iliaco* Hippocrates Sect. VII. Aph. 10. vel *dysenterico* Tralles l. c. vel *dysurico* Bonet Sepulchr. de Urin. diff. art. D. P.

Debetur hæc species dolori vehementi partium ventriculo aut diaphragmati vicinarum, immo & remotarum, si hæc cum distis visceribus consensum foveant. Affinis est hæc species singultui inflammatorio; Morbus simpliciter dolorificus aut evacuatorio-dolorificus, in quo singultus huiusmodi proofofuit, præcipuum signum ministrat, cuius ope a reliquis speciebus ista dignoscitur. Ad prædicendum singultus exitum attendendum est ad causam, cui debetur dolor: neque ex alio fonte haurienda curatio, quæ in rite oppugnando morbo principe tota est.

est. Curam variis colicæ, dysentericiæ, ilei, dysuriæ speciebus accommodatam nostrum non est hic loci persequi ex Practicorum libris hauriendam.

18. *Singultus ab hernia strangulata vel irritata.* A. P.

Ut alia symptomata bene multa ileam, observatur singultus in herniis intestinorum, omenti, vesicæ urinariæ, si has incarcerari contigerit; immo in enterocæle & cystocæle singultui aliique symptomata inducendis par est una irritatio. Præsentia herniarum præfatarum, suis signis cognoscendarum, & strangulationis & irritationis ipsius supervenientium notæ, & singultus signa generica hanc speciem determinant. Declarantur *Class. 1. Ord. VI. enterocælis, cystocælis, epiploælis character genericus, strangulationis & irritationis diagnosi ac prognosis, & quæ sub his accidentibus competere methodus curatoria, cui tantum inorigera se præbet hæc singultus species.*

19. *Singultus a vulnere.* A. P.

Vulnera quibus jungitur singultus, sunt vulnera diaphragmatis *Bonnet. Sepulchrot. de Sing. Col. de Viscer. Tom. III. p. 277. vulnera ventriculi Bonnet ibid. Senart. Med. Pract. Lib. III. de Vulnere, Ventriculi Col. de Viscer. ibid. pag. 291. Fandæ des Playes pag. 503. vulnera intestinorum Col. de Viscer. ibid. pag. 292. (coli) Transl. Philof. Vol. 49. pag. 1. 36. 37. Bonnet Sepulch. ibid.*

Inter symptomata, quæ vulneribus partium memoratarum accedunt, singultum locum sibi vindicare norunt omnes, qui vel-levisime Chirurgiam acceperunt; gravissima est hæc species, & prognos vulnus sequitur. Diagnos ex Chirurgiæ foro petenda. Non aliam medelam exposcit symptomata hujuscemodi, quam quæ pro morbo primo isolet institui. Vide *Autores Chirurgicos.*

20. *Singultus purulentus.* A. P.

Pus singultum creans ortum debet vel (a) ulceri ventriculi *River. Obs. communic. 1. Trall. l. c.* vel (b) ulceri diaphragmatis *Tralles ibid.* vel (c) ulceri intestinorum *Hercul. Saxonia de Sing. C. IV. vel (d) empyemati Brunnerus apud Boerllum de Sing. vel denique (e) ulceri exteriori Tralles l. c.*

Ulcus diaphragma, ventriculus, intestina occupans, si manifestè præcesserit phlegmone, sive non, non raro excitat singultum; idem præstat pus in alia parte interna, immo & in ipsa corporis peripheria genitum, si illud resorberi contigerit; & ad ventriculum aut diaphragma deponi: res eodem prorsus recidit, facto intra præfatorum viscerum textum decubitu; vel pure in ipsorum superficiem effuso. Speciei hujus diagnosi petenda est tum ex signis ulceris in ventriculo, diaphragmate, intestinis post abscessum aut apostasiam enati, ex signis empyematis, ex ulceris externi arescentia, tum ex characterè singultus generico. Prognosis ut plurimum funesta debet institui. Curatio morbi primi Therapæia absolvitur. Ad

*Sauvages Nosologia Methodica, Tom. I.*

versus varietatem empyematicam Chirurgia; contra eas, quas facit ulcus internum, Medicina variis pugnans remediis alibi legendis. Varietatis ultimæ cura ex jam dictis, & ex specie 12. de facili hauriatur.

Cum varietate, quæ puri in pectus effuso debetur, convenientiam alit singultus, quem fero acri intra thoracem ad aliquot uncias collecto adscribit *Hoffmannus*; qui casus, de hoc genere vehementissimus, & intra dies tredecim tandem letalis observabatur.

21. *Singultus a gangræna, interna Hoffmann l. c. Obs. 3. 4. vel externa Hippocrates de fracturis §. 12. 35. Tralles l. c. A. P.*

Prorsus lethalis est singultus hujuscemodi, sive febris acutis & inflammatorius tandem accedat, sive morbis dolorificis, evacuatoriis, rabidis, ut subcardialgicæ, colicæ, dysentericiæ, volvuli, marasmi exitialis finem; in his enim casibus instantem catastrophem prænuunt, gangræna partes internas occupante, quam denatorum elispicia oculis ipsi subiciunt. Neque meliori omine gangrænam externam sequitur singultus: probat febris lyngodes, quæ iphacelum a calcanei contusione, & a femoris & brachii fractura obortum secuta est, observante *Hippocrate*; probant fracturæ tibiæ casus geminus gangræna exceptus, nec non historia phlegmones gangrænodeæ, ulceri in pede supervenientis, referent *Cl. Tralles*, quibus singultum molestissimum acque immedicabilem accessisse vidit *Vir prælaudatus*, rabo septico vastis bibulis resorto, & ad diaphragma aut ventriculum delato.

22. *Singultus ab aphthis, vel (a) nascentibus atque stabilibus Tralles loc. cit. vel (b) deservibus, crustis jam deciduis Tulpus Obs. Med. Lib. IV. C. 24. Sydenham Shed. monit. de novæ Febr. ingressu. A. P.*

Hanc speciem designant morbi nostri notæ genericæ, & febris aphthosa, cujus stadia varia singultum occupat: nunc enim (& hæc est, varietas) in febris hujuscemodi incremento aut statu invadit singultus, aphthis in orificio ventriculi superiori & in œsophago primum nascentibus, & ad fauces, usque internum sensum ascendentibus, vel iisdem os interius & linguam statim occupantibus, transitu dein ad fauces & œsophagum gradatè facto. Nunc vero (& hæc est varietas altera) sub febris ejusdem declinatione accedit hoc symptoma rædii certe ac molestiæ plenissimum. Perfima est varietas prima; præsertim si aphthæ ascenderint; minus periculi hæc involvit, si aphthæ ab ore ad fauces descendant. Non alla est singultus hujuscæ, quam aphtharum ascendentium aut descendendum curatio: sita hæc est, si obtineri possit, in medicamentis demulcentibus & emollientibus blandissimis, quæ crustæ lapsum promoveant; & locorum subjectorum teneritudini, atque hyperæsthesi parcant. Ex *Tulpio* & *Sydenham* discrimine vocat varietas altera nisi perversa methodo tractetur. Singultus hic

Y

crusta



crustarum, febre aphthosa jam declinante, excipies debetur excoarctatio tunicae oesophagi & locorum denudatorum sensibilitati ac phlogosi; hinc cum exacerbaret pene omnium quæ deglutiuntur, attactus. Conveniunt linctus oleosi, demulcentes, potus blandi, parca copia sæpe assumpti, qui cum syrupo de meconio utilissime nubunt. Ex *Sydenham* sponte tandem evanescit morbus, nisi officioso nimis & inutiliter multa ingerantur remedia; quo in casumors pro Medico est. Si aphthæ & singultus sponte facessere reuagant, & in longam tempus decurrat, author est Vir prælaudatus, ut cortice Peruviano, & lacte deslorato adoriatur malum, hac methodo cæsius, quam ulla alia, etiam celebratissima, prolixaodum.

23. *Singultus ab excoarctatione oesophagi*, Gorter, l. c. *Monticuli* Forellus Lib. VIII. Obs. 12. Tralles l. c. A. P.

Si deglutione asperioris vel detergentis, oesophagi mucus ablatu fuerit, nascitur singultus, qui deglutione oleosis, mucilaginosi, blandi, compescitur. Gorter l. c.

Si villosam ventriculi tunicam non obliniat mucus ille natus quo tenera vestitur nervorum lanugo, ex deglutitorum, etiam mere aqueorum attactu, oriri potest cardiacia & singultus: mucum abraderé valent cathartica & vomitoria drastica: io praxi non semel observavit Cl. Tralles, noo a fortiori horum remedium operatione, sed diu ipsi eandem. De facere potest mucus in prope diu scio; evincere videtur exemplum vetulæ octogenariæ a *Froese* relatam, cui per sex menses subinde singultu frusta fuerunt remedia omnia, una profuerunt demutencia & incrasstantia. Io varietate secunda depellenda emulsivis, oleosis, mucilaginosi, gelatinosis usus est *Celebr. Tralles*, opio rejecto, vel tantum ex necessitate remediis memoratis interposito aut subjuncto.

24. *Singultus a cerebro* Tralles l. c. a *cerebri vulnerationibus* Hoffmann. l. c. (a) a *capitis vulnere, contusione*, Cl. Imbertus Thes. pro Reg. Cath. vac. (b) a *fractura cranii*, Gorter. l. c. (c) a *commotione*, Imbertus l. c. A. P.

Pessimus generatur singultus in omni cerebri plaga, contusione, in cranii fractura, in capitis concussionibus. Affectum memoratorum prognosim & curationem Chirurgia subministrat, quæ in singultum ab his genitum vere quadrat: in hoc latet magnum medicatiois arcum, ut omni opera humores a capite revellantur. Opiata vix prodesse, immo potius nocere, autumat Cl. Tralles. Si post causam fraturarum ablationem singultus remaneat, hunc antispasmodicis adori jubet Gorterus.

Sub speciali titulo recensere non opus est singultum, qui morbos deliros interdum comitatur, ut melancholiam, maoliam, paraphrosyn, &c. nec non singultum, qui cum morbis convulsivis, cum universalibus, tum particularibus aliquando complicatur, ut epilepsia, eclampsia, &c. Notabo tantum eandem tunc merito suspi-

cari morborum primariorum, singultusque causam, atque ita adversus symptomata hujuscemodi remediis morbo principi debellando idoneis maxime pugnandum esse.

25. *Singultus nervosus* Hoffmann. l. c. Tralles l. c. L. P.

Hinc speciei obnoxii sunt homines debiles ætneriores, hypochondriaci, flatulenti, mulieres hylericæ. Conveniunt auxilia, quæ sub singultu accidentali retulimus; 2. opiata, antispasmodica; 3. *vid. serici* 5. *cajum alterum* 3. hypochondriacis, hysteriæ Therapæia. De gemitu hocce morborum geore in univèrsu affectu potest, methodum, quæ iusculis pulli, vituli, sero lais, intermiscendo antispasmodica, ut radices pæroziæ, valerianæ sylvestris, folia autantium, menthæ hortensis, pulverem de Gut-teta, &c. balneis, aquis Eusebenis, Alekeis, Vallesiensibus, lacte asinino & similibus incedit, reliquis omnibus palmam præcipere.

26. *Singultus virulentus*, C. P.

Virus scorbuticum Hoffmann. l. c. Tralles l. c. syphiliticum Afruc de Morb. Ven. Lib. III. c. 4. §. 9. si ventriculus aut diaphragma ipso tacta sint, singultui anam præbere, ut alios missos faciam, restantur Authores allegari: Diagnosim specifica eratur ex signis quæ scorbutici, syphilidem adesse commostrarunt: de his legatur *Clar. Lind. Traité du Scorbut*, & *Celebr. Afruc de Morbis Ven.* Cadit in hanc singultus speciem prognosim, quæ de morbo primario ferenda venit. Methodus curatoria ex affectu principe deducitur. Scorbutici humorum diathesis per appropriata pharmaca corrigi debet: hac in re præsentis silentio premimus, ne *Clar. Lind.* complasse velle videamur. Singultus venereus mercurio tantum moret. gerit: uniones, ut Monspelii moris est, celebratæ præprimis arident; non ideo methodis aliis, ut Syvencianæ, Keyserianæ, Levretianæ, medentem jubemus valedicere.

27. *Singultus catbeticus* Boet. Med. Sept. L. V. Sect. 5. Obs. 6. Hoffmann. l. c. Tralles l. c. C. P.

Ita *Celebr. Tralles* de hac specie; Aliquando in subiectis viscerum atenia laborantibus, viscerumque lentorum humorum cellulis sententibus, hac sensum congesti plicis ventriculi & intestinorum ita agglutinantur, ut chronicus singultus inde emergat, unaquo serie vel per series portio affigit, cum vel suo vomitu intercurrente. Ita vero Hoffmannus: Singultus chronicus, aquæ ac-periodicus, affligere solet catbeticos & hepate affectos: ubi causa in bile, acris redditâ, & tunica ventriculi, ac duodeni notatâ villositate, quærenda est. Hinc talem affectum in catbeticorum diu durantem, donec vomitus sequeretur *Levretius in Latron. p. 286.* Curatio per aromatica, stomatica, martialia, attecuantia, amara, evacuatia, & aquas minerales iostitueoda venit; additis quæ belem acrem, corrigunt remediis; in eorum statu non adeo felicitur. utrapantur opiata.

28. *Singultus mechanicus*, (a) ab hepate scirrho-

se, vel ventriculo adhaerens Bonet Sepulchr. de Sing. Obs. 2. (b) a pancreate scirrhus; idem; (c) ab omni in postu abarante Thom. Bartholin: Cent. VI. Obs. 55. vel mole aucta & ventriculo deorsum trahente. Vesal. Anat. L. V. C. 4. (d) a luxatione vertebrae colli, dorsi, Bachmayer de singulis; Rhodius Cent. II. Obs. 61. (e) ab ossibus, Hoffmann. l. c. (f) a costa luxatione, fractura, distortionis Fernel Lib. VI. cap. c. 3. Albertus Diss. de Sing. Trailles l. c. (g) a depressione cartilaginis xiphoidis Fernel l. c. P.

Non ita frequentes prolant de hac specie observationes: viscera, ventriculo vicina, quia sunt hepar, pancreas, omentum, &c. si mole augeantur, tumorem obducuntur, adhaerentiam morbosam contrahunt, ob vim stomachi pressione illatam, singulum excitare posse facile perspicitur; atque exinde revera hunc casum ortum duxisse fidem faciunt scriptorum annales. Non ita facili semper diagnosis varietatum (a) (b) (c), cui extricandus unus quandoque est par culter anatomicus; in longum decurrit mechanici hic singulus; neque curationem radicalem admittit, palliativa tantum mitigandas.

A luxata colli vertebra Singulum quatuor annorum ex Hoffmanno memorat Bachmayer; & iustum a luxatione vertebrae dorsi undecimae pronati & continuo affligentis mentionem iniecit Rhodius. Costas inferiores luxatas, fractas, inortas, simili affectui originem dedisse auctores sunt Fernelius, Albertus, Trailles, Hoffmannus. Appendicem ensiformem luxatam, aut pressione & contusione externa rudiori intus hexam, singulotum convulsionem: excitare testantur Fernelius & Segner. In hac specie curatio e foris Chirurgico petenda. Monere tamen quod ex Practicorum consensu in varietate (g) egregiam operam navent cucurbitulae siccae, regioni scrobiculi cordis applicatae.

29. Singulus epilepticus maniacus Hecquet Naturalisme des Convulsions part. 2. pag. 113.

Puella 23 annos nata affligebatur violento & continuo singulto, canis latratum referente; vix ob diaphragmatis & intestinorum convulsiones poterat iusculum haurire, haec in Nosocomio debebat vicina aliis quatuor puellis, quae tertio die omnes singultire coeperunt; altera cessante per semihoram tres singultiebant; & hoc tempore elapso quatuor simul convulsionibus agitabantur, quibus vix quatuor viri resistere poterant; post quadrantem horae convulsionibus impensum, omnes quiesce, & quasi sine respiratione alterum horae quadrantem remanebant; tunc vero sui compotes per semihoram bene se habere videbantur; quo elapso tempore iterum apud omnes simul & singultus, & dein convulsiones, & quies & valetudo eodem ordine revertebantur intervallis aequalibus: sanari singultu, priores quibus tres ultimae decumbebant morbi evanescere; haec anno 1692. in urbe Villia magna Novae Franciae. An singulus hystericus Eugenii Tom. II. Lib. 7. pag. 106.

V. TUSSIS: Bos Graecis, Tosse Italis; Cough Anglis: la Toux; Sechresse de poitrine, de la gorge, Dictionn. de Santé.

Tussicula est minus praecipuum symptoma in bene multis morbus quos comitatur ut in Pleuritide, Peripneumonia, Hepatitide, Paraphrenitide, Cynanche, nec non in Empyemate, Hydropothorace, Asthmate, Angina, in Coryza, Catarrho, Phthisi, Haemoptylis, Ascite, Rachitide, Hysteria, &c. Praecipuae species quae singularem merentur attentionem enucleatae proponuntur a Nicol Rosen Suecia Archiatro in Dissert. de Tussis: sed differentias cum speciebus confundit Illust. Auctor. Tussis humida eadem est in finem morbi ipsius in cuius initio sicca fuerat, nec inde species diversa est. Tussis idiopathica & symptomatica plures involvunt species, proindeque vix speciebus distinctis designandis interservire possunt.

Tussis desinente Duroni eximio Hippocratis interprete, nihil aliud est quam concussio thoracis studentis excutere quod sibi molestem est; concussio vero sic irritata natura a causa morifica; etenim omnibus partibus officialibus insita est quaedam facultas vernacula concussiva, sicut sicut ad excitandum quod illis molestem est; quod naribus sternutamentum, ventriculo singultus, id thoraci tussis est. Eadem quoque facultatem indidit natura renibus, vesicae, lieci, diaphragmati. Duroni auctor in Hollerium de tussi.

1. Tussis catarrhalis N. Rosen Dissert. Frid. Hoffmann. Spec. 9. Tussis siccata ac mucosa aliis dicta L. P.

Distinguitur levis symptomatica, & ortu ex impedita respiratione per frigus susceptum, adeoque raucitate stipatur; praeterea coryza, sternutamentum, horripilatione, &c. si febris videatur accedere, jam rheumatica est; ultra duas, tresve septimanas non extenditur.

Cura. Si vehemens sit, phlebotomia institenda est & diata tenuis; verum ut plurimum sufficit frigus vitare, pedus linea subucula munire; potum calidum mane fortillare, calidam in pastu quovis bibere, syrupo edulcoratum extra passus, noctu ovi vitellum cum saccharo in calida dissolutum haurire, pomum excavatum melle impletum & coctum edere, aut aliquot thoriaceae grana noctu vorare.

Datur hujus varietas, ferax, epidemica, cum cephalalgia, otalgia, angina, &c. vide Huxham lib. 1. pag. 791 de aet. Vide Catarrhum epidemicum.

2. Tussis hysterica Nicol. Rosen dissert. de tussis. Sydenham de hysterica passione.

Non solum hystericae tussim siccam pertinacem quandoque expeririunt, quae lactiniis, exercitio, narcoticis est debellanda, sed & epileptici tussis non raro extra epilepsiae paroxysmos vexantur, de qua tussis consultatur Willisus in pathologia cerebri.

3. *Tussis secca*, Nicol. Rosen.

Illa proprie dicitur eo quod nec initio, nec in decursu quidquam expulsi, talis est phthisis a calculo pulmonum: Vide Borellum curat.

1. obs. 6. *Zacutus lib. 1. praxi admiranda obs. 96.* Talis est ea quæ a pulmonum scirrhus excitatur. Vide *phthisim seccam*. Convulsivæ tussis hylericarum, hypochondriacorum seccæ sunt, sed aliis signis distinguendæ: mirevum extraxim caput papaveris rheudosa granis ijad x, xx, &c. quod sedativum est non stupefaciens: observante D. Cœsar.

4. *Tussis accidentalis* B. P.

Ea est, quæ a principiis externis evidentibus pendet, ut a mica panis, guttula aque, rideo in tracheam illapsis; a risu, a calore, ab acidis assumptis; sive eriam notabilis sit, ut a fumis acerbis, a pulvere tenui inspirato, unde etiam asthma vel phthisis deinceps imminet. Tussim diurnam in vacca observavit Bartheleus a iaculo ipsius diaphragmati ioxho.

Species tussis determinare & cuique propriam diagnosis, medelamque assignare difficilissimum est; potissimas iodicasse sufficiat.

5. *Tussis simulata* Benedicti Stein dissert. de tussi stomachali. P.

Ea est quæ nullum plane organorum respiratoris incommodum sui principium habet, sed ex libera mentis determinatione, morali cujusdam morivi impulsu, excitatur. Sic tussunt v. g. malitiosi quidam mendicii coram illis a quibus slipem rogant, ut misericordiam concipiant, nec non comedi ægri, aut lenis decrepiti personam agentes, atque gonorrhœici, ut sub larva tussis dietam & medicamina morbo vero propria adhibeant, gonorrhœicamque celent, &c. quæ ideo rheuma a quibusdam vocatur.

6. *Tussis stomachalis* (humida) Benedicti Stein dissertat.

Ea est cujus principium morbificum est in stomacho, & quæ copiosa aocatharsis stipatur.

Cognoscitur ex eo quod 1. ea satis frequens & vehemens statim post pastum fortior & pertinacior fiat, ex eo quod eo tempore non solum mucosa & viscosa fiat expectoratio, sed etiam cum tussi vomitio allumportum jungatur; 2. quod fames sit imminuta, quod nausea & vomititio accedant; quod dolor gravitatis & tussendi stimulus in cordis scrobiculo sensibilis sit, quibus ventriculi iostatio non raro adjungitur; 4. æger profundius inspirare iussus ex hoc peraQu tussire non cogitur, ut in pectorali tussi; 5. medicinis est muci anacatharsis ante pastum aut vacuo stomacho, in pectorali iostigis est anacatharsis etiam jejunio ventriculo, si humida; 6. rarius vexat ægrum quam stomachico-pectoralis; 7. & recentior est quam complicata seu minus contumax.

Principium hujus est saburra acida, alkalina, viscosa, aut alia in ventriculo collecta; huc pertinet cacochymia mucosa, temperamentum

pituitosum; ventriculi & pulmonum debilitas; hinc tussis illa infantibus est familiaris, maxime quia expectorata deglutunt, nec non senibus.

Principia procacitica sunt voracitas nimia cibi viscidæ ex farinosis non fermentatis, caseo, &c. aer humidus & frigidus; autumnalis præcipue, perspiratio suppressa, refrigeratio corporis, pedumve, vita otiosa, abusus mucilaginosorum in tussi pectorali.

Hæc tussis semper gravis est, & sibi relicta pertinacior, gravior si febris sit conjuncta; inlantes non raro ducit in atrophiam; quo tenacior mucus expectorandus, eo majores conatus, qui hæmorrhagiam, convulsiones, hernias consistant; facile in stomachico-pectoralem transit, qua facilius curatur; demum emollientibus & oleosis, mucilaginosisque augetur & habitualis evadit.

Curatio. 1. Saburra ventriculi evacuanda est; 2. pituita tenax ventriculo adhærens resolvenda est; 3. totus ejus visceris est restaurandus.

Primæ indicationi satisfaciunt lenia vomitoria, præmissa Glymate, nigralvus sit laxa, sic: ipecacuanhæ pulverate, grana sv, vel, cum pauçillo pulveris cinnamomi & salis abinthii, gran. ij, infunde in aquæ coelestis; sumat infans triennis; vel oxyacchari emetici Ludovici gr. vi. in aqua cinnamomi aut buglossi.

Secundam indicationem adimpleat salia media, ut arcanum duplicatum, tartarus vitriolatus, nitrum antimoniatum, terra foliata tartari, sal abinthii, centaury minoris, ramarisci v. g. radices calamiaromatici & ari, drach. ii; iridis florentinæ, corticis aurantiorum, ana, drach. x. salis ramarisci, oculorum cancerorum, tartari vitriolati, ana, scrupul. i; olei destillati scæniculi, gutt. iv. misce; fiat pulvis ad cultri cuspidem mane & vespere sumendus.

Saburram resolutam expurgant identidem mercurius dulcis, sal polychrestum, sal catharticum amarum; pilulæ vero Becherianæ ac Stahlianæ resolvunt, laxant & simul roborant.

Tertiam indicationem adimpleat stomachica, ut mucus, abinthium, cortex citri, elixir proprietas, tinctura vitrioli martialis Ludovici, liquores spirituosii, qui vulgo cinnamomum, oleum venæis, &c. dicuntur; balsamus peruvianus & similia.

Dietæ exigit ut potus frigidus, acidus, aut accefcæos vitetur, potus sit ex infuso radicum graminis, scorzooeræ, salis parillæ, cum pauçillo anisi & cinnamomi; aer sit purus, temperatus, alvus libera servetur, & perspiratio juvetur.

7. *Tussis stomachalis* (secca) Frider. Hoffmanni tom. 4. part. 3. sect. 2. cap. 3. pag. 112. hypochondriaca ejusdem observ. 5. & 11.

Ea est quæ a saburra stomachi dependet; ea cognoscitur 1. quod stimulus tussis referatur ad scrobiculum cordis; 2. quod præcesit indigestio, voracitas nimia; cibi incongrui, acris, acidi

acidi usus, 3. vomituritio; 4. ætas infantilis; 5. levamen a cathartico: an sabbura agat subiens sanguinem & inde glandulas bronchiales inficiens? an œsophagi tunica ad guttur usque irritans? an tussis concussione natura ipsam ventriculum ab hac fascina ligare conetur? ea si diuturnior fuerit, atrophiam inducit.

**Cura.** Viâ & medicamentis taburra corrigenda est, vel evacuanda; ipsecacitæ grana aliquot, totidemque salis absinthii ad vomitum ciendum usurpentur. Si tuto id fieri nequeat, rhei pulvere & mannæ dosi conveniente faburra eliminetur: vel fiant pilulæ ex succi liquiritiæ, aquilæ albæ & aloës, ana, serupulo semisse, horum grana duo, tria vel quatuor, singulis diebus vorentur: sebum candelæ solum terobiculo cordis inungatur; aut applicetur crutra panis spiritu vini, & aromaticis aspersa.

Primus *Boissacius* tussim stomachalem descripsit & ex sonitu profundo a pectorali & gutturali distinxit. A scirrbo pone ventriculum ortam vide apud *Morganii Epist. XIX. §8.*

8. *Tussis gutturalis, Rascario Arabum.*

Est ea quæ ad guttur a phlegmate viscoso aut altero quodam molesto liberandum instituitur. Visa est tussis quam calculi in tonsillis nati excitabant; tussis angine & cynanche ejusmodi est, catarrhalis etiam quandoque guttur afficere videtur; difficile est quandoque tussim phthisicam a gutturali distinguere, quippe in phthisi æger sæpius stimulum in guttur, seu funiculum laryngem tantum refert; maxima pars ægrorum hanc tussim tribuit aquis salis quas e cerebro destillare putat: sonus tussis gutturalis est ut plurimum acutior quam pectoralis; omnium gravissimus sonus est in stomachali, nisi tussim hæmoptoicam, quæ quandoque vix sonora est, annueremus.

9. *Tussis hepatica* Albert. de hæmorrhoidibus. D. Venel quæstion. agônitiæ, pag. 27. 1759. *Tussis hypochondriaca* Nicol. Rosen. P.

Tussis est ferocissima, intermitens, in cujus intervalli nulla omnino respirandi difficultas, nullaque febris initio.

Ea si lacticiinis, bechicisque edulcorantibus tractetur, ut tussis vulgaris, ab in tabem hepaticam ex hepatis abscessu cum febre amphimerina.

Initio avertitur feliciter fundentibus aloeticis, jusscalis aperientibus, pituitas nitratis.

Differt ab hepatitide per absentiam pyrexie acutæ, diuturnitatem; in hoc morbo naturæ conatus videtur vertere ad removendum obicem quem hepar obstructum opponit.

10. *Tussis ferina* Frid. Hoffmanni §. 12. *Tussis* Allen, *Tussis clangosa* Cl. Bourdelin 1752. *Cogneluthe* vulgo, A. P.

Est tussis sæpius epidemica puerulis i seftans per paroxysmos, quintas dictos, revertens, in quibus fere suffocatur per aliquot secunda, cum facie livescente, & sæpius vomitione, totiusque corporis vehementi concussione.

Pueri quidem in his accessibus pituitam spasmofam, albam, viscidam demum expectorant; *Sauvages Nosologia Methodica, Tom. I.*

aut infantes deglutiunt, nec quidquam extofsi. renorunt; accedit inappetentia, lassitudo, asthenia, macies, & vitæ periculum imminet.

Si laqueat infans, nutrix pitifana edulcoranti ex decocto oryzae, gruti utatur, a vino & cibis talis abstineat; infans lacte solo vescatur, & ex pauxillo mannæ identidem perferatur, manna in lacte dissolvatur, oleo amygdalarum etiam miscetur. Si infans natu major sit aut provectior, phlebotomia in usum vocetur, vesperæ grana aliquot theriacæ deglutiuntur, potu calido theæ, capillorum veneris utatur, & catharis repetatur. Paulo provectioribus puerulis emolm fœdet *Bourdelin*.

11. *Tussis convulſiva* Theod. Forbes, dissert. Edimburg 1758. *Paratussis* Huxham de aere lib. 1. p. 75. Vocatur Gallice *Cogneluthe*; Anglis *Kinkcough*; Græcis *Bex tharides*; aliis *Tussis ferina*; Paroxysmi Quintas, P. A.

Est ea læva, cita, violentaque tussis, quam acuta quædam & sonora inspiratio, galli cantui similis, una cum vomendi nisu comitatur.

Incipit ut plurimum cum febricula, sensim crescit conatus tuſſendi cum sono gallicini, dein mucus sincerustantum expectoratur, paroxysmus præcedit vel titillatio gutturis, vel suffocatio; in paroxysmo venæ tument, arteriæ fortius pulsant, caput dolet, oculi prominent, lachrymæ fluunt, palpebræ tument; facies torget, rubet aut livescit; æger veluti suffocatus cito moreretur, nisi velis naribus, vel e pectore sanguinem funderet, aut vomeret: qui vomunt melius habent: si neutrum acciderit in vehementi tussis, metuendæ convulsiones, aut apoplexia; ex diuturnitate morbi metuenda phthisis. Hæc tussis epidemica est, & contagiosa creditur; semel in vita quæque aggreditur, sæpius infantes.

Quænam sit sedes principii proximi ignoratur.

**Cura.** Arcendum frigus, arcenda humiditas; quo natura verget, eo ducere oportet, adeoque phlebotomia præmittenda, dein lene vomitorium præstribendum; infusum ex pulegio, hyssopo sit pro potu: purgatio in septimana iteretur, cum manna, rheo, granis aliquot aquilæ albæ; pro vomitorio oxymel scillicum detur cum syrupo de althæa. Tussilago, althæa, capilli veneris, semina lini cum kinkina pauxillo coquantur pro potu. Vescicatoria a multis suadentur. Laudantur specificæ lichen pyxidatus in lacte decoctus, nec non saccharum saturni ad grana duo, tria, & demum kinkina parva dosi, item succus pulegii pro specifico habetur a *Boyleo*.

12. *Tussis a dentitione.*

Oritur sive ob materiem verminosam quæ sæpe cum hoc morbo exalatur, ut patet ex narium pruritu, halitu subacido; sive sympathia a gingivarum distractione oritur; ea autem minime confundenda est cum tussis clangosa, seu ferina, de qua egimus.

13. *Tussis metallicorum* Frid. Hoffmanni de tussis artic. 9.

Est comes asthma metallici, quod vide.

14. *Tussis gravidarum* Mauriceau lib. 1. c. 16. P.

Quæ fœtus suos gerunt altius cæteris, tussis & dyspnœæ sunt magis obnoxie, cum inde pectoris cavitas magis ardeat.

Huic vero principio quandoque alia tussis principia adiunguntur, ut frigus susceptum, inde perspirabile acre retentum & in bronchiis secretum, irritans, sanguis a peripheria ad interiora pectoris repressus; hic accedit ventriculi alimentis, flatibusve nimis dilatis, quæ singula distinguenda sunt, & oppuganda.

**Curatio.** Gravida bene regime videtur, vitetque omnia salita, pipeata, necnon acida, ut acetum, limonia, mala granata, a quibus tussis augetur; utatur bechicis, edulcorantibus, ut glycyrrhiza, passulis, jujubis, hordofundato, &c. clymatissalustia servetur.

His irritis ad phlebotomiam quovis graviditatis tempore confugiat, major enim est metus abortus a tussi, quam detrimenti a phlebotomia. Contra frigus semuniat in cubiculo se continens; muccinum aut villola pectorum tegat.

Syrupus vini adusti sic paratur.

*Recipe vini optimi, uncias octo; cinnamomi, drachmas duas; caryophyllis, n. vii; sacchari, unc. iv. bulliant in fenella, dein accendantur vinum usquequo ad syrupi consistentiam devenierit, sumat ante somnum cochlear 2. ano 2.*

Caveat gravida ne vestibus nimis ardeatur abdomen & pectus, a coitu abstinere, levibus hypnoticis somnum sibi conciliet, a fortioribus abstinendo.

2. *Tussis gravidarum* Morisot Deslandes Præface du Traité des Accouchemens de Puzos & Frid. Hoffmann. Obs. 12.

Est in gravidis symptoma formidabile; prodece potest a multis principis, ut, 1. a plethora gravidis familiaris; 2. a sensibilitate uteri quem fœtus calcitat; 3. a fœtu fœtus altior; 4. a suppreffa leucorrhœa; facta in pectus metastasi; in his omnibus casibus laxantia, edulcorantia, bechica vel noxia, vel inutilia sermo sunt.

Prodest in prima varietate phlebotomia cum regime 1. quod valere etiam in 3. casu, sed in quarto nocet; nimis adhaerent Medici, in tussi, & vomitu gravidarum, auxiliis ex phlebotomia, & cathart. petitis; quidni audent quandoque tentare semicupia, tonica, antispasmodica, immo narcotica; forte ea remedia in gravidis dissimata sunt, quia ab imperitis præposere usurpata. Hæc D. Dispauder. Vidi puellam quæ, syphilidis gratia balneabatur, sed in lipothymiam ducebat quodvis balneum; sortum vero illud gravidum erat; uxorem tamen Chirurgi gravida a balneo aliunde indicatis nullum incommodum patiebatur.

15. *Tussis hæmoptica; Tussis contumace, con spiti cruenti in femina deboli, emaciata* Del papa consult. 29. P. C.

Tussis contumax, per quam identidem sanguinis quædam guttæ expuuntur in subiectis jam emaciatis & debilitatis, est phthiæose sæpe prodromus; in hac itaque humorum, & maxime

me succi bronchialis, acrimonia est incusanda; docet autem observatio succos digestivos a sebricula aut a pure, si jam confectum sit, si vitari, ut digestio victiosa succedat, & metus diarrhœæ periculose concurrat.

In simili casu auctor laudatus interdicit omnia cathartica, necnon phlebotomiam; clymata ex lacte vel aqua hordei cum saccharo & pauxillo salis suadet; deinde ut spumum sanguinis sanetur, adstringentia varia præscribit, ut terram sigillatam, corallia rubra, sanguinem melitemsem; ad tussim vero competendum lambicativa, seu looch ex saccharo & amylo, succum urticæ & hederæ terrestris cum jupio de rellis siccis, necnon serum lactis distillatum, in quo cocta fuerint herbe centinodæ, hederæ terrestris, necnon bugulæ folia, cum cancris fluviatilibus & jujubis; præscribitur etiam lac alinum mane, & vaccinum vespere; pro potu vero aqua di Nucera, vel aqua cum pane tosto & pauxillo cinnamomi insus; laudatur etiam gelatina cornu cervi, nec omitti debent papaveracea nodu usurpanda.

16. *Tussis a polypo* D. Samber Philof. Transact. n. 398. ann. 1727. P. C.

Violentam tussim expertuserat quinquagenarius; demum post sanguinis expuitionem copiosam, polypum prius bronchiis adhaerentem expectoravit; superstituit vero phthiæosa quæ absumptus est.

*Tussis* Obs. 7. lib. 2. expectoratum polypum venæ pulmonariæ ramose similem observavit, post tussim hæmopticam; similem polypum concretione pariter expectoratum vidit D. Nicola Philofoph. Transact. n. 429. anno 1731. Videatur icon in libro citato.

17. *Tussis phthiæica* Morton. de Phthiæologia lib. 2. cap. 3. *Toux de venard* Vulgo, quia ducit ad foream. P. C.

Est ea species quæ phthiæim incipientem designat, & quam sæpius ægri cum catarrhali tussi, seu rheumate confundunt, atque ob teillationem gutturis procedere credunt a pituita acri, quam a cerebro delabi judicant. Dissert autem ab illa, 1. quod tussis phthiæica stipatur sensu quodam ponderis in pectore gravantis, utpote quæ exciteretur a tumore glanduloso, seu tuberculis pulmonum. 2. Quod in primo limine tussis phthiæica sit difficultate respirandi stipata, & ah ipso initio arida, arida inquam habitualiter per aliquot menses; raro enim & accidentaliter mucis, salivæque gutturalis expuitionem inducit, alii non expectorationem, quæ intra aliquot dies, vel septimanas catarrhali tussi supervenit cum levamine, anhelationis immutatione. 3. Tussis phthiæica vere perennis est, & licet per intervalla molestior evadat, nunquam omnino ad fatalem mortis terminum; cessat, atque tunc ledatur, cum verum pus suppurato tuberculo ejicitur. 4. Tussis phthiæica initio morbi mitis est, sine insigni irritatione, longis & incertis intervallis sæpius recurrens; e contra catarrhalis in primo limine ferox & fere continua est. 5. Tussi

phthi-

phthisicæ fere semper inappetentia jungitur cum siti, & post cibam vomitio supervenire solet, ut pueris accidit in tussi clangosa 6. Vox rauca est, vel clangosa & exilis, quod ob pulmonis obstructionem accidit; cubus enim eo acutorem sonum edit, quo brevis est 7. Huic tussi comitem se præbet respiratio difficilis, molesta & anhelosa, præsertim ab ambulatione 8. His demum accedunt pectoris oppressio, hypochondriorum gravitas insolita, iracundia & tristitia, ita ut nec sibi nec aliis placere & facere satis possint. 9. Dein pectoris in aliquo loco gravitas major, major tussis ex decubitu in alterutrum latus. 10. Potissimum signum est etiam febris sensim crescens, pulsus frequenti, urina rubra, vigiliis, inappetentia, calore manuum & pedum stipata, cum rubore hæmogenarum; febris, inquam, mitis, lenta post passum discernenda, cæterum homotona, usquequo suppuratio facta sit; nunc vero hecica vespere exacerbans evadit. 11. Tandem tabes, seu infensibilis statim & gradatim crescens consumptio, aut extenuatio incipientis phthiseos, adeoque tussis phthisicæ signum est, & ultra procedente morbo phthisis est confirmata, nullumque dubium superesse potest.

12. *Tussis rheumatica* Nicol. Rosen. dissert. de tussi. Frid. Hoffmann §. 12.

Dicitur etiam inflammatoria, illa quæ febrem comitem habet, & a phlogosi pulmonum pendet.

Horrificationes & febriles commotiones, cum tussicula sicca, ab initio sentiantur, quæ vespere cum pulsi & calore acutis ingravescent; accedit dyspnœa, pulsus celer, & stridulus, dolor pectoris tussicula exacerbans cum doloribus vagis thoracis; error extractus est phlogisticus. Dissert. a catarrhali defectu coracæ, hernutationis, anginæ, a febrili simplici per dolores rheumaticos pectoris, crassam sanguinis crustam, &c. Indicantur phlebotomizæ repetitæ, potus theiformis, diluens, calidus, ex passulis, glycyrrhiza, hordeo, sicubus, iulapia ex syrupis capilorum veneris, althææ, &c. iuscula ex rapis, brassicæ rubra, pulmone vituli vel vervæcis, additis sebestis, vel dactylis, aut jopibus, &c.

19. *Tussis arthritica* Musgravii cap. 12. hist. 1.

Ea pendet ab arthritide repulsa, & nisi materies arthritica pedes iterum afficiat, frustra bechicis impugnatur, ac periculosa est.

20. *Tussis exanthematica* a Scabie repulsa, Fr. Hoffmann III. 117. a tinea repulsa, idem ibidem.

21. *Tussis verminosa*, Schenckii lib. II. pag. 249.

Consistat observationibus, octo Authorum a Schenckio citatorum, tussim quandoque pendere a variis insectis intra pulmonem delitescibus: horum insectorum plurima sunt larvæ aut puppæ; cum aere scilicet haurimus quandoque semina, vel ovula mæscarum, quæ exclusa in pulmonibus suppedant larvas apodas, quæ vermium nomine apud Medicos historizæ naturalis contemptores audiunt; quandoque etiam vermes, si credamus Authoribus, expectorati sunt;

sic album & longum vermiculum in pulmone se reperisse testatur Morgagni.

Succo marrubii & scilla utebatur Benivenius ad pulmonicos vermes necandos.

A vermicibus intestinalibus excitati tussim insanum vulgaris est opinio; atque hæc tussis sicca cum genæ alterutrius fugaci rubore ut plurimum est lumbricorum indicium; hanc tussim cathartici & anthelmintici aggredimur.

22. *Tussis calculosa*, Schenckii Obs. lib. II. pag. 246. ubi viginti quatuor Authorum observationes de hæc specie referuntur.

Calculi pulmonares a magnitudine lentis ad uncis volumen variant; alii sunt cretacei, alii murales, plures topthorum arthriticorum similitudinem obtinent; dantur & grandinei seu subpellucidi & a mucro indurato oriundi. Undecim calculorum pneumonicorum observationes videre est in *Epistemicis Nat. cur.* Ipse habeo calculum ante decem annos tussi rejectum a virgine quæ adhuc dum viget, phthisicæ matris filia. Plures vero ex his, qui calculos tussi rejiciunt hæmoptyci; phthisicæ demum moriuntur.

23. *Tussis excretæ angæ*. Sécherasse de la gorge, Dictionnaire de santé.

## ORDO SECUNDUS.

### ANHELATIONES OPRESSIVÆ.

*Difficultas anhelitus* Mercurialis; *Inspiratio viscosa* Etmulleri; *Respiratio infans* Mangetti; *Gallice* Oppressions de poitrine, Estoufflement.

HIC ordo continet morbos, quorum maxima pars lædit constanter respirationem, maxime vero inspirationem, sine febre inflammatoria; quare distinguuntur a pleuritide, peripneumonia, hepaticide, in quibus scilicet phlegmatis est præcipuum symptoma; difficultas quidem respirandi multorum morborum diversæ classis est comes, ut februm, hydropum, spasmodum: verum, in hac classe reponimus eas anhelationes quæ ægritudinis præcipuum symptoma constituent, de quo agri primo & potissimum conqueruntur.

VI. STERTOR; *Rencher* & *Roux* Hippocratis; *Ronchus* Slevogtii Dissertat. de Roncho; *Rausling* Anglorum; *Renslement*, *Stertor*, *Râlement*. Occitanis le Rale.

Est anhelatio sonora, seu sono involuntario, sæpius raucos, quandoque sibiloso, stipata, qualis apud bene multos sanos dormientes observatur.

Stertorem pro lubitu effingit quisque laxatis chordis vocalibus, & aere velum palatinum, ac uvulam intremulos motus agente.

Ita & pro lubitu stertorem, *resationem Gordonio* dictum effingimus, quoties gargarisma in gutture volutamus, & aerem efflatum intra aquam agitari cogimus.

Stertor qui fit ore clauso, cuius proinde sonus nasalis est, cum altera genarum inflatione & detumescencia, qualis observatur in illis qui fumum tabaci alternis vicibus efflant, Gal- lis dicitur *Rensement*; qui vero ore patulo, qualis in agone ducentibus, proprie *Rôlement*, Occitanis *Rôle* nuncupatur; alternat sæpe in asthmaicis stertor sono gravi & rauco, eum stertore sibilante, seu *sibile*: horum veroomnium sonorum theoria adhuc desideratur. Stertor apoplecticus est eum respiratione sublimi quidem, sed rara; unde differt a stertore asthmaico, qui est eum respiratione frequentiori: ana chordarum vocalium motu tremulo sensibili pendeat stertor agones non ausim decidere; motus vibratioris homotonos ambarum chordarum sonum edie suavem; ast si alterutra ex his cordis sensibilibiter tremat, nec cum altera consonet, tunc sonus edetur rancus & dissonans; stertores haecenus citati sunt aliorum morbo- rum symptoma secundaria.

Num vero stertor sit quandoque symptoma primarium dubito; nisi forte stertor ille qui in famulos quandoque continuo & per multos menses affligit, qui ronchus *Steregitis* nominatur. Vide *Tom. 2. Disputat. D. Halleri de morbis pectoris*.

1. Stertor asthmaicus, ille est qui orthopnoeam & asthma paryoxysmos comitatur.

2. Stertor apoplecticus, est ille qui apoplexiam & agone in plurimis casibus terminat. Hi stertores a consueto quibusdam sanis dormientibus stertore maxime distinguendus est. De his symptomatibus plura dicere superfluum est.

VII. DYSPNOEA; *Difficultas respirandi* Latinis; *Disœia* Gordoni Lilius; *Sanguisugum* Gordoni de Asthmate; *Pseudo-Asthma* Alex. Benedicti Lib. III. cap. 33. *Asthma spurium* Riverii Lib. VII. cap. 1. *Asthma continuum* Car. Pilonis & Floyeri, *Dyspnœe*; *courte haleine*.

Est morbus cuius præcipuum symptoma est anhelatio frequens, cum ægritudine ebionica, non intermittenti, sine signis hydrothoracis, nec empyematis.

In febribus & phlegmasiis est anhelatio frequens, respondens pulsus ipsi frequentiori, sed quæ non est præcipuum symptoma. In orthopnoea ægritudo est acuta, in asthma intermittens; in hydropibus, ut ascite, tympanite, præcipuum symptoma est abdominis intumescencia, ut in phisconia & graviditate; hinc pater quomodo dyspnœa genus sit ab aliis distingui, ærum quo pacto ab hydrothorace & empyemate pos- se distingui, dictu difficile est: Vide *Hydrothoracem*, &c.

Dyspnœa sumitur a Veteribus, ut asthma ab Arabibus, pro designanda hæc classe, seu anhelationis difficultate.

1. Dyspnœa pituitosa, Hydropneumonia; *OEdema de pulmonis*; C.

Est ea species quæ agnita, seu lymphapul-

monem relaxante & insarciente pendere cre- ditur.

Difficile est eam ab hydrothorace distingue- re, nisi tamen hydrothorace percipitur fluctuatio aquarum, agitato ægri thorace, quod signum in dyspnœa non adest: de cætero adest pallor faciei, pedum vespertina intumescencia œdematosa, copiosa muci expectoratio, temperamen- tum pituitosum, levamen ab expectoratione: difficultas respirandi crescit a situ horizontali, maxime a supino; præcesserunt morbi pectoris inflammatorii, catarrhosi.

*Cura*. Indicantur levia aperientia, quæ phlegma viscidum pulmonum vasa insarciens resolvant, & diuretica quæ foras serum luxurians educant; caveatur a cathartici quæ nimium commovendo anhelationem augeant: convenit itaque gummi ammoniaci drachma cum octo granis tartari vitriolati, in pauxillo vini albi solvatur gummi, & omni mane sumatur, superbibendo uncias tres decocti hæcchazum juniperi, foliorum matrubii, & pulmonariæ Italorum; vespere adhibeatur tartarus vitriolatum eum aqua hyssopi; ad anacathartism juvandam syrupi de tabaco cochlear unum, vel sperma ceti in oleo amygdalarum soluti, aut eum saccharo contriti ad scrupulum; dein pillulæ balsamicæ ad drachmam usurpentur ea balsamo Peruviano, extracto florum hyperici, gummi guaiaci & succo glycyrrhizæ, superbibendo jusculum, vel levem osam deglutiendo.

Æger alternis utatur ossis, & juseulis, aer incenso storace, benzoino, thure, salubrior red- datur &c.

2. *Dyspnœa a tuberculis* Boneti Sepulchret. obs. 39. 40. &c. *A scirrhopericardii* Diemerbroeck, *Ab exsiccatis pulmonibus* Sennert. prax. lib. 2.

Tuberculum vovo scirrhum pulmonis; quippe dantur similes tumores qui nunquam in suppuratum abeunt, & tubercula cruda vocantur. Memini me vidisse in cadavere mendicis dyspnœici, qui nullum pus unquam exspuiverat, de cætero emaciatus, & hædica dudum labo- rans obierat, totum pulmonem nigrum & scirrhosum. Vide *Phthisim siccam*.

A spiritus frumenti abusu frequens est hic morbus apud Saxones; inde enim scirrhus pulmonum, dampnè Saxonibus dictus: *Haller Olysiæ*, lib. 5. pag. 27.

Qui dyspnœa paulatim contabescunt, si eo- rum pectus aperiat, illis nullum ulcus in pulmone apparet, sed pulmones veluti fumo exsiccati conspiciuntur, ait *Sennertus de pulmo- nis intemperie sicca*. Cognoscitur vero hic affe- ctus respiratione parva & frequenti, siti con- tinua, ipso paucio. Huic obnoxii sunt Auri- fabri & Chymici ob halitus, quibus pulmones exsiccantur; hunc morbum *Paracelsus* vocat *Bersuchs*, & memorat *Schenckius* Epist. 72.

3. *Dyspnœa calculeosa* Bonet. Sepulchret. obs. 44. 46. &c. *a calculis pulmonum* Fabricii Hil- dani Cent. II. Obs. 29. *Schenckii* Lib. II. pag. 146.



Ut scirrhi obdident non raro glandulas bronchiales, ita quandoque in illis glandulis generantur calculi durissimi, inæquales, scabri, lentis magnitudine, qui tussiendo ejiciuntur, nec semper phthisim inducunt.

In pulmone dyspncici lapillos minutos, friabiles, casei veteris fragmentis similes inventos dicit *Salmuth. centur. 1. obs. 7.* Ego veros calculos gypseos expectoratos habeo; similes in Cardinalis Cajetani pulmone viros narrat *Crucius. Vide* numerosas observationes similes apud *Bonnetum Sepulchret. obs. 46.* Huc pertinet dyspncæ a metallis in pulmone coneretis *eiusdem obs. 44. ex Gregorio Hæstio lib. 7. obs. 25. & ex Sennerto.*

In his casibus lacticia tanto magis indicantur, quo frequentius est maciem & hectiæm accedere: pro dissolvendo vero calculorum sapo videtur convenire; aut in concretis metallicis *Mangetus & Hæstius* laudant mercurium dulcem.

4. *Dyspncæ ab hydatidibus* Boneti Sepulchret. obs. 33. 36. Schenckii Obs. de vesiculis tussii rejectis, p. 249. G.

Vix cognoscitur hæc species ante extipicium; adeo respiratio celer, frequens, difficilis; inspiratio tamen difficilior; accedit sitis, pervigilium, rubedo genarum, febris hectica, sputum paucum, sanguinosum, non purulentum; secto cadavere inventæ sunt vesiculæ in toto pulmone, aqua flava turgidæ, observante *Læzio a Fonte consult. 2.* vel humore lento pelucido instar albuminis ovi turgent hydatides, ut vidit *Mangetus.*

5. *Dyspncæ a steatomatis* Boneti Sepulchret. obs. 34. obs. 5. a carcinomate Jacotii in coacas; a glandulis, & c. Vide orthopnœam a lipomate. C.

Differunt steatomata pulmonum a tuberculis duris, ex eo quod tubercula scirrhusa glandulas bronchiales obdident in angulis bronchiorum; steatomata vero alibi enascantur, nec dura sunt.

Steatomata quæ in cavo bronchiorum crepant, & suum solum effundunt, vomitum pulmonum constituunt, de qua inter species phthiseos agemus; sæpe vero mella sui signa characteristica præbent steatomata.

6. *Dyspncæ a vomica* Boneti Sepulchret. tom. 1. obs. 25. pag. 365. *Vomica pulmonum* Villii, Ballini, & c. *Vomique du poumon.*

*Vomica* dicitur cystis, vel folliculus materia puriformi turgidus; nec proinde discrepat ab steatomate nisi paulo majori fluxilitate materie contentæ, & quod steatoma vocetur, cum partes externas obducat; differt vero ab apostemate, quod materies sit ab inflammatione oriunda in apostemare, verumque pus; aut in vomica & steatomate mucus quidam adiposus calore liquefactus, qualis in vesicis hydatidosi viscerum toties observatur; cum itaque folliculus glandulosus, vel capsula valis lymphatici dilatatur, vel cellula adiposa turgescit, sensim-

que erefcit, fit vomica, quæ in pulmone genita nullam vel exiguum febrem excitat, parvam, lenteque per annos crescentem dyspncæm creat, cum tussicula sicca, usqueque demum rupto folliculo, vel pus copiosum foras anacatharsis expectoratur, & fit phthisis a vomica dicta; vel in cavum pectoris effunditur, unde empyema; vel intervallis costarum protuberans extorsum aperitur; vel consensum pulmones intus aggravans pure viscido obstruens ægrum subito necat.

Signa dyspncæ a vomica pendentis sunt obscurissima: æger languet, tussie, lecto non affigitur, dolorem obscurum alicubi in pectore percipit, maxime cum vehementer tussire conatur; quandoque sub finem paucillum puris foetidi expectorat sine febre, aut cum febre exigua; anxius, trillis: sunt qui quotannis vomica minori rupta pus cum febre expectorant, & convalescunt in intervallis: sunt qui subito pus & sanguinem consensum expectorant ad plures libras, & tunc phthisici evadunt, ex qua tamen phthisi speciali evadunt, si folliculum expectorato sensibili folliculo, ut *Villii* observata docet, & ipse vidi. Qui suadent emetice ad rumpendam vomicam, minime timent ne æger rupta subito vomica suffocetur, ut accidit *Vatgesio* aliisque.

7. *Dyspncæ a phthisonia*, Vide Bonet. Sepulchr. tit. de dyspncæ ob molem hepatis, ejusque protrusionem versus diaphragma obs. 12. & 172. ob renis molem nimiam, obs. 141. a massa carnea crinita in abdomine, obs. 143. ab onete crassiori, obs. 158. ab insigni mesenterii tumore, obs. 156. L.

8. *Dyspncæ a gravitate*, Bonet Sepulchr. Obs. L.

9. *Dyspncæ tympanitica*, Bonet Sep. Obs. 147. 143. 150. a flatu in intestinis, abdomine, & c. G.

10. *Dyspncæ rachitica*, Bonet. Sep. Obs. 116. a costarum extremis ossibus, Plater Pr. Lib. I. cap. 4. a sterni prava conformatione, Riolan. Euch. a cartilagineo infirmi ossa, longa, Diemerbroeck Lib. IX. c. 14. ab ossificata pleura Schenckii; ab ossificatis bronchiis, D. Deidier Observ. L.

11. *Dyspncæ a cordo*, Boneti Sep.; a corde capitis magnitudinem adepti, Ballon. Epid. Lib. II. p. 144. a cordo polyphysarico, id. ibid.; *Villii* Traët. de hysteria, Tulpus Obs. Lib. I. c. 172. a corde adiposo nimis ample Bonet Sep. Obs. 103. ab auricularum aneurysmate, *Horsii* 3. P. de Marchetis. C.

Dyspncæ palpitatioque sunt fortiores obstruæis vel distensis partibus finitris cordis, ut auricula vel sinu, quam dextris; Vide *Albertini* *Atl. Acad. Bonon.* 1731.

12. *Dyspncæ a pneumatia* Riolan. Enchirid.; ab emphysemate pulmonis, Bonet. Sep. Obs. 131. Vide Asthma equinum Floyeri Append. C.

*Pneumatia Hippocratis* est flatuum collectio intra thoracem, vel thoracis tympanites.

Femina, 30. annos nata, difficillima respiratio, tussis interdum fere suffocativa laborabat; ant-

tibyltericis morbus exasperabatur; pulsus erat inaequalis, parvus; respiratio sublimis, brevis, pulmones in expiratione sursum trahi & natate agere videbantur, minima mutatio tempestatum symptomata adaugebat. In pulmonibus inventus est aer per membranam cellulosa dispersus, hinc inde vero vesicae elasticas pugno maiores referebat; pulmo in terram projectus vi elastica resiliabat; hic morbus phthisis aerea a *stercis* vocatur: subleabatur phlebotomiis, pectoricis, emollientibus & bechicis. Vide *Storacium Ann. Méd. II. pag. 239.* Lac cum infuso seminum, carvi & feniculi alias profuit.

13. *Dyspnœa a stomacho*, Bonet Sep. Obs. 142. 143. ab *agagripila in ventriculo*, Charleton de Ech. 1. ab *abscessu ventriculi*, Pifo de morbo, a colluv. fer. Lib. III. cap. 4. D.

14. *Dyspnœa a liene*, Bonet. Sep. Obs. 152. 155. ab *abscessu juxta lienem*; a *lienis mole aduqua*, a *liene dura*, luxato, &c. C.

15. *Dyspnœa traumatica* Tulpii; a *lato magno pectorali musculo* Mery Mem. de l'Acad. R. de Sc. 1715. *contuso*, *illa thoraci* & *quintus pedus subante* & *infuso errore intra cavum thoracis*. Vide Heister Vulus Thoracis; *Emphyema sanguineum* Chirurgorum. A.

#### 16. *Dyspnœa Galenica*.

Est ea quam inducere per elegans experimentum *Galenus* tentavit in brutis; ligatis scilicet aut resectis nervis diaphragmaticis, vidit ille dyspnœam supervenire; cum enim sic debilitato diaphragmate totum respirationis opus incubat exsequendum ab aliis muscularis, isti soli destituti difficilius opus exsequuntur. Idem accidit intactis nervis, si minor sit fluidi nervi quantitas, ut in convalescentibus; actionis enim difficultas crescit, prout potentia motrix minor est sub eadem resistentia; hinc sit ut convalescentes, cum non possint solite amplitudine respirationem percipere, minores, sed tantumdem frequentiores respirationes insistant.

17. *Dyspnœa a gastrocele*, Vandermonde Novembr. 1758. pag. 518. D. Bonnet Cbirurg. a Limoux, Collect. Acad. tom. 3. pag. 697. L.

Monialis a quindécim annis laborabat dyspnœa post passum recrudescere, & saepe astumptorum vomitione. Inventum est post mortem stomachus intra cavum pectoris.

In adolescente qui a sumpta liberaliori cerevisia turbida multum eiecerat materiam pici similis, & obierat, inventus est stomachus ab ortu in cavo sinistro pectoris locatus; ita ut pylorus ad clavículas usque ascenderet; mirum autem quod respiratione libera gavisus esset, nec nisi post liberaliorem potationem momentanea suffocatione premeretur. Vide hujus historiam apud *Th. Bartheolinum*, cent. 6. Hist. anat. 5.

Civis Monspeliensis, Rai dictus, ab ortu etiam gerebat stomachum in pectoris civitate sinistra, licet exigua difficultate respirandi oppressus, ita ut militiam satis comode exercisset; in eo vero pectoris cavo pulmo deerat. *Reverii obs. 67. centur. 3.*

Alesia similis gastrocele observata est in praegranda muliere; quam recte valentem vidi.

18. *Dyspnœa scorbutica* Sennert. de signis scorbuti; *Eugalen. obs. 6. 7. 8. &c. Lind. de Scorb. C.*

Difficilis respiratio & pectoris angustia, frequens scorbuti symptoma est, cuius principium ipsi aegri abdomine indicant quasi status diaphragma sursum pellerent; tanta est illa angustia, ut aegri unice de hac conquerantur, lipothymiamque ex ea metuant, necnon visus obscuratorem jam patiantur, & animam statim reddituri videantur; ea dyspnœa brevis intervallis recurrit, dein augetur, vel remittit; nulla tamen adest tussis, nullus stertor, sibilusve; post validum exercitium illa dyspnœa augetur ad lipothymiam, & visus obnubilationem, ita ut aegri non agnoscant adstantes. *Quod* addit ab hac dyspnœa scorbutica quandoque subito e medio tolli sine ullo pectoris dolore.

19. *Dyspnœa aneurysmatica*, Morgagni Epist. XVIII. 17. &c.

Ab aneurysmate aortae supra cor, quod *Malpighius* & *Ramazzinus* non cognoverunt, nisi cadaveris extispicio, licet aegrum rite medicantes; Post tussim siccam, diuturnam, accessit dyspnœa, & dein per paroxysmos recurrebat orthopnea, fere strangulans, sine febre; angor ex deglutitione; sensus auras ex hypochondriis ascendentes; hinc suspicio hypochondriacis; nullum levamen nisi a situ capitis & pectoris antrosum inclinati; aneurysma premens oesophagum hac symptomata inferebat. Vide *Cardiogramum* & *Palpitationem*.

20. *Dyspnœa polypsea* Clar. Dalbis Journ. de Méd. Juill. 1759.

Ea est quae fovetur a concretionem polypsea in bronchiis tereti ramosa quam anacatharsis rejectam observavit Author. Vide *Tassin*.

#### 21. *Dyspnœa plethorica*.

Mulier a duobus annis ita suffocabatur ut qualibet die necessum foret ter saltem venam tondere, & bis mille phlebotomias passa erat cum morbo historia Monspelium pervenit; qua audita suavit *D. Chaptal* ut aegra in balneo calido tepius elueretur, additis frictionibus, ut cutis, vernice velut obducta, libere perspiraret, & sic reverteretur illa plethora ab adiuvantia procedens; quo solo remedio intra decem dies aegra convaleuit.

22. *Dyspnœa ab aorta angustia*, Morgagni Epist. XIX. 51.

Virgo parum menstruata, quoties se movebat dyspnœa laborans, tandem suffocata & convulsa perit. Aortae parietes, juxta cor crassiores, ejus cavum angustabant, unde pulmones copioso sanguine obruti, quod in gressu & motu arrium accidebat, eo sanguine viz liberare se poterant, cum aorta quantum emitterent pulmones non posset transmittere sanguinem.

VIII. ASTHMA dicitur ab *ασθμα* Græce, *anhela*; *Susprium* Cæli & Senecæ; *Asthma*, *Puffa*.

Est chronica, periodica respirandi difficultas, asthmatis præcipuum symptoma.

Differt a dyspnoea, quod ista continua sit; ab orthopnoea, quod ista sit acutus morbus.

Asthmatici dicuntur Gallice *Asthmatiques*; de jumentis vero dum agitur, *pouffis*, Anglice *Broken-Winded*.

Asthmatis in genere principium morbosum & proximum est obex periodice recurrens pulmonum alteratur dilatationi & contractioni oppositus, circulationi vero sanguinis vix noxius; hunc obicem natura fortioribus respirandi conatibus removere, corrigere; sputum sæpe viscidum tussis interventu expectorare contendens paroxysmos efficit; principii morbosici, & conatum eorum naturæ concursus causam morbi constituit; cum conatus naturæ pacati vel iotopolati sunt, nec ita vehementes ut virium vitalium magna iactura ad diversio subsequatur, morbus diurnus esse potest, non vero acutus; morbus vero diuturnus est potius quam chronicus asthma, cum in genere vix vitæ periculum portendat, saltem asthma vulgare, quod usque ad mortem cum ægro confenescit.

1. *Asthma humidum*, Riverii praxis; *asthma pneumonicum* VVilligii; *humorale* Baglivi; *asthma fluctuans* John. Floyer. tractate of the asthma; *asthma spiritus or humid ejusdem*; *asthme ordinaire*, P. C.

Floyer Medicus Anglus cum triginta annos hoc morbo laborasset, de eo scriptum librum exitum, ex quo morbi descriptionem erare consultum duxit.

*Præliudium*: Pridie accessus stomachi plenitudo, rectus insipidus, præcordiorum angustia, flatibus stomachi expansis tribuenda; succedit fervor sanguinis, calore enim levis angitur æger; vino, igne, tabaco se incallescere percipit, frigidum potum stomachus ejus sublevar, cauterium si adhit, dolet, calet, crucietur; caput stupet, leviter dolet; somnolentia, pandiculatio, oscitatio, & noctu copiosæ urinæ aquosæ mittio, quæ intense colorata post accessum cum sedimento; accedit artuum gravitas, anxietas, caput veluti fumo plenum videtur; inspiratio difficilis perfitur, raucescit vox, diaphragma ægre descendere videtur, labore in acre inspirando exerit æger, tussis convulsiva licet, vel quid paucum viscidum extrudens, in fine vero accessus multum.

*Invasio*: Hora circiter secunda matutina, potius confringi, diaphragma sursum trahi, rigescere videtur, non nisi cum labore deprimitur, alt multo major est difficultas costas elevandi; postque dilatandi, ad quod concurrere opus est multos lumborum & scapularum; æger e lecto surgere cogitur, inspiratio difficilis est, multo magis quam expiratio, quæ ideo lenta & tarda; asthmaticus vix potest tussire, exspuere,

nare vomerem, aut loqui; stertor vel raucitas in expiratione apparet; alterutri lateri difficilis incumbit, & deia ex eodem pulmonis latere sputa procedunt; flatulentia stomachi crescit, & inspirationi partim obstat, si accessus sit intensus, vomitus biliosus concurret; frigida appetantur; calida ut vinum flatulentiam augent; sæpius accessus invadit vacuo ventriculo post cartharum, jejuniæque; si vero stomacho bene pasto accidat, diutius durat, & iocensior est. Asthmaticus incalcescit ad sudorem uique cum pulsu celeri, licet inæquali; febricula illa a lacte intenditur; surgens e lecto alvum pluries deijcit cum flatibus.

Accessu perseverante pulsus debilis & intermitens est, manus & pedes frigidæ, facies livescit, accedunt cardiacæ & palpitantes, deglutitio difficilis evadit & sonora, ructuosa. Labia stragentis instat disponuntur, oculi prominent, & lachrymas profundunt sine mœre, oculorum ambitus cutaneus livet, musculi subdant, motus artuum languet, dein caput dolet, turgidum est, & phantasmatis ut in insomnio delusum, somnolentia ægrum invadit, sed erebras vel in sedili sedens vix somno indulgere valet, in alterutrum latus vel antrosum inclinato capite, non vero retrorsum; a cubiculo angustiore, ab igne, a pulvere multum læditur, nec non a parvis odoribus, a vino, ab illis quæ pectori incumbunt; dantur accessus ephemeri seu qui intra paucas horas sputo viscido terminantur, quales accidunt initio morbi antequam periodos stabiles acquirat; accessus ut plurimum tres, quatuor, vel quinque dies dixerant, quibus elapsus æger expectatur usque ad sopientem accessum; accessus sexaginta hieme, viginti circiter æstate patiebatur Floyer, ætate accessus intensiores erant, & longiores hibernis; quo longiores accessus fuer, cointervalia longiora & reciprocæ; ad phases lunæ nunc hæc nunc illas intenduntur accessus; regela sententibus quis nec non vento orientali flante, revertuntur quibusdam.

*Cura* asthmatis humidi seu fluctuanti juxta Floyerum, alia in paroxysmo, alia extra paroxysmum.

1. *In paroxysmo*, clymate præmissis, vomitorium leve ex oxymelitis scilicet semuncia cum oleo amygdalarum, vel ex seminum raphani drachma semisse, ventriculum exonerat, & accessum asthmatis sæpe fugat; fortiori emetica anhelationem intendunt. Phlebotomia mire levat, sed in extrema anhelatione est adhibenda, non in vulgaribus accessibus; ne successu temporis hydroper accerfat. Potus refrigerans & diluens adhibeatur, ut infusum panis tritici, aqua levissime acidulata sale prunellæ, vel nitro, vel sale ammoniaci, vino, limonata, serum lactis, decoctum hordei; vesicatoria humeris, tibialibus apponunt Angli ad serum derivandum. Hora somni vel syrupus papaveris vel laudanum liquidum parva dosi propinetur: prima saltem die iusculis aut cremoribus tantum utatur, Immo duobus sequentibus diebus, si vehementer sit anhelatio; dein ossis, oris cum multo aceto, pane vino quatuor

tibystericis morbus exasperabatur; pulsus erat inaequalis, parvus; respiratio sublimis, brevis, pulmones in expiratione sursum trahi & natate aegre videbantur; minima mutatio tempestatum symptomata adaugebat. In pulmonibus inventus est aer per membranam cellulofam dispersus, hinc inde vero vesiculae elasticae pugno manes referebat; pulmo in terram projectus vi elastica resilliebat; hic morbus phlebitis aerea a *Storckio* vocatur: subleuabatur phlebotomiis, paracoricis, emollientibus & bechicis. Vide *Storckium Ann. Med. II. pag. 239.* Lac cum infuso seminum carvi & feniculi alias profuit.

13. *Dyspnoea a stomacho*, Bonet Sep. Obs. 142. 143. ab *agregipile in ventriculo*, Charleton de Ech. 7. ab *abscessu ventriculi*, Pifo de morb. a colluv. fer. Lib. III. cap. 4. D.

14. *Dyspnoea a lieno*, Bonet. Sep. Obs. 154. 155. ab *abscessu juxta lienem*; a *lienis mole adhaesiva*, a *lieno duro*, *luxato*, *Spe. G.*

15. *Dyspnoea traumatica* Tulpii; a *laso magno pectorali musculo* Mery Mem. de l'Acad. R. de Sc. 1713: *confuso*, *illa thoracis* & *uniore costae subeunte* & *infuso cruore intra cavum thoracis*. Vide Heister *Vulnus Thoracis*; *Emphyema sanguinem* Chirurgorum. A.

16. *Dyspnoea Galenica*.

Est ea quam inducere per elegans experimentum *Galenus* tentavit in bruciis; ligatis scilicet aut resectis nervis diaphragmaticis, vidit ille dyspnoeam supervenire; cum enim sic debilitato diaphragmate totum respirationis opus incumbat exsequendum ab aliis musculis, isti soli destituti difficilioris opus exsequuntur. Idem accidit intactis nervis, si minor sit fluidi nervi quantitas, ut in convalescentibus; actionis enim difficultas crescit, prout potentia morrix minor est sub eadem resistentia; hinc sit ut convalescentes, cum non possint solite amplitudine respirationem percipere, minores, sed tantumdem frequentiores respirationes instituunt.

17. *Dyspnoea a gastrocele* Vandermonde Novembr. 1758. pag. 518: D. Bonnet Chirurg. a Limoux. Collect. Acad. tom. 3. pag. 697. L.

Monialis a quinquagesimo annis laborabat dyspnoea post partum recrudescens, & saepe astumptorum vomitione. Inventum est post mortem stomachus intra cavum pectoris.

In adolescente qui a sumpta liberaliori cerevisia turbida multum ejecerat materiae pici similis, & obierat, inventus est stomachus ab ortu in cavo sinist. pedosis locatus; ita ut pylorus ad clavículas usque ascenderet; mirum autem quod respiratione libera gavissus esset, nec nisi post liberaliorem potationem momentanea suffocatione premeretur. Vide hujus historiam apud *Th. Bartolinum*, cont. 6. Hist. anat. 55.

Civis Monspeliensis, *Ras* dictus, ab ortu etiam gerebat stomachum in pectoris civitate sinistra, licet exigua difficultate respirando oppressus; ita ut militiam facis commode exercitaret; in eo vero pectoris cavo pulmo deerat: *Riverii* obs. 67. centur. 3.

Aesiae similis gastrocele observata est in praegrandi muliere; quam recte valentem vidi.

18. *Dyspnoea scorbutica* Sennert. de signis scorbuti; *Eugalen. obs. 6. 7. 8. &c. Lind. de Scorb. C.*

Difficilis respiratio & pectoris angustia, frequens scorbuti symptoma est, cujus principium ipsi aegri abdomine indicant quasi flatu diaphragma sursum pellerent; tanta est illa angustia, ut aegri unice de hac conquerantur, lipothymiamque ex ea metuant, necnon visus obscuracionem jam patientur, & animam statim reddituri videantur; ea dyspnoea brevibus intervallis recurrit, dein augetur, vel remittit; nulla tamen adest tussis, nullus stertor, sibilusve; post validum exercitium illa dyspnoea augetur ad lipothymiam, & visus obnubilacionem, ita ut aegri non agnoscat adstantes. *Lind* addit ab hac dyspnoea scorbuticos quandoque subito e medio tolli sine ullo pectoris dolore.

19. *Dyspnoea aneurysmatica*, Morgagni Epist. XVIII. 17. &c.

Ab aneurysmate aortae supra cor, quod *Malpighius* & *Ramazzinus* non cognoverunt, nisi cadaveris extispicio, licet aegrum rite medicantur: Post tussim siccam, diuturnam, accessit dyspnoea, & dein per paroxysmos recurrebat orthopnoea, sere stragulans, sine febre; angere ex deglutitione; sensus aures ex hypochondriis ascendentes; hinc suspicio hypochondriacos; nullum levamen nisi a situ capitis & pectoris antorsum inclinati; aneurysma premebat phragmum hac symptomata inferebat. Vide *Cardiogramum & Palpationem*.

20. *Dyspnoea polyposa* Clar. Dalbis *Journ. de Med. Juill. 1759*.

Ea est quae fovetur a concrecione polyposa in bronchiis tereti ramosa quam anacatharum rejectam observavit Author. Vide *Tassim*.

21. *Dyspnoea plethorica*.

Mulier a duobus annis ita suffocabatur ut qualibet die necesse foret ter saltem venam tondere, & bis mille phlebotomias passa erat cum morbi historia *Monspeliensis* pervenit; qua audita fuit *D. Chaptal* ut aegra in balneo calido saepius elueretur, additis frigidioribus, ut catas, vernice velut obdusa, libere perspiraret, & sic averteretur illa plethora ab adiuvantia procedens; quo solo remedio intra decem dies aegra convaleuit.

22. *Dyspnoea ab aorta angustia*, Morgagni Epist. XIX. 51.

Virgo primum menstruata, quoties se movebat dyspnoea laborans, tandem suffocata & convulsa perit. Aortae parietes, juxta cor crassiores, ejus cavum angustabant, unde palmones copioso sanguine obruti, quod in gressu & motu artuum accidit, eo sanguine vix liberare se poterant, cum aorta quantum emitterent pulmones non posset transmittere sanguinem.

VIII. ASTHMA dicitur ab *astho* Græce, *anhelo*; *Suspensum* Celsi & Senecæ; *Asthma*, *Pouffe*.

Est chronica, periodica respirandi difficultas, asthmatis præcipuum symptoma.

Differt a dyspnœa, quod ista continua sit; ab orthopnœa, quod ista sit acutus morbus.

Asthmatici dicuntur Gallice *Asthmatiques*; de jumentis vero dum agitur, *pouffes*, Anglice *Broken-Winded*.

Asthmatici in genere principium morbosum & proximum est obex periodice recurrens pulmonum alterius dilatationi & contractioni oppositus, circulationi vero sanguinis vix noxius; hunc obicem natura fortioribus respirandi conatibus removere, corrigere; spiritum sæpe viscidum tussis interventu expectorare contendens paroxysmos efficit; principii morbosissimi, & conatum eorum naturæ concursus causam morbi constituit; cum conatus naturæ pacati vel interpolati sunt, nec ita vehementes ut virium vitalium magna jactura ac diverso subsequatur, morbus diurnus esse potest, non vero acutus; morbus vero diuturnus est potius quam chronicus asthma, cum in genere vix vitæ periculum portendat, saltem asthma vulgare, quod ut plurimum cum ægro confenescit.

1. *Asthma humidum*, Riverii praxis; *asthma humectivum* Villisii; *humectate* Baglivi; *asthma flaccidum* John. Floyer, tractat. de curæ asthma; *asthma spiriting* or *humid* ejusdem; *asthma ordinare*. P. C.

Floyer. Medicus Anglus cum triginta annos hoc morbo laborasset, de eo scriptum librum exitum, ex quo morbi descriptionem erare consultum duxi.

*Præliudium*: Pridie accessus stomachi plenitudo, reclusi insipidi, præcordiorum angustia, flatibus stomachi expansis tribuenda; succedit fervor sanguinis, calore enim lectili angitur æger; vino, igne, tabaco se incallescere percipit, frigidus potus stomachus ejus sublevar, cauterium si adit, dolet, calet, cruentatur; caput super, leviter dolet; somnolentia, pandiculatio, oscitatio, & noctu copiosæ urinæ aquosæ mitti, quæ intense colorata post accessum cum sedimento; accedit artuum gravitas, anxietas, caput veluti fumo plenum videtur; inspiratio difficilis persistitur, raucescit vox, diaphragma ægre descendere videtur, laborem in acre inspirando exierit æger, tussis convulsiva sicca, vel quid paucum viscidum extrudens, in fine vero accessus multum.

*Invasio*: Hora circiter secunda matutina, potus coarctatur, diaphragma sursum trahi, rigescere videtur, non nisi cum labore deprimatur, aut multo major est difficultas costas elevandi potiusque dilatandi, ad quod concurrere opus est musculos lumborum & scapularum; æger e lecto surgere cogitur, inspiratio difficilis est, multo magis quam expiratio, quæ ideo lenta & tarda; asthmaticus vix potest tussire, exspuere,

nares emungere, aut loqui; stertor vel raucitas in expiratione apparet; alterutri lateri diffusi cilii ingambit, & dein ex eodem pulmonis latere sputa procedunt; flatulentia stomachi crescit, & inspirationi partim obstat; si accessus sit intensus, vomitus biliosus concurrit; frigida appetuntur; calida ut vinum flatulentiam augent; sæpius accessus invadit vacuo ventriculo post cartharum, jejuniūve; si vero stomacho bene pasto acidat, diutius durat, & intensior est. Asthmaticus incalcescit ad sudorem usque cum pulsu celeri, licet inæquali; febricula illa a lacte intenditur; surgens e lecto alvum pluries dejicit cum flatibus.

Accessu perseverante pulsus debilis & intermittens est, manus & pedes frigescent, facies livescit, accedunt cardiacæ & palpitantes, deglutitio difficilis evadit & sonora, ructuosa. Labia refrigerant instar disponuntur, oculi prominent, & lachrymas profundunt sine morore, oculorum ambitus cutæque livet, muscoli subdant, motus artuum languet, dein caput dolet, erigidum est, & phantasmatis ut in insomnio delusum, somnolentia ægrum invadit, sed etæus vel in sedili sedens vix somno indulgere valet, in alterutrum latus vel antrosum inclinatio capite, non vero retrorsum: a cubiculo angustiore, ab igne, a pulvere multum lædatur, nec non a parvis odoribus, a vino, ab illis quæ pectori incumbunt, dantur accessus ephemeri seu qui intra paucas horas spuito viscido terminantur, quales accidunt initio morbi antequam periodos stables acquirat; accessus ut plurimum tres, quatuor, vel quinque dies divexant, quibus elapsis æger expectoratur usque ad inequentem accessum; accessus sexaginta hieme, viginti circiter ætate patiebatur Floyer, ætati accessus intensiores erant, & longiores hibernis; quo longiores accessus fuere, coarctata longiora & reciprocæ; ad phases lunæ nunc has nunc illas intenduntur accessus; regelascentibus aquis nec non vento orientali flante, revertuntur quibusdam.

*Cura* asthmatis humidi seu flatulenti juxta Floyerum, alia in paroxysmo, alia extra paroxysmum.

1. *In paroxysmo*, climata præmissa, vomitorium leve ex oxymelitis scillitici seminiola cum oleo amygdalarum, vel ex seminum raphani drachma semissis, ventriculum exonerat, & accessum asthmatis sæpe fugat; fortiora emetica anhelationem intendunt. Phlebotomia mire levat, sed in extrema anhelatione est adhibenda, non in vulgaribus accessibus, ne successu temporis hydroperem accersat. Potus refrigerans & diluens adhibeatur, ut infusum panis tosti, aqua levissime acidulata sale prunelle, vel nitro, vel sale ammoniaci, vino, limonata, serum lactis, decoctum hordei; vesicatoria humeris, tibiisve appoint Angli ad serum derivandum. Hora somni vel syrupus papaveris vel laudanum liquidum parva dosi propinetur: prima saltem die iusculis aut cremoribus tantum utatur, immo duabus sequentibus diebus, si vehementer sit anhelatio; dein ossis, ovis cum multo aceto, pane vino equato

utatur. Linctus fit ex oleo amygdalarum & syrupo papaveris ana, uncia, oxymelitis scillitici semi-uncia, sacchari candidi drachmis duabus, capiat cochllear bis vel ter in die; pro syrupo asthmatico misce syrapi de althæa, deerylismo, de prænio, ana, uncias duas, oxymelitis scillitici, & aquæ bryoniæ compositæ, ana, unc. unam, balsami peruviani drachmam semissem, sumat mane hujus cochllear. Copiosius usum aquæ cum paxillulo nitri & salis ammoniaci, æque vespere semicochllear acetii scillitici cum oleo amygdalarum pectus ut plurimum sublevar.

Zacchius in vehementi accessu laudat croci grana decem, moschi granum unum, in cyatho vini optimi.

2. *Ad paroxysmi præventendos.* Vomitus ope acetii scillitici cum oleo, vel decocti seminum raphani, vel cardui semel in mense, si accessus frequenter recurrant, secus semel vel bis in anno; sed vespere emetici vel cathartici pægoricum non est omittendum; clystima semel in hebdomada iteretur; cathartici vulgaris est in usum semel, hisve potius vomitorum vocanda, vel semel intra quatuordecim dies, si intra illud tantum intervallum recurrat asthma; si asthma catarrhale fuerit, decoctum sudorificum leve adhibeatur. Diuretica minus videntur indicata cum asthma in diabetem sæpe vergant; ad corrigendam & statulentam cacochymiam potus fit ex decocto hordei, sero lactis pro junioribus; lac asinum spuma sæpe incrassat; rari sunt, quos potus aquarum Batheni sum juvet. Optimus victus est ex carne elixa vel assa, potus ex aqua, addito pro senescentibus vini paxillulo; vestimenta denso calore intendunt, frigus spuma incrassat, moror accessus excitat, exercitium minime negligendum. Amara stomacho profunt, sed levissima usurpanda sunt. Plures urinæ suæ potus asthmaticos juvat; satius est sal ammoniacum adhibere multa aqua dilutum; chalybeata, victuifica, omnia adstringentia nocent asthma. Galenus laudat aloem in aceto solutam, & recte monet morbum esse potius in paroxysmo blandiendum quam curandum; ita ut abstinendum sit juxta *Septatium* ab emeticis, ne ægrum suffocent, a catharticis, immo ab enematis: ipsemet *Flogerius* tentatis omni generis remediis minime convalescit.

Asthma vulgare quod in scholis humidum dicitur minime pendet a laxitate pulmonum, ut vulgo dicitur, & ratione temperamenti restatantis potest dividi in pituitosum, & in sanguineum; aut in pituitoso ipso, calefacientia, exsiccantia sæpe nocent, ut patet ex historia asthma *Flogerii*.

2. *Asthma Convulsivum* VVillisi de asthma cap. 12. Baglivi lib. 2. pag. 203. Boerhaave Consult. *Asthma oculorum*, situm Ettmulleri pag. 162. Aretæi lib. 3. cap. 11. ex Frider. Hoffmanno; *Asthma convulsivum a scabie* Frid. Hoffmanni. T. III. pag. 98. P. C.

Distinguitur ab humido 1. quod subito accessus ægrum contrahat; 2. quod a dolore seu cramp-

po cujusdam parris pectoris ineat, maxime si quædam pars pectoris olim vulnus vel scum passa fuerit; 3. quod violenta sint symptomata; sed nullum est certius signum quam si aliarum partium convulsio addit, aut præcesserit; illud vero asthma vix ullam anacatharsin accersit. *Villisius* putat materiem hujus morbi sicam non esse in pulmonibus, sed in nervis musculis thoracis adnatis, unde illud asthma non esse pulmonare contendit.

Hanc speciem Helmontius vocat *caducum pulmonis*, id est *epilepsiam pulmonis*, ut ait Baglivi. Vide Helmontium de asthma sum. 14. Vide descriptionem ab Aetæo traditam. Vide *crampum diaphragmatis* Lindani.

Adolescentes illi, dives, æles toto ad coram uti solitus, a cæna ledum perens, post primum somnum expergestus, immani dyspnœa & anxietate correptus, moriturus statim videbatur, intra horam sine medicamine, sine evacuatione immunis evasit; tales tales paroxysmos quotannis sub autumnii initium patiebatur: hæc Londini passus, Belgium reversus, ibi paroxysmi, frigore suscepto, revertebantur, aut expectoratione superveniente levabatur, usus exercitio & medicamentis pectoralibus; paroxysmus typum fixum induens per octo vel decem dies perleverat, intervallis omnino variis; phenomena paroxysmi sunt ingens constrictionis sensus circa scrobiculum cordis, inflatio per reliquum abdomen, scyncipitis artuumque dolor gravativus, præcordiorum anxietas, tussis arida, febris, alvus constrieta, urina solito paucior, rubicundior, pulsus frequens, inæqualis, calor, aliquando rigor paroxysmum pejorem denotans; hæc perstant symptomata; tandem tussis evadit humida, phlegma viciduum copiose ejicitur, urina copiosior, sedimento lateritio copioso, ex anacatharsi & diureti copiosis majus levamen, a paroxysmo brevior phlegma dilutius, extra paroxysmum hilaris est æger, appetitus viget, facillime spirat, ultimis sex annis asthma evasit hypochondriacum, animi scilicet ingenti dejectione symptomatis prægressus in paroxysmo adjuncta.

Curatio Boerhavia. Diaphragma convulsum ob irritationem nervorum ventriculi a cæna toto suffocabat ægrum, aut debilitas orta ex hoc malo mortem suffocativam avertit, laxatis nervis, musculisque tensis, dum vis vitalis urebat, dein viscera chylopoetica debilitata infartur suscipiendo apta facta sunt, horum alio vitiata, atra bilis genita; hinc suadeo 1. ut omni mane jejuno, omni vespere hora ante cenam abdomen, præcordiaque paucis siccis calidis per horæ quadrantem perfricentur; 2. quotidie ante prandium jejunos, & vespere bibulos ante cenam equitet; 3. mane a frictione degluce pilulas ex saponis veneti drach. iiii. & sem. misce, siant pilulæ gran. xv. harum sumat v. & id repetat quinquies interpolans semper decem minutorum spatio; cum superbibat de potione sequenti unciam, scilicet herbarum acetosæ,

bellidis prat. charophylli, cochleariæ, hederæ terrestri, nasturtii aquat. taraxaci, ana q. f. ut lotis, scissis, rufis, expressis succi puri unc. vi. exprimantur, quotidie, recentes hora vi. exhibeantur, interim deambulet; 4. ante decimam vespere cubet, matutinus surgat; 5. cibum sicciores coctum facilem, perfecte maturos fructus, præcipue vacuo ventriculo, cum paucis panis biscocto, laudo, ætate præsertim; carnes recentes assæ, pisces assati, olera cichoraceæ, lactuca, proderunt; 6. his sedulo factis bimestri spatio, ætate de acidulis ferratis cogitandum una cum exercitio corporis assiduo, & vacatione animi a severioribus studiis.

3. *Asthma hystericum* Baglivi lib. 2. pag. 202. & 204. Helmont. p. 14. P. C.

Ea species afficit mulieres hystericas; de salute recuperanda desperantes, restitit remediis vulgaris asthmatis, stipatur sensu frigoris in vertice capitis cum alimiali dolore. Illam speciem sanavit Baglivi sale novis in aqua melissæ, nec non apposito emplastro matricali Mynsichti, sal iovis recipiente in regione umbilici: mira præstat etiam extractum capitum papaveris rhæados ad gr. iij. vj. &c.

Vide Hoffmann lib. 5. observ. 32. Floperum de asthmate pag. 113. vocatur *asthma umbilicæ* Zittmulleri.

4. *Asthma hypochondriacum* J. Rhodii, Ettmulleri p. 162. L. V Volpi Dissert. Argentoræ 1764. *hypochondriacæ - spasmodicæ*, Frid. Hoffmanni Obs. 3. *asthma noshum* Riverii. P. C.

Est difficultas inspirandi, quæ ab hypochondriacorum viscerum, hepatis potissimum, resistentiæ & insarctu procedit: illa species ex hypochondriorum vitio primam trahit originem; hæmorrhoidarios, flatulentos, suppressis solitis sanguinis effluxibus, aggreditur: Consultatur Riverius Pr. Lib. VII. cap. 1. Osterdyk Schacht. Institut. Junckeri Tab. 72. Helversius Traité des Maladies, pag. 177. Baglivi pag. 214.

Signa specifica sunt regio hepatis renitens, elata, tensa, cum faciei flavedine & alvi constipatione, nec non tussi sicca, hepatica dicta. Differt ab asthmate flatulento per obstructions hepatis, licet pluries hæc duæ species combinantur. Quamvis ejus morbi principium constans videatur, interea paroxysmos patitur æger cum tempestas mutatur, quoad hygrometrum & barometrum.

Curatio exigit lenia laxantia, clysteres, catameniorum aut fluxus mariscarum revocationem: juvant thermæ aquæ leviores ut *De Cauteris, de Bagdole*, nec non ætate acidulæ cum lacte mixtæ, quales sunt Vallenles; in inveterato asthmate, superveniente œdematâ, mira præstant grana duo vel tria icillæ cum nitro coacta & interne sumpta; fluxum mariscarum revocant pilulæ balsamicæ, ut degammi ammoniac, fastigatio.

Fusam hujus morbi theoriam & proximam vide in *Dissertatione L. Volpi de asthmate hypochondriacæ*, quod rectius *hepaticum* dicas,

5. *Asthma arthriticum* Musgrave, Zelf. p. 42. Dureti in Holler; *asthma convulsivum a materie podagrica* Frid. Hoffmann de asthmate agr. 13. & obs. 1. *Orthopnea* Dodon. obs. c. 20. P. L.

Est ea species quæ arthriticis, rheumatico obnoxiiis, scorbuticis, ob repulsam podagram, aut retentam materiem arthriticam accidit; affinis est convulsivo & hypochondriaco; primas regiones afficiunt status, mollitiæ, anxietates; scapulas molestant pangitivi dolores, cor contrahitur.

Conducunt præter auxilia generalia pulveres ex bezoartico & nitro, cum cinnabari, camphorâ, croco; pediluvia extra paroxysmum possunt revocare materiam inoribicam ad pedes; nec non sinapismi, vesicatoria suris semotimve applicanda; ulusthermarum Bagnolien-sium etiam in prophylaxi confert.

Asthma orthopnoicum observavit Dodonæus in juvene mercatore, qui per intervalla & multos annos suffocatus ferme erat; subleabatur multis phlebotomiis, cathartici, aquis acidulis, sed demum obortis doloribus podagricis & neuralgia calculosa illico ab asthmate immunis fuit. Vide *Orthopnoeam apud Schenckium*.

Daretus in asthmate arthritico putat causam esse adhesionem majorem diaphragmatis cum hepate, observatam in cadavere Polemarchi de Thermes.

6. *Asthma a Polypo cordis*. Diemerbroeck; Floyer. de asthmate; Pæzoldus obs. 52. Ephemer. natur. Curios. Carol. Pilon. de morbis a colluvie pag. 214. Scultet. in append. obs. 31. Vide *orthopnoeam a Polypo cordis*. P. C.

Cognoscitur autem ex vehementi palpitacione, pulsus intermissione, alisque, sed potissimum cadaveris sectione; tunc enim frequenter satis concretiones polyporum in auriculis, ventriculifve cordis, illæsi omnino pulmionibus, ostendunt asthmatis principium, in quo certe casu quam periculosa sint emetica, inutilia cathartica, necessaria vero quies, phlebotomia, &c. quisque videt.

7. *Asthma pulverulentum* Ramazzini de morbis artificum. Epilem. Germanic. Vide Synopsin Buchneri. P. C.

Lapidææ, gypsum, mutatores, granorum cribratores, molitores plures huic asthmatis speciei sunt obnoxii, ob haultum copiosum singulis diebus pulverem in aere volitantem, quo hronchia eorum infarciuntur, unde anhelosi, tussiculosi, pallidi evadunt, & sæpe phthisici. Signa & remedia inquirant quibus dabitur otium & occasio. Molitor phthisi fuit liberatus sumptis aquis Bagnolienibus.

Vide *Hecquet Maladies des Artisans*, tom. 2. Frid. Hoffmann. lib. 3. cap. pag. 106.

8. *Asthma stomachicum* Baglivi appendic. de asthmate. P. L.

Magnam asthmatum humoralium crudorumque partem a stomacho pendere observat Baglivi hinc uti solebat pilulis de hiera cum agasico, & salæ vitrioli initio accessus a scrupulo



uno ad drachmam cum aquæ hordei unciis sex ad vomitum cicandum singulo mane præscribatur: in hac specie quæ humoralis est, & non multum discrepat ab humida, coctæ oxymelitis scilicet edulcoratorum succo malorum, superbibendo jusculum ex cichorio eum paxillo (as-fasfras cocto, vel gravis ses liqui aloes: Gummi ammoniacum, oxymel scilicetum, spermacetæ, & juleps tabaci quatuor sunt quæ in asthma humoralis & stomachico cæteris omnibus mire antecellunt: *Aggluti.* Syrupus de althæa conjungi debet julepo tabaci, qui ad drachmas duas datur: gummi ammoniacum ad drachmam dissolvitur in paxillo vini albi, & calide bibitorum cum aqua hyssopi in gravissimis & desperatis casibus, nos calidissimo jusculo dissolvimus sperma ceti cum aliquot gravis benzoini.

9. *Asthma a gibbo* Hippocratis, Floyer pag. 109. P. C.

Non solum gibbi ex asthma sunt quidam, quod si accide, illi ante pubertatem moriuntur, verum ex gibbositate multi in asthma deducuntur, præterquam quod fere omnes gibbi dyspnœa laborant. *Vide dyspnœam.*

10. *Asthma equinum*, Soleysel. *La pousse*. Flyer. appendic. *Asthma adipex* Journ. de Med. May. 1761. p. 403. P. C.

Equi cognominantur *Poissifs*: Broken winded Angli.

Illi identidem tussim profundam pectoralem patiuntur, & illa ducunt; species vero ista in eo ab aliis discrepat quod textus cellularis pulmonis sit omnino emphysematosus, ut in equæ asthmaticæ cadavere observavit *Floyer*. Idem observavi in pulmone vacæ asthmaticæ; pellacebant interstitia lobulorum pulmonis, & tusa membracula illa aer copiosus exhalabat.

Nonne illa violenta aeris introitus per vesiculas in textum interlobularem fit cum equi magno impetu currunt? in illis enim violentis conatibus magna vi aer in pulmonibus compressus, in vesiculas reagit, easque distumpere valet.

Potius ea species asthma emphysematosum vocanda foret, nec enim esiliandum eam solum equos afficere, & ab ea homines immunes esse. Desiderantur ejus signa & remedia, quod ferme de omnibus morborum speciebus dicendum est.

11. *Asthma exanthematicum*. Frid. Hoffmanni Sect. II. Cap. 2. §. 13. P. C.

*Aloerpeslate*, variolis, maximeque morbillis, purpura, seu miliaris, maculis, pusillisque scorbicis ad corporis superficiem pulsus, & crasso astringentium usu retroactis, a scabie (*Juncker*.) tinea, vel achoribus capitis, crusta lactea per oleosa pingua, aut linimenta sulphurata præposere excicatis, a pedum factore suppressio, a perspiratione subito cohibita, ab ulceribus chronicis, vel fomiculis inopportune consolidatis hæc morbus exoritur.

Illa species est vel varietas asthmatis convulsivi, quod non a motu inordinato fluidi nervi, sed a materia acri, caustica, subtili, se-

pe virulenta, quæ originem suam repetit ab exanthematum, impetigium, ex quacumque feri acris excretionum impedita, non sufficienti evacuatione, in cutem depositione aut improvi repensione.

Atque ex illa historia facile est intellegendum quænam indicationes ad ejus morbi curationem sint adimplendæ; illa enim acris materies est eliminanda per flogisticos, diuretica, cathartica, sudorifica; modo tamen sanguinis æstus non intendat, quod asthma tics perniciolum est; illa materies simul est edulcoranda per diluentia, thermas sulphureas, lacticia, serum lactis, prisanas bechicas, formulas vero ac procellus integros in hac specie curanda videbis apud *Hoffmannum*, nec non in tabula 31: *Junckeri de asthma* p. 274.

12. *Asthma metallicum*. Vide *Ettmüllerum* ad asthma; *Ilsemann* de colica saturnina. *Ephem.* N. C. Dec. III. Ann. IV. Obs. 30. *Helmont.* de Asthma. n. 44.

Est species spasmodica sicca, quæ a fumis metallicis, saturninis, sulphureis, venenatis, arsenicalibus, carbonum fossilium, aquæ fortis, antimonii exhalationibus oriuntur, quo quidem morbo in præparando antimonio clyffo tactum se fuisse narrat *Ettmüllerus*. Eo laborant sæpius metallicolæ & plura fabrorum genera. *Vide metallurgicam morbosam Frid. Hoffmanni*. Tæri hujusmodi vapores inspirati costringunt teneras pulmonum vesiculas quibus adhærent, & sic hanc speciem producent.

Curatio aliquatenus convenit cum cura Rachialgie metallicæ, colicæ saturninæ, tremoris metallurgorum &c. Vinum lithargyrio dulcificatum induxit hoc asthma. *Vide Ephem. Nat.* Car. Dec. 3. Ann. 4. obs. 30.

13. *Asthma cachecticum* Frid. Hoffmanni §. 16. P. C.

Est illa varietas asthmatis spasmodici, quod in cachecticis a fero acris pectoris organa exandante proficitur, absque tamen hydrothorace, quale vulgo vocatur œdema pulmonum; tale supervenit ab œdemate pedum repulso, maxime sub frigore febris intermittens; illud asthma ingentem spirandi difficultatem infert, quæ per intervalla decrescit, aut oborta copiosa diuresi intermitte. Historiam vide in *casu 62. consultation. Frid. Hoffmanni tom. 1. sect. 2.*

14. *Asthma venereum* *Junckeri* *Compend. med.* tab. 31. n. 15. sanatur hydrargyrosi. P. C.

15. *Asthma plethoricum* *Doveri* a Physician *Legacy* &c. *Asthma sanguineum* dictum Frid. Hoffmann. lib. 3. pag. 95.

Cognoscitur ex signis & causis plethoræ, faciei rubore, febre ephemera illius primos accessus comitante, suppressis evacuationibus sanguineis; varietas est asthmatis humoralis; in qua potius phlebotomia conveniunt quam emetica; cum ventus orientalis fiat, illud mitefcit & ægri expectorare incipiunt, ait *Dover*.

16. *Asthma catarrhale* *Scholtzii*. P. C.

Ambigit inter rheuma & asthma humida; di-

gaoscutur per coryzam, raucecinem, anginam, steroutationem, dolores catarrhales ipsum initio potissimum comitantes; & curatur ut rheuma a quo differt per periodos, &c.

17. *Asthma pneumodes* Aretæi lib. chr. 1. c. 12. *Pneumodes* Mercurialis. prax. de difficultate anhelitus pag. 150. *Pulmonaria* Hippocrat. C. P.

Est asthma io quo humor externocodus e pulmonibus mutatur io grandinem, vel veluti lapidescit; de quo egerunt *Galenus* & *Alzaravins*. Hic affectus rarissime accidit hominibus, ast frequenter in brutis, quæ rarissime tussunt, & idcirco retinent huiusmodi bronchialem, qui ideo iuxta *Aristotelem* in gypseam materiem abit.

*Aretæus* ait hunc morbum esse asthmais speciem, nam spirandi angustia & tussis & vigilia & caliditas utrumque comitatur morbum; item in cibos odium, & totius corporis exenutatio; id malum anni spatium non excedit; pulsus parvi, crebri, infirmi sunt, ut in asthma; privatim vero pulmonarii seu pneumodes tussunt, tanquam aliquid expulsiuri, cum tamen iustus eorum labor sit, nihil enim rejiciunt, aut tantummodo quid exiguum, album, rotundum, grandinosumque; pectus in his latius utique est, non obortum, non ulceratum; tamen vero pulmo non supparet, humorum tamen veluti concretorum plenus est. Temporis intercapedines inter huiusce morbi accessiones, longiores sunt, nonnulli suffocantur cito, alii in ascitem, aut anasarcam labuntur. Hæc *Aretæus*. Degradinatione brutorum ut porcorum, *Vide Chazarasem* class. 10.

18. *Asthma febricolum*, Fr. Sylvii de febre intermittente. Torti Therapeut. pag. 302.

Est difficilis respiratio tertianæ accessus comitans, iis solutis cessans, quæ a veneno tertianæ fovetur, & ope kinkinæ tuto tollitur.

Apud Americanos pro specifico asthmais vulgaris laudatur decoctum foliorum arboris immortel vel *Maurepas dictæ*. *Chevalier de Morbis Americanis*.

## IX. ORTHOPNÆÆ; *Meteorismus* Hippocr.

Coac. ; *Catarrhus suffocativus* Auctorum ; *Suffocatio* Ettmulleri ; *Suffocatio*, *Orthopnæ*.

Est morbus acutissimus subitanea anhelatione sublimi & fere suffocatoria stipatus.

Differt ab asthma, cujus paroxysmos vehementes moritur ex eo quod per periodos non recurrat. A dyspnœa, quod sit morbus acutus, dyspnœa vero chronicus vel diuturnus, nec subito suffocationem intentans.

Perperam hæc tria genera confuderunt *Aures*, illique etiam anhelum addidit *Ettmullerus*, quasi anhelitus, dyspnœa, asthma & orthopnæa forent diverſi gradus ejusdem morbi; quod si ita sit, quidni omnium aliorum morborum gradus nominibus genericis insigniantur, quod numerum generum quadruplo majorem sine fructu faciet. Sic plebs incallum multiplicat no-

mina generica plantarum, piscium, quadrupedum; sic vaccam, vitulum, a bove mare, adultum, genere distinguunt rustici; sic demum sparum prout major, minorve est, apud Occitanos diversa nomina sortitur *aurata*, *Mesane*, *Sanguine*, &c. quod a sana ratione & legibus lethyologie quam alienum sit, facile percipiunt Methodici.

Hujus generis species determinare perarduum est; suffecerit iodicasse observationes individuas, ex quarum penitatione quondam sagaciores illas eruere valeant.

1. *Orthopnæa peripneumonia*; *Catarrhus suffocativus* Baglivi, Ettmulleri pag. 155. A.

Maxima de nihilo facta est historia, ait *Hildanus*, & reapse Veteres ea opinione occupari omnes fere morbos fieri a destitutione feri ex capite, seu a catarrho, omnem morbum qui subito ægrum suffocando enecaret, catarrhi suffocativi nomine salubant. Insulsissima est sententia orti catarrhum suffocativum ex illapsu feri vel lymphæ, non dico a cerebro, quod absurdum est, sed ne etiam a vasis pectoris vitiis lymphaticis; quippe non nisi gradaria fieri potest congestio, non vero morbum illico præfocans unde *Helmontius* Scholasticis merito deridet in capitulo cui titulus, est, *Catarrhi deliramentum*.

Oleum sulphuris injectis *Ettmullerus* in vehem. cruralem canis, qui per semi-horam admodum anxie respiravit; sensim difficilis, & demum suffocatus spumam ex ore & auribus copiosam emisit; aperto cadavere omnes vis aereæ erant tardidæ simili spuma sanguinolenta, pulmones vero sanguine nigro fardæ. Hæc est idea catarrhi suffocativi.

*Michael* refert exemplum catarrhi suffocativi, qui fere strangulavit coquum, qui ab igne calens subito frigidissimam cerevisiam haurit, unde tamen exivit ex focci expressi ex bellide, qui sanguini resolvendo est apertissimus.

2. *Orthopnæa cardiaca*; *Syncope cardiaca* Caspar. Hoffmanni. A.

Ha species orthopnææ, quæ vulgo pro apoplexia habetur, quia satis subito cum stertore suffocat. & enecat ægrum, quæ tamen ab infarctu ventriculorum, vel auricularum cordis procedit; quippe si quavis de causa, ut polyposa concretione, grumo cruosis, obturetur alterutrum, potissimum vero sinistri cordis orificium, illico sanguinem continuo in pulmones appellentem in ipsius venis, arteriisque acceri necessum est; quod fieri non potest, nisi arctatis viis aereis; illico difficulas respirandi continuo, subitoque crescens, & cordis palpiationes, & pulsus intermissiones, & extrema naturæ adversus mortem luctantis conamina convulsiva ægrum in extremum discrimen conjiciunt; hinc mors repentina, quæ catarrhus suffocativus apud multos vocabatur. *Vide Asphyxiam, vide Bartholini centur. 2. epist. 1. 623.*

3. *Orthopnæa spasmodica* Baglivi; *Orthopnæa sic* Ballonii Epidem. pag. 198. *Convulsio lary-*

gis Bartholini centur. 4. epist. 454. Solenandri Confil. 14. A.

Est illa suffocatio quæ a convulsiva pulmonum, aut potius laryngis constrictiones, aut diaphragmatis spasmo accidit, citra tamen hysteriam.

Sic refert *Platerus observ. p. 182.* virum robustum, quoties coitu uteretur, toties suffocationem expertum esse, quæ demum obiit, coitus autem merito ab *Avicenna* dicitur parva epilepsia, sed ille morbus gradu tantum videtur differre ab asthma convulsivo.

4. *Orthopnea hysterica* Villius de nervis cap. 26. a *terrore* Forelli lib. 6. observ. 10. *Præfocatio uterina* Auctorum, vel *strangulatio uterina*, *suffocatio hysterica* Frid. Buriel dissert. 1698. *Asthma uterinum* Helmontii de asthma; *Caducus matricis* Paracelsi; *Hysterica pnx* Græcor. A.

Hoc nomine intelligo non hysteriam in genere, in qua multi Veteres errarunt, confundentes sub eodem nomine generico diversos morbos hystericos, sed tantum symptomata hysterics familiaria, quod sæpe pertinax est, & in præfocatione consistit, sive anginam hysteriam vehementem, sive cingulum hystericum simulet; prima varietas a convulsione tonica musculorum laryngis, altera vero a diaphragmatis tensione spasmodica dependet.

Discrepat a caro hysterico, ex eo quod in caro nullus sit respirandi conatus, & contra ægræ velut in apnea constitutæ vix respirare videntur; aut in orthopnea respiratio sit velox laboriosa, præceps, frequens, cum spasmodica pectoris agitatione, voce rauca vel obscura, & summo suffocationis metu. Mulieres a veteribus Medicis hanc abstrusam opinionem, quod uteris in gulam ascendat, ibique ægram suffocet, mirum quamdiu hæc insulsa fabula apud Medicos vigerit. Dysphagia hysterica ab hoc symptomate diversissima est. Vide *Arætam de vulva strangulata*.

5. *Orthopnea ab hydrothorace* Rhodii observ. 27. centur. 2. Morgagni Epistol. XVI. 34. 43. A.

Mirum quandoque quam cito aquæ in cavo pectoris colligantur: illas vix tanta mole collectas, ut sedeo cadavere sursum et vulnere pectoris exillirent. Vide *Hydrothoracem*, & obs. 15. *Sepulchreæ*.

Symptomata sunt quandoque cordis oppressio & animi deliquium, quæ a loquela vel motu intenduntur. In morbo quem refert Morgagni *Epist. XVI. Obs. 43.* nulla alia erant symptomata, & inter peritos Medicos alii aneurysma, illi polypum, illi tuberculum incusabant: faxit Deus utinceps errores illi viteant ad ægrorum juvenem & artis decus!

6. *Orthopnea a pinguedine* Theod. Kerckringii obs. 66. A.

In puero trienni qui suffocatus perierat, invenit *Kerckringius* copiosissimum adipem extus & intus; sed adeps exterior mollis erat, & quasi

oedematofus; cor erat ita adipe obvolutum, ut delicere videretur, venter non nisi adipem purum continere videbatur, intra quem exigua immerfa erant viscera, cæterum sana; cerebrum erat flaccidum, aquam inspidam continens in sinibus cum hydatidibus juxta plexum choroideum. Similem orthopneam in muliere vidit *Fabricius Hildanus*, centur. 6. obs. 97. a pinguedine monstruosa osundam, itidem *Bartholinus* anno 1671. obs. 74. Vide plura in *Sepulchreæ Boneti appendice in suffocatione*.

7. *Orthopnea a vomica* Boneti *Sepulchreæ* de suffocatione, obs. 40. 37. Dodonæi obs. c. 19. A.

Abcessus in ipsis pulmonibus juxta diaphragma, in abdomine diaphragma sursum pellens, in axillis, aliisque pectoris locis aliquoties observati sunt apud eos qui orthopnea extincti fuerant, natura hilce conatus spatiosius vomicas illas rumpere concidente. Sæpius Auctores tribuunt orthopneam causis minime illam per se producentibus, ut jecoris molli adjectæ, adhesionis pulmonis cum costis, cum ea sint principia naturam ad validos, eosque suffocatorios conatus edentes incitantia.

A vomica suffocationem refert *Guillemau*, &c. 8. *Orthopnea ab aneurysmate* Bonet. *Sepulchreæ* obs. 28.

Ab aneurysmate aorta ortam vidit *Petr. de Marchettis*: *Horslius* cor duplo vel triplo majus sanguine distensum, & cruore grumoso turgidum in suffocato invenit; *Zacutus prax. admirab. lib. 2. obs. 63.* *Fonstannus respons. pag. 59.* Plura vide apud *Laëcijum* de cordis aneurysmatibus, *Horslium* obs. 1. lib. 9.

9. *Orthopnea a deglutitis* Bonet. *Sepulchreæ* pag. 579. & obs. 1. pag. 483. *Mércell. Donatus* histior. Foresti lib. 15. obs. 38. *Bartholin. cent. 1. obs. 11.* *Etmuller* pag. 137. *Journ. de Med. Juill. 1759. p. 82.*

Ea est quam corpora duriora aut crassiora, vel semideglutita, & in cæcithago hærentia, vel quod peius est, in glottidem illapsa, & bronchium alterum obstruunt, inducunt; prostant de his nuper recensitæ historiæ *Mém. de l'Ac. R. de Chirurg. T. I. lectu dignissimæ*; videatur etiam *Morton. De phthisi ab hæmoptisi Boneti Sepulchreæ* de suffocatione, obs. 6. 7. Vidi quos convalescentes in Nolocomis frustulo panis suffocatos.

10. *Orthopnea a bronchocele* Boneti *Sepulchreæ* de suffocatione obs. 9. A.

Exempla prostant apud *P. de Marchettis* & *Thom. Kerckringium*; idem a thymo intumefactum ortum *In: Plater. obs. l. 1. pag. 184.*

11. *Orthopnea a gastrocele*. A.

Equi nimium in cursum concitati non raro patiuntur gastrocelen, quæ ventriculus scisso diaphragmate intra thoracem adigitur. Similem olim casum vidi in muliere quæ hinc suffocabatur, dein vero vomitu habituali assumpta est. Orthopneam memorat *Bonetus in Sepulchreæ de suffocatione obs. 41.* in qua per vultus diaphragmati insidit a cutello intestina tenuia intra thoracem irreperere, & pulmones ac cor suffocavere.

12. *Orthopnæa ab hydropneumonia* Barrere obf. anatom. 1. pag. 109. A.

Miles virginis quinque annos natus magna oppreffione, tuffi violenta, & febre decens. Nofocomium appulit, fepties in triduo phlebotomiam paffus, fublevabatur, aft recidivante morbo, orthopnoicus, fudore frigido, afphyctos ferme, huc & illuc anxie fe jactans obiit, fruflra tentatis pluribus auxiliis.

Aperto cadavere, pulmones tumidi, pleuræ agglutinati, maculis rofeis hinc inde notatis: a preffione digiti fluctuatio; remoto digito, fovea evanefcebat illico, fedis diverfis pulmonis locis aqua copiofa effluit, nulla tamen erat in thorace effufa, nullum ullibi vitium, nec in corde, nec in pulmone ullum tuberculum.

13. *Orthopnæa ab empyema.* Vide Empyema.

14. *Orthopnæa traumatica.* Bonet. Sepulchr. obf. 31. de fuffocatione. Frid. Hoffmann. de affluat. n. 15. A.

Idus vehementem in pectore juvenem humi proflravit attonitum, cum anhelitu gravi, vomitu frequenti, voce fuppreffa, fuma confertim ex ore emanante.

In cadavere pulmo habebat plurimas maculas lividas, a lapfu fraclum erat cranium. *Tulpus lib 1. obf. 6.*

Orthopnæam etiam inducunt vehementes collarum, aut sterni contufiones, luxationes, vel fracluræ, cartilaginis xiphoidæ intropreffio.

15. *Orthopnæa antipathica* Zacuti prax. obf. 103. lib. 3. B.

Certum eft ab antipathia, feu fingulari & irrationali quorundam objectorum averfatione, quidam homines, potiffimum hyfterici, quafi fuffocari & , ut ipfe ajunt, incubum experiri.

Condifcipulus Zacuti cafeum ita averfabatur, ut fyncopem ab ejus odore sæpe incurreret, a focis per jocum oblato hoc cibo, flatim cum livore faciei, tectore fuperveniente, cum pulfu parvo, mortis imaginem repræfentabat, ac fuma excreta ex ore more epilepticorum, ad vitam revocatus eft.

16. *Orthopnæa a vaporibus* Ettmuller de fuffocatione pag. 139. A.

Ex fumo fulphuris vehementer confringuntur pulmonales veficulæ, unde fuffocatio. Idem præftant vapores vitriolici, pulvis lycoperdonis, feu crepitus lupi, fi infpiretur, calcis & fimilium.

Longe vero alium effectum producant vapores mephitidum; vini fermentefcents, cellarum diu claufarum, illa vero nullam orthopnæam excitant, fed fubito enecant, quafi homo fulmine percuffus foret, adeoque ad afphyxiam pertinet ille morbus.

17. *Orthopnæa a vermibus* Ephem. Nat. Cur. dec. 3. ann. 3. & 8. obf. 184. Thoneri Obf. I. Lib. II. A.

Suffocatio a vermibus in ventriculo, & in œfophago potiffimum.

Differt orthopnæa a *cynancho* & ab *angina*, *Sanguis Nofologia Methodica.* Tom. I.

quia deficit in orthopnæa fensus strangulationis in gutture, ab *afphyxia* fufpenforum, fubmerforum, mephitide infeclorum, per anhelationem præcipitem, cum in afphyxia nulla refpitio, aut vix confpicua; ab *apoplefiis* differunt orthopnoici, quod fentiant; a *peripneumonia*, quod fubito præfocati videantur.

18. *Orthopnæa a lipomate* Philosophical. Transact. Abridg. tom. 3. pag. 157. Van Swieten aphor. 75. A.

Scæatoma ultra fex libras pendens in cavo pectoris repertum, poft enormes calamitates, tandem fuffocavit regem.

Vide fimilem cafum in obf. 4. Boneti Sepulchr. de fuffocati. pag. 521.

Huc pertinet atrocis rariffimique morbi hiftoria Marchionis de S. Alban Delphinatis a *Boerhaave* relata, cujus principium ipfe ante extispicium ignoravit *Boerhaave*. Eger poft tres pleurodynes, cum tuffi & refpirandi labore per decem menses antequam moreretur, fuit fine pyrexia, fine anorexia, nec emaciabatur, crefcebat interim in dies orthopnæa atrox quæ pendebat a lipomate intra mediastinum ad libras fex & ultra excrefcendo. Vide affinem huic hiftoriam in *Physiologia Lindani*, pag. 221.

19. *Orthopnæa ab inanitione* Platner. infl. chirurg. *Asthma convulfivum* Gernhardi diff. de fpafo ab inanitione, Lipfæ 1755. A.

Puerperæ, magnam fanguinis jacluram paffæ, aut quarum flatim a partu non vincitur fæscis abdomen, necnon hypodropici, quibus citra hanc cautelam aqua tota fimul detrahitur, quandoque fuffocati, & convulfi pereunt, teffe *Flainero*, *Heiftero*, *Lamotte*, quod accumulato in pulmonibus fanguini tribuunt Lipfienfes, & asthma convulfivum vocant.

20. *Orthopnæa febrilis* Morton de febribus, pag. 139. hift. 7. & pag. 74. A. P.

Eft paroxysmus febris triplex, aut tertianæ duplicis, fimplicisve, fed larvæ & proteiformis, qui inter dira fymptomata cardialgica, fpafmos pectoris & fuffocationem infert, quovis die repetentes; non ideo asthma annumerandus eft morbus acutiffimus, cum asthma chronicum fit.

Mortoni ad fimilem regram advocatus, eam invenit vomitione perpetua pene confectam, atque præ fpafmis thoracis & abdominis perpetuo ejulantem, & tantum non fuffocatam, febre nullo modo fe prodente, præ vehementia fymptomatum; urina etenim erat clara & tenuis; temperies mitis; extrema frigecebant; pulfus erat celer, fed debilis & inordinatus.

Præfcripto leni emetico, aqua pulli copiofa offerebatur, bolus ex theriaca & pulvere abforbente fequebatur cum antiemetico Riverii; in remiffione urina erat lateritia; kinkina non poterat affumi propter vomitionem; die fequenti miffella virgo fuffocata pene, & delira præ atroci dolore totum thoracem & abdomen occupante fele jactabat, & perpetuo vociferabatur, nec vomitio ceffabat.

Præscripta phlebotomia, & clysmata, febrifuga narcoticis juncta quaque hora quarta adhibita sunt; decocto albo Sydenhami, julapiis perlatiis, anodynisque suppressi sunt illi horrendi paroxysmi.

21. *Orthopnoea pseudoperipneumonia* i. *Peripneumonia hiemalis* Sydenhami process. p. 656. *Peripneumonia nosta* van Swieten aph. 267. For-  
te *Peripneumonia catarrhalis* class. tertie; *falsæ* *Peripneumonia* i. A.

Morbus hic, a solo Sydenhamo & Boerhaave fere descriptus, differt a peripneumonia, cujus imaginem refert ex defectu febris acutæ, differt juxta Sydenhamum ah insultu asthmatis sicci, quod in illo nusquam comparent febris indicia; in hac vero dyspnœa, manifeste ie produr febris, licet longe minor, & magis obscura quam in peripneumonia vera.

Hic morbus primo fallaci lenitate opprimit, nec opinantes; quippe levi defatigatione, debilitate, prostrato fere auiui motu, anhelitu, oppressione pectoris incipiens, adeo levis motus excitat, ut vix caloris, febrisve indicia moeant periculi; mox vagæ horripilationes, leviusculi febris insultus adfunt; unde subito crescente anhelitu & debilitate mors, cujus in urina & pulsu vix ullum adfuit prælagium.

Ingruente hieme, & sæpe initio veris emergit; insultu primo nunc incalcescit, nunc frigit æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & calent genæ, oculique; tussit & inter tussendum capitis dolor lancinans premit, protulenta vomitu rejicit, urina turbida est, & intensè rubet, sanguis pleuriticorum æmulus, anhelus crebro & celesper spiritum ducit dolente thorace.

Morbus ille senibus, pituitosis, frigidis, catarrhosis sæpe, in borealibus præsertim regionibus; orthopnoëis ascribitur, quia acutus est morbus; non peripneumoniæ accensetur, quia febris non est acuta, ut in vera peripneumonia; ad rheumata accedit quam proxime & *finxio in pectus* vulgo vocatur, nobis peripneumonia catarrhalis, a qua tamen differt defectu coryzæ, sternutationis, aliorumque rheumatici characterum.

Curatur juxta Sydenhamum duobus, tribusve phlebotomiis, & præscripto alternis diebus cathartico quod ingrediatur senna, agaricus, verum qui in hisce regionibus acrior videretur; diebus vacuis, decoctum pectorale, eclegma & oleum amygdalarum usurpantur.

Boerhaave vero phlebotomiam unam tantum suadet; dein quotidie repetitum clysmâ, victum tenuem, ex iulculis; potum tenuem, subacidum, mellitum, vapores & fustis emollientes; deum balnea crurum pedumque, & ampla vesicatoria cruribus admovenda: quam diversa a Sydenhamiana curatio!

22. *Orthopnoea scorbutica* Eugelei obs. 11.  
24. *Strangulationis metus in scorbuto* Sennert. de signis scorbuti. A.

Plurimi scorbutici conqueruntur de obstructio-

ne ventriculi ad os usque, instar pali totum œsophagi meatum obturante, & suffocationem minante: id primis cibum sumpturis accidit, qui cum primum bolus degluritur sunt, in præsentissimo suffocationis periculo versantur; *Sennertus* vidit qui hoc non minus metuebat quam si carnifex laqueo eum suffocaturus prælo esset; is ut ab hoc morbo se liberaret, Januæ parte superiori manibus prehensa, pedibus pendulis totum corpus concutere necesse habebat.

Hanc orthopnoeam in ultimo gradu scorbuti vidit *Lind*.

23. *Orthopnoea ab hydrocephalo* Ballonii, Boneti Sepulch, de catarrho suffocativo obs. 14. 15. 16. A. Illum morbum esse convulsivum verosimile est, atque huic convulsioni subito lethali ansâ præbere subitam feri in ventriculi cerebri exundationem.

*Barbeyracius* qui vidit hanc speciem pro apoplexia habuit, eaque pituitosa; quæ cum flertore si-patur, pro catarrho suffocativo habebatur. Veteres juas e cerebro in pectus delapsas ægro suffocando pares esse putabant; hinc nata fabula.

24. *Orthopnoea variolosa* Sydenham. pag. 393. Baglivi pag. 569. A.

Ea est quæ undecimo die rassis 14. vel 17. in variolis confluentibus accidit, cum febris secundariæ exacerbatione, jactatione, &c.

Vena illico in pede secanda, dein emeticum præscribendum; vespere paregoricum, immo narcoticum; sequenti manenleis catharsis adhibenda.

Hæc orthopnoea a materia variolosa retenta accidit.

25. *Orthopnoea a fungis* Journ. de Med. Oct. 1755.

Assumptis fungis venenatis æger primo gastrodyniam gravativam & distensionem percipit, dein suffocationem experitur cum strangulationis sensatione; accedit non raro singultus, vomitio, urinæ crassæ, turbidæ, vel suppressæ; in secunda periodo crescit suffocatio; pulsus minuitur; animi deliquia, rigores & sudores frigidi universales gangrænâ in primis viis & mortem imminere designat.

Curatio exigit 1. emetica quantocius haurienda; 2. acida, ut oxycratum, acetum, limonis succum aut acetosam, oxalidem & silymbrium aquaticum, quod ex *Carrhenfero* acidum in analysi fudit.

Sumpto euphorbi succo succus limonis fuit eximium antidotum: *Dubamel Hist. de l'Acad. des Sc. p. 247.* Lac in quo frustum fungi venenati fuerit, illico muscas enecat. Fungi venenati non seccantur, sed putrescunt; fungi itaque sicci minus aut minime timendi. Fungi venenati apud nos frequentiores sunt Agaricus piperratis, Agaricus extindorius, boletus luteus, &c.

26. *Orthopnoea poliposa*, River. Cent. I. Obs. 82. Barth. Cent. 2. Ettmuller de suffocatione; ea est quæ a polypo cordis excitatur.

X. ANGINA, ab angendo dicta; *Paragynanche* & *Parasynanche* Græcis; *Mal de gorge*, *Angina*.

Est difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, & sæpe deglutitione difficili, sine phlegma.

Dis-

Differt a cynanche, quia nulla febre inflammatoria stipatur angina; a cæteris anhelosis morbis, quod sensu strangulationis, aut dolore gutturis stipetur. Differt a dysphagia, quia angina comitem sæpe habet difficultatem deglutendi; sed dysphagia nunquam habet notabilem respirandi difficultatem quam habet angina. Si confundatur angina cum cynanche, pari jure sub eodem genere confundi debent mania & phrenitis, hæmoptylis & peripneumonia, nephralgia & nephritis, seu morbi classe distincti.

Falsum est angustiam laryngis semper essentiali anginæ, cum non sit essentialis difficultas respirandi ad guttur relatæ: si etenim quoquo modo resistant organa respirationis in gutture posita, seu si doleant, rigeant, cum ad respirationem sive tacitam, sive velocem & loquelam moveri debeant, inque difficilis erit respiratio cum sensu molesto in gutture; sic anginæ frequentissimæ sunt in tonsillis, & velopalatino, intracta larynge.

Anginam non semper comitatur respiratio frequens; quandoque pacatissima est, nisi quod doleant organa inter loquendum clamandum, ridendum, aut fortius respirandum.

Cum Scholastici, clarioris doctrinæ gratia, ad unum principium simplex volunt referre plures species ejusdem morbi, necessum habent species multas ab eodem genere procul amandare, oblivioni tradere, & historiâ infidam, mancâ tradere; aut historiâ morbi cuiusvis debet scribi, seposita omni theoria, & satius est ignorari specierum theoriâ quam earum historiâ.

1. *Angina bronchus*; *Angina priapica*; *Catarrhus faucium*; *Angina mucus*; Huxham pag. 16. *Angine catarrhale*; *Fluxio*; *Fluxio in the gorge*; A.

Est ea species quæ a lymphâ intra organa gutturis congesta dependet; atque cognoscitur ex raucedine, tussi, stertutatione, corryza, vel prægressis, vel concomitantibus, cum tumore & dolore colli, tonsillarum, parotidum, aut maxillarium glandularum, sine febre acuta, & a frigore succipro, dum potissimum corpus æthrat.

Hæc species *Bronchus* Græciâ dicitur, vulgo dicitur fluxio in fauces, a Boerhaave *angina catarrhus tenuis* apud 791. Etiam vero tumor externus colli, si addit, cum color sit, & vix acute doleat, tumorem tonsillarum, paragonique tubet, quia hic est natus scire harum partium color. Boerhaave existimat affici in hac specie membranam mucosam, quæ narès internas, fauces, œsophagum investit, & mucosillo infarciti, quod dein maturiscente angina, plorat, ubertim exprimitur, sub forma viscoli phlegmatis, quandoque acris, vicina excoarctatis, & quamvis, addit illustris van Swieten, in catarrho levius, & superficiali hujus membranz phlogosis, ad hanc anginæ speciem, non vero ad cynanchen, hic morbus pertinet, cum cynanche longe gravioribus stipetur symptomatibus, hisque diversis.

Cura vero unam ad summum phlegmonem; dein vero potum calidum, leviter sudorificum

ex thea, capillis veneris, decocto scorzonæræ, scabiosæ, tomenta calida, aërem secum, calidum; diuretica, dietam tenuem, vel medicrem, gargarismata re solventia ex aqua vitæ, uvule, aut tonsillarum scarificationem, si nimis tumeant. De his vide illustris van Swieten 796.

2. *Angina Lovveriana*; *Angine œdematose* Boerhaave.

Anginæ est species artificialis a Lovvero inventa lib. de corde cap. 2. pag. 123. quæque ad theoriâ hujus morbi illustrandam multum confert; venas scilicet jugulares filo ligabat in cano viâ, post aliquot horas partes omnes supra ligaturam mire intumuerunt, & intra biduum canis angina suffocatus est; per totum illud tempus lacrymæ, saliva ubertim effluebant, pyralismi mercurialis instar, post mortem canis cutim a partibus tumefactis separans miratus est Lovverus minime rubere partes curgas, & tumidas, sed musculos & glandulas sero pelucido tantum esse distensas.

Hoc experimento docetur quid agendum sit in angina, quam excitat venarum collo vicinarum compressio, facta ab scirrho, isœmatem, struma, hygromate, calculo adnato, quorum exempla videlicet apud illustris van Swieten num. 793. de angina aquosa; ea enim agunt utiligatura Lovveri: cum enim in venis sanguis liberime fluit, tunc vix agit in oscula venarum lymphaticarum ex vena oriendarum, parciusque lymphæ ea subit, aut tardato motu progressivo cruoris, tunc ille cruor latera, versus quæ distulit, fortius distendit, oscula lymphaticorum ducit, unde & lymphæ ea uberius subit, distendit, quæ omnia, sublata ligatura aut resistentia, solent evanescere, angina autem illa dicitur œdematosa, cum œdemate tumet partes externæ, membrana scilicet adiposa cutis loco adipis copiosam lympham, aut serum perspirabile retentum excipiente; ideo vero sunt illa œdemata, quia retardato motu progressivo cruoris, ut accidit chloroticis, pressio lateralis sanguinis in parietes venarum & arteriarum adaugetur, ut in angina Lovveriana, atque ut ea œdemata prævertantur, nihil est aptius quam ut martialibus, millepedibus & exercitio, sanguinis viscositas solvatur, fluxilitas ei concilietur, roburque vas restituantur sudorifica, fomenta res solventia, spirituosâ, summi aromatici extus. In eundem finem confiant.

3. *Angina calcenosa* Riverii obs. 7. pag. 127. L.

Similes calcenos aut concrementa dura in faucibus, tonsillis, initio tracheæ, in larynge observant Felix Plater. obs. 1. s. pag. 180. Balten. Ephemer. lib. 2. pag. 197. & 205. Kerkring. obs. 27.

Sexagenarius gutturis inflammatione frequenter corripiebatur, præcipue a cantu: sedabatur hic morbus phlebotomia & gargarismate ex oxycrato; demum Medicus quoddam extrancum juxta finem mandibulæ dextræ in faucibus inter antrum vidit, globulum scopeti referens, quod.

extractum nihil aliud fuit quam lapis durus & compactus ad pyri formam compactus, cauda sua masculis maffeteribus infixus; ulcus, quod superfuit ænomelice deterfum & consolidatum fuit: *Pomaret Chir. Monfpel.*

4. *Angina a deglutitis* Tulpii lib. 2. obf. c. 7. *Ab infixe aspera arteria officulo* Bonct. Sepulcret. de dyspnœa obf. 1. *Angina a spinâ piscis in faucibus hærente* Schœuck. A. D.

Vidi & dolores gutturis cum difficultate canendi, loquendi, tussi, dysphagia, ab aciculis intra guttur hærentibus: modo nulla febris inflammatoria enascatur, hic morbus intra angix aut dysphagix limites continetur. Vide *Dysphagiam*.

Curam hujus speciei & historiam vide apud *Foreſtum obf. 27. lib. 35.*

5. *Angina a laqueo; Strangulatio suspensorum;* Vide *Foreſtum obf. 25. lib. 15. A.*

Frequens est observatio melaneholiorum, maniacorum, furore pericoritur, qui se laqueo suspendunt, ita & in bello non raro ab hostibus milites capti quandoque ad ramum arboris fune suspenduntur, nec strangulati relinquuntur; illis omnibus opem ferre non est inutile, etiam si aliquandiu suspensi jam demortui videantur; verum nulla spes est ad vitam revocandi eos quibus toror ita pede caput detorſit ut veterem colli luxaverit.

Ipsæ opem tulit quondam misero, qui vitam æris defectu redimere non potuit a publicanis; reſecto a pœnitentibus fune delatus est in ipsorum sacellum, ubi intra duas horas tres phlebotomias passus est, pulsus ante primam nullus micabat, aſt fluente sanguine præſertim poſt alteram ſenſum ſeſe explicuit, ita ut rariffimus eſſet, & vix quædagies intra minutum perceretur, vitæ reſtitutus miſer caput erexit, rareſſima voce aquam petiit, multa ſputa rejecit, aquam ex urceolo aſſatim bibit, tunc paulo clarior locutus; antea ætero pede ſeretrum, in quo jacebat invitus percutiebat convulſione repetita, tunc vero pœnatus fuit, pulsus ad frequentiam ſanis ordinariam pervenit, reſpiratio nunquam frequens fuit, aſt collum prius ad pollicem laqueo depreſſum iramuit, & cum nullus Chirurgus metu frivolo deterritus vellet venam juguli ſupra tumorem tundere, miſer placide obdormivit tunc illa dyspnœa, pulſu ſenſum rariori & depreſſiori facta ob impedimentum ſanguinis a cerebro reditum, & ſic obijt, pulſus vix trigieſies ſexies in minuto micabat, & reſpiratio raritate, & parvitate erat vix conſpicua paulo ante mortem.

Auctores in hoc præſcribunt emetica & cardiaca, verum multo præſtautius eſt phlebotomia largas, promptas, inſtituere, frigida ſitim horrendam ſedare, & carum a popularibus compreſſis per inflammationem ſulci a laqueo eſſiſſi prævertere, nam raro reſapē pacatiſſime & ſine dyspnœa moriuntur, quibus, laqueo reſecto, vita reſtituta eſt.

6. *Angina ſchirrhoſa* Boerhaave aph. 797. *Dysp-*

*nea a tumore carcinomatoſo aspera arteriâ adnate*, Boneti Sepulcret. obf. 5. *a ſarcomate in poſſica parte palati*, Ruyschii obf. 43. pag. 45. Galen. de locis aſſect. lib. 5. cap. 5. Tulp. obſer. lib. 1. cap. 44. D.

Scirroſus tumor ſæpe ſequitur cynanchem non reſolutam, ſerophuloſus, bronchoceloſus ſine cynanche prægreſſa ſenſum oritur, dantur etiam excreſcentiæ ſeu ſarcomata, quæ jugulo adnata anginam excitant.

Raro vero, niſi recentes, ſcirrhi reſolventibus ſanantur, adcoque ſuperſtē tantum ut cultro exciſciantur, cum vix erodi poſſint cathæreticis.

7. *Angina ſuppuratoria* Boerhaave aph. 824. Dela Motte Chirurg. tom. 1. pag. 293. C.

Eſt duplicis conditionis, vel ſcilicet apoſteumatosa, de qua Boerhaave & illi, van Swieten ſuſe egerunt, quæque caute lanceolam admodum exigit, ut pus foras effundat, præmiſſis emollientibus intus ore detentis, extus cataplaſmatis forma admodum, & illa neplariſimum ſauſum ſortitur eventum.

Vidi ſuper abſceſſum intra quatuor dies eſſe formatum & ſponte ruptum in textu veli palatini; qui vero plures cynanches paſſi ſunt, illi poſteriores habent mitiores, & non ita conſtringitur via aeris, immo ſere ſine febre abſcōdunt tumores.

Si vero exulcerentur fauces, ulcus illud, modo non ſit venericum, nec caſtroſum, detergentibus ſanatur, exigua difficultatem loquendi, & reſpirandi ſecum inferit, cum anhelitus ſœtore, copioſo pyraliſmo; numquam vidi ulcus ibi profundum, ſola epitheli ſeu membrana mucosa excoſiata eſt, & hæc excoſiata eſt coloris griſæi.

8. *Angina membra, Ulcers utrinque non poſſit, Chancra an poſſit?* C.

Nihil eſt frequentius in venericorum praxi quam ulcuſcula ſuperius deſcripta, leviſſime excreſa, griſea, ſed circa laryngem, pharyngem, uvulam ſerpentia, cum voce rauca, miali, pyraliſmo aquoſo, mucoso, ſordido, exiguo dolore, nullatenus frequenti reſpiratione, ſed cum ſenſu impedimenti inter deglutendum, luter loquendum, clamandum. Micro loqui de cynanche mercurialis ſeu quam hydrargyreoſis excitat, quæque non eſt hujus loci.

9. *Angina hyſterica*, Riverii obf. 26. centur. 2. Frid. Hoffmanni; L.

Ea ſpecies periodicè ſingulis diebus revertitur, cum ſopore, naſea, ſuffocatione, doloribus vagis, difficultate deglutendi; quæ omnia ſymptomata poſt aliquot horas evaneſcunt; an febris intermitteus, licet ſine pulſus frequentia, eum morbum ſoveat, qui complicatur eſt cum hifteria, ſuſpicatus eſt Rivierius, & non obſtante ſopore magnam laudandi doſim anteaſceſſum exhibuit, quo morbus ſanatus eſt. Vide *dysphagiam hyſtericam*, & *orbopneum hyſtericam*.

10. *Angina hydrophobica; Icyamæ Græcis* Darlowe Jour. de Med. 1756. H. Brogiani de Veneti. p. 102. Puerulus Monſpelienſis, a ſele rabida demorſus

in

in tibia, bene se habuit per duos menses, deum febricula cum difficultate deglutendi & respirandi, ac aquæ horreo correptus, pacatus & minime fuit languis, nec ullum cibum capere voluit, sicque intra undecim dies obiit. Rusticus ante quadraginta dies a cane rabido demorsus, quem memorat in *Mém. de l'Acad. de Montpellier. Huguier*, querebatur tantum de angina, atquequam furor, & mordendi cupiditas eum invaderent; haustus nulla, aut exigua febris. In cadavere hydrophobicorum videnti summam rubedinem in pollicis parte tracheæ arteriæ juxta glottidem; caveant Medici nodigito in guttur ægri adacto malum explorent, ut accidit peritissimo Chirurgo.

#### 11. Angina nasalis.

Est inflammatio catarrhalis membranae pituitariae, quæ nares pollicis succingit, cum difficultate loquendi, deglutendi, & per nares respirandi, nec non doloribus noctu adauctis, velum palatinum ejusque columnas, nec non tubas Eustachianas distrahentibus, pervigilio, odore singulari cupri in naribus. Terminatur intra aliquot dies per excretionem & emundationem copiosi muci, albi, flavescentis, insipidi, qui non ex suprema narium parte, sed tantum ex naribus posticis juxta fauces procedit. Hanc passus sum & in aliis observavi. Auditores vero minime recentent.

Diffingitur a coryza 1. sede in parithimii; 2. odoratu superfluo; 3. dolore ad aures externas protenso, vivido; 4. continua exspuione muci faucibus viscosi; 5. deglutendi difficultate; 6. veli palatini rubedine; cum solvitur morbus mucus viscidus & sanguinolentus ex naribus & ore circa sextum, septimumve diem affatim rejicitur; adeo ut in coryza vox natalis, rernutatio & sensus obstruccionis in naribus, ira ut æger noctu, ore aperto dormire cogatur ad respirandum.

12. Angina exanthematica Frider. Hoffmanni. Symptomatica dicta §. 8. variolosa Sydenhami p. 661. 659. & 96. morbillosa. Vide Hist. Rubeculæ. A.

In variolis confluentibus apud adultos non raro circa undecimum diem saliva gutturis eoque viscida est, & excocta, ob calorem præcedentem & pustulas adnatas, ut tantum non suffocetur æger; gargaria necessaria in usum trahatur, & syringa in fauces sedulo sæpe die, noctuque injiciatur, quod componatur ex aqua bordei cum melle rosarum; sed si æger eo redactus fuerit, ut singulis momentis a suffocatione periclitetur, stupore obruptus, & spiritu fere undique præcluso, non satis est si pyralismus accedat ægro ad has incitas redacto, feliciter nonnunquam exhibetur dosis emetici stupori proportionalis; interea quotquot undecima die in hac specie variolarum intereunt, fere hoc symptomate jugulantur.

Angina vero rubeculosa potissimum in morbi initio ægros divexat, cum tussi, dolore faucium, sternutatione, sed facta eruptione cessat: succedat *Nosologia Methenica*. Tom. I.

ditetiam angina erysipelati repulso, arthritidi. 13. Angina scorbutica Frid. Hoffmanni §. 6. Bartholin. Med. Dan. Die besen halfe Germanorum. B.

Est levior colli & interiorum faucium phlogosis cum tumore & dolore glandularum, quæ frequens admodum est scorbuticis.

14. Angina rhimica Boneti Sepulchret. obs. 1. Simon. Paulli. L.

Videtur pertinere ad dyspnœam; procedit a rhymi intumescencia.

15. Angina polyposa Albucasis Chirurgæ l. 2. cap. 36. Balgivi prax. C.

Est difficultas respirandi ac deglutendi a polypo narium in gulam apud proctoso; hujus observatio, & curatio apud *Albucasis*, nec non in *Schenckio* & apud *Daglivi* reperitur. Vide *Schenckium* pag. 223.

16. Angina aneurysmatica Boneti Sepulchret. C.

Est angina orta ab aneurysmate arteriæ majoris laryngem aut tracheam prementis.

17. Angina bronchotica Petri de Marchetris & Fel. Plater. a *sterna interna circa jugulum*. L. Vide orthopnœam, nec non dysphagiam.

18. Angina spasmatica Rud. Zvingeri Aët. Helvet. Tom. III. p. 319.

Nono die post vulnus metacarpi & fracturam digiti, sedata pyrexia, æger juvenis, jam, ut videbatur, convalescens, inopinata deglutendi difficultate & anxietate suffocativa ad singulos manducandi conatus corripitur: in collo nihil erat conspicui; maxilla inferior ad superiorem contracta & rigida, in manu faucia spasmus dolorificus frequens per totum brachium excurrens; animus sui compos & supra modum anxius & inquietus; interdu saliva & mucus ex ore scaturiens, cum deglutendi nisu spontaneo; ingesta quivisa faucibus resiliencia; post aliquot dies, sic noctu & interdu consiliatus tetano resiliens correptus, voce quasi catulina, interius ardens, sitiens, omnia stragula rejiciens, die post vulnus 17. ab angina 8. obiit: curam vide in *Trismo traumatico*.

19. Angina alba De Meyserey Tom. 2. pag. 315. *Esguinancie blanche ou pituiteuse*.

XL. PLEUODYNE; *Pectoris laterum, vel dorsi dolor* Boneti Sepulchret. lib. 2. sect. 4. *Pseudopleuritis*, Nouvell. classes des maladies; *Pleuritis spuria* Auctorum: Vide van Swieten comm. 4ph. 875. *Douleur de poitrine*.

Est genus morbi, cujus præcipuum symptoma est pectoris, laterisve dolor pungitivus cum difficultate respirandi, citra phlegmasiam acutam. Non minus differt a morbis inflammatoris, ut pleuritis, quam mania a phrenitis, & hystericalgia ab hysterite, præterea hoc genus includit species quæ a pleuritis quam vocant falsam alienæ sunt, nec ad aliud genus aptius referri possunt.

1. Pleurodyne plethorica, pseudopleuritis Zacuti prax. *Pleuritis spuria* River. centur. 1. obs. 73. B.

Z 3 Spec.



Species illa dolore lateris pungitivo, tum & spūis raro cruentis, cum difficultate respirandi sine febre acuta cognoscitur; oritur a plethora, ut plurimum frigore suscepto aut simili errore concurrente.

Curatur vel sponte abortis catamenii, aut fodore adjuvante, dicta tenui, resolvente; vel curatur phlebotomiis, poro diaphoretico, licu parvis afficitur cum unguento de alba, foru ex linreis calidis, ex ovorum intrita, cataplasmate ex avenæ granis frictis cum foliis petroselinis, cicuta &c.

2. *Pleurodynæ verminosa* Quercetani pharmac. lib. 4. Vernæ de pleuritide pag. 89. *Dolor pleuritici ex lumbicis* Riverii centur. 1. obs. 75. Bonet. Merc. Compit. p. 574. A.

Illa species cognoscitur ex febre vaga, continua vel remittente, sed non inflammatoria, cum tussis sicca, dolore lateris pleuritico, lumbicorum excretionem, singularis oris fœtore, in infantibus potissimum.

Curatur cathartici & emetici, nec non vermifugis, licet phlebotomia una ob vehementiam febris sit quandoque præmittenda, cathartica ramen mitia sint; julepi ex aqua portulacæ, decocto graminis canini, infuso seminis fantonici, foliorum tanacetii, oleum amygdalarum, &c. cæteris præstant.

3. *Pleurodynæ rheumatica* dolor lateris, Ballonii Epidem. lib. 1. L.

Est dolor qui a rheumatismali materie fovetur, quique stipitatur crusta alba, crassa, sed molli supra sanguinem in patella effusus. Sæpiatur ut rheumatismi, potissimum phlebotomia, & pristinis sudoriferis; æger in laus affectum facere non potest.

4. *Pleurodynæ flatulenta* Ballonii Epid. pag. 7. & 2. 18. 34. *Dolor lateris a flatu* Biauchi pag. 235. B.

Est ea species quæ subito partem pectoris corripit & diro dolore excruciat, dein vero subito recedit, nec per plura minuta tolerari posset, quippe præfocatus, crampum pectoris merito diceret, & reapse Veteres crampum a flatu omnes deduxerunt; utrum vero status in carni interstitiis geniti id producant, valde dubium est, potius spasmus inculcarem; hic dolor melancholicos, hypochondriacos, studiosos, sæpius a frigore suscepto, corripit, pulsus lentus & contractus est, nulla tussis urget, sed oppressio in loco dolente quæ respirationem intercipit, raro catenus durat, ut remedia queant adhiberi præter lintea calida. A potu frigido sub noctem, a crudis fructibus excitatur.

2. *Pleurodynæ flatulenta* Pringlii p. 219. *Pleuræse ventense*, pendet a flatibus & scybalis in colo sub diaphragmate positis, respirationem lædit & tussis parva sed frequenter stipitur; dolor a sterno ad dorsum vel ab uno ad alterum latus protenditur; deest febris, pulsus drities corium sanguinis; nocet phlebotomia; juvant carminantia intus admoda, atque vesicatoria.

3. *Pleurodynæ venerea*; *lateralis dolor*, Ballonii

Epidem. lib. 1. pag. 8. Moroni Direct. Gall. c. morbus.

Sunt dolores lateris perpetui, sed qui de nocte urgent magis, nullisque cedunt remediis, præter hydragryosum; illi verno tempore recrudescunt cum febricula.

Similem dolorem noctu recrudescentem memorat Riverius obs. 8. centur. 2. dolores erant vagi circa thoracem, quo post primum somnum in quinquagenario recurrerant, tanta vehementia ut nullo decubitu consistere posset, sed surgere cogereetur; Riverius cum dolorem a cacochylia deduxit, & decocto chinæ per quindecim dies, præmissis phlebotomia & apozematibus, cum abulit.

Septuagenarius ab ægmo dolebat latere pectoris, in quo jacere non poterat: in cadavere vidit illi Veziani cariem quæ costas, vertebbras, musculos, & pleuram absumperat; ea vero caries erat syphilitica; Veziani de Parapleurisi de Cap. 3. pag. 26.

6. *Pleurodynæ hysterica* vān Svvieten Comment. aphor. 633. & 675. *Hypochondriaca* Vernæ c. 17. pag. 87. de pleuritidis nothæ signis; Storck Ann. Med. p. 78. L.

Ea est quæ etiam flatulenta Veteribus dicitur, & quæ hysterica vel hypochondriaca afficit.

Phlebotomia minime competit, observante Ballonio Epidem. lib. 1.

7. *Pleurodynæ a cacochylia* Vernæ cap. 11. de pleuritidis nothæ signis pag. 90. A.

Ea a cacochylia primarium viarum, sanguinem inspissante, & pleuram infascente, procedit, & licet synochum aut febrem mesentericam comitetur, tussis, abdominis tensione, genarum rubore, dolore ad hypochondria extenso, purgare potius oportet quam sanguinem mittere; Vide Hippocratem lib. de diata acutor. n. 12. & lib. Prænotion. n. 25.

8. *Pleurodynæ phthisica*, Guarinoni, Dodonæi Obs. Cap. 12. Bonet. Mercur. Comp. pag. 574. *Pleuritis phthisica* Vernæ cap. 11. p. 92. C.

Ea est pleurodynæ species quæ in pulmonis vomica, empyema, tuberculo, cum febre miti, identidem exacerbatur, quoties novum tuberculum inflammatur; ita ut tussis acrior, spūis cruenta, pectoris oppressio major accedat, ira ut venam tundere non raro necessum sit ad suffocationem avertendam, dein de narotica vespere sunt exhibenda; in illis vero casibus insula cruoris crusta alba, sæpius flava tægitur, & sero copioso sublato innata; illa species mitigatur aborta nova puris anachataris. Juvat emplastrum de melioto, cucurbitula.

9. *Pleurodynæ a spasmo* vān Svvieten Comm. in aphor. 675. L.

Spasma non est spasmus, sed distractio, divulsio, qualis accidere solet a vehementi musculi nisu, contractione, extensione, ut inter ludandum, onera gestanda, currendum; illos autem vehementes nissus sequuntur postmodum dolores pectoris cum sensibilitate partis affectæ; ita

ita ut tunc non recuset, non secus ac si pars confusa fuisset.

Curatur autem phlebotomia, fomentis hume-  
stantibus, linimentis oleosis, intrita ex ovib.  
fraxis; ea species est ut plurimum sine tussi.

10. *Pleurodyne ex aneurysmato* Riverii prax.  
lib. 11. cap. 5. Parei lib. 6. cap. 18. C.

Ab aneurysmate aortæ, arteriæ pulmonaris  
aut auriculæ dolore, quandoque pectoris pul-  
satione & palpitatione cordis agnoscentur.

Pleurodyne vero symptomatica observatur in  
multis morbis, quos vide suo loco, ut dyspnœa,  
emphema, phthisis, orthopnœa, palpitaris, hepato-  
algia, rachialgia, lumbalgia, nephralgia.

11. *Pleurodyne scorbutica*. Vide Lind. de scor-  
buto pag. 367. pleuritidis scorbuticae Sennert. de  
scorbuti signis. A.

Adest tussis cum abacathari viscosa, dolor  
locum mutat, crescit a tussis; aut progrediente  
morbo figitur in alterutro latere, tunc vividissi-  
mus evadit ad sternum & respirationem præpe-  
dit, cum periculo vitæ; si accedat diarrhœa, le-  
thalis est; vesicatoria quæ multis aliis speciebus  
pleurodynes utiliter parti dolenti applicantur,  
hic tuta non sunt. Juvant potus saporifici ex  
acetate theriacali, ipsa theriaca, spiritu Mindere-  
ri, maxime vero repetitus usus acetici scilicet  
parva copia; phlebotomia vero nocet. Acetum  
scilliticum præscribitur ad drachmas duas ter  
in die; cruor extractus omnino dissolutus est,  
sudor feliciter proritat sumpto scrupulo se-  
milis nitræ & camphoræ, superbibendo infusum  
salvæ. Vide Bartholini Medicinam Danicam.

12. *Pleurodyne arthritica* Baglivi pag. 43.  
Stahlii de morbis ætatum, van Swieten aphor.  
376. B.

Salia volatilia cornu cervi, & narcotica sua-  
dentur, nec non sinapismi pedibus admoti.

13. *Pleurodyne rachitica* Buellneri de rachiti-  
de. L.

14. *Pleurodyne catarrhalis*. Vide Catarrhum. B.  
Differt a rheumatica per coryzam, raucedine-  
m, sternutationem, &c.

15. *Pleurodyne febrilis* Mortonii de febribus,  
pag. 93.

Febris intermitiens sublarva doloris puncto-  
rii lateralis. Vide curationem, & historiam loco  
citato.

Febris proteiformis Diar. Med. Mart. 1761.  
pag. 111. dolor lateris vividus in hypocondrio  
dextro, pyrexia exigua, pulsus debilis, sputa  
viscosa, magna debilitas, accessus febris hora  
quinta vespertina inibat a frigore, & post ali-  
quot horas sudore ac urinis lateritiis termina-  
batur: in hoc morbo kinkina est eximium re-  
medium.

16. *Pleurodyne miliaris* Allonii de miliari.  
Vide pleuritidem. A.

17. *Pleurodyne ex abscessu* VVillii. Path. 10. L.  
Vir quidam Monspelli laborabat a duobus  
annis dolore lateris, cum febre lenta, tussi sic-  
ca, decubitu in latus dolens impossibili; demum  
sub mamma inter costas apparuit tumor, qui

ad pomi aurantii molem excrevit; hoc seculo  
fluxere puris libræ plurimæ, & æger conva-  
luit, observante Barbeyrac.

VVillius vidit etiam similem morbum ex ab-  
scessu inter musculos thoracis.

Vidi in pleuritici cadavere magnum absces-  
sum pleura tectum, & ad diaphragma serpens,  
atque intra pectus extuberans, inde oritur em-  
phema intercostale, cujus exempla decem re-  
ceperat Ill. Veziani della parapleuritis cap. 3.  
n. 33. 39. &c.

18. *Pleurodyne ab officio* VV. Giffard. Trans.  
Philos. n. 395. anno 1726. L.

Talis, dyspnœa, magna inspirandi difficul-  
tas, cum sensu ponderis & doloris in latere  
dextero pectoris, diu defatigaverant ægram,  
quæ demum peripneumonia occubuit. Inventa  
sunt in pectore officula, quorum unum sex pol-  
lices longum, tres latum, costarum dexteri la-  
teris perioleæ annexum, ubi dolor & pondus.

Multas alias pleurodynes hujusmodi rariarum  
videtis in Boetti Sepulchreto, titulo doloris pleuritici.

19. *Pleurodyne parapleuritis* Ill. Veziani C.

Parapleuritis est dolor lateris chronicus, pleu-  
ritidi succedens, sæpe cum tussi sicca, sputo  
quandoque cruento, pyrexia a palstu accedente,  
sine sudore, cum loquendi labore, respiratione  
brevis, decubitu in latus dolens difficili, & san-  
guine pleuritico. Hic morbus differt a phthisi  
incipiente, ab emphyemate, a rheumatismo per  
signa ab Authore tunc & dilucide recensita.  
Curatur vero possimum phlebotomia, nec non  
potu diluente, oleo amygdalarum, narcoticis  
levibus, oxymelite, nitro, sero lactis, &c.

20. *Pleurodyne a rupto œsophago*. Boerhaave  
historia morbi Baronis de VVassenaes.

A nausea incipit, subito dolor atrox in ima  
œsophagi parte, cui accessit sensatio mutationis  
inaudita; in situ partium internarum, æger in  
lecto erectus stare cogebatur capite anteriorum  
flexo metu suffocationis, immobilis erat, quid-  
quid deglutiret illud in pectoris cavum diffunde-  
bat cum multo flatu, inde sensim distantum  
epigastrium, dyspnœa crescens, debilitas sum-  
ma, & intra paucos dies mors.

21. *Pleurodyne vomica*: Vomica pulmonum VVil-  
lisii, Vomica lateris Tulpii; Tuberculum pulmo-  
num Baglivi; Abscessus pulmonum Ettmulleri.

Signa duo pathognomica sunt vomicæ, sed  
sæpius insuficientia, tussis scilicet sicca perma-  
nens, & dolor levis in pectore: ægri, de cæ-  
tero bene habentes, difficulter spirare incipiunt,  
inter respirandum non sistent, nec quicquam  
expirant, in locum dolentem decumbere ne-  
queunt; sicca tussis, dolorque assiduus perseve-  
rans; tandem genæ rubent, pyrexia lenta su-  
pervenit, & alia suppurationis symptomata ac-  
cedunt; rupta vomica puscullo intra tracheam  
ubertim effunditur, & ægrum non raro suffoca-  
cat illico, secus pus fortitum copiosum æger  
expectorat & phthisicus evadit; aut ab ea phthisi  
plures convalescunt, maxime si expectoretur  
cytis pus continens.

**XII. RHEUMA**; *Catarrhus ad pectus Capivacci*; vide Schneider Lib. I. cap. 5. *Refredatura Italis*; *Rhumadix Hifpaois*; *Rhème de poitrine*.

Est difficultas respirandi aeris quod frigus & calorem vicissitudinibus superveniens, tussis, rancedine, sternutatione, coryza, doloribus vagis, intumescencia partium acri expositarum, &c. siipata.

Per hanc syndromen distinguitur rheuma ab omnibus aliis pectoris morbis, & a morbis aliis catarrhalibus, ut tussis catarrhali, quia in rheumate pectoris, oppressio & difficultas respirandi sunt præcipua symptomata; & præipue pneumonia catarrhali, ex eo quod non sit febris inflammatoria.

Veteres inæpte definiunt rheuma & catharrhom, alii per *diffinitionem*, aut *diffusionem*: alii per *decubitus* humoris; cum illa *diffusio* foret imaginaria, hypotheica, *decubitus* nomen absurdum, & morbi omnes definiri, tantum debeant per phenomena. Immensa vero disputatio Schneideri de horum verborum significato integrum librum comprehensens, est opus hominis sua eruditione, suo otio abutentis.

1. *Rheuma catarrhale*; *Rhème*. D.

In rheumate membrana mucosa, quæ vias aëreas pulmonum obducit, levi phlogosi afficitur, tum quia frigore contrictis ejus poris, perspiratio aeris & copiosa, quæ ex his continuo exhalare debet, retinetur, & sensibile illud organum irritat; tum quia frigore coagulata lymphæ, quæ illac fluit, obicem aliqualem ponit lymphæ retro secuturæ, unde congelat, ipsi sanguini per vasa minima circulantia resistens; natura vero tum tussis repetita hoc coagulum resolvere, tum febricula excitata obicem tollere conatur; hinc calor, qui sensum crescens, diu applicatus, oscula excretoria diduxit, lympham ad excretionem disponit; tum demum sit muci illius viscidus, quandoque aeris, anacathartici morbum solvens.

Perspirabile quod ex pulmonibus quotidie exhalat, ad uncias circiter viginti duas assurgit, experimento *Halesii* hoc ergo suppressio, infarciuntur vasa excretoria, secretoria pulmonum, tumet textus cellularis, imminuitur viarum aërearum capacitas; inde vero respirandi difficultas, angustia, dolor.

Cura est potissimum opus naturæ, quæ debito caloris gradu per longum tempus continuato fovet, coquit, & demum resolvit hanc pituitam, quæ membrana interna viarum aërearum turgescit: huic Medicus ferens suppetias, præscribit viduum parcissimum ex jussulis, panatellis, ofsis, cremoribus, potum calidum diaphoreticum ex infuso capillorum veneris, florum papaveris rhæodori, decocto fursuris cum melle, vel farcharo, vel syrupo capillorum veneris.

Si tussis acris, secca, dolor vividus, pyrexia, pervigilium, ætas florida sint, phlebot-

mia utilis est, potus magis emolliens imperandus ex decocto radicum althææ, infuso florum malvæ, violarum; julpia sint ex syrupo de althæa, de violis, & ad somnum conciliandum vespere ex syrupo de nymphaea, papavere albo, aqua liliorum.

Si tussis faciliior, dolor gravior, pyrexia nulla, sputa viscida, sensibilitas pulmonis minor, sensus frigoris, &c. præstare sint diaphoreticæ ex floribus papaveris rhæodori, foliis scabiosæ, radice scorzonæræ, addantur deterfiva ut ficus, mel, syrupus de hyssopo, tussilagine, pedecati, erylino; poterunt calide infusa horum, florum salviæ; jussulis incoquantur cæpæ, porra; noctu grana pauca theriacæ assumentur.

Interea frigus, aura ex rimis illapsa, loquela, cantus, vespertinus potissimum ros, fugiantur; morbi omnes catarrhales vespere intenduntur; proindeque aeris humiditas lucido igne dissipetur, caput & pectus paulo curatius tegantur; perspiratio, potissimum capitis, tanta perspiratione, laneis tergminibus, pectoris calor similibus indutiis, foveantur, quæ dum calida sunt & secca humiditatem combibunt, perspirationi proinde favent; abigenda vero velimentæ & indusia quæ frigori & humiditati aufferendis non conducunt, ut pellicæ.

2. *Rheuma Epidemii* anni 1743. *la Grippe*.

Invasit cum quadragesimali jejuniio: juvenes tussis secca, dolore artuum, ephemera, cephalalgia affecti, post quartam diem sputo superveniente sanabatur; senes vero intensissima illa symptomata patiebatur cum sibilo mortis prænuncio, & die nona vel undecima efferebantur: pulmones erant gangrenosi vel sanguine infarcti; pluribus natium hæmorrhagia antea aut post mortem accedebat, licet vena bis terve secta fuisset; apud Invalidos Parisiis quadraginta ægri quotidie moriebantur.

Processus felicior hic fuit: prima die duæ phlebotomiz; secunda emeticum vel catharticum; tertia phlebotomia, & vespere julepis narcoticus; a quarta ad nonam mixtura ex tribus granis kermes-mineralis cum tartari vitriolati & antimoni diaphoretici; ana semidrachma; divide in sex doses, sumatur una tertia quaque hora: expectoratione circa decimam diem accedente salus.

**XIII. HYDROTHORAX**; *hydrops pulmonis* Hippocrat. lib. 2. de morbis; *hydrops pectoris* Auctorum; *hydrothorax* Corderi compend. præx. *Hydropisio*, de poitrine.

Genus est anhelationis seu difficultatis respirandi, quæ crescit pro gradu inclinationis trunci, cum faciei pallore, manuum & pedum phlegmasia, subita in somno suffocatione, alterutro brachii stupore, & ægitudine chronica non intermittente.

Cum dyspnœa ab hydropneumonia facile confunditur, nec distingui solet nisi per eventum instantum in hydrothorace, quandoque sanctum

in hydropneumonia seu œdemate pulmonis. Si tamen aquarum fluctuatio perecipiatur, commoto ægri humeris prehensi pectore hydrothorax certius cognoscitur.

Signa ex *Hippocrate* sunt febris, tussis, respiratio frequens, pedum tumor, ungulum contractio, symptomata emphyematis, cum majori diurnitate, minorique intensitate, sonus quasi ebullientis fluidi in pectore, dein diarrhœa quæ æger aliquandiu subleatur, sed dein in pectus ruget, acites, hydrocœle, faciei œdema sublequantur. Brachii alterius œdematiâ addunt *Fanionius*, *Euchernus*, *Falsalen*, aliique; sed nulla certa esse signa præter aquæ fluctuationem sono perceptam concedunt omnes, & ea fluctuatio raro auditur.

Empyema distinguitur a prægrævis signis peripneumonizæ vel pleuritis suppuratæ.

In utroque affectu si latus dexterum aqua torqueat, æger cogitur decumbere inclinando versus latus oppositum; si utrumque afficiatur, in neutrum latus inclinare potest, quin tussis & dyspnœa majori, immo si paulo celerius inclinet, cordis palpitatio, tremor corripitur; tussis ut plurimum sicca est, febricula anomala; cum omnia symptomata hydrothoracis abique effusione feri in thorace quandoque observata sint, male in ejus morbi definitione reponitur hæc effusio; cum enim ipsa effusio feri est reapienda hujus morbi principium morbosum, male in definitione hujus reponitur, cum nulla nota ione testat, & si qua innoscatur, ea nota in definitione reponenda est. Is erat pravus mos Veterum causam in morbi definitione reponere; sic fatis ridicule definiobatur syphilis per interemperiem occultam hepatis inherenter, illiusque sanguinem, ac spiritus nativa quadam antipathia inficientem, &c. ut acribat *Varandans*.

1. *Hydrothorax chylosus*. Vide *VVillisi* c. 13. de hydropneumonia pag. 113. tom. 2. C.

Adolescens immodicus deditus exercitiis tandem in thorace velut inflationem quandam persensit, ut tumescere pulmonem sinistram, & cor extra locum protrudi ipsi videretur cum maxima pulsatione: deinde quasi vasirruptionem & feri cuiusdam stillicidium in pectore percepit, quod ab adstantibus audiri potuit; attonitus statim rei novitate, interea, quia aliunde quoad vires, somnum, famem bene se habebat, securus vixit: postmodum a quovis corporis motu fluctuationem in corpore persensit, cretente morbo illustr. *VVillisi* & *Lewerus* paracentesim pectoris suaverunt, intervenit cauterii inter sextam & septimam collam applicati; postmodum foraminis facto canalis inditus est, ex quo statim uncizæ sex liquoris crassi, albi, chylosi extractæ sunt, postmodum tantumdem, & sic per longum tempus, relicta cannula, æger identidem fluere sinebat humorem deinde ferocem, interea vegetus vultu & viribus valens ambulabat, eguitabat adolescens, decocto vulnerario utens.

Nunc ut verosimiliter ruptum est quoddam vas chyloferum ex ramis causalis thoracis.

2. *Hydrothorax ab emente Rhodii* observ. 24. cent. 2. C.

In hoc morbo sunt hydrothoracis vulgaris symptomata, nulla vero effusio in pectoris cavo, sed omentum mole sua, & convulsione diaphragma premeas & dyspnœam inducens, quæ pro hydrothorace vero imponit.

3. *Hydrothorax vulgaris*; Carol. Pison. de morbis a colluvie serosa, hydrothoracis pag. 215. Baglivii p. 432. C.

Vel succedit morbis acutis ut pleuritidi, peripneumonizæ, de qua varietate infra. Vel obstructionibus pulmonis, hepatis supervenit; vel ab asthma, dyspnœave procedit, verbo a causis morbi chronici, & ista varietas non ita cito ægrum jugulat. Plures observavit *Pisæ*, qui per annum unum aut alterum hoc laborabant, & dubium erat inter Medicos, num laborarent epialte, quippe tolemne est in hydrothorace circa horam unam aut alteram ab ineunte somno subito exasperari, & aeris capendi gratia fenestram aperire, quæ difficultas respirandi mane remittit, & vespere revertitur; ita ut insomnes, suspiriosi, anhelosi, animam agere viderentur; ægri ut plurimum procedente morbo minime possunt in lecto decumbere; sed in cathedra sedent & dormiunt capite paululum ad antica inclinato, pedibus œdematosi, sitibundi.

Cavendum est a fortibus catharticis ne suffocentur; præmissis levis hydrogagis, diuretica adhibenda sunt, qualia sub forma jussulorum ex balneo maris paratorum adhiberi solent, potissimum cum sacculis ægri est fracta a morbis prægressis, in quo etiam casu vix potest suaderi sectio pectoris, cum viscera sint prius labefacta, nec principio mali obviam ire possibile sit.

Ubi vires integræ, morbus recens, color ægri bonus, nulla labes verus in visceribus, lateris sectio faustos successus fortiri potest, & laudatur a multis; profunt etiam cauteria tibiis inulta, vel leves, & cutaneæ scarificationes ex suavis *Hequetii*, sed curativum processum fuscæ delineatur videtur in curatationibus illustr. *D. Lazere*. *Rivierus* hydrothoraces aliquot sanavit cum usu calomelani, cum decocto sudorifico. *Baglivii* decocto plantarum aperientium, & oxymelitis scilicito inveteratum hydrothoracem abtulit. Successum scarificationum pedis in hydrothorace videns in *Journal des Savans Ann. 1636.* auctore *Rainsfani* terra foliata tartari a scrupulo uno ad drachmam unam sæpe promovet catharsim, anacatharsim & diuresim, cum magno ægri levamine, si repetatur.

Paracentesim opus acutis trienspidis mature instituendum suadet eximii Auctores, modo nulla labes prævia & insanabilis visceribus insideat, inter quos illustrissimi *Senacius*, *Bonardellinus*, *Bergeron*, *Merand*, *Chuvrier* felices ex hac operatione eventus observarunt.

Signa hydrothoracis juxta eruditum *D. Bonillou* sunt

sunt primaria, difficultas respirandi, difficultas in hoc vel illo situ jacendi; tussis sicca vel humida, pondus supra diaphragma, pulsus depressus, urinae paucitas, & oedema vel palpebrarum inferiorum vel extremorum: signa secundaria sunt anorexia, vigilie, anxietates, syncopes, vox debilis, orthopnoea, urinae lateritiae, tumor hydrochondrii, cingulum dolens in imo pectore, sputa cruenta &c.

4. *Hydrothorax febrisque* D. Varnier. D. M. M. Journ. de Med. Octob. 1757. pag. 261. C.

*Grandulæ Nosocomii Valent. anarum Medicus, Traité des Malades de poitrine Paris 1739.* plures pleuriticos inter 6. & 11. morbi defunctos dissecuit, inque omnibus hydrothoracem, ac pleuræ cum pulmone adherentias invenit.

Duo parvas circiter novènnæ syncho levi cum fratre pectoris oppressioe & tussicula, misso bis vel ter sanguine obiere. Pectus sero limbo plenum repertum est, pulmonibus sanis. Ego vero in insuperabilis Nosocomii generalis multoties minime prævisum hydrothoracem inveni, licet cadavera sere calenta exenterassim, unde apud eos rarissime phlebotomia utor.

Signa imminents hydrothoracis ista proponit D. Varnier. Si pleuriticis, peripneumoniacis, catarrholis, febris valde remittat, nec sudorifica adhibeantur, aut quod pejus, phlebotomiae iterentur; si sanguis in patella non est sebaceus, sed multo sero circumdatus, si lingua humida, calor exiguus, tussis parva, sicca, inutilis, oppressio etiam parva, quæ tamen in quovis pectoris motu crescit, continua, sensus fluxus aquæ pulmonem prementis, &c. in his timendus hydrothorax, adhibenda sudorifica fomentis juncta.

In hac specie cum vires non sunt fractæ, nec est ulcus, scirrhus, vel suppuratio in visceribus, cathartica hydragoga possunt adhiberi, ut succus iridis, syrupus de rhaino; item optime conveniunt diuretica, ut succus copiosus chærophylli juxta methodum Geoffroi, decoctum fructuum paliorii, vel semina ad drachmam unam deglutita, juscula aperientia cum millepedibus, acetum scilicet cum ad drachmam pluries repetitum, vel ejus radices pauca grana, ut duo vel tria.

5. *Hydrothorax hyatidosus* C. Pison. hydatides pulmonis pag. 225. obs. 53. Læzii a Fonte consult. 8. Morgagni Ep. XVI. 43. 33. C.

In adulescente anhelatione sublimi a multis annis laborante cum febre, dein repente suffocato, inventus est hydrothorax in uno tantum latere; & pulmo ejusdem lateris refertus erat vesicis hamore pellucido viscoso plenis.

Ideo æger in hydrothorace truncum erigere cogitur ad facile respirandum, quia in hac positura, aqua proprio pondere deprimit magis diaphragma, quam in alio quocumque situ, adeoque cavitate pectoris tantumdem ampliatur, e contra in situ horizontali pondus aquæ sustinetur a collis & in longum spatium diffusæ a-

quæ minori ex altitudine ponderant in diaphragmatis ambitum, non vero in centrum, adeoque in eam partem, quæ minus deprimi potest, ergo capacitas thoracis non ampliatur, & aquæ in pulmonem gravitant, unde oppressio; jam vero si hydatides amplæ, molles, flaccidæ sint, & in thorace pendulæ, eæ debent pari lege gravitare ac si fluidum constituerent, proindeque hydrothoracis phænomena exhibere.

6. *Hydrothorax mediastini* Riverii. centur. 1. observ. 60. Columbi anaoom. lib. 2. cap. 3. D. Bouillet dissert. 1753. Heister Anat. num. 39. C.

Morbus est qui conjuncta habet symptomata asthmatis, peripneumoniz & palpitationis. Videlicet, cujus historiam refert Riverii, intra mensē hoc morbo obii; initio correpta est magna respirandi difficultate, asthmatis paroxysmum æmulante, cum tussis, sputum cruento, febre & faciei rubedine, quæ phlebotomia sedabantur; accessit pondus grave in medio pectoris, ardor internus, pungitivus in diversis thoracis locis; intra quatuor dies quatuor phlebotomiz cum levamine celebrantur; vespere febris crescit; aut in regione cordis violenta percussio instar mallei, seu palpitatio vehemens, pulsus depressus; medicamina antihysterica præscribuntur, catamenia copiosa accedentia sublevant, levis alvi fluxus, vomitumque spontanea accedunt, juvant; antea vixesimo die convalescere videtur; vixesimo nono subito moritur; aperto cadavere, mediastinum fuit plenum sero sanguineo, pulmones purulentos, ovaria nigra; *Rachinus* optime judicavit initio hujus ægritudinis adfuisse pleuritidem mediastini.

Hydrothoracem mediastini ab hydrothorace pericardii distinguere difficillimum est, in pericardio tamen, si fides *Plousio*, æger sedens caput ad anteriora inclinat, & ratio est quia in hoc situ diaphragma horizontale evadit, adeoque pressio superincumbentis pericardii sero turgidit est ipsi perpendicularis, proindeque ad illud deprimum & thoracis eægum ampliandum efficacior, unde levatur difficultas respirandi.

7. *Hydrothorax pleura* Frider. Hoffmanni cap. 12. hydrope; Bergeron dissert. de hydrope pectoris. C.

Ex morbus quem censent pendere a collecto sero inter lamina pleuræ & costas, vel diaphragma; sed qui nullis signis certis ante cadaveris sectionem se prodit.

In adulescente sanguine, minime abstemio, dolor fixus in latere sinistro pectoris difficultas respirandi, cum tussis, quæ in dies crescebat, ita ut asthmatici instar fenestras aperire cogere; accessit oedemata pedis, crurifera sinistra, cum hydrocele; pulsus debilis, inæqualis, tussis cruenta, cita mors. Secundo cadavere sepe circumferi seri libæ in latere sinistro pectoris, quas rupta vesica saciformis parti posticæ adherens continerat; hæc Hoffmannus.

Dolores pectoris in latere dextro pectoris

CUM

scum tussi secca notabili, febre hectica, & macie successiva; post triduum difficultas respirandi crescens a decubitu in latus sinistrum, nullum pondus in diaphragmate, levis tumor dextri lateris, & dolor a pressione inter sextam & septimam collam; crescente admodum anhelatione & debilitate, tricuspidæ ac in partem dolentem adacta, quatuor feri libræ eductæ sunt; unde stillante continuo sero sublevatus plures mentes supervixit, hæc D. Bergern, qui sectione cadaveris pleuram a collis in tota lateris dextri longitudine disjunctam invenit.

8. *Hydrothorax pericardii*, *Hydrocardium* Hildani observ. 19. *Hydrops pericardii* Zacuti Lusitani centur. 3. obser. 19. Morgagni Epist. XVI. 34. 36. &c. *Hydrops in pericardio* Vacuensis *Traité du cœur*, Senac *Traité du Cœur*, to. 2. pag. 361. D. Bouillet. dissert. 1754.

Signa hydrothoracis simplicis. 1. Eadem principia prægressa, quæ in hydrothorace pectoris, pallor, palpebræ infimæ, manumque tumor œdematosus, urina pauca, lateritria, litis, tussis secca. 2. Pulsus iuxta ill. *Archiatrum* duriusculus, parvus, inæqualis, intermittens. 3. Palpitatio cordis cum sensu ponderis, doloris, ustionis. 4. Synopes frequentes, maxime erecto capite. 5. Oppressio pectoris cum decubitu tamen horizontali usquequo in thorace facta fuerit effusio. 6. Motus pectoris tremulus vel undulatorius, inter costam tertiam quintam conspicuus, pulsationi cordis respondens. Accedit difficultas deglutendi, tussis, œdema inferiorum artuum crescit, stræ sanguinis expectorantur, summa debilitas, necessitas pulvinarium ad erigendum caput, decubitus supinus, anxietas, orthopnoea, mors; sub finem autem aquæ in pectoris cavum exundant.

Hydrothorax alius est acutus, seu qui intra mentem ægrum trucidat, alius vero chronicus, in quo mitiora sunt symptomata, & juxta observata non pauca æger sedens caput ad anteriora inclinare cogitur.

Vidi hydrocardiam in adolescente prægnante ortam a rheumate pertinacissimo neglecto, recidivo; ægra per multos dies continuo jacebat supina, horizontalis, erecto paulisper capite, animo linquebatur; pulsus erat intermittens, subdurus initio, inæqualis, parvus, cum ægra foret hysterice obnoxia, ea non multum terrebant, nec œdemata pedum & tibiæ; interea peperit, & post biduum lochia evanescere; œdemata subito increvit cum sit, urina pauca, lateritria; tunc pulsatio tremula pectoris & palpitatio cordis accessere, synopes frequentiores evasere, pallor maximus, nulla tussis interea, quæ in rheumate tandiu desatigaverat, quæ tamen deinceps accessit fuitque cruenta; tum pulvinaria adhibita sunt; livor sub axilla apparuit inter costas, difficultas deglutendi, ardor & dolor in regione cordis, nausea, abdomen tumidum, delirium obscurum, dyspnœa major, mors. Cadaveris apertio de-

negata fuit; an aneurysma cordis vel auriculæ simul adfuerit dubium est.

Pluries inveni hydrothoracem, & hydrocardiam maxime apud infantes cachecticos, sine prægressa difficultate respirandi, sed effusio illa feri in cavum pectoris sepiissime accidit paulo ante & post mortem; immo quo serius a morte referatur pectus, eo major est feri copia.

Paracentesim in hoc morbo suadet *Illust. Archiatrum*, vulgo diuretica, catharticaque adhibentur & semper incassum.

9. *Hydrothorax a scabie*. Morgagni Ep. XIV. 35. Storck Ad. Nat. Cur. To. 5. Observ. 47. Ea est quæ a repulis scabiei, rubeolæ, &c. exanthematis supervenit: resumpta scabie spes est sanitatis recuperandæ. Vide *Anasarcam* 3. Ascitem 8.

#### XIV. EMPYEMA, *Empyeme*.

Est difficultas respirandi a pectoris reclinatione crescens, quam præcessit phlegmasia non resoluta, sed suppurata, & comitatur febris hectica, macies, decubitus in latus sanum difficultis, gravitas supra diaphragma, cum plurimis demique hydrothoracis signis.

Principium materiale morbosum est copia puris in cavo thoracis; five sacco pleuræ, five mediastini, five pericardio includatur; sed ut plurimum put illud in cavo thoracis effusum est, diaphragma premit, respirationem difficilem, & in dies crescente puris copia, difficiliorem reddit.

Initio morbi facies minime pallet in empyemate, aut pallet in hydrothorace; latus pectoris affectum sæpe sub finem tumet, remolefcit in empyemate; in quibudam casibus, anacatharsis datur purulenta; sæpius puris consecutionem renovata febris, cum horroribus vagis paroxysmis vesperinis, comitata fuit.

Aposlema quo rupto fit collectio puris in cavo thoracis quocumque sequitur, vel 1. peripneumoniam, hæmoptysim, rheuma; vel 2. pleuritidem vel paraphrenitum, contusumque, vulnus, vomitum lateutem, quæ sine prægressa inflammatione a flatomatibus incipit, deia foris, vel intro crepat, & in hoc casu signa sepe desunt, quibus cognoscatur vomica & dignoscatur empyema subsequens. Puriformem pultem in flatomatibus seu vomicis hujus generis produci citra inflammationem haud dubiam est.

Si inflammatio pulmonis, pleuræ, mediastini, diaphragmatis, pericardiæ duravit per viginti dies absque anacatharsi vel metastasi materiæ purulentæ, tunc hic püs latere certissimus, maxime si signa suppurationis simul adfuerint; rupto apostemate, symptomata subleventur, dolor; febris minuitur; remanet tussis, dyspnœa, quæ crescit in dies; decubitus in dorsum, erectio sensim magis capite, & pectore, illis est commodus; si latus dextrum pure turgear, illi insident; in opposito, cito tuf.

tussunt, suffocantur. In corporis convulsione, quandoque fluctuatio puris perlentitur, immo strepitus auditur; febricula hectica, pulsus frequens, rubor genarum, sitis, anorexia, tabes, sudor nocturnus, diarrhœa coliquativa, mors.

Certe distingui debent tanquam totidem species empyema thoracis a phlegmasia & a vomica pulmonis; empyema pleuræ pure intra eas duplicaturam contento; empyema mediastini; empyema pericardii; verum non satis adhucdum provecta est harum specierum historia diagnostica, prognostica, nec specialis curatio. Interea

1. *Empyema a peripneumonia* van Svvieten, aphorif. 1183. Baglivi pag. 337. C.

Designant symptomata peripneumoniar prægressæ aut pleuritidis cum pectoris gravitate, sputo cruento.

P. Paulus Carmelita, a peripneumonia liberatus, & a febre, rigore, dyspnœa per duas septimanas immunis, signa hydrothoracis habere cœpit, scilicet phlegmatiam, sitim, respirandi difficultatem in dies crescentem, demum obiit; immissa in pectus acu tricuspidæ puris magna copia effluxit.

2. *Empyema a vomica* van Svvieten aphorif. 1183. &c. C.

Inquirenda sunt ulterius illius signa.

3. *Empyema pleura* Boneti Sepulchret. p. 619. tom. 1.

Vidi in cadavere pleuritide extincti magnam puris copiam inter pleuram & costas lateris sinistri, minime effuso pure in cavo pectoris.

4. *Empyema mediastini* Boneti Sepulchr. pag. 609. tom. 1. C.

Sequitur pleuritidem mediastini suppuratam; cujus signa vide suo loco, & curam in *Enchiridio Riolani*.

5. *Empyema diaphragmatis* Bonet. Sepulchret. tom. 1. pag. 619. C.

Præcessit paraphrenitis, aut pus ex pleura costas succingente replevit intèr diaphragma & ejus tunicam superiorem, ut mihi videre contigit.

Harum specierum historias videbis in *Sepulchreto Boneti tom. 1. lib. 2.*

6. *Empyema intercostale*. C

Pendet a facco pure turgido, quem efformat pleura costalis post pleuritidem veram pure distensa, & intra cavum pectoris intumescens; hoc facto compressi pulmones difficiliter respirant: decem plures hujus observationes refert aut citat *Ill. Veziani de paraphrenitide*; atque si ejus signa prostrarent, certe eximio remedio esset lateris paracentesis. Vide *Pleurodynem* 17.



# CLASSIS SEXTÆ SYNOPSIS.

## DEBILITATES.

**CHARACTER.** Impotentia clare & distincte sentiendi, appetendi, consueti artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

### ORDO I. DYÆSTHESIÆ, impotentia clare ac distincte sentiendi.

- I. **CATARACTA**, *Cataracte*, visus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.
- II. **OPALIGO**, *Vuë obscure*, visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.
- III. **AMBYOPIA**, *Amblyopie*, visus debilitas respectu ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.
- IV. **AMAUROSIS**, *Goutte serena*, visus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate.
- V. **ANOSMIA**, *Perte d'odorat*, odoratus debilitas, aut olfaciendi impotentia.
- VI. **AGHEUSTIA**, *Perte de goût*, gustus debilitas aut gustandi impotentia.
- VII. **DYSECŒA**, *Douleur de oreille*, auditus debilitas, obicibus extra labyrinthum positis.
- VIII. **PARACUSIS**, *Ouïe trouble*, voces articulas distincte audiendi difficultas vel impotentia.
- IX. **COPHOSIS**, *surdité*, sonos etiam simplices, percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.
- X. **ANÆSTESIA**, *Engourdissement*, tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore, & sopore.

### ORDO II. ANEPITHYMIÆ, appetituum sensitivorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita.

- XI. **ANOREXIA**, *Perte d'appétit*, appetitus esculentorum suppressio seu famis feriatio.
- XII. **ADIPSIA**, appetitus potulentorum suppressio seu sitis feriatio.
- XIII. **ANAPHRODISIA**, *Impuissance*, appetitus venereorum, motuumque ei famulantium, seu libidinis suppressio.

### ORDO III. DYSCINESIÆ, aut impotentia motus ac sæpe sensus in organis libertati subditis, ut lingua, larynge, artubus.

- XIV. **MUTITAS**, *Mutité*, voces articulas edendi impotentia.
- XV. **APHONIA**, *Perte de voix*, plenaria vocis suppressio, citra stuporem & Syncopem.
- XVI. **PSELLISMUS**, *Bégaiement*, quasdam syllabas pronuntiandi impotentia.
- XVII. **PARAPHONIA**, vocem solitam edendi impotentia.
- XVIII. **PARALYSIS**, *Paralyse*, motus aut tactus vel utriusque debilitas in alterutro cum hujus laxitate.
- XIX. **HEMIPLEGIA**, *Hémiplégie*, debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere, dextro vel sinistro.
- XX. **PARAPLEXIA**, *Paraplexie*, debilitas motus ac tactus in utroque latere corporis, exceptis partibus superioribus.

### ORDO IV. LEIPOPSYCHIÆ, motuum, viriumque vitalium debilitas.

- XXI. **ASTHENIA**, *Epuisement*, totius corporis gradaria seu successiva debilitas sensubus integris.
- XXII. **LIPOTHYMIÆ**, *Lipotymie*, virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsus superflite.
- XXIII. **SYNCOPE**, *Syncope*, motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione.

XXIV.



XXIV. ASPHYXIA, *Asphyxia*, omnium motuum & sensuum apparens cessatio, mortem se-  
re referens.

ORDO V. COMATA; sensus omnis, appetitus, motus liberi, phantasmæ, memo-  
riæque feriaciones seu morbi soporosi.

- XXV. CATALEPSIS, *Catalepsia*, status soporosus cum artuum sterilitate & ad quovis no-  
vos situs retinendos aptitudine.  
XXVI. ECSTASIS, *Ecstase*, status soporosus a gravi pathemate subito ortus, ægrum in eo-  
dem situ quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.  
XXVII. TYPHOMANIA, *Typhomania*, status soporosus facile excitabilis cum frequenti mus-  
sitatione, seu somnio, & vividitate imaginationis ac memoriæ.  
XXVIII. LETHARGUS, *Léthargie*, status soporosus facile excitabilis, cum summo imagina-  
tionis & memoriæ torpore, ac febre.  
XXIX. CATAPHORA, status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio & obli-  
vione.  
XXX. CARUS, est sopor profundus sine stertore.  
XXXI. APOPLEXIA, *Apoplexie*, est sopor profundissimus cum stertore, vel sonora respi-  
ratione.

## CLASSIS SEXTÆ THEORIA.

MORBI PARALYTODEI,

S E U

DEBILITATES.

1. **M**OTUS impotentia, & sensus abelitis Fel.  
Plateri. *Motuum defectus* Junckeri  
Tab. 143. quibus marasmus & catarrhus sus-  
suscitatum accendit. *Auctor Morbi adpressi* Pro-  
sp. Alpini Medic. methodica, Lib. X. ubi re-  
ceperat cum apoplexia, paralyti, caro, catale-  
psi, morbos convulsivos, anhelolos, aliosque  
diversarum classium. *Resolutiones nervorum* Frid.  
Hoffmanni Tom. 4. ubi morbis soporosis, &  
sensuum defectibus admiscet insanias, cachexias,  
&c. *Morbi quietales* Ill. Linnæi. *Symptomata*  
*sensuum* Jonston de Morbis capitis, ubi apople-  
xia, carus, paralytis, &c. a morborum nume-  
ro excluduntur. *Paralytis* vulgo audit motus &  
sensus, vel alterutricius abolitionem; provenit a  
Græco *paraluo*, resolutio, & paralytodei ab *oides*  
affinis, & *paralytis* resolutio, quasi morbi pa-  
ralyticis affines; Gall. *Paralyse*, *subesse des*  
*nerfs*; *Anglis* *Palsies*.

2. *Debilis sensus*, ut visus, tactus, est im-  
potentia efformandi ideas claras & distinctas  
objectorum in organa agentium.

3. *Debilis artuum* est impotentia movendi  
artus juxta cupiditatis, aut voluntatis dictamen.

4. *Debilis appetitus*, ut famis, sitis, Hibi-  
dinis, est impotentia appetendi alimenta, po-  
tulentia, venerea, &c. quando & quomodo ad  
sanitatem conveniunt.

5. *Debilis pulsus* est quantitas motus cor-  
dis, vel arteriarum minor, quam in statu  
sano.

Defectus sensus, motus, appetitus, est sum-

ma. corum debilitas, vel obscuritas, quæ mala  
*abelitis* vocantur, quamdiu recuperari possunt;  
aptius suppressio nuncupantur.

6. *Character* hujus classis est partialis, vel  
integra sensuum, appetituum, motuum tum li-  
berorum, tum naturalium sensibus prius obvio-  
rum debilitas.

7. Quoniam imaginatio & memoria non pos-  
sunt deficere, quin depraventur quæ ab his  
pendent facultates superiores, ut intellectus, vo-  
luntas, & illæ depravationes ad vesanias atti-  
nent; imaginationis & memoriæ suppressio,  
vel abolitio aptius ad vesanias attinet.

8. Impotentia movendi quæ a dolore, febre,  
phlegmasia, similive graviore morbo dependet,  
seu quæ non est in his morbis præcipuum sym-  
ptoma, ad alias classes releganda est.

*Theoria Debitatum.*

9. Anima est in continuo conatu statum suum  
mutandi. *VVelf. Psyche*.

10. In statu sano consequenter ad impressio-  
nes quæ sunt in organis, ut visus, tactus,  
auditus, anima sibi repræsentare potest ideas  
colorum, tactilium, sonorum, &c. atque si  
illæ impressiones vividiores sunt, ea non po-  
tuit non eas sibi repræsentare, atque in hoc  
casu formale sensationum cum materiali ne-  
citur.

11. Animæ facultas idearum repræsentativa  
ita limitata est, ut si fortius attendat ad unam  
ideam, sive a phantasia, sive a sensatione oriun-  
dam, ea cæteras impressiones debiliores minus  
aut minime appercepiat, ut exemplo ecclitæcos,  
epilepsiæ patet.

12. Vis animæ, seu conatus statum suum  
continuo mutandi, ita pendet a dispositione cere-  
bri.

bri ut si denegetur influxus liquidus nervi in datum musculum, ea in hunc minus, aut nullatenus exeratur, unde huius immobilitas; docent nervorum ligaturæ vulnera.

13. Vis animæ repræsentativa ita pendet a dispositione fibrarum nervearum, & medullarum, ut si deprimitur, vulneretur nervus in origine sua, vel in tractu, organum sensus, cui nervus ille prospicit, sensatione sua destituitur, immo illius sensationis idea imaginaria, memoriarum excitari nequeat, præpedito refluxu fluidi nervi ab organo externo ad animæ sedem.

14. Præpeditus itaque transitus, id est, influxus vel refluxus fluidi nervi ab animæ sede ad organum, & recipere ab organo ad sedem animæ, est conditio necessaria ad debilitatem sensus moriæ inducendam.

15. Impeditur vero ille transitus, vel quia animæ vis fluidum impellens quomodocumque immittitur, sive quia resistentia huius fluidi transitui opponitur.

16. Vis animæ fluidum nervum in nervos propellens imminui potest, aut tolli, sublata 1. voluntate movendi, ut in motibus liberis, & paralyticis simulatis. 2. Si anima urgentiori necessitate, graviore pathemate detineatur, ut in celsa, terrore subito, mœrore, aut similibus quæ eam ætonicam detineat, aut stupidam faciat, ut in animi deliquio multiplici.

17. Resistentia quæ fluidum nervi in fluxu opoponitur, pendet, vel 1. ab huius inopia, ut in longa inedia, diarrhœa, vomitu, longo morbo, vel acuto vires exhauriente. 2. ab ejus fluidi destructione, absorptione per vapores venenosos, narcoticos, mephiticos, qui vim ejus electricam auferunt. 3. a fibrarum medullarum corticis, aut medullæ cerebri depressione, humiditate aquosa, quæ huius fluidi transitum interceptat, ut in electricitatis conductore accidit: 4. a depressionibus, ligaturis, scissionibus, induratione, similibusque vitiiis in nervorum tractu.

18. Tollitur vero in organis facultas sentiendi, si impressiones sensuæ, ut lucis, soni, &c. ad organum immediatum visus, auditus, &c. devenire nequeant ob organi resistentiam, aut ob corneæ, crystallini, &c. opacitatem; ob auriculæ, canalis auditorii, tympani, labyrinthi vitia, & sic de aliis.

19. Quoniam vero natura de corporis sanitatem, & vitam continuo sollicita, nisi vehementi quodam pathemate abripiatur, motus ad vitam necessarios præ aliis continuare semper nititur, ea fluidum nervum ad organa circulationis, deinde respirationis, necnon digestionis mittit quantum potest, & pro rata roboris superficialis ratione; aut si fluxum illum intermitteat, illæ intermissiones eo sunt breviores, quo magis organorum illorum actio ad vitam actualem est necessaria.

20. Robor vero, seu promptuarium virium est limitatum, adeoque non potest major fluidi nervi quantitas, ad organa vitalia erogari, quia

in summa inopia illud in aliis organis ad vitam actualem minus utilis deficiat, quin proinde illa organa debiliora ad sensum & ad motum evadant; ergo quorundam organorum debilitas hanc inæqualem fluidi nervi distributionem subsequi debet, ut monuimus, dum de febribus egimus.

21. Debilitas organi est in ratione composita, 1. inertie, seu languoris ipsius animæ, vel ejus stuporis & ectasies; 2. inopiæ fluidi nervi totius; 3. distributionis ad illud organum parcius; 4. resistentiæ fluidi illius transitui oppositæ; 5. insensibilitatis ejusdem organi ob vitiolum illius structuram.

*Somnus* est status in quo omnes sensationes sunt obscurissimæ, & motus vitales plene, pacate procedunt.

*Somnium* est status in quo omnes sensationes sunt obscurissimæ, dum viget, & vivida est imaginatio.

22. *Sopor* est status in quo profundus est somnus; & quandoque somniis imaginatio, ac consequenter motus vitales, tum naturales interturbantur; talis forte viget in apoplexia, epilepsia, epialte, somnambulismo, &c.

23. *Morbi soporesi* vocantur illa genera morborum, quæ in paroxysmis sopore stantur, ut apoplexia, carus.

24. In his cerebrum magnopere afficitur, ut patet ex principijs præcæptis, v. g. cranii fractura, commotio, vel ex cadaverum aperturis, quæ cerebri vulnera, abscessus, tumores, seri, cruorici effusiones ostendunt. Cum autem cerebrum sit omnium virium corporis grigo, utpote cum ibi fecernatur fluidum nervum, & animæ sic sedes, non possunt graves huius lesiones accidere, quin & immunitas fluidi nervi secreti, aut secerendi copia, vel ejus transitus præpeditur, quin & anima, summi quod in ejus curae imminet periculi, perniciosæque ruinæ consue conscia, quidquid superest fluidi nervi ad illam ruinam, quantum potest, præverendam, adeoque vires vitales aliarum dispendio sustinendas conatus suos intendat.

25. Hæc suadet analogia; quippe ubicumque datur gravis noxa in aliis organis, vel clare, vel confuse percipienda, illa dolore, mœrore, metu, necnon motibus febribus, convulsivis, evacuatoriis, similibusque conatibus statum corporis se moleste ferre, & in alium mutare conari satis ostendit. Nec dubium est quin organum in quo residet, quodque, etiam in cortice tactus expertus videatur, sensu saltem acutissimo versus medullam oblongatam præditum est, anima percipiat, ejusque læsione graviter afficiatur.

26. Falsum est, multiplici experientia in junioribus catellis, felibusque a mensura, ablato cerebello citius animalia mori, quam ablato cerebro; docet observatio per aliquot minuta vitales motus superesse, etiam utroqueque ablati, modo a gravi hæmorrhagia caveatur; ergo verosimile est animam ex nervis cerebri & cerebelli ad cord tendentibus, & his ablati, ex gan-

gliis

gliis horum nervorum quidquid superest fluidi nervi sensum amandare, ut mors quantum fieri potest procrastinetur; falsa est itaque Villisiana opinio, fluidum nervum a solo cerebello organis vitalibus suppeditari.

27. Si per foramen trepani adigatur acus in corticem cerebri meninge denudatum, verum est eatenus nullum doloris scilicet scilicet exhibere; quod vero non fecerat cortex, hoc minime evincit, cum aliud sit sentire, aliud dolere: verum si paulo altius adigatur acus, ita ut nervorum origines medullares citra cerebri basim attingat, illico diris clamoribus & convulsibus dolorem suum animal significat; immo si versus spinalem medullam dirigatur acus, non raro illico convulsus moritur.

28. Falsum est cerebellum esse firmius cerebro, & etiam si foret, non minus infarcti foret obnoxium, & in illius medullis abscessum reperi in cadavere hominis, qui ante octo dies in occiput lapsus ejus fracturam passus fuerat, atque per totum illud temporis spatium cephalicis laboraverat; falsa est itaque opinio Villisiana, nervos cerebelli solos vitalibus motibus, non seosui, solos cerebri nervos unico sensui inservire, & falsa quæ inde deducitur vulgo saporosorum morborum theoria.

29. Cum in apoplecticis gravis sit læsio cerebri, vel cerebelli (24), adeoque grave imminet acri ipsius animæ, vel proprio domicilio periculum urgens; cum ea vero ipsius tutelæ, invigilans, utpote morborum curatrix, nulla alia arte possit imminentem mortem procrastinare, quam quidquid est fluidi nervi in nervos vitalium organorum moribus inservientium immitendo, ea quantum potest horum organorum motus necessarios conservat, quod ex pulsu pleno, & ex respiratione alta, stertorosa patet, cæteros motus minus morti procrastinandæ aptos derelinquit, & fluidum nervum parcius, vel nullum ad alia organa dimittit, unde omnium motuum aliorum, atque sensuum seriatio: hinc pathognomonica apoplexiæ symptomata: si vero tanta, talisque est nervorum omnium ad cor tendentium resistentia & læsio, ut ne in ullum ex hisce nervis, qui plurimi sunt, & ex pluribus locis oriuntur, possit amandare fluidum nervum, inde vel asphyxia, vel mors inevitabilis.

30. Quod autem durante apoplexia anima agat, & sui seosus signa præbeat, videtur evincere multiplex phenomenum, quod in machina inanimata, aut si incens omnino foret anima, dari non potest; 1. siquidem a sufficienti stimulo, ut emetici, cathartici, quandoque supervenient conamina ad vomendum, ad alvum exonerandam; verum ex theoria actionis medicaminum liquet nullam operationem extus conspicuam ab illis fieri, nisi sentiant organa ab illis medicaminibus stimulata: (Vide *Dissertationem de medicamentorum facultatibus*). 2. Apoplexiæ, nisi morti sint proximi, deglutiunt, respirant fortius aut frequentius, quæ conatus pri-

cipii moventis & sentientis, seu animæ satis arguunt. 3. Apoplexiæ quidam ad se vi emeticorum redeunt, clamant, de dolore ventriculi conqueruntur, ut vidi; ergo obscurus est in eis, non vero omniō sublati, sensus & conatus; atque si animæ vis cogitans ipsi essentialis statuatur a *Cartesio*, vis motrix in corde & pectore magis evidens ipsi non minus essentialis ascribenda est.

31. Qui motum cordis & pectinis sine motore admittunt tanquam mobile perpetuum, illi apud peritos Mechanicos pro mechanicis ignaris merito habentur. Qui itaque, ubi sunt majores resistentiæ cordis motibus oppositæ, ejus motus citam solito majores a sola machinæ dispositione deducere conantur, illi omnino se in mechanicis delirare significant. Ex duabus opinionibus circa objectum intricatum, & difficultatibus undique obvolutum, ea eligenda videtur, quæ nulli veritati aut propositioni demonstratæ repugnat, licet omnes difficultates non expediatur; ea vero rejicienda quæ propositionibus demonstratis contradicit; ergo opinio Machinistarum, quæ legibus mechanicis repugnat, quæque aëtomizæ contradicit (26, 28) rejicienda est.

32. Cordis motus duplex est; alius *systolicus*, quo parietes alternatim ad ventriculi axim accedunt, unde systole, & recedunt, unde diastole; & ille motus localis non est, cum axis loco non necessario moveatur.

33. Alter motus est *subsultorius*, quo totum cor ad costas accedit in ascensu, & rursus ad mediastinum accedit in descensu, & ille motus localis est.

34. Illi motus ambo combinantur in sanitate atque a subsultu systole cordis augetur, majorque sanguini in arterias impulso imprimatur impetus; verum nunc in statu morbofo fortior est subsultus quam systole, ut in palpitatione; nunc vero systolicus solus motus viget, & subsultus fere nullus est, ut in summa debilitate cordis, cum pulsus fere evanescit, & vermicularis est.

35. Cor est vera antlia duplex, cujus ipse musculus cavum coarctans in systole, & dilatans in diastole vicem emboli gerit; atque certum est ex legibus hydrodynamice maximam esse fluidi in aortam immissi copiam sub minori virium impensa, cum status hujus machinæ est perfectus, seu cum velocitas, qua cor agit in sanguinem, est tripla velocitatis quæ sanguis ex illo ejicitur (*Euler, Mem. de l'Acad. de Berlin 1792. maxime 7.*)

36. Sit vis premens arteriarum parietes in statu sano æqualis altitudini datæ, v.g. 16. pollices (*Mém. de Berlin 1755.*), crescente vi cor contrahente, minori ratione crescat transitus sanguinis, seu quantitas sanguinis ex arteriis in venas transmissi, & eo minori, quo pressio in parietes aortæ major erit consueta, unde ioutle virium pendendum, & successiva machinæ ruina superveniet (*Ibidem maxime 9.*)

37. Si vero tardior aut velocior est motus cordis,

dis, quam qui perfectior est, cum quia resistentia arteriarum & sanguinis solito major est, aut solito minor; in utroque casu minor est respectu virium impensarum sanguinis circulantis, vestra corde in arteriis projecti quantitas, quam in statu sano (*ibidem maxime videtur*.)

38. Si motus contractivus cordis sit tardior, verum quidem est quod sub data virium impensa major erit quantitas sanguinis per vasa transmissi; verum poterit deficiere tum calor requisitus ad functiones, tum sanguinis attritus mechanicus, qui certam contractionis cordis vim requirit; si vero metus cordis contractivus sit velocior solito, tunc quidem erit virium dispendium inutile ad transmissionem sanguinis ex arteriis in venas; verum erit calor & attritus major, ut in morbis inflammatoriis.

39. Iude perspicimus cui bono in morbis syncopitis, ubi vires vitales languent, natura transmissi sanguinis prospicit, visibusque suis simul parit, retardata cordis contractione, quod quidem sine caloris & attritus imminutione fieri non potest, nec sine pallore; arteriæ scilicet cutaneæ a cutis elasticæ contractilitate iunguntur, & sanguis ex illis partim in venas, partim in arterias ipsas majores recedit, quoties non est vis in sanguine sufficiens ad eas deducendas; quæ tamen vis sufficit ad circulationem per majusculas arterias conservandam.

40. Cum major requiratur impensa virium ad cordis subitum excitandum, quam ad ejus systolicum motum servandum, & cum subitiori virium impensa minus recedat a perfectione, quæ desideratur transmissio sanguinis; suppressio cordis subsulsi, vel maxime imminutio, superest in syncopitis morbis ejus motus systolicus, sed ex quo vix pulsus arteriarum percipitur, & calor cutis natus, ejusque color vix sustentatur.

41. Errant autem illi qui in syncope ex eo quod pulsus non percipitur, concludunt sanguinem minime circulari, & cor nullatenus moveri, cum aliquoties acciderit, ut apertæ pectore animalium, immo hominum in hoc statu constitutorum, cor adhuc non quidem subsilire, sed motu systolico gaudere visum fuerit; non enim, omnis arteriæ dilatatio sensibilis est; sed illa tantum quæ infra breve tempus & sufficienti vi perficitur; si enim sensim seu tarde & parum arteria dilatetur, pulsatio ejus vix perceptibilis potest, licet realis sit.

42. Ruina seu destructio humanæ machinæ in morbis duplici est generis, ut in machinis hydraulicis; alia a nimia vasorum pressione, unde afflicti, detriti, rupsi, dissensio, &c. & illa in morbis in quibus magna est & nimia vis cordis, locum obtinet, in illa, quo major est solita pressio sanguinis in ipsum cor & vasa, eo magis abest quin quantitas sanguinis transmissa accedat ad maximam, quæ ab impensis viribus expectari potest, transmissionem,

*Sauvages Nosologia Methodica. Tom. I.*

ita inutile in eum scopum est virium dispendium; hæc ruina mechanica est.

43. Altera vero ruina est physica; cum enim solito debilior est cordis contractio, sive minus extensa, sive minus frequens, aut utraque simul, non solum pulsus languidus, calor minor, colorque pallidior evadit, verum metus est ne primo sanguis, qui ad coagulum continuo vergit, reapse coaguletur, unde major resistentia, polyposæ coheretiones, & mors; sive metus est ne lymphæ extrayascetur, ne fibræ ab illa resollantur, sive hæc cedemata, hydropes, immo sphaceli ab infiltrationem oriundi, aut similia mala.

44. Datur itaque media cordis vis, & sanguinis velocitas quacum, minima cum virium impensa, maxima est sanguinis per vasa transmissio, & tutissima ad machinæ conservationem conditio; verum, ut in nimia debilitate motus vitalis, utile est cordis actionem augeri, ut pericula infarctus areantur, ita, in nimia vasorum pressione ob conatum cordis nimium, utile est motum cordis retardari, quod etiam Medici per abstinentiam & repetitas phlebotomias in morbis acutis febrilibus præstare conantur.

45. Ex his hydrodynamicis legibus sequitur errare illos qui putant sanguinis transmissi seu circulantis copiam fere nullam esse in syncope, cum tamen demonstrari possit, per antliarum principia, tunc temporis respectu ad vires contrahentes eam esse majorem quam cum vires cordis sunt nimium auctæ; utrumque autem terrorem inquietat ille status syncopiticus, non minus certum est Veteres hujus utilitatem respexisse in morbis in quibus phlebotomiam ad animi deliquium usque continuabant. Verosimile est etiam hujus interventu profusus & aliunde lethales hæmorrhagias quandoque fisci, nec non atroces dolores illico supprimi; demum eas, quæ sine gravi causa superveniunt, ut meteliosis in phlebotomæ apparatus, hysteris, &c. facillime ut phuriam discuti.

46. Tantus est animæ in cor influxus, ut in corde animæ residere putaverint inter vetustos Philosophos Græcos Celeberrimi, indeque apud Oratores invaluerit ut cor insculet in omnibus animæ cupiditatibus, & moribus, illudque spiritui seu intellectui opponant; atque licet animam in cerebro residere cum aliis existimemus, quia ibi residere dicitur ubi præcipue operatur, nec enim ens immateriale aliter in loco residere potest, non minus verum est quod impressiones primariæ omnium animæ pathematum in cor referantur quippe docet experientia illius organi vires & motus augeri, minui, perturbari pro diversis cupiditatibus aut aversionibus, unde in ira, gaudio, plenus, mollis, æqualis, in merore parvus, tardus, in gravissimis gaudiis, doloris paroxysmis evanescens est pulsus.

47. In molinibus etiam criticis, quos nature curatrici conatus esse cetera pronuntiavit veritas, pulsum

Aa

pulsum

pulsus diversitates singulares & cuique erigi proprias observare *De Salano, nihil, Ill. de Borden*, alique Neoterici, ita ut pulsus intestinalis, qui nos olim in adultorum morbis terrebat, hodie diarrhoeam criticam tantum indicet, ut uodofus sudorem, adeo ut vix dubium sit hodie quin eadem potentia quae critica molimina suscipit, & facit, eadem in cordis motus imperium obtineat, eosque in bonos fines dirigat.

48. Fateor non io morbis magis sibi consilare naturam quam in negotiis moribus gravissimis libertas, & ratio; ut enim ista in magnis periculis quandoque spem omnem abijcit, & iners omoia molimina remittit, ita & natura io magnis periculis, & pathematibus quasi territa non audet, ut ait *Galenus*, adversus materiem moribicam certamen inire, & inde lipthymiae, syncopes, a quibus, ut liberetur homo, sufficit animam deo altantium auxilio praesenti commonescere, & ea ita omnium animis infedit opinio, ut nullus est qui in illis animae deliquis non adhortetur aegrum ut bono animo sit, quod certe ridiculum foret, nisi ab animo sic resumpto vires aegri refocillari crederent, atque merito credunt, quod repetita docet observatio. Nullus est Medicus qui non possit observare pulsus debilem, & languidum in aegro; a Medici aspectu laeto verbisque salutem nuntiantibus statim erigi, & roborari, dom ejusdem aegri pulsus demitteret teille ejusdem Medici silentium. Querant mechanici in silentio rationem hujus phaenomeni mechanicam, & nullam invenient nisi psychologicam.

49. Dabitur io aliis circumstantiis mechanica syncopes principia, scilicet certa requiritur fluidi nervei quantitas in cerebro, quae in cor irradians illudque contrahens valeat sanguinis & vasorum superare resistentias; ut autem illius fluidi nervei sufficiens detur copia, debet sanguis illud suppedians proportionali quantitate vasa cerebri transire, ita ut siye deficiat requisa in his vasis, boni sanguinis copia, siye tardius quam par est per ea vasa procedat, minor quam par est ex eo separatur fluidi nervei quantitas.

50. Si solito major sit aut etiam solito minor sanguinis resistentia (37.), minor est in utroque casu respectu virium. Impeforum quantitas sanguinis ad quasvis partes: & proinde ad cerebrum transmissi; est si solito major sit, ut in plethora, & obstructione, modo non obstruat cerebrum, ausis cordis coarctibus, aut detracto sanguine, ablatique obicibus restituitur debita sanguinis per cerebrum transmissio. Si vero vires cordis non augeantur, aut resistentiae non tollantur, parvus, & rarus evadit pulsus in ratione resistentiarum, friger corpus, secretio fluidi nervei decrescit, & machina fatiscit.

51. Si solito minor sit sanguinis resistentia, illud tantum procedit ex nimium immunitate ejus copia per haemorrhagiam, iocidiam, sudores colliquativos, aliaque evacuationes; vel propter

ejus fluxilitatem nimiam, vnde sudores, diarrheses, vel similes evacuationes ferose sunt; in utroque casu adio cruoris in sanguinem minor est solita, quippe sanguis eadem velocitate in aortam influit qua cor se contrahens eum insequitur; ergo a corde sufficientem non potest recipere pressioem, nec proinde sufficienti vi vasa miورا distendere, replere, quod ad fluidi nervei secretionem requiritur; sique sensum fatiscit circulatio cum pulsu frequentius parvo & molli, inde demum Syncopes, nisi analeptici rescoscillantur vires, & isospasantibus restituitur fluidorum requisita viscositas.

52. Errant ergo illi pathologi qui viscositatem sanguinis semper oppugnandam esse in morbis contendunt, & nunquam nimiam ejus fluxilitatem verentur, eum tamen facillius sit mederi debilitati quae a nimia sanguinis resistentia procedit quam ei quam nimia fovet fluxilitas aut minor resistentia.

53. Si dicere liceat quod sentio, cum retardata cordis contractione, minus fiat virum dispendium, minor evadat pressio in pariete vasorum, diutius facta, tutaque remaneat machina (*Euler Mem. de Berlin 1753, maximo 10.*), simulque minor sit decessus quantitatatis sanguinis transmissae, nulla est in hoc casu ratio syncopes mechanica, & a principis psychologicis taorum deducitur cur syncope potius in hoc casu quam febris huic opposita superveniat, atque idem ratiocinium valet in caso immoatui sanguinis resistentiae, ergo in utroque casu, nisi maxima sit, vel minima omnio resistentia, tantum a principis psychologicis syncope videtur repetenda.

54. Singulare prorsus videtur quod ea apud omnes indos orientales & occidentales invaluierit opinio animam a corpore sponte recedere in obitu, unde Corsici, Africani, Americani pro more recens mortuum ioterpellant, & ab eo sciscitantur qua ratione commotus obierit; verosimile est hanc opinionem plebejam ab antiquis Philosophis processisse.

55. In syncope feriari omnes sensus & motus tum liberorum tum vitales docet observatio; numquid ad vigiliam requiritur certus impetus sanguinis in fibras medullares cerebri, qui in ipsis vim electricam excitet, aut teosioem debitam impertiat? Numquid ad hanc vim electricam extricandam aut tensionem praebendam requiritur, praeter systalticum, motus cordis sussultorius, qui non simpliciter premit, & etiam vi viva has partes impetit? qui syncopem eludati ad se reveruntur nullius ideae per syncopes tempus elicitae consilii sunt, nec ullo signo se interea temporis cogitant, aut quidquam egisse significarunt; in apoplexia non ita iners videtur vitae principium: non minus est obsequa interitus hominis quam ejus ortus ratio.

56. Ex numerosis *Braynii* & *Vindoboni* observationibus deduci potest veram mortem ab asphyxia vix distinguere posse, nisi per triduum cir-

directer phenomena mortis perliterint, & se-  
ne caruim accedente putredo; ergo dubium est  
candiu num vivat, id est num anima in ipsis  
præesse pergat necne.

57. Atriplici principio pendere videtur syn-  
cope, 1. ab animi pathemate in quo anima vi-  
ram mori ponit, ut in summa indignatio-  
ne, in tadio vitæ, gaudii extremo, ita inex-  
plebili: 2. in magnis, quæ cordi opponuntur,  
resistentiis a polygo cordis, a veneno coagulan-  
te sanguinem, a summo frigore, a submersio-  
ne, &c. 3. ab inanitione vasorum & imminu-  
tione maxime sanguinis resistentia, ut dissolutio-  
ne ejus, fluxibus immodicis, inedia, &c.

58. In syncope a metu, terrore, cardiacis,  
hysterico affectu, si aliunde æger antea robu-  
stus fuerit, plus est terroris quam periculi, &  
æger sponte ad se redit; si cum stimulo in-  
clamare; odore forti, sapore acro, alapa in  
faciem, aut manum, plorum avulsione irrita-  
te, & cum velut a somno exiret; sic aqua fri-  
gida in faciem projecta aut propinata, acetio-  
dor, jusculli paucillum animam ab hoc stupore,  
vel languore revocat; verum interest ut interea  
vires superfluit non incassum impendantur; a-  
deoque, ut æger jaceat horizontaliter; tum ut  
sanguis a corde projectus uberius in cerebrum  
affluat, cui affluxui in situ erecto obstat par-  
tim sanguinis gravitas, tum ut æger in hoci-  
tu abstergeat ab omni artuum conatu, qualis in  
omni alio sit: requiritur; unde frustra nec  
virum dispendium fieret; sic syncope a metu  
phlebotomiz, aspectu operationis Chirurgicæ,  
hac sola posita evanescit aut prævertitur.

59. Si vero ea non sufficiant, aer frigidior,  
liberior, & apertus ægro est præbendus, ut  
scilicet circulatio per pulmones facilius fiat,  
vel ut fluidum electricum aeris in sanguinem  
hac via uberius traseat, quod necessarium est  
illis, qui in conclavi calidiori, caldario, cubi-  
culo hominibus multis repleto, loco foetido,  
mephitico, carbonis fumo inquinato, post sus-  
pensionem soluto laqueo, in æstu febrili, itæ  
paroxysmo, &c. animo delinquantur.

60. Si vero ob plethoram, nimiamque cordi  
oblatam resistentiam fiat syncope, ut in priori-  
bus casibus, si syncope resistat, tunc ad spiri-  
tuosa, aromatica volatilia, cardiacia, potu, o-  
dore, soti, vapore applicanda quantocius con-  
fugiendum est, quibus & excitatur principium  
vitale, & major fluidi nervi copia suppedita-  
tur illico, & sanguis resistens fluxui evadit,  
quo frictiones & corporis succussiones perti-  
nent; in certis circumstantiis dantur & casus  
plethoræ, & febris suppressæ, in quibus ven-  
nam tundere necessarium est, ut in suspensis,  
asthmaticis fere suffocatis, apoplecticis.

61. Si hysterica sit syncope, tunc a suaveo-  
lentibus abstinendum ut plurimum, ut amba-  
ra, moscho; tuberosis, narcissis, rosæ, &c. &  
graveolentibus insistentum; ut fumo anima-  
mæ, castoreo, matricarie, rutæ; nec non ad  
stimulantia, & cardiaca deveniendum; atque

si frigus occupet artus, tunc aqua cinnamomi,  
melissæ composita, Regiæ Hungariæ, spiri-  
tus volatilis cornu cervi, lilium, confectio al-  
kermes, hyacinthina, & similia usurpanda;  
atque si cardiacis a saburra ortum ducent con-  
currat, quæ vomitum adjuvant aut excitant  
cardiacis locandæ.

62. Denique si ob hæmorrhagias graves, flu-  
xus nimios, inediam, verbo minorem fluidorum  
resistentiam fiat illa debilitas, summa quæ cor-  
poris, & animi est imperanda cum positura hori-  
zontali, & simul analeptica, gelatinosa, le-  
viter acidulata, aut adstringentia; ut aqua Ra-  
bel, spiritus sulphuris ad gratam aciditatem,  
cremores incrassantes præscribendi; præmissis  
auxiliis quæ extus admodum valent fluxus illos  
immodicos sistere, iisque tum mechanicis, tum  
physicis; in his vero casibus sæpe suspecta sunt  
cardiaca & volatilia.

63. Cerebrum est fons vitium tum vitalium,  
tum liberarum, & nervi sunt canales per quos  
vires omnes ad mûculos transferuntur, & per  
quos impressiones sensieræ ad animam perve-  
niunt; obstructis itaque quomodocumque ner-  
vis, & motum liberum, & sensum in illis or-  
ganis deficere necessum est, necnon alia munia,  
ut appetitus, quæ ex his dependent; quidquid  
itaque nervos immeabiles facit, est horum sym-  
ptomatum causa, quatenus efficitur resistentia  
fluidi hujus transmissioni opposita, vires trans-  
mittentes superet: hic est casus frequentissimus  
in paralyticis partialibus morbis, ut hemiple-  
gia, paraplegia, amaurosi, anaphrodisia, & in  
quorundam organorum resolutione, ut lingua,  
penis, &c. adeoque therapeutiam generalem ex-  
postulat.

64. Illa nervorum obstructio, compressio, &  
fluidi nervi interceptio multis in praxi ten-  
bris est involuta, nisi fracturæ, luxationes, si-  
milibusve principiis evidentibus tribuenda sit;  
cum vero latet, & interna sunt principia,  
tunc ex ætate, seu temperamento, visu, &  
principiis prædisponentibus, ac procatartecis  
simul attente pensatis in causam specialem  
morbi inquirendum est.

65. A plethorâ pendere infarctum vasorum  
capillarium, tunica medullæ spinalis aut ner-  
vorum perreperantium, judicamus ex his quæ  
copiam ingulorum majorem, & egestorumpar-  
torem indicant; ut ex pulsu pleno, forti, ru-  
bore, levamine a phlebotomia, incremento mor-  
bi a crapula, a suppressis catamenis, phlebo-  
tomis affluctis, perspiratione retenta, & tunc  
phlebotomia repetita, hirudines, abstinentia,  
potus diluens, perspirationem intendens, &c.  
indicantur.

66. Si obstructio, vel compressio pendeat a  
sanguinis visciditate, quam induxerit saburra  
in sanguinem transmissa, hoc surdebunt anore-  
xia, nausea, linguee sordides, febris, exacerbatæ,  
capitis gravitas, præter aliâ prægressa & comi-  
tantia; tuncque abstinentia, diæta liquida, eme-  
tica, cathartica, dein stomachica conveniunt.

67. Si sero imbutæ sint partes nervosæ, aut lenta pituita infarsita vasa, hoc suadebunt suppreßi feri fluxus, facies pallida, adipfia, frigus, mollities, temperamentum pituitosum, ætas senilis, aut puerilis, constitutio scrophulosa, cachectica; conditio vitæ, qualis lotricum, piscatorum, balneariorum, eoriariorum; dispositio hereditaria; atque in his circumstantiis non usum vocanda, præmissis catharticis, diuretica, aperientia, & resolventia, ut radices aperientes, salia neutra, millepedes, sudorifica ligna, & præ cæteris thermales aquæ potu, fottu, balneo, embrocatione adhibenda.

68. Ex his vero aquis aliæ sunt salinæ, ut Belliliuncæ; aliæ vero sulphureæ, ut Baregienses, Balneolenses, Sancti Laurentii, &c. priores in mucosis, frigidis, pituitosis; posteriores in salso acribus, siccis, irritabilibus temperamentis magis conducunt; alterutræ vero ad perficiendam curam paralyseon a principiis supradictis, ut plethora, saburra oriundarum, ideo conveniunt, quia superata plethora, saburra, non raro est laxitas in parte affecta, quæ resolventibus, tonicisque indiget.

69. Initium vulgo ducitur a remediis generalibus, ut phlebotomia apud adultos cæterum vegetos, a catharsis; dein iusculis, vel apozematibus ipsi humores resolvuntur, siccis diluuntur; deinde vero per triduum, si salinæ aquæ indicentur; harum potius ad libras sex quovis mane instituitur; diebus vero sequentibus jeiunio ventriculo balnea adhibentur pro gradu caloris aquæ & ægri, breviora & remissiora; embrocationes & cuti applicationes horis vâcuis lucenturiantur.

70. Aquæ Belliliuncæ vulgo calent ad gra-

dum 40. therm. Reaumurii; ille calor vix intra minuta pauca potest tolerari sine metu syncopes; facies enim rubet, tumor, incallescit, sudat, pulsus frequentius & fortius omnes arteriæ, respiratio anhelosa evadit. Ast si incupiam ante semi-horam translatæ fuerint aquæ, duodecim circiter minuta potest in ea cupa balneari; & per aliquot alia minuta, intereardum aqua ex fundo effluit, embrocari, quibus transactis æger in lectum transferretur, ubi febrili accessu perseverante, per semi-horam, aut ultra sudat, iusculo reficitur, deinceps linteis calidis exsiccat.

71. Aquæ Balneolenses juxta Mimatensem calent in fonte ad 38. gradum, nullo principio salino scatent, sulphuris tantum est suspicio, calor fere eodem gradu quo Balneicæ, tamen est mitior, aut tolerabilior; potus non purgat, balnea loogius a fonte sunt tepidiora, & per semi-horam ac horam tolerantur; aquis vespere emissis, idem locus caldarium est; in hoc aqua ideotidem torbillatur, pars dolore, vel paralyti affecta fonti etiam supponitur, & fricatur, fumi extra caldarium per horam hauriuntur a phthisicis; adeuntur hæc balnea mensis Augusto ut plurimum, uti balnea Lemalæ prope Bitteras, quæ tepidiora sunt.

72. In acutis hujusce classis morbis, ut apoplexia, robur est potius oppressum quam exhaustum, unde debilitas; sed ubi robur est oppressum, idque per phlebotomias, cathartica & emetica potest restitui, illa auxilia vires restitunt, non detrahunt; ergo in acutis hujusce classis æ ratione ea auxilia indicantur, aut suadentur si aliunde nil repugnet.

## CLASSIS SEXTA. DEBILITATES.

### SEU

#### MORBI PARALYTODÆI.

DEBILITAS est vires solitas exerendi impotentia, Græcis *Adynamia* vocatur ut facultas seu potentia agendi *Dynamis* dicitur.

Ad sanitatem requiritur non actio quæcumque, sed cuique generi animantis, cum adolevit, vigor actionum proprius; qui vigor sub eadem ætate & eodem sexu respondet circiter corporis molis & animæ activitati, seu audaciæ.

Duplex est facultas; alia *animalis* seu cuius actiones ad animam referuntur; seu sunt animæ meræ modificationes, ut facultas cognoscendi & appetendi; altera ad corporis mutationem refertur, & est facultas motrix aut *ipso motiva*.

Facultas cognoscendi seu ideas excitandi est eo fortior, quo sæpius, diutius, tenacius, ideas excitandi simul clariores & distinctiores producere potest anima; quo vero ideas sunt obscuriores, magis confusæ, rarius, brevius, fugaciusque excitantur, reficiantur, eo debiliior est facultas & ea animæ actio.

Anima diutius actionibus lassata vires somno & quiete refarcit; somnus vero idem præstat quoad vires animæ, quamquoad vires motrices, quas restituit; somnus itaque est tempus quo minimas vires impendit facultas cognoscens & movens, seu quies utriusque; involvit itaque a qualem debilitatem, eoque maiorem, quo somnus est & altior & pacatior; intereardum facultas utraque majores vires recuperat, & ad sortius agendum, discesso somno, disponitur. Facultas appetendi semper proportionem respondet ideæ bonum representantis, vividitatis aut acuminis, ita ut quo idea boni fortior, eo cupiditas intensior; quo idea mali vehementior, ita ejus

avert-

averfatio validior. Ergo debilitas actionum animalium repetenda est ex impotentia cognoscendi & appetendi, & ex obfcuritate, & confufione tum cognitionis tum appetitus, proindeque ex fopore tum totius, tum artuum & organorum.

Jam intelligitur in amaurofi effe majorem visus debilitatem, quam in barycoia. Ita in anorexia datur debilitas facultatis, quæ alimenta appetit, & in anaphrodisia libidinis feratio.

Appetitus determinat motum, nec enim ulla musculi adio fit sine motivo animam ad agendum excitante; motus autem sunt *liberi* vel *naturales*, prout anima determinatur ad agendum a voluntate, seu, ut aiebant *Duretus*, *Dulaurentiusque* *cata proairesis*, ex electione; vel determinatur a cupiditate, seu *cata ormeas*, ex instinctu. Voluntatem scilicet movere intellectus, seu cognitio distincta, proindeque clara boni vel mali; cupiditatem vero instinctus seu cognitio confusa aut obfcura boni vel mali.

Motus muscularis supponit vim impressam ab anima fluido nervo sufficientem, hujus fluidi debitam copiam, nervorum permeabilitatem, musculorum flexilitatem, molecularum sanam, artuum nexum, figuram, situm, quales a sapienti architectonico creatæ sunt, ita ut non resistant viribus fluidi nervi ultra quam par est.

Debilitas motus muscularis pendet itaque vel a debilitate cupiditatis eum determinantis, vel a fluidi nervi defectu, nervorum impermeabilitate, musculorum & artuum majori resistentia.

Cum penes animam sit regimen corporis seu œconomia animalis machinæ, cujus conversationi seu tutelæ, ac medellæ invigilare amat illud principium movens & cognoscens, illa debet vires suas juxta quasdam leges distribuere, & diversis organis ita erogare, ut urgentiori necessitati occurrat; cum itaque primum sit vivere, nec vita sine cordis & pectoris motu possit levare, cordis & pectoris motibus primum ea prospicere debet continuo & omni tempore, quamdiu ad vitales motus sustinendos ipsi penus virium superest. Hinc fit ut cum languere, immo abolentur semet actiones organorum sine quibus vita sustineri potest, ut artuum, interea motus cordis & respirationis, pro rata necessitatis & vigoris superstitis ratione, exercerentur.

*Amblysa* Græcis dicitur facultas cognoscendi per organa visus, auditus, tactus, olfactus, & gustus, eo sine ut quæ jucunda hisce sensibus videntur, sectari possimus, quæ ingrata removeamus: horum sensuum obfcuratio, confusio debilitas *Dysamblysa* est; si nulla est cognitio, remissio sententiarum colorum, sonorum, saporum, odorum, nulla pariter est corporum, quæ ah his representari solent, cupiditas, adeoque *Dysamblysa* secum inducit sæpius imminutionem aut abolitionem appetitus horum objectorum. Præcipua objecta quæ vehementius appetimus, sunt objecta famis, sitis, libidinis; horum

appetuum debilitas videtur ideo accensenda inter appetitus debilitates, Græcis *Anepithymias*.

*Kinetische dynamis* dicitur Græcis loco-motiva facultas, hujus debilitatem *Diskinesiam* vocabimus, & in hoc ordine referemus morbos qui tollunt facultatem artus movendi, qui simul combinati sæpius sunt cum obfcuratione sensus & appetitus, a quibus illa facultas ad agendum determinatur: sic anaphrodisia cum atechnia vulgo conjungitur, & amaurosis mydriasis & immobilitas pupillæ sequitur, & agbeustiam mutitas non raro comitatur. Genera itaque morborum ne frustra multiplicentur, debent quandoque involvere anaphrodisiam & diskinesiam ejusdem organi.

Graviores sunt morbi qui universi corporis debilitatem important, proindeque a partialibus prius indicatis diversi, quorum alii soporosi sunt seu feriatiorem sensus omnis, motusque arbitrarii inferunt; alii vero sine fopore totam machinam, immo ipsum cordis motum debilitant; prioribus soporis vel *comatis* nomen tribuimus, posteriores animi deliquiis seu *leipopsychias* accensimus; quippe docet experientia animam a tanto vitæ periculo perterritam & veluti dejectam ita profleri ut vitæ regimen desperanda abjicere videatur, quod in negotiis moralibus, extremis scilicet æternis, quandoque facimus; a quibus, defectu spei & animi, attentionem avertemus, cum maxime attendendum, & invigilandum esse suadet ratio.

*Leipopsychia*, Gallice *Decouragement*, animi debilitatio, est remissio illius facultatis quæ ad laborem utcumque improbum viriliter sustinendum nos excitat; illa vero animi abjectione accidit, vel cum post iteratos conatus successum nullum aut spem frustratam percipimus, vel cum resistentiis tantis & improvisis viribus nostris majores fore timeamus, seu nostris vitiis indubitemus; metus itaque qui obices & mala exagrat, pusillanimitas quæ diffidentiam suarum virium augeat, hanc leipopsychiam inducunt.

Exemplum abjectionis animi a causa morali nobis exhibet historia ab illustri *Nichells* relatæ, inter bene multas a *Barrichio*, *Pachino*, aliisque traditas. *Calista* scilicet pulcherrima mulier, cum in adulterio deprehensa fuisset, tanti, tamque excelsi animi erat, ut repudii ignominiam spontanea vitæ derelictione committeret; hæc cum præ dolore & sollicitudine ita febre opprimeretur, ut de morte nemo dubitaret, a nobili marito impetravit promissum ut morienti condonaretur: cum autem spe plena, Medici cura, convalesceret, non dubitans quin suis gratiis, seuque pulchritudine & poenitentia commotus maritus exorari se pateretur, & ipsa domi retineretur; rus abiens maritus ipsi nunciavit se satis eisse, qui, promissa venit, vitam conservaverat, & præter repudium nunc nihil velle; ad hæc mulier respondit, *sibi itaque no-*



*viandum esse, & pulsu per gradus concidente, supervenienteque pectoris oppreffione, intra paucas horas vivere debuit. Nicholls oratio de anima Medica pag. 17.*

Qui male intellecta hominis definitione, quod scilicet sit *animal rationale*, inferunt animam nihil nisi juxta rectæ rationis leges acturam esse, illi mehercule ineptie mihi videntur, quippe nulla est insania, protervia, ineptia, quæ in animam rationalem non cadat; homines siquidem non corpore sed animæ sunt oblinati, superbi, iracundi, ultionis cupidi, iniqui, leves, morosi; hæc viria non corpori fed animæ a Theologis & Jurisperitis imputantur, atqui ramen his pathematis excæcata anima, probono & malo reali apparens sumit, errat millenis modis, hallucinatur, & contra rectæ rationis leges peccat quotidie; qui itaque *Animiffas* derident quod animæ errores in regimine vitæ tribuant, seipfos ignorare, quid sit anima nescire videntur, & ipsi primi deridendi veniunt. Numquid verbis opus est ut probeatur humanæ animæ fragilitas, morositas, protervia, inconstantia, error multiplex? Si vero in rebus ad intellectum pertinentibus erret, quid mirum si in negotiis vitalibus, seu regimine peneralium corporis, sensibus aditorum & instinctui tantum perviorum, a recta via recedat? Talis profecto videtur anima, quæ hominis corpore præponitur, quæ, si penitus saperet, si reiectis nugis & ineptiis, soli corporis pervationi invigilaret, venientibus malis occurreret, senectutem diu retardaret, vitam curreret, quatenus ab internis causis tolleretur; quæ in millefimum forte annum produceret; quæ si ab officio desleret moderatrix, non millefima hominum pars, unius anni damna & incommoda perferret, ut navis sine rectore præcelsa mari jacta inter scopulos. Tali doctissimo, timide, res suas, & legem gerat, Medicis artibus allicienda, excitanda atque provocanda est., *Nicholls*.

Ea sæpe est naturæ infirmitas atque imprudentia ut ab externis rebus perturbata corporis curam vel remittat vel deferat; ea, ait *Galenus lib. 3. de crifibus*, cum a morbo superatur, ne pugnare quidem adversus eum aggreditur; sic cum in abdomine gangrænam resolvit aut prævertere non potest, subito a febris motu abstinere, & æger, nullo dolore laessitus, torvo ramen atque perturbato vultu, sollicitam animam, atque inevitabili corporis ruina perterritam, indicat: hinc accidit etiam ut pridie mortis fontanelle, antiqua ulcera, quibus natura se a pravis ichoribus exonerabat, exsiccantur.

Qui debilitatem motus cordis, foperem, aliæque symptomata funella semper existimant, nec a remissione spontanea facultatis sentientis oriiri posse putant, attendant ad sequentia. Mulierem horrendis doloribus in abdomine cruciatam curabam; co vehementer deventerunt illi,

ut subito ægra animi, deliquium passa sit, & paulo post sui compos facta omnia a dolore immunis evasit, abique ullo medicaminis aut evacuationis spontaneæ auxilio; felicem judicavi hanc syncopem instantaneam, quæ tanti doloris finem fecit.

Soporem in variolæ, aphthæ, miliaris præludio pericemifimus, quia malum malo additum putamus; interea numquam felicius in pustulas prorumpit materia morifica, quam cum laxata per somnum cute, libenter huic veneno paratur exitus.

Symptomata terrificæ sunt quandoque naturæ salutis nostræ prospicientis conamina vel artificia; sic ineuntibus variolis, si somno foras extrudi non possit venenum, per vim naturæ illud ejicere tentat, febre adaucta & convulsionibus etiam adfectis, atque posttridie summo mane eruptio felix est expectanda, observante *Sydenham*.

In negotio parvus, sævus maturus semper præfens est, utrumque pondere premit; verum quam impar foret ea vis ad superandas resistentias! natura, quasi intelligeret fibras uteri sensum dilatactas sine ruptura extendi posse, identidem conatus edit, successive vegetiores, atque cum quod caret alterna requie durabile non sit, illa identidem conatus omnino intermittit, ut suas & sævus defatigati vires reficiat, quod somnus interpolatus exsequitur: suspendit itaque, ubi id res postulat, omnem in corpore sensum, auctoque dein ad summum impetu, sæctum extrudit, peracto opere, reiectis secundinis, anima rursus somno se recondit, ut suis rebus attentius incumbat, stagnantia dissipet, confusa reficiat: *Nicholls p. 26. Anima enim, ut ait Hippocrates*, etiam dum corpus quiescit, vigilat, & habitaculo suo prospiciens cuncta vitæ obit munia.

Nuper & antea pluries observavi in febribus malignis statim a morte abdomen portentolet intumescere, antequam novæ putredinis flatus rerefacienti id adscribi posset, cum frigus mortiferum hanc putredinem subito nedum intendat, potius cnhibeat; ergo cum nulla alia hujusce subitæ intumescenctæ sit ratio quam quod anima non amplius obnititur adversus materiei putrescentis expansilitatem, jure inferat quod, durante vita, anima, nobis etiam inscisi, tonum partium, ut sphincterum, aliorumque musculorum vim, contractionemque sustinet, qua cessante, intransciscit abdomen, sæces & recto elabuntur, mucus sæpe spumofus e bronchiis exudat.

In somno itaque, ut ut anima otiosa videatur, non minus illa negotiis vitalibus incumbit, ut cordis & respirationis motibus, quia etiam impressionum externarum latagat; sic sani somno opprelli sentiunt obscure nubes faciei incumbentes, easque manu abigant, incommodum situm percipiunt, & commodiori mutant, quio evigilant; sed si interiora corporis gravissime & periculossime lædantur, tunc, iis solummodo intenta, externas impressiones non curat, nec

nec percipere videtur; hinc sopor apparet.

Verum quidem est quod dormientes, etiam gravibus morbis oppressi, licet quandoque somnient de illis quæcumque statu suo affinia sunt, ut plurimum a suo morbo longe aliena mente revolvunt, unde quis facile concluderet animam regimini virali non incumbere; sed advertant, quæso, animam confecta omnia obire, licet se obire non percipiat, & de aliis cogitet, aliquæ negotia tractet; quoties enim accidit, cuique, ut dum confectas ad Deum fundit preces, & labiis pronunciat, tamen de diversissimis rebus meditetur; & se preces fundere non advertat? Ergo nil mirum, si dum somno detinetur imaginatio, natura, quæ altera est animæ facultas, operi non animadverso incumbat; quippe ut multa agamus quæ visu, auditu, memoria non novimus, ut nictare, deglutire, in somno ambulare, ita facultas motrix independentes a pluribus animæ aliis facultatibus operatur.

Aliæ sunt intermissiones motuum quæ coactæ sunt, aliæ vero quæ spontaneæ; intermittit motum & sensum anima coacta, cum organum, quo utitur, vitiöse se habet; sic obstrueto, relecto, compresso oculo opaco, coacta est cæcitas; nervis linguae resolutis, coacta est mutitas: verum aliquando spontanea est visus & tactus intermissio, ut apud illum Sacerdotem Hipponensem, qui testis *Divus Augustinus*, omnes suos sensus pro lubitu suspendebat, & apud *Chilarchum Tersoniensem*, qui, teste *Chrysa*, omnem sensum & vitalem motum in se pro lubitu suppresserat: plura vide in *historia catalepteseos*.

Mirum est quod narrant de anaplophilia magica, sed quotidiana observatione firmatum; ita est anima eorum qui hisce vanis maleficorum præstigiis fidem adhibent, ut ex eo quod ob præjudicium, metum, pudorem prima vice debuit reddere nequiverint, dein id sibi minime licere & impossibile reputent, atque ex eo maleficiati, frigidi, & reapse veneri ineptificant.

Vidi hominem qui præ singulari morositate, aliunde vegetus & sanus, per mensem nullum cibum deglutire voluit, oec hujus anorexiæ unquam ullam rationem protulit; pridie mortis mihi obsequiosus iusculum scelle deglutivit; al paulo post cum me recessisse putabat, sedens io lecto, illud ad sex pedum distantiam, ridens, & uno filo evomente, placideque sequenti die expiravit; quare vero id ageret, & interrogatus nullis unquam responderet; nunquam divinare potui, cerebrum vero firmissimum, & veluti exsuccum, aperto capite prehendi.

Cum itaque facultas motrix animæ sit primum virium omnium hominis principium movens, illius adynamia, exhaustio, infirmitas naturæ a morbis seriatim, pigritia, stupor, non raro in morbis hujus classis, incusanda sunt.

Deinceps fluidi nervi defectus, exhaustio, ineptitudo inter principia morborum potest accerseri; unde debilitas senilis, convalescentum, longis, vel acutis morbis, potissimum evacua-

toris, exhaustorum, longo jejunio, angina, vomitu iocantorum; unde etiam debilitas eorum qui mephiticos halitus hauserit, & qui subito, velut fulmine tacti, viribus destituuntur, ut patet ex historia asphyxiæ.

Alterum debilitatis principium est nervorum immobilitas, cerebri, medullæ spinalis obstru-ctio, compressio, nec intelligitur ex historia apoplexiæ, paraplexiæ a casu, lapsu, luxatione ortæ; denum in ipso musculo movendo vim hæreticæ potest, si obstrueto, rigidus, fluidus, fluido nerveo, vel cruri impervius fit.

Si tamen impotentia movendi non sit præcipuum Symptoma ægritudinis, tunc morbus ad alteram classem est referendus. Sic in febris acutis tum continuis, tum remittentibus, maxime vero in typo & syncho, in hemiplegiis, & tritaphyis, delirio, somnolentia diapsis, necnon in phlegmasiis, versus morbi finem, summa est debilitas.

Est etiam impotentia movendi symptomati-ca, ut, aut, in morbis dolorificis, fracturis, luxationibus, sed ea a dolore ipso dependet; quippe natura & libertas abstinent a motu, quoties motivum ad agendum debilius est quam detrimentum a motu metuendum.

Auxilia in debilitate requisita sunt vel moralia, vel physica, vel mechanica.

Moralia sunt quæ agunt in animam, ejusque viciosum statum mutant; animam esse omnino mutationis expertem docent Cartesiani; eam vero in continuo statui sui mutandi conatu versari docent VVolfiani, quibus experientia ad-stipulatur, licet ignoremus, aut imaginari nequeamus unde pendeat diversitas status inter animam moriorem, pudore, poenitentia, desiderio prostratam, læticia excitatam: sensus ap-prime non omnes ejus diversos status a machi-næ prævio statu determinari, qui Materialistarum error est; sed partim semetipsum muta-re, partim corporum mutationum occasione, diversimode affici, sunt verba & voces quibus lenire dolores animæ, vel eam exhilarare, spem ejus erigere, vires addere, stuporem excutere possunt amici, Philo sophi: non inanis est mos jubere ut bono animo, sint illi, quibus a mor-tore impender syncope; pauper in lectulo suo æger, derelictus, omni solatio destitutus, si-pe ita animo despondet, ut nec cibos appetat, nec e loco ad victum sibi parandum & vitam sustinendam se movere queat, pulsus deficiat, mors impendat; alii si quævis externa impres-sio, si sonus, tactus eum moneant, præsto adef-ficet manum auxiliatricem, amicum qui ejus mis-leret, illico sensus, motus, pulsus redeunt. Sic ad nomeo Thybes oculos jam morte gra-vatos Pyramos erexit; sic adolescens, cujus his-toriam narrat *Tulpius*, omni sensu, motuque destitutus, jacebat morti proximus, & morore repulsæ fere exanimatus; sed ad vocem amariæ, a qua repulsam pulsus erat, subito reviviscit. Sic non dudum mulier, cujus masti-cæ ære alieno obrutus effugerat, cum sola do-

mi apparitores residuam supellestem, Magistratus auctoritate, correpturos cerneret, concidit velut exanimis: recesserunt apparitores, accersitus Chirurgus frustra cardiaca cum servare conatur, phlebotomiam non admittebat pulsus depressus vix conspicuus, nec ullum potum dentes invicem appressi; frugebat misera, cum accersitus accuro; ea vocem meam cognoscit, aureum offero, & statim, spe reddita, vitales motus redierunt.

Ea sunt itaque auxilia moralia, quorum actionem ex motus legibus explicare velle superfluum est, forte impossibile, nisi animam cum omnibus antiquis dicas esse principium quo vivimus, sentimus, & loco movemur, penes quod est vitæ & vitalium motuum regimen.

Auxilia mechanica sunt ea quæ frictionibus, percussionibus, gellatione fluorem & motum sanguini fluidoque nervo conciliant, & sic vires restitunt, & anæsthesiam horum fluidorum quiete dependentem tollunt; in quo sensu quandoque phlebotomia, quatenus resistentiam cordi oppositam tollit, est reponenda; succussiones etiam corporis vulgo adhibentur.

Auxilia vero physica sunt ea medicamina, quæ principium debilitatis tollunt; analeptica in inanitione; cardiaca, tephatica in sanguinis tarditate, spissitudine, organorum atonia; Romachica omnia agunt, ut auxilia physica simul, & ut moralia, vel ut mechanica, qui omnes agendi modi ex singulorum morborum curatione patebunt.

## ORDO PRIMUS:

### DYSAISTHESIA.

*Perles de sentiments, ou Faiblesse des sens.*

**A**ISTHESIS, seu *aisthetica dynamis* est facultas qua anima percipit objectorum impressiones sensuum organum illatas, seu *sensu* est; inde *dysaisthesia* intelligitur difficultas, vel impotentia sentiendi.

Duplex est percipiendi modus, alter per *instinctum*, alter per *intellectum*; instinctus brutis hominibus communis comprehendit sensum & phantasiam: illius actio *sensatio* dicitur; istius vero *imaginatio* nuncupatur.

Sensatio supponit ex parte *materialis* motum impressum fibræ nervæ organorum, qui interventus fluidi nervi, seu vaporis electrici nervos pervadentis illico ad *aisthetium*, seu *sensorium* transferatur: ex parte vero *formalis* supponit animam fortiori idea, aut cupiditate non detentam; & quo magis ea ab alienis cogitationibus immunis, cæteris paribus, eo vividior sensatio.

Imaginatio supponit vel actualem sensationem, seu impressionem forissecus accedentem ad sensorium commune, ubi fibræ medullares cerebri in motum aguntur; en novæ idææ a

sensatione diversæ, & phantasmata inde in anima exsurgunt occasione sensationum externarum; vel absque externis impressionibus, ut in somno, delirioque, ab arteriarum pulsus, capitis istu, sive illapso moventur fibræ medullares emporii. Demum penes nos est iure libertatis, absque ulla prævia corporis mutatione, quasdam ideas mente refricare & imaginari actualia, præterita, vel futura; inde imaginatio, anamnesis & prognosis, quæ ultima in bruti *similium eventuum expectatio* dicitur.

Non omnis itaque imaginatio est *passiva*; datur etiam *activa*, quæ a libertate dependet; uti & *anamnesis*, seu reminiscencia, vel memoria; pendet scilicet a nobis, cum bene valeamus, pro lubitu Romam, Londinum, Cæsarem, Alexandrum imaginari, &c.

*Intellectum* quod attinet; is est facultas ideas distinctas, universales, abstractas formandi, quæ facultas supponit ideas a sensu & phantasia prius acquisite: ex his sequitur ad dysaisthesiam attinere imminutiones & suppressiones non solum sensuum, ut visus, auditus, tactus, sed etiam imaginationis, memoris, & prævisionis, quæ objecta visus, auditus, tactus, &c. nobis repræsentant veluti actualia, præterita, vel futura; atque etiam sequitur quod his quod maximam partem læsis vel abolicis, intellectus inde suas ideas mutuans multum detrimenti sit passurus; inde summa affinitas inter dysaisthesias, & quasdam vesanas, ut dubium sit an ad illas pertineat memoriæ imaginationisque imminutio, seu morosis, & oblivio.

Cum autem suppressa sensatio & imaginatione supprimatur appetitus, seu nativa bonorum cupiditas, & malorum averfio saltem sensitiva, dein etiam rationalis, alterum classis ordinem ingrediuntur illæ appetitus imminutiones, ut anorexia, adipis, anaphrodisia.

Quo organa sunt magis utilia, magisque cognita, eo accuratius eorum morbi a Medicis investigati sunt, & eo major morborum illis insidentium numerus in medium prolatus, ut patet conferenti numerum morborum visus, cum numero morborum olfactus; genera itaque morborum omnia non sunt ita cognita & definita, quin nova in dies assignari queant, immo debeant, ut individuorum morborum plenior notitia acquiratur.

**I. CATARACTA;** *Glaucoſis*, Hippocratis; *Hypophrys* Galeni; *Gutta opaca*, & *Aqua Acutum*; *Glaucoma* quorundam; *Suffusio* Jonſoni, Rumphii; *Cataracte*.

Definitur recte a *Boerhaave* visus abolitio, quæ sensibili opacitate pone pupillam conspicua stipatur.

Lis fuit inter Ophthalmographos an in membrana, an in crystallino recideret illa opacitas, sed bona definitio ab omni theoria & opinione libera esse debet.

Disert

Differt cataracta ab *amaurosi* per labem pupillæ conspicuam, seu maculam subrotundam, sæpius albam, in regione & loco pupillæ: a *caligine*, quod obex visui oppositus in caligine sit citra pupillam, ut in cornea, palpebris, &c. cum in cataracta lens crystallina, quoad nucleum suum, aut quoad alterutram capsulæ laminam, anticam scilicet, opacitatem sit opacata, etque proinde omnes reflectat, nullos fere transmittat lucis radios, evidens est nullam objectorum imaginem in retina depingi posse, proindeque visum suppressum iri, huius obiculis culpa, licet optime se habeant retina, cæteraque visus organa.

Lens crystallina non ita arcte involvitur sua capsula, quin inter nucleum & capsulam guttula una aut altera humoris viscosi intercedat, cuius interventu illa capsula figuram mutare potest, & convexitur planior fieri per actionem coronæ ciliaris, quæ actione cessante, sorte capsulæ elasticitas nititur ad figuram sphericam levis crystallinæ conciliandam, & reapse in extactis crystallinis cataractosis hæc spherica figura sæpius observatur.

Opacitas crystallini raro accidit subito a causis saltem internis; sed per gradus crescit; verosimile autem est pari passu laxata corona ciliaris, leantem illam in corpus sphaeroideum, proindeque magis convexum, mutari simul & magis opacum.

Idem itaque accidit in cataracta recenti, quod oculis trans lentem magis convexam objecta respicientibus; illi scilicet non nisi propria, & ad determinatam non ultra citrave distantiam posita, distincte cerunt, fere visus in dies decurtatur; præterea quoniam crescit sensim opacitas illa maculæ, quæ initio nebulam repræsentabat in fundo oculi posita, sensim magis albescent, corneæ propior, seu minus profunda, videbitur ophthalmiatro illam insipienti; objectum enim idem propius positum videtur quod majorem lucem reflectit quæ ratione quo majorem lucem reflectit; illa macula, eo minorem transmittit ad retinam; ergo successu temporis obscurior evadit in cataracta visus, & cum non amplius crescit obscuritas, *cataracta matura* dicitur, quoque idem tempore lucem solarem a tenebris ægri distinguunt, sed corporum colores & figuras, distinguere nequeunt. Sunt cataractosi, qui initio suffusione, seu muscarum, filorum in aere suspensorum, visione apparenti defatigantur ob vitium retinæ conjunctum; sed hæc suffusio quandoque cataractam minime comitatur, nec inter ejus indicia reponi debet, errantque illi qui ex suppositis in crystallino illis, vel punctis opacis similes apparentias deducendas esse supponunt, quos merito deridet *Deschales in Optica*; cataractosi illibata retina gaudentes vident objecta quasi uniformi nebula involuta, nulla vero vident objecta distincta, seu certis limitibus circumscripta in aere volitantia.

Auxilia cataractosis afferenda sunt vel physica vel mechanica, etque Chirurgica & dioptrica,

Auxilia physica sunt medicamina intus sumenda quæ lymphæ crassiciem, spissitudinemque dissolvant, tum externa quæ fluxilitatem ipsi concilient; sic jalscula & serum lactis, assellorum succo mixta, balneaque repetita plurimum profunt. Auxilia dioptrica ante operationem Chirurgicam sunt vitra concava, ut plurimum parvi usus propter opacitatem crescentem, licet indicentur a myopia seu brevitate visus conjuncta; post cataractosæ lentis destructionem, elapsis tribus mensibus non antea, perspicilla, quæ conveniunt, sunt utrinque convexa, foci brevissimi seu aliquot pollices extenti, ut quatuor vel quinque.

Auxilia vero Chirurgica sunt crystallini r. depressio, quæ fit ope acus apice ancipitis juxta canthum temporalem ad unam a cornea lineam immissa pone uvam, cuius ope crystallina lens desuper inciditur, & dein & crystallinus & capsula deorsum in ima vitrei parte recondantur, & longa quiete per novem dies servata, oculis fascia obductis etiam ambobus, detineantur; a. ejuldem crystallini & capsulæ extractio, quæ fit iocula in orbem cornea ad tres quartas circuli partes, ab ima parte incipiendo, quod fit ope forficum curvorum, præmissa incisione ex lanceola: Interea speculo sub palpebris posito fixus detinetur oculus, molliorque facta incisione premitur, atque illico fere crystallinus sese obvium offert foras, aut si cataracta maturitatem non adeptæ sit, ope auriscalpi vulgo *carrette* foras educitur; dein lacinia capsulæ & flocci mucosi a capsula rupta elapsi per vices extrahuntur.

In prima methodo expectandum donec cataracta perfecta, seu matura sit; timendum ne, ut aiunt, crystallinus depressus resurgat, aut potius ne capsulæ mucus opacus superfit qui cataractam recidivam inducat; in altera methodo metuendum ne fortiori pressione oculi, cum aqueo etiam vitreo foras prorumpat, & quod frequentius accidit, ne choroidea graviter inflammatur; sorte quia dum crystallina lens foramen pupillæ transit, aut auriscalpio educitur, uvea & coronæ ciliaris distrahantur; illa autem ophthalmia per quindecim aut viginti dies perseverat, quæ superata, mira suffusio, sed fugax accidit, æger scilicet objecta omnia quasi nive respersa & in medio quasi nigram avem videre sibi videtur. Statim ab utraque operatione collarium albuminosum, seu ex albumioe ovi & aqua rosarum commixtis, oculo debet apponi, sed præterea in ultima methodo, ne tussi, vomitione aut sternutamento oculus secus omnino vitreo suo evacuetur, oculus vinciri debet, saltem per quatuor dies.

1. *Cataracta vera* Maitre-jan; *Glaucome* VVoolhouffii de cataracta pag. 30. *Cataracta vraye*, S. Yves des maladies des yeux cap. 14. L.

Est species hæcenus descripta, & matura, Dividitur in virgatam, luxatam, purulentam, excisatam, & protuberantem.

a. *Cataracta virgata* S. Yves pag. 288. *Cataracta barre*.

Est ea in qua crystallinus opacus est interfectus una vel pluribus lineis coloratis quomodocumque dispositis. Raro hæc varietas crystallinum gerit maturum. ut possit acu deprimi; pertusa enim lens crystallina fundit mucum albidum, vel flavum, quo turbatur humor aquosus; unde visus obscurus remanet, nisi sponte resideat ille mucus, aut iterata operatione deorsum acu deiciatur.

b. *Cataracta purulenta* Ant. Maitre-jan; *Cataracta purulenta, ou absces au crystallin*. L.

Est ea quæ producitur a crystallino intus suppurato; suppurationem illam præcedit dolor in ipso oculo, cum ophthalmia quandoque externa, & hemicrania frontali, accedit nebula crystallini, facta pure dolor sedatur, crystallinus albescit, inæqualiter tumet; licet volumine minori gaudens; effuso pure turbatur humor aqueus, iridis color mutatur, pupilla multum angustatur. visus admodum obscuratur. Vide ophthalmiam ab empye, & caliginem a myope.

c. *Cataracta argyriæ* VVoolhouff & Mauchartii. L.

Est ea in qua supra crystallinum est tantum exigua macula resplendens inlar argenti, quæ creditur a S. Yves, fieri a partiali & exiguo abscessu in superficie crystallini; interea illud punctum album, quandoque per totam vitam perseverat & tantum paululum visum obscurat; æger quocumque versat oculum umbram seu nebulam objectis effulam videt; ait Maitre-jan.

d. *Cataracta clavata* VVoolhouff de cataracta par. alba & opus Veterum, Persia, calli & clavi oculorum; in *Grando* Mauchartii? L.

Est species soli VVoolhouff cognita, quam canibus ad ignem dit assidentibus evenire observavit, & ea fit a fibris albis, quæ veluti clavi & conjunctiva proficientes, ubi nodum efformant; in oculum penetrant, & crystallinum veluti perforant, ac colligant.

e. *Cataracta luxata*, *Cataracta déplacée* Maitre-jan & S. Yves.

Est ea quæ pendet a crystallino opaco, sed a nativa sede dimoto.

Cognoscitur 1. a causa, idu scilicet in oculum, cum cruoris effusione, seu hæmaloque; 2. a pupillæ immobilitate, & magna mydriasi; 3. crystallino albescente, & aream quam premit extorsitum trudente. 4. Exsiccatu dein illa lens & decrevit; tunc vero æger corpusculum luci & oculo interpositorum umbram cernit.

Hos crystallinos attingere inutile censet Maitre-jan.

f. *Cataracta a synchisi*, Mauchart; *Cataracta viva* VVoolhouff; *Glaucome* Heisteri; *Cataracta brulante* d'Ant. Maitre-jan; *sente & dissolution du vitre*. L.

Est visus abolitio cum macula alba, vel lutea, a crystallino opaco & simul mobili ad quemvis capitis motum; crystallinum illud mole minuitur, induraturque.

Procedit hoc malum a virrei dissolutione in serum subileum, putre; præcelsit ophthalmia interna quæ in suppuratum abiit, cum diris doloribus, & tunc albescit initio pupilla, quandoque dissolutio fit putredinosa sine pure; initio dolet oculi fundus, & pars anterior capitis, dein visus obscuratur, vel omnino avertitur; crystallinus rufatur, albescit, & flavescit, pupilla dilatur, irisium colorem nativum amittit, corrumpitur, & cum crystallino adhærens interorsum vel extrorsum flectitur uvea. Hæc autem dissolutio putredinosa, malum est insanabile visum tollens, sed nullum aliud damnum oculo inferens.

VVoolhouff hanc speciem tribuit globulis hydrargyri in crystallinum deductis p. 62. vel spumæ humoris aquei.

g. *Cataracta antiglaucoma* Ant. Maitre-jan; *P. Antiglaucome*. L.

Differt a glaucome quod 1. crystallini moles major videatur, quæ minor etiam in glaucome; 2. quod pupilla dilatur; 3. quod crystallinus protuberet, & colorem cornu politici, splendentis, referat, licet inæqualis sit ejus superficies; 4. quod pupillæ ambitus inæqualitatem crystallini referat; 5. nulla demum est visio, nulla pupillæ contractilitas; 6. nullus dolor præcedit, vel comitatur, ut præcedit glaucomatis exortum.

Differt a cataracta vera; 1. quia in cataracta pars antica capsulæ crystallini dissolvitur, in antiglaucoma induratur & incrassatur; 2. unde crystallinus major apparet; in glaucome vero minor est; 3. crystallinus in glaucome variegatus, profundus, in antiglaucoma coloris puri, ut cornu albidum, & protuberans.

Morbus est insanabilis.

h. *Cataracta glaucoma* Anton. Maitre-jan & S. Yves, *La Glaucome* de Maitre-jan, non de VVoolhouff.

Differt juxta S. Yves a vera, quod glaucoma sit stipatum amaurosi seu gotta serena.

Est cataracta exsiccata seu cognoscitur 1. colore subcæruleo seu glauco, vulgo *Verd de mer*; 2. volumine minori, amissa diaphaneitate, aucta duritie, visu penitus ablati, juxta S. Yves; 3. raro præcedunt dolores nisi ab ophthalmia interna vel ab idu cataracta oriatur, quod frequentissime fieri putat S. Yves; 4. pupilla rotunda est & diametri nativæ; at juxta S. Yves adeit mydriasis; 5. visus initio nebulosus est ut in cataracta, a cantho tamen majori clarius videt; 6. colorem mutat, initio glaucus est, sed dein griseus, perlatius, vel viridescens, flavus, immo luteo nigricans crystallinus. Malum est insanabile si combinetur cum amaurosi, seu cæcitate a retinæ paralysis, ut putat S. Yves.

i. *Cataracta membranacea* VVoolhouff de cataracta 1719. Freitagii thesis Tiguri 1721. a senla Hist. de l'Acad. des Sc. 1718. pag. 18. *Cataracta vera* Veterum; *Cataracta membranacea* Mauchart, diff. L.

Mucus ex margine pupillæ seu uveæ exudans apud equos observante Levvero concrevit quandoque

doque in membranam quæ pupillam obturat. Num in homine talis cataracta membranosa detur, dubium est, licet eximii Ophthalmiatri hanc se aliquoties invenisse aut acui depressisse putent.

Signa ejus diagnostica nondum sunt distincte comperta.

5. *Cataracta secundaria* Hoin Mem. de l'Ac. R. de Chir. tom. 2. pag. 425. L.

Depresso crystallino cataractoso, nec deterfa capsula crystallini, non raro accidit, maxime si æger, incuria sua, vel Chirurgi, ophthalmiam internam patiat, ut pars capsulæ illius quæ adhæret vitreo, opacetur & albefcat, tum propter ophthalmiam quæ pariter corneam opacare consuevit, cum externa est inflammatio; tum propter mucum ipsi capsulæ adhærentem, & exsiccatum vel collectum; quippe ea cataracta secundaria non accidit cum crystallinus sit methodo Davielis extractus, & capsula mucu suo deterfa, licet ophthalmia interna sæpius huic operationi superveniat. Similem cataractam secundariam *Hilmar* examinandam præbuit, sed operationem minime successuram recusavit; color hujus cataractæ est mere nebulosus, situs videtur profundus, sola operatio Davielis, qua auriscalpio detegeretur hæc capsula; succedere posse videtur, sed nondum tentata est, quantum scio.

Si operationis Davielis usum respiciamus; cataracta in duas tantum varietates est dividenda, scilicet in *simplices* quæ extractione crystallini sanari possunt, hæc autem vi quarta pars ab operatione visum distinctum recuperet; & in *complicatas* cum amaurosi, atrophia, ophthalmia; &c. quæ operationem frustra aut minime patiuntur.

Ufus extracti hyoscyami albi quotidianus, a triente grani incipiendo, & sensim augendo, quamdiu nulla est esophagi nariumve secitas, est egregium & ferme unicum remedium quod cataractam resolvat, ut pluribus observationibus compertum habeo. Presbyter ea affectus in oculo dextro, post octo dies quibus hoc medicamine usus est, quo intervallo, ad tria grana pervenit, jam minutis librorum characteres legere valet, qui prius non nisi maximos perspiciebatur; crystallini prius albus, jam subcæruleus evasit & subpellucidus; suffusus myodes qua laborabat evanuit, fames autem & letum, prius languentes, vigent maxime. Ab hoc medicamine alium vidimus a *D. Contas* etiam curatum, cujus crystallinus omnino diaphanus evasit.

## II. CALIGO. Obscurissement de la vue.

Est morbus cujus præcipuum symptoma est visus imminutus partialis vel totalis propter repagulum opacum citra pupillam oculo inhaerens. In Amblyopia & Amaurosi nulla est opacitas. In cataracta opacitas est altera pupillam.

Repagula lucem intercipientia in caligine sunt vel vicia contentorum in camera antica, vel vicia continentium, ut corneæ, palpebrarum.

Plura ad visionem distinctam requiruntur, 1. ut radii ab objecto videndo emissi oculos ad retinam usque pervadant, quod repagula impediunt; 2. ut coeant apices penicellorum lucis ab eodem puncto objecti proficiscentes in eodem retinæ puncto, non in diversis, nec ultra citraque retinam, ut accidit sæpius in amblyopia; 3. ut ambo oculi conspirent & axes suos opticos ad idem punctum objecti, quod cernitur, dirigant, quod in strabismo fieri nequit, & in pluribus caliginis speciebus difficile est; caligo itaque nocet visioni, & intuitui objectorum; intuitus enim est directio amborum axium opticorum versus objectum videndum.

Opacitas est corporum ea dispositio, qua fit ut vel radios omnes reflectant, unde albissima corpora opaca sunt; vel ut radios absorbeant, & non transmittant, unde corpora, ex lamellis seorsim pellucidis constata, si crassiora sunt, vix pelluciditatem suam servant.

Opacitas pendet ab iteratis refractionibus radiorum in diversis plagas, & illæ iteratæ refractiones accidunt; quoties moleculæ, vel laminæ quibus constantur corpora, sunt heterogeneæ seu diversæ gravitatis specificæ, ut ostendit *Newtonus*.

Cornea eo plures in lamellas dividitur, quo industria anatomici major est; verosimile est fluidum lymphaticum, quo imbuta est, esse ejusdem cum ejus lamellis gravitatis specificæ, si vero actione caloris adauget paulo rariore vadit illa lymphæ, pari passu non rarefescit parte solida, opacabitur; & eo major erit opacitas quo albidior erit macula, & quo crassities membranæ major.

Qui caligine laborant, illi obscurius vident in minori luce quam in majori; nam quo major est claritas lucis, eo major est radiorum lucis numerus; adeoque cum e majori radiorum corneam ferientium numero major pars subit interiora oculi, quam cum minor est numerus, fieri potest ut qui minime videbat in luce minori, sufficienter videat in majori; adeoque ut caliginosus sit heneralops seu indigeat luce meridiana ad videndum, & in crepusculo cæcus fiat.

Si macula vel repagulum luci oppositum sit e directo pupillæ, tunc æger tantum objecta lateraliter versus alterutrum canthum oculi posita visurus est; in utroque scilicet cantho magis recedunt limbi palpebrarum quam superne & inferne a pupilla; ergo per hanc rimam radii ad oculum possunt accedere, cum vix ullus desuper aut inferius illabi potest in oculum; si pariter ex alterutro cantho fuerit macula opaca, eo versus dirigi non poterit axis utriusque oculi, ut ad intuitum decentem opus est, unde strabismus orietur.

1. *Caligo a symblepharosi* Mauchart. dissert. inter Hallei disput. Chirurgicæ, *Prostaphys* Mauchartii. L.

Symblephorosis est palpebræ, potissimum superioris, coactus cum oculi globo; nocet

tem vel-visui, vel intuitui: intuitui vero quatenus oculi mobilitatem tollit hæc adhesio, unde oculus huc & illuc converti non potest; potissimum nocet symblepharosis visui objectorum distitorum, quibus cærendis maxime confert palpebræ superioris elevatio, ut docet experientia; cum e contra ad objecta proxima cernenda palpebræ conniveant, ut scilicet maiorem lucem a proximis objectis reflexam arceant.

Symblepharosis procedit a Græcis verbis *syn* cum, & *blepharon* palpebra: ea est vel congenita seu abortu, vel acquisita, ut ophthalmiæ, ulceri gravi succedens oboeculum diutius clausum. Curator operatione Chirurgica ut Ancyloblepharon.

2. *Caligo ab ancyloblephare* Heister Chirurgia. L.

Ancyloblepharon est coactis palpebræ superioris cum inferiori, onde conoivent palpebræ, & vel omnino vel partim intercipiuntur lucis radii. Coactus est vel a levis glutinosis, ut accidit in ophthalmiis humidis, potissimum palpebris ulcerosis, & tollitur lacte tepido, pulvere absorbente, potissimum tutiæ. Vel coactus est intima concretio palpebrarum inter se, & sæpe cum oculo, qui tollitur ope scalpri perita manu ducti, qui parcat potius palpebris quam scleroticæ; dein lamella, plumbea tenuissima interponitur, cavendo ne rursus succedat coactio.

3. *Caligo a blepharoptosi*. Vide S. Yves ch. 9. L.

Proptis est lapsus palpebræ superioris, ita ut carneam obumbret; tribuendus est ille lapsus vel resolutioni musculi palpebram attollentis, & tunc proptis est vel continua, vel intermittens; ista sanata fuit Montpellii irrigatione aquarum Balneucanarum. Vide *Philos. Transf.* n. 449. anni 1736. In continua frustranea sunt medicamina exsiccantia, resolutentia; ad excisionem cutis deveniendum est ut docet Heister. *Chirurg.* c. 45. Methodus *Baillifii* crudelior videtur. Lapsus palpebræ superioris, ad atonia oriundus, sanatus fuit ope electrificationis: J. G. Baumer. *Act. Acad. Moguntina* Tom. 1. pag. 286.

Intermittens nocte qualibet per duodecim horas durabat cum lippitudine; vel lapsus pendet a pachea-blepharosi.

4. *Caligo a pachea-blepharosi*. *Pachea-blephara* Gorræi. *Pachytos* Zelleri. *Prilosis* Græcis.

Pachea-blepharosis est incrassatio palpebræ a tuberculis, verrucis, & excrecentiis, grandinibus, hordeolis, vel atheromatibus limbo palpebræ adnatis.

Si excrecentia interiori, ut mos est, palpebræ superficiei, aut verruca major ejus limbo adnascatur, modo lancinatio & durities nulla sit, quæ canceri suspicionem moveat, ea si petiolata sit, filo vincienda; si exigua, cathartico absumentia; si sessilis, forficibus resecanda.

Si vero grando, si hordeolum leviter rubens & dolens adit, illud resolutivis aut suppurantibus est diu fovendum, aut scalpello e sua cyllide avellendus ejus nucleus. Si majusculum sit atheroma, illud est apertendum, dein capsula levi-

bis corrosivis absumentia cum cautela, ne oculi lædatur. Vide Heisteri *Chir.* c. 43. & 44.

Alii tumores palpebrarum pertinent ad ophthalmiam, ad anasarcam, erythelasma, variolam, carcinomata, &c.

5. *Caligo a nephelio*. *Nuage de la corne*. L. Macula corneæ subpellucida vocatur Latinis nebula, Græcis *Nephelium*, *achlys*, & *agla*, quarum discrimina videlicet apud *Mauchartium* ac maculis corneæ differt.

Si nebula pendeat a guttula aquæ inter corneæ lamellas congesta, ea ope optimi perspicilli distingui potest, & ope acus iosticæ aqua effundi, ea nebula vocatur *Ajunula*.

Si a lymphâ opacata ut accidit post variolam, ophthalmiam, macula illa resolvitur sponte successu temporis, vel ope faccari pulverati, tutiæ in pollinem redactæ, addito dein vitrioli pauxillo, vel aqua fœniculi, succo expresso ex anagallide, vino emetico, &c. vel remediis leucematis.

6. *Caligo a Leucomate*: *Tacho de la corne*, *sayo*. L. Leucoma a *leucos* albus, est macula species albescens & minime pellucida in corneâ, unde differt a *Nephelio*.

Vocatur *Paralampsis* seu *Margarita* macula alba-cærulea, crassa, opacissima & resplendens. *Albugo* est proprie leucoma si alba, prominens, coloris cretacei, ad margines sæpius inflammata & dolens.

*Gerontoxon Mauchartii* seu *arcus senilis*, est macula alba vel fusca arcuata in limbo corneæ, seorsibus familiaris, sed vix vix officiens.

*Onlo*, seu cicatrix, est macula corneæ ab ejus cicatrice.

*Albugo D. S. Yuzi* est species ophthalmiæ.

*Glaucosis Aetii* est macula alba opaca totius corneæ sine phlogosi.

Differt ab exulceratione defectu excavationis, poris, doloris acris, &c.

*Curatio*: si sit dolor, calor, siccitas, præmittenda phlebotomia, fomenta emollientia, anodyna, ex croco, albimine ovi, &c.

In leucomate multa humiditate stipato laudantur suffumigia ex aloe, myrrha, bacis juniperi, prunis injectis, fumo e longinquo ad oculum adducto, oleo applicetur unguentum de tutia, cum pauxillo gummi arabici.

Laudat *Bidloo* lambitionem oculi ope linguae, semioibus anisi, fœniculi, saccharoque prius masticatis, addito vitrioli pauxillo.

*Mauchartius* suadet vapores ex herbis hyssopi, chærophylli, chelidoni majoris, persilli, origanis, toris marini, bacis juniperi, coffeæ, radice valerianæ, mastiche, camphora in aqua, vino, aqua calis coctis, aut lavacro ophthalmico; ex horum decocto oculus immergatur.

Collyria sicca sunt, ex saccharo, testa ovi calcinata, osse sepæ, iride florentina, agarico albo, tartaro martialum in pollinem redactis.

Acriora sunt camphora, fel piscium, tauri, axongia viperæ, crocus metallorum, succus chelidoni, oleum buxi, chætare, linteive cum mele mix-

le mixta; cavendum a vitriolo puro, ærugine, alumine.

*Bærbæve* præscribit repetitam catharsim ex aquilæ albæ & diagrydii ana granis sex, cum pulve vorandis ab infante.

7. *Caligo a lupia* Saint Yves pag. 119. *plaudantes* Mauchartii. L.

Atheroma, steatoma, meliceris, &c. sunt lupiæ succo pitaceo, sebaceo, vel melleo factæ, quæ non raro palpebris admiscuntur, sine dolore, rubore, periculo, avellanzæ aut nucis magnitudine; æstivi autem intuitui nocent, faciemque dedecorant.

Resolventia nil profunt, sola exstirpatio sanat; præparetur itaque æger phlebotomia & catharsis; dimidia pars cyllidis juxta rugarum palpebræ directionem fornice denudetur, dein hamulo profusum atheroma ope cultri cœvi a vicinis eximatur, radix forficibus resecetur; curatur deinde vulnus ope digestivi, superimponatur emplastrum diapalma.

Si suppuratio capsulam non omnino auferat, lapide infernali tangatur pars & capsula semel absumatur.

Lipoma seu excrecentia adiposa cantho temporali juxta glandulam lachrymalem nasci solet, id a pressione recedit, mox revertitur. Curatur excisione; dein vulnus recipit collyrium ex aloë, tutia & saccharo saturum in aqua rosarum.

8. *Caligo a sarcomate* S. Yves, 18. *Morus*. L.

Excrecentia carnea inter palpebram & oculum nascens, lævigata, *sarcoma* est; si sic granulosa & fungosa ac rubra vocatur *morus*, Gallice *mûre*, si sic coloris plumbæi, *encanthis*.

Utraque mature trahenda periculo vacat; duplici vero methodo tollitur sarcoma, excisione & causticis; 1. tangitur lapide infernali, cavendo ab oculis; 2. tumor filo trajicitur sericeo, interventu acus, ut exstirpatus cultro vel fornice fieri possit; 3. levissima corrosiva vulnere dein admoventur, talis est pulvis ex nua aluminis ussi parte, & odo sacchari partibus; pulveris hujus semigrammum sero & melle radici sarcomatæ applicatur.

9. *Caligo a cancro*, S. Yves. Vide ophthalmiam cancerosam. L.

10. *Caligo ceratocela*, *staphylo* Gunzii differt. Ceratocela seu hernia corneæ, est tumor exiguus corneæ, ut caput aciculæ, qui recta inspectus, in medio pellucidus, sed subobscurus videtur ac subrotundus; oblique inspectus, opacusest, & annulum opacum lutei peripheria refert. Fit ab exsione seu exulceratione puncti in tunica interiori corneæ, unde lamina externa paululum prominet ab aëque pressu. Curatur vel tonicis adstringentibus vel lamina plumbea appressa.

11. *Caligo ab staphylomate* Mauchartii. L.

Melon quasi parva bacca, *staphylophal* quasi caput mulæ, *staphylo* quasi clavus, vocatur staphylophal pro diversâ mole, tumor in cornea enatus, a prolapsu uvæ intra fistulam vel foramen ipsius corneæ, qui tumor est subrotundus, rubro lividus, Hujus vero existentia negatur a

Gunzio, qui contendit uvam prolabi non posse, eatenus ut foramen illud subire queat.

Illius vero tumoris basis filo vel crine vincitur, usquequo excidat tumor.

Scleroceleam admittit S. Yves, seu tumorem conjunctivæ prominentis ab humore aëque, per rupturam sclerotice subtus effuso in parte alba oculi, unde tumor ejus sphaericus, qui pressione recedit.

12. *Caligo a pterygio*. L' Onglet des yeux, la Drapée. L.

*Pterygium* quasi ala, quibusdam myx, sed male, necnon *unguis* & *ungula*, est membrana sacpius ex oculi cantho natali, vel allunde enascens, & supra corneam sensum se extendens in qua vasa sangulifera nec eminent nec distincta sunt.

*Pannus* vero dicitur congeries valorum sanguineorum supra albam oculi, ipsamque corneam expansorum, non membranam uniformem, ut in pterygio efformantium, qui pannus sæpius pterygio observatur & ophthalmia initio stipatur.

Utrumque pterygium, scilicet unguis & pannus, sanatio prius, si sit, ophthalmia, absumitur, vel resecatur: huic assumentur confert pulvis ex sacchari drachma & vitrioli vel aluminis granis sex, inperge semel in die; vel adhibeantur collyria acrida de leucomate indicata, sel squali, anguillæ, oleum chartæ, os sepia, lapis divinus D. S. Yves, succus chelidonii, &c. His incassum tentatis, caute forficibus resecetur pterygium, dein per quadratum foveatur oculus aqua vitæ & fontana mixtis, deinde vero collyria ex aqua rosarum & plantaginis uncia una, matris perlarum scrupulo, sacchari saturum granis sex, & vitrioli albi granis tribus fiant.

13. *Caligo hypophagma* Jonstoni Id. Medic.; *stomatops* Hippocratis; *Hypopyon* Galeni; *Echymoma* alius; *Sugillatio* Latinis; *Tarsen* Arabum; *Echymose*, *œil pûché*, *meurtrissure de l'œil*.

Differt ab ophthalmia defectu doloris, caloris, inflammationis, cum ea complicatur initio, si ab idu procedit, sed quandoque hypophagma sic a causis internis, ut ab scorbutico viru: in quo casu sola antiscorbutica profunt.

Curatur hypophagma ab idu, seu contusione 1. phlebotomia repetita, dolori, inflammationi, idus gravitati, symptomatum numero, respondentis, necnon hirudinibus palpebræ admotis. 2. Oculo affundatur initio sanguis valens columbæ, pulli; fac croco tinctum calidum, collyrium ex ovi albumine cum aqua rosarum coagulato. 3. Deinde sedato dolore vinum calidum, aqua vitæ, feniculi, decoctum foliorum hyssopi, folia parietariæ trita in vino, aqua vulneraria, ter indie renovato cataplasmate vel linteo.

14. *Caligo venerea*, Quælmate Panegyris 1750. L. Est cæcitas infantium recens natorum quorum mater gonorrhœa virulenta laborabat: ea caligo est cum atrophia oculi atque corneæ obliteratione. Plurimas vero hujus speciei caligines vidit Auct. celebri Taylor oblatas & prorsus insanabiles. Albugo, pannus, corneæ opacitas, cataracta, vene-



venerea; p[er] spiritum antivenereum subinde disparent: in his applico aquam ophthalmicam cum sapone, vel immitto parum mellis rosacei; vel ubi opacitas major, mercurius dulcis cum saccharo bis in die inspergitur. *Lecher*.

15. *Caligo hypopoma* Mauchartii de hypopyo. *Hypophysis hamathodes* Græcorum. *Hypophthalmia* Galeni. B.

Est ea species quæ pendet à cruore effuso intra cameras oculi. Hanc sanavit *Mauchartius* appolitis facculis ex herbis resolutivis in vino coctis, dein cauterio brachio inauso; sed phlebotomia debet antecedere.

Utrum objecta rubro colore tincta videantur valde dubium est.

16. *Caligo lactea* obs. D. *Haguenot* illustr. Medic. Profess. *Montpel.* B.

*Hypogala* est lactis collectio in camera oculi antica vel media; observata est in puerpera cujus lac repressum fuerat.

Huic affinis est illa caligo quæ succedit operationi cataractæ lateæ, vel purulentæ, qua materie residente visus restituitur.

In hypopyo, & empyesi est pus in alterutra vel utraque camera, sed ob gravissimos dolores, qui superveniunt, morbus ad ophthalmias referendus videtur.

17. *Caligo a rhytidosi* Mauchartii; a defectu humeris aquei Sennerti prax. L.

*Rhytidosi* est subsidentia & corrugatio corneæ. Humor aqueus factio eorum vulneris statim effluit, sed intra diem reparatur; sponte in fitola cootivose effluit, unde flaccescit cornea & undulosa evadit, binc minus pellucida. Quandoque oon generatur, ut in senectute, & tunc vitium est immedicabile; si fenestre exhauritur, ut in tritaphya, casu, aliisque acotis febribus, & tunc sanata febre, caligo evanescit.

Si a siccitate & calore pendeat, curatur somentis emollientibus, balneo oculi seu lavacro ophthalmico.

Sutor Agathensis subula sibi corneam tutidit, unde elapso humore aqueo visus obscuratus est, ia votum vovit in templo, cuius Parochus Bexti, ut ajunt, Parisii pulverem oculo obscurato adpersit, & reparato humore aqueo visus rediit, quam medelam miraculi instar celebravit D. *Menigron*.

18. *Caligo ab elasi* Mauchart. *Hypauxesisi* irriti. L.

*Elastis* seu chalasis Mauchartio est obturatio pupillæ a faogiosis appendicibus ad oras eius enatis. Hoc vitium equis familiare, observante *Louvere*, illis amblyopiam meridiam seu nyctalopiam causatur, forte & cataractam membranofam quandoque induxit. Curatur appendicem excisione op[er]e acus intra corneam adactæ.

19. *Caligo a synopsi* Mauchartii, VVoolhouffii &c. L.

*Synopsi* est pleoarica obturatio pupillæ a coalitis uvæ labris; hæc pupillæ imperforatio vel est nativa vel æqui fita, ut ab hypopyo, empyesi, cataracta purulenta, cephalæa, ophthalmia choroidæ.

Curatur operatione chirurgica a *Chesleio* instituta; foramen scilicet uvæ cuditur opæcus trans corneam immittit.

20. *Caligo a myesi*. Vide Amblyopiam & Suspensionem. L.

III. AMBLYOPIA, abnpsis & visus & amblyus hebes, obscurus; visus debilis Aetii; visus hebetudo Boerhaave de morbis oculorum; Amblyopia, vnde confusa, solbste de la vue.

Amblyopia est genus morbi cujus præcipuum symptoma est debilitas visus vel absoluta, vel respectiva, sine illa opacitate corneæ, vel interioris oculi.

Visus obscuritas & confusio dicitur relativa, cum non in omnibus consuetis distantis objecti, ejusque posituris & in luce vulgari, sed tantum in quibusdam videri potest objectum; sic myopes confuse vident objecta distantia, proxima vero distincta, ergo sunt amblyopes respectu distantiorum.

Visio clara est quæ ad objectum totum agnoscedum, & ab aliis distinguedum sufficit; obscura, quæ non sufficit.

Visio distincta est ea quæ ad objecti partes, & partium particulas agnoscedas & distinguedas sufficit; e contra est confusa, sic incipientes cataracta hæc chartam si quis ita videat ut ab alia, aut à tabula distinguat, & chartam esse agnoscat; is eam clare videt; sed si lineamenta nigra huic inscripta non distinguat, aut characteres qui sunt linearum partes & particulas cujusque characteris non agnoscat, nec litteram unam, non nisi ratione loci quem occupat, distinguere ab alia valeat; hic habet visionem claram sed confusam; qui vero & plures & minores tum linearum, tum litterarum partes & particulas cognoscit & distinguit, is visio distincto gaudet, eoque tanto magis distincto, quo minores sunt particule & major distantia ab oculis particularum quas distinguat, sub minori etiam lumine.

Limites visionis distinctæ sunt quatuor vel quinque. pollicum pro objectis vicinis, quatuordecim pedum scilicet pro objectis remotis ejus magnitudinis quam litteræ majusculæ utplurimum obtinent; quo majora sunt objecta & magis luce collustrata, eo major est distantia ad quam distincte videri possunt.

Objecta nigra supra fundum album posita, ejus magnitudinis & distantie ab oculis nostris, ut axes optici versus illa directi, includant angulum majorem triginta quatuor secundis minutis, cerui possunt, sub minori angulo evanescent.

Viginti quinque candelæ in tenebris accensæ, & uno pede distantes ab oculo fundant locum æque fortem ac lux diurna reflexa seu ad umbram. Pro diversitate vero lucis visus acies est magis vel minus extensa.

Claritates lucis sunt in ratione duplicata inversa distantiarum, docet experientia. Terminus vero visionis in mediocri luce sequitur rationem subtriplicatam distantiarum lucis v.g. candelæ. Ergo terminus visionis pro objectis solitariis erit in 12-

In ratione subtextuplicata claritatis objecti. Sic si terminus visionis sit triginta secundum ad lucem diurnam, ille erit pro quarta parte huius lucis 38. secundum, pro nona parte huius lucis 43. secundum & sic deinceps: *Math. Affer, Göttingen, 1774.*

Si vero objecta sint alata, striata, cancellata, similia, sibi invicem proxima, duplo major debet esse numerus secundum angustiam sub quo videtur objectum ut distinguatur, quam si objecta sint solitaria, uti punctum nigrum in charta alba, vel album in nigra.

Lux mediocriter ut diurna ad umbram est aptissima ad videndum; lux enim maxima, ut directis solis, non minus offuscatur visum quam lux debiliior, ut crepuscularis eum infirmat, vel obscurat.

Hinc patet cur, cæteris paribus, distinctius videamus objecta mediocriter vicina; ut litteras vulgares ad septem pollices; cum quo majora sunt objecta, eo ad maiorem distantiam posita illa distincte videamus; consule vero minima, immo non videamus; sic punctum nigrum unam quartam lineæ partem in diametro obtinens evanesceat ad distantiam pedum duodecim; aut punctum idem, sed cuius diameter sit æqualis duobus tertiis partibus lineæ, non evanesceat nisi ad distantiam viginti sex pedum.

Quantitas lucis quæ oculum subit, cæteris paribus, est ut amplitudo pupillæ; sed pupilla in magna luce coarctatur, ita ut quandoque diametrum duplo minorem obtineat, seu amplitudinem subquadruplam; ergo non mirum si in magna luce quæ pupilla coarctatur, minus clare videamus, quam intensitas lucis exigere videtur.

Amblyopia differt ab amaurosi ex eo quod in amaurosi omnino amittitur visus, & pupilla immobilis evadit; si tamen unus oculus sit sanus, pupilla cæci movetur cum pupilla sani, aut sano clauso, pupilla cæci omni motu destituitur. Præterea in amblyopia relativa oculus clare & distincte videt objecta sub certis circumstantiis, ut myops proxima, nulla vero in amaurosi.

Amblyopiæ causa est confusio imaginis in retina depictæ; confusio vero adest in imagine quoties fasciculi radiorum ex uno puncto objecti veniunt non adunantur in retine uno, eodemque puncto, sed in diversis; aut plures fasciculi ex diversis objecti punctis radiante simul in unum imaginis punctum, talis est confusio quæ locum habet in myopia & presbytia.

Confusio etiam oritur ex obscuritate, ut in amblyopia, nam cum nulla imago distincta sit nisi sit elata, omnis imago obscura necessario confusa est: obscura est quoties non sufficiens est claritas seu radiorum quantitas propter curvam oculorum, aut non sufficiens eorum vis in retinam propter retinæ sensibilitatem immutam.

1. Amblyopia crepuscularis; Græcis hemeralopia; Nonnæis Nyctalopia; Visus diurnus Boëthæ; ve; Collect. Acad. Tom. I. pag. 307. L.

Est in qua visio ad crepuscularem lucem vel matutinam vel vespertinam hebes est & confusa, in eodem loco, ubi ætopes distincte vident.

Ætopes (vel ætopes) voco ab ætes aquila, & optumæ video, eos qui aequilam instar distincte vident proxima, remota, meridie & in crepusculo, &c. uno verbo, visus perfectos vel omnium minime imperfectos.

Gallinæ amblyopia crepusculari laborant, unde non nisi magna luce, minuta quibus videntur grana conspiciunt, & sic ad crepusculum otiole dormiunt.

Hoc vitium est plane oppositum amblyopiæ meridianæ, quæ nocturnæ omnes laborant; quæ scilicet in media luce cæcitant; noctu vero distincte vident.

Hic morbus duobus ab hinc annis fuit in vicina Mospellii epidemicus, maxime in oppidis flumini cuidam vicinis, ut iuxta flumen quod Suave, Samedrias, Sanctum Hippolytum aligne, ubi, potissimum milites, octu sub dio excubias agentes in aere humido, & nebuloso, hemeralopes evadebant.

Cum autem multiplex experientia docuerit eo sanari, quibus per cathartica, emetica, diuretica, vesicatoria, & similia, superfluum serum e massa sanguinea evacuabatur, præmissa una aut altera phlebotomia; verosimillimum est hanc speciem processisse ex sero superfluo in massa sanguinea, quod organa visus specialiter relaxabat; non certe difficile est conceptu quod ab aere humido & nebuloso, autumali tempore, perspirabile serum in massa sanguinis retineatur, sique exundet; nec cur per evacuationem superius recensita foras eliminetur, adeoque morbos sic sanetur; verum cur illud serum quædam organa visus afficiat, potius quam organa auditus, tactus, aliæ quæcumque, hoc intellectu arduum est.

Interea ex principiis a me traditis in dissertatione de medicamentorum specificorum actione, cum quælibet corporis humani pars habeat eam sibi propriam, ut quælibet vervecis pars saporem suum delicatis palatis discernendum, ita dantur humores milleni a se invicem quoad crassam diversam, ob combinationes quas in diversis partibus patiuntur: cum iterum non omnibus indiscriminatum partibus adhaereant fortiter humores quilibet, sed ille tantum agat humor in illam partem cui fortius adhæret; seu quocum ratione gravitatis specificæ & figuræ molecularum majorem habet affinitatem, facile conceptu est, cur humor serosus determinatæ crassæ ex oculorum ambitu perspirandus, si retentus sit, fortius adhæreat retinæ quam aliis partibus.

Si io vase simul agitentur & misceantur frustula panis, carnis, liqui, salis, cum aqua, oleo, hydrargyri, non singula fluida agent quælibet in ea corpora, sed oleum panis adhærebit fortius, aqua sal dissolvere, aurum ab hydrargyrio emollietur, minime attractum a sale, &c.

&c. jam vero cum actiones ejusdem fluidi in diversas partes sint valde diversæ, quippe hydragryo vix lignum mutatur, nec aurum ab oleo; sic fieri potest ut retinæ filameuta, quæ a propriis humoribus non relaxantur, ab hoc alieno fluido serotino emolliantur; unde fiet ut minus sensibilis sit impressioni objectorum.

Quid autem in retinam potius quam in alias oculi partes agat hæc causa relaxans, suadere videtur obscuritas visus, quæ hanc relaxationem sequitur; quippe cum visus obscuritas sit ex prædictis in ratione composita, ex inversa sensibilitatis, & inversa intensitatis lucis conjunctionem, evidens est posita sensibilitate minori retinæ, fore ut obscuritas sit in magna luce exigua, & in mediocri, ut crepusculari luce, magna; ita ut æger meridie fastidiosis videat, accedente vespere consuetissima & obscurissima fiet visio; quippe debilitas lucis vespertinæ tunc temporis concursit cum minori retinæ sensibilitate ad obscuritatem visus augendam. In hoc affectu pupilla est magis dilatata quam in ætopis; quippe frömmimoda foret insensibilitas retinæ, dilatatio ejus foret maxima, cum vero tantum sit imminuta retinæ sensibilitas, abauda est pupillæ dilatatio sub meridie; vespere autem cum lux minuat, iterum magis dilatat pupilla; siquidem natura ex proportionem pupillam dilatat, quæ majori lucis quantitate indiget ut videat; cum autem indigeat in ratione insensibilitatis retinæ, & imminutionis lucis, dilatatio pupillæ utriusque rationem sequitur.

Alias species hujus vel potius varietates commemorant Auctores, in quibus alia phenomena, immo diversa possunt esse, ut pupillæ angustia, retinæ rigiditas, & similia; verum an accurate observata fuerint dubium est; & satius est eas omittere quam assignare.

Curatio ex dictis patet; omni ope enitendum est, ut tensio pristina retinæ restituatur, atque in hunc finem, ut serum in ea exsuperans per venas bibulas reducat, & derivetur ad collatoria renum, intestinorum, cutis, & ad ulcera vesicatorii pones aures inusta, concurrente victu exsiccante, diaphoretico; drastica; emetica, in certis casibus plus detrimenti possunt asserre quam emolumenti, cum nullum vitæ periculum ex hoc morbo imminet, ex emeticis vero, nisi robustis & inertia subiectis; pituitosa curentur, non raro metuendum sit.

Hujus morbi varietatem annumerat Boerhaave, quæ pendet a pupillæ stricture immobili, interea dum retina sensibilitate confusa gaudet; in statu sano pupillæ apertura respondet reciproce sensibilitati retinæ, adeoque repugnat pupillam non dilatari eadem proportionem quæ luminis intensitas decrevit; verumtamen fieri potest ut pupillæ apertura, propter singularem uvæ insensibilitatem, non eam legem sequatur, & tunc temporis vitium cui mederi opus est, seu principium proegumenum morbi est rigiditas uvæ, non vero hujus insensibilitas; quare vero hoc

asseram ratio est, quia, testante illustrissimo Hallero, si acn pungatur uvæ, ut vidi in operatione cataractæ, & ut ipse instituit in animalibus, ea minime movetur, unde facile inferre liceret hanc nullis aut rarissimis filis nervis ornatam esse. Huius autem speciei nullum remedium novit Boerhaave, maxime si, ut fieri solet, ea uvæ rigiditas senibus accidat.

Quod autem addit summus ille Professor de juvene Britanno, qui optime interdiu videbat quandiu sol erat supra horizontem, ast ad ejus occasum nebulas præ oculis videbat, post occasum nihil omnino videbat, ne quidem in cubiculo candelis copiosis illuminato, nec ad lumen lunæ utcumque splendide, ad quod pupilla erat immobilis: hujus phenomenon ratio non est nexus aliquis inter lumen solis, ut Boerhaave censet & oculi illius partes, nec vapor noctu ascendens, ut Briggsius judicat, sed est immanis differentia inter splendorem & activitatem luminis solaris, & vim luminis candelæ & lunæ: luminis solaris vis est ad vim luminis candelæ 16. pedes distantis, observante D. Bouguer, ut 1664. a. 1. & ad lumen lunæ in plenilunio, ut 374000. ad 1., demonstrante D. Euler Mem. de l'Acad. de Berlin ann. 1750. pag. 299. non mirum itaque si vis toties major sufficeret ad succutiendam retinam quam tanto minor non suffiebat.

1. Amblyopia meridiana; Nyctalopia Hippocratis Prædictione. L. 2. Vespertina actus Fel. Plateri; Visus nocturnus Boerhaave de morbis oculor. pag. 161. Gallice Nyctalopia, Vuë de hibou, de chat, &c.

Quæ de die nihil cernunt, sed vesperi & noctu satis acute vident, ait Hippocrates, illi Nyctalopes sunt: duas hujus varietates recenset Boerhaave: 1. a nucleo crystallini opaco, pupilla tamen remanente mobili; hæc vero species fictitia mihi videtur: verum quidem est quod si interdiu pupilla coarctetur, nucleusque crystallini sit opacus, visus erit obscurissimus; & si vespere pupilla dilatetur, & juxta observationem Boerhaave, ejus diameter tripla diurnæ evadat, adeoque apertura noncupla prioris, tunc sufficiens lux limbum crystallini penetrabit ad visum clarum efficiendum; verum repugnat pupillam ita coarctari, etiam in luce meridiana, cum datur cataracta; quippe quo minus luminis accipiant cataractosis, eo plus pupillam suam dilatant, docente quotidiana experientia, ergo hæc varietas fictitia videtur. 2. Varietas est quæ pendet a retinæ summa sensibilitate, qualis in ophthalmia interna datur, dum uvæ solram retinet mobilitatem, qualis est in pueris; quippe non secus ac in gravi ophthalmia natura claudit ita accurate palpebras, ut ipse æger, minus intervenit, vix ea se possit impetrare ut eas deducat, metu doloris quem lumen infert; non mirum si dum retina valde sensibilis est, ut in ophthalmia interna, nihil possit determinare naturam ad pupillam aperiendam, verum quidem est, quod accurate pupillæ clau-

fura impossibilis sit, etiam in ophthalmicis, & si vel parum illa preceat, minimus lucis radius in oculo sensibili sufficiet ad vium; unde si hæc spectetur, certe rarissima est, nisi accedat altera conditio quam multi equifones, innotent eos. *Rich. Lowrie*, in equis observantur; folliculi docent *Al. Leonardus Societatis*, equis huic esse obnoxios, & ad marginem uvæ nasci excrescentias fungosas, quas omnino obturant pupillam, dum solo lucente pupilla cæcatur, nequaquam vero impediunt ne noctu lux sufficiens admittatur; quippe pupilla apud equos, ut apud felis, ita est dilatabilis, ut noctu diametrum cornæ obtineat; hujus vero curatio manum Chirurgi dexterrimi exigit: si vero phlogosis sit in oculo, curatur ut ophthalmia.

3. *Amblyopia distorum*: *Myopia* vulgo; *visus* *Juganum Plateri*; *Gallice* *Vae recourre*, *Myopie*. 1.

*Myopes* sunt qui obiecta paululum distula confusa vident, sed proxima distincte; dicitur *myopia* quasi *visus moris*.

*Myopia* valde obnoxia sunt qui minuta trahant, ut Aurisabri, Horologarii, Cælestiores, Pictores in compendio, quibus cornæ est valde convexa, seu respectu globi oculi est pars multo minoris sphaeræ.

Causa vero hujus est adgnatio radiorum lucis, antequam ad retinam devenierint, seu radiorum cœtus pone crystallinum.

Ideo autem pone crystallinum cœtunt antequam ad retinam pervenerint; 1. vel quia vis refractiva aquei & crystallini major est; 2. vel quia cornæ & externa facies crystallini nimis convexa est; vel 3. quia retina a crystallino remotior; vel 4. quia obiectum est nimis distitum; vel 5. quia pupilla est nimis parva, & ut rectius loquar, *myopia* est in ratione composita ex his conditionibus, scilicet vis refractiva aquei & crystallini, distantia crystallini & cornæ a retina, distantia obiectorum, & demum aperturam pupillæ.

2. Cæteris paribus cœtus adunatur radii, quo vis refractiva corporum pellucidorum oculi major est; sed vis refractiva est in ratione differentie densitatis & oleositatis mediorum: ergo in eadem ratione crescit promptior radiorum adunatio, seu *myopia*; posita eadem mediorum oleositate, vis refractiva est ut densitas aquei, dum sit visus in aere; supponamus v.g. crystallinum & æquum adipisci densitatem vitri, quoniam ratio refractionis ex aere in vitrum, est ut 3. ad 2. dum ex aere in aquam, est ut 4. ad 3. demonstrant Dioptrici focum in primo casu distare duplo minus a superficie refringente quam in altero: ergo si densitas crystallini, aquei, aut etiam vitrei crescat, vis refractiva major erit, proindeque *myops* evadet homo intra aerem degens, qui intra aquam distincta distincte videret.

2. Radii paralleli inter se, & omnes qui ex obiectis remotissimis procedunt, si incident in corneam magis convexam, obliquius incident:

angulos itaque incidentiæ radiorum cum perpendiculari & centro corneæ a corneam dista major est; sed angulus refractionis est semper in ratione constanti ad angulum incidentiæ; ergo angulus refractionis erit maior: sed quo major est sinus anguli refractionis; eo citius cum axi optico adunatur radii: ergo quo magis convexa fuerit cornea, eo radii ab obiectis distitis prominentes citius pone crystallinum uniantur, unde *myopia*; quod de corneæ convexitate dico, de convexitate crystallini dictum sit, & *myopia* crescit in ratione convexitatis corneæ, tum crystallini; ita ut licet cornea non sit solito convexior, sufficit ut alterutra, vel utraque crystallini superficies sit magis solito convexa, ut *myopia* deor.

3. Quo retina est a crystallino & a corneâ remotior, eo longius a retina, & proximius crystallino sit radiorum adunatio, licet vis refractiva, & convexitas partium oculi sint eadem; in statu vero perfecto tam affabre sunt proportionata, & accurate ad leges sublimioris Geometriæ composita hæc organa, ut ne millefima lineæ pacto retina sit remotior a crystallino, in uno quam in altero homine; verum si quavis de causa mutetur illa proportio, aut distantia relativa crescat, tunc fiet *myopia*.

Hoc autem multiplici modo fieri potest; 1. quidem si ligamentum ciliare contrahatur, adeoque corneæ ligamentum coarctetur; inde enim oculus ovalis fiet, qui prius sphaericus, & cornea magis convexa; verum hoc fieri vix concipitur, cum ligamentum ciliare minime musculolum sit.

2. Si musculi obliqui simul agant, & veluti fascia globum oculi comprimant; inde enim oculi figuram ovalem evasuram exhibentur multi, quæ sphaerica est excepta prominencia corneæ.

3. Observare est etiam ab exostosi laterum orbis; aut alio tumore laterali pressionem illam fieri posse.

4. Quo obiecta sunt magis distantia, eo radii ab illis prominentes, & in oculum incidentes magis ad parallelum accedunt; sed radii paralleli cum axi optico citius uniantur, quam divergentes, quod experimento facillimo quisque probare potest; si enim candelam nunc admoveat ad lentem vitream, nunc ab ea removeat, is videbit focum radiorum pone lentem recedere qua proportionem candelâ accedit, & accedere qua recedit. Inde autem facile intelligitur cur *myops* confuse videant obiecta distita, distincte vero proxima; ita cur ex *amblyopia* sit relativa ad distantiam obiectorum. Cum crepus focus incidat ante retinam, tunc punctum A obiecti non depingeretur solum in ponto correspondenti A retinæ, sed simul per radios focos divaricatos in singulis punctis maculæ, & sic unum in pluribus locis videretur; & pariter punctum ejusdem maculæ recipiunt radios ab alio obiecti punctis procedentes; ergo & diversa obiecti puncta in eodem imaginis puncto representantur, unde confusio; aut obiecti

ad oculum accedentis focus incidit tandem in retinam, & tunc omnes radii ab uno objecti puncto promanantes in unum imaginis punctum incident, quodlibet objecti punctum diversum in diversis retinæ punctis pingitur, unde visus distinctus.

3. Denique multis experimentis compertum habeo, quod in lente convexa, prout apertura pupillæ, vel, ut loqui amant Astronomi, diaphragmatis vitrum regentis, major est, eo focus lentæ proximior est, & decrevit pupillæ apertura focus remotior est, ita ut decrevit illa apertura secundum progressionem duplicem, foci distantia crescat in singulis terminis una circiter vigesima fuis parte; itaque si pupilla fuerit subdupla prioris distantia foci, sit una vigesima parte minor; si subquadrupla, una decima; si suboctupla, una septima circiter: si subsexdecupla, una quinta parte, &c. Ergo cum pupillæ diameter, iuxta assertum Boerhaave, triplo quandoque major se ipsa evadat, potest focus una decima parte removeri, adeoque efficeretur ut visus sit distinctus, quæ proprietas mirabilisante *La Hire* omnium hominum ingenia incassum torserat: quare vero focus recedat coarctata pupilla, & dilatata accedat ad corneam, illud pendet ex eo quod radii in limbum crystallini incidentes, dum pupilla dilatatur, citius coeunt in axe optico, utpote magis obliqui, quam radii paralleli qui soli admittuntur, dum pupilla coarctata est, ut docent Dioptrici.

Indicatio curatoria, alia palliativa, alia radicalis, palliativa causam morbi respicit, radicalis principium. Quodcumque sit principium sæpius ignotum, causa est radorum, antequam retinam attingant, adductio. Remedium itaque est retardare illam adunationem, usquequo radii retinam attingant. Docet autem experientia, & dioptrica demonstrat, admoto oculis perspicillo plano concavo, vel utrinque concavo, radios ab objectis distinctis procedentes, proindeque sibi mutuo parallelos, incidere in oculum a se mutuo divergentes; atqui nunc temporis incidunt eodem modo ac si ab objecto proximo promanarent, in quo casu, docente experientia, focus recedit a lente; ergo si proportionatæ concavitatis perspicilla ad debitam ab oculo distantiam adhibeantur, objecti remoti radii in oculum illapsi veniunt in ipsa retina, seu objectum distinctum distincte videbitur.

Principium myopiæ progumenum est; 1. vel convexitas corneæ, vel convexitas alterutrius, vel utriusque superficiæ crystallini, quæ postrema vitia nulla signa distincta præbent; convexitas vero corneæ, præterquam quod sæpe confunditur cum oculi prominentia, non est signum certum, quandiu ignoratur situs respectivus retinæ; ignoratur vero omnimode: ergo ex illis principiis nulla certa indicatio desumi potest, nec proinde certum adhiberi remedium; ut enim possibile tantum est morbum ex his principiis dependere, possibile pariter est ut pendeat ab

aliis, quæ diversa, immo quandoque opposita, remedia exigunt; ergo in hisce tenebris, cum sit periculum nocendi æquale spei juvandi, facius est nullum remedium adhibere ad hoc principium indicatum.

Alterum principium progumenum myopiæ est contractio spasmatica, vel etiam contractura mulcutorum obliquorum oculi, immo iuxta quosdam ipsorum rectorum, quos alii aliquorum antagonistas supponunt; verum merito dubitatur an myopia constans a tali principio, & an ab altero ex hisce pendat: focus vero emollientes, anodynæ vix quidquam præstant; ergo unica spes est in remedio prophylactico: idem dictum esse de opinione *Hist. De Chales, Pemberton, Porterfieldii*, & aliorum. Si principia ab his assignata exigant emollientia, laxantia, aliunde metus est ne hisce medicamentis, si quid præstent, ipsa retina relaxetur, adeoque visus inde hebetior evadat; ergo satius est ab his abstinere.

Curatio individualis exigit, 1. ut gradus morbi accurate cognitus sit; 2. ut perspicillum debite concavitatis inveniatur huc congruum: solvenda itaque sunt hæc duo problemata, antequam myopi prodesse possimus, nec unquam præsuisset ipsi ars medica, nisi opem tulisset dioptrica.

*Determinare gradum myopiæ in dato homine.*

Quoniam distantia visionis distinctæ apud homines, qui minuta objecta, ut characteres respiciunt, est circiter octo pollicum; eo major est myopia, quo panceiores sunt pollices, ad quos myops legere consuevit; ita ut si legat ad unum pollicem, alter ad duos, prior myops habeat visum brevioris septem pollicibus, & sic deinceps.

Sed ut distantia visus distincti accuratius in myope determinetur, prætendat alterutri oculo chartam duobus foraminibus, ex acicula factis, pertusam, quæ foraminula nondistant invicem diametro suæ pupillæ, & trans illa foramina punctum nigrum parieti albo inscriptum respiciat, chartam, oculumque ipsi conjunctum admovendo, vel removendo usquequo unicum punctum nigrum videat, non geminum; hæc distantia in pollicibus lineisque fumatur; hæc est mensura visus distincti in dato myope, v. g. trium pollicum, si fides sit *La Hire*.

*Determinare diametrum concavitatis perspicilli plano-concavi, vel utrinque equaliter concavi pro myope dato.*

Resolutio. Quærat per experientiam dati myopis quanto intervallo debeat distare objectum, v. g. liber ab oculo, ut sine incommodo distincte liber legi possit ab ipso. Hæc ipsa distantia erit diameter perspicilli plano concavi, vel semidiameter utrinque concavi oculis myopis applicandi.

Quoniam enim objecta remota radiant per radios parallelos, si perspicillum fuerit plano-concavum, focus virtuosus radorum retrahetur distat ab eo intervallo diametri concavitatis.

ratæ. Si vero fuerit utrinque concavum, idem tunc semidiametri concavitatis intervallo distat a perspicillo. Enimvero in priori casu distantia objecti a myope distincte videndi, diametro eiusdem æqualis est; ergo objectum remotum in casu priore distincte videtur per perspicillum plano-concavum, in posteriore autem per utrinque concavum.

Objecta remota per radios ad sensum parallelas, vicina per divergentes in oculum radiant; Myopes vicina distincte, remota non nisi confuse vident; iidem non vident distincte nisi per radios divergentes, confuse per parallelos. Quare cum lentes tam plano-concavæ quam utrinque concavæ radios parallelos per refractionem efficiant divergentes, ut perinde sit ac si ab objecto vicino venirent, myopes per cava perspicilla objecta remota distincte videre possunt; medetur itaque perspicillum huiusmodi morbo; ergo myopibus conveniunt perspicilla concava, vulgo bica.

Magis myopi, si illis qui non distincte vident, nisi ad minorem distantiam, conveniunt perspicilla minoris diametri, & minus myopi perspicilla maioris diametri; perspicilla enim minoris diametri radios parallelos, adeoque ab objecto remoto advenientes efficiunt magis divergentes, quam quæ sunt maioris diametri. Quamobrem cum magis myops ad minorem distantiam objecta distincte videat, adeoque per radios magis divergentes cernat, perspicilla diametri minoris conveniunt magis myopi; per vitra concava objecta minora videntur, quam oculo nudo, cum radii in oculum incidentes minorem angulum efficiant, quam qui ex vitro refringuntur ad latera: ergo myops ope perspicilli concavi objectum minus videbit, & quo magis perspicillum removebitur ab oculo, vel oculus a perspicillo, eo minora videbit objecta. *Vulgo. Dioptric. 23.*

Ut autem inveniat semidiameter perspicilli dati, seu uteligatur perspicillum concavo-concavum dato myopi conveniens, illud luci solari in loco aliunde obscuro obvertatur, & per reflexionem foci distantia invenietur. Specillum utrinque æqualiter concavum maioris sphaeræ, v. g. semidiametri quinque pollicum, æquivaleret specillo plano-concavo sphaeræ duplo minoris, nempe diametri quinque pollicum.

Symptomata myopiz, licet morbus simplicissimus videatur, sunt multa, ita ut ex gestu, vultu, scriptura, myops fere cognoscatur; sic myopes non solum quod legunt veluti naso admovent, sed etiam limis oculis spectant, & unico oculo, si proximior sit charta; sic characteribus minutis gaudent tum scribendo, tum legendo, ne caput ad prosequendas lineas continuo moveant; sic exigua luce indigent, pupilla enim apud eos est parva: visio illorum est tenebrosa, vis confusa in perspicendis objectis ultra pedem distans, quæ cum sint multo numerosiora quam vicina, ideo advescit pupilla huius dilatationi a qua non potest desuere. Si myopes per fora-

minulum chartæ respiciant; illi distinctius vident objecta remota; idem fere commodum præstat palpebrarum conniventia, unde ut objecta distita cernant, palpebris connivent, non sine notabili faciei distortionem. Præterea myopes secum alloquentes non respiciunt, & frustra respicerent, cum non possint ex alloquentis oculis, facie, nutu, ejus dicta melius capere, ut ætæoptæ solent; at quod ex hoc deest intellectui, vindicatur majori attentione, oculis demissis; quia circumstantia non vident, in obvia non visa incurrentes se lædunt; sæpius etiam objecta multiplicata vident, ut videbimus dum de suffusione; nodum dum candelas remotas respiciunt, magnam flammam circularem, non conicam, videre sibi videntur, & alia quam multa a myope erudito *De Chales* recensita.

Verum inter illa symptomata unum est optimum signum ad iudicandum de myopia; cum etenim per geminum chartæ foramen candelæ flammam geminam respicit homo, si digitus dextro oculo admoveatur, & dextra imago flammæ evanescat, homo myops est; si vero sinistra, presbyta est.

4. *Amblyopia proximarum; Presbytia* aut *Presbyopia* vulgo, a Græco *Presbys* senex, seu *visus senilis* Latinorum; Gallice, *Vue-longue* & *Lo*.

Est illa species visus quæ proxima confuse, remota vero distinctius vident.

Sic mulieres presbytæ ut filum per acum trahant, acum & filum ab oculis longe removeant; senes etiam libros removeant ab oculis ultra octo pollices ut distinctius legant.

Hujus theoria ex præcedenti facilis est; causa est ferior radiorum ab objectis proximis advenientium adunatio quæ fit ultra retinam.

Principia sunt; 1. cornæ & utrinque crystallini faciei, vel alterutrius minor convexitas, ita ut illarum curvatura sit portio majoris sphaeræ; 2. nimia distantia cornæ, vel crystallini, vel utrinque a retina; 3. vis refractiva corporum pellucidorum oculi solito minor; 4. objectorum nimia proximitas; 5. pupillæ angustia quam Græci *phibisim* vocant.

Singularum enim & a tortiori omnium conjunctum horum principiorum concursus fit, ut radii ex objectis emanantes proximis tardius adveniant, & focum ultra retinam exerant, unde visus distinctus esse non potest; quippe pyramis luminosa refectatur a retina, radii nondum in apicem coni coarctatis; ergo quodlibet objecti punctum depingit maculam in retina non secus apud myopes, eo solo discrimine quod macula fit a radiis nondum coactis, & apud myopes jam coactis & iterum expansis.

Magis presbytæ ad trium pedum distantiam minuta objecta distincte vident, dum proximiora confuse minus presbytæ ad pedis distantiam libros legendo removeant, aut saltem ultra octo pollices. Si ultra distantiam sui visus distincti fiat posita objecta, ex presbytæ non distinguunt, quia non sufficit ad objecta distincte videnda, ut radii ex illis emissi exacte uniantur in reti-

na, quod apud presbytas accidit objectis etiam valde remotis, sed requiritur ut quantitas radiorum ex objecto promanantium sit tanto maior, quo retinæ sensibilitas minor est; verum apud senes retinæ sensibilitas paulo minor est quam apud juvenes, & si objecta sint ulterius distita, minorem radiorum numerum dimittunt in oculo, ergo non sufficientem ad visionem claram. Radii qui ex objectis in datam superficiem irradiant, eo pauciores sunt, quo distantia objecti quadratum majus est. Sic a duobus tribusve pedibus, quater, novies pauciores emittuntur quam ab uno pede. Sic a quatuor pedibus idem objectum mittit fere dimidio minorem radiorum numerum, quam a tribus pedibus distantia.

Si presbyopia principium fuerit pupillæ angustia, quod frequens est, eo minorem radiorum copiam ab objectis accipiunt, quo quadratum diametri pupillæ minus est; ita ut si diameter pupillæ sit duplo minor & simul distantia objecti duplo major, numerus radiorum ingredientium pupillam sit sexdecies minor. Coguntur ideo objecta ad certam distantiam, non ultra, removere, ne visio obscurior evadat; non citra, ne radii magis ultra retinam cocant, adeoque confusus videant. Presbytae siquidem vident tantum per radios parallelos aut convergentes in cornem immisos, minime per divergentes; verum quo objectum proximius est oculo, eo magis sunt divergentes radii simul ac copiosi, ex eo quod radii ab objectis proximis copiosius intrent oculos, quam a remotis; non ideo, saltem in eadem proportione, crescit claritas imaginis, quippe qua proportione objectum proximius est, ea imago per retinæ fornem diffusam amplius evadit; ergo eo sunt plures partes illuminandæ; verum non exinde singula puncta magis illuminantur; interea ex eo quod objectum sit proximius, magis ultra retinam remouetur focus, ergo magis confusa evadit visio.

Presbytae itaque ut distincte videant objecta indigent magna luce, e contra myopes exigua luce indigent ut legant; presbytae siquidem habent retinam magis rigidam ab ætate, pupillam angustiorē, objecta remotiora, quæ omnia visionis claritatem minuant; ergo illi defectus, majoris objecti splendore, aut illuminatione, debent compensari.

Si presbyta aliquod objectum valde lucidum, v. g. flammam candelæ, trans foramen chartæ inspiciant, illud ipsis videbitur adæquatum, veluti capillitis radians & subrotundum: etenim illud objectum representatur in retina per maculam ampliorē quam foret imago, si focus caderet præcisè in retinam; ergo debet objectum ampliatum videri; præterea ut objecta splendētia, v. g. alba, in fundo obscuro ampliora videntur quam nigra in fundo albo ut docet experientia; cum objectum supponatur splendens, & oculus sit camera obscura, ea iterum ratione ampliatum videbitur.

Item vero ex radiis objectum illud delinean-

tibus, illi qui ad limbum crystallini incidunt, paulo minus remotum habent focum, quam qui axi optico sunt paralleli; ergo paulo vividius objectum in medio maculæ delineant, cæteri proinde confusus videntur, adeoque veluti coram dilutiore retrahunt, qua objectum circumdatur.

*Curatio.* Presbytis conveniunt perspicilla concava; presbytae enim remota distincte, vicina confuse vident; quamobrem cum lentes convexæ radios a puncto vicino advenientes ita refringant, ac si e puncto longinquo emanarent, presbytis specilla convexa conveniunt. Pariter ratione magis presbytas juvant perspicilla magis convexa, seu quorum convexitas est portio minoris sphaeræ.

*Presbyta individuum invenit perspicillum conveniens, seu diametrum convexitatis perspicilli ipsi convenientis.* Inquiratur distantia ad quam presbyta individuum objectum, v. g. characteres libri, abique defatigatione legere aut distincte videre consuevit; sit ea, v. g. viginti quatuor pollicum, distinctia vero vulgaris ad quam ætopia distincte vident, sed presbytae confuse, sit octo pollicum; differentia harum distantiarum est sexdecim pollicum; instituaturs proportio ut 16. ad 8. ita eadem distantia octo ad quartum terminum, qui erit quatuor pollicum, & ille quatuor terminus additus distinctie visionis distincte ætopiarum, seu 8. facit 12. quod significat perspicillum presbytae conveniens illud esse eligendum utrinque æqualiter convexum; cujus semidiameter sit duodecim, vel plano-concavum, cujus diameter sit 12. pollicum.

Excoim si presbyta distincte videre possit objectum octo pollices distans, ita inspicendus est radius vi refractionis in perspicillo, ac si e viginti quatuor pollicum distantia procederet, qui terminus est suæ visionis distinctæ; ergo (ex *Dioptr. Wolff. 493.*) convenit huic presbytae perspicillum utrinque convexum, cujus semidiameter sit duodecim pollicum, quo ut par est intellendantur radii; si quis fuerit magis presbyta, seu non videat distincte, nisi ad majorem distantiam, v. g. tres pedes, illi conveniunt perspicilla minoris diametri, v. g. decem pollicum & trium linearum, si plano-convexum, aut semidiametri si biconvexum.

Si vero, ut quandoque accidit, presbyopia a vitio consuetudo oculi, coque recenti ortum ducat, tunc auxilia etiam ad curationem radicalem ex præcedenti theoria possunt indicari.

3. *Amblyopia laesorum.* v. *Lusitana*, vel *Lusitanæ Boerhaave, Gallice Veu louche.*

Lusci dicuntur qui objecta e directo oculis obversa confuse, oblique vero oculis oblata distincte vident.

In praxi confunditur vulgo *Lusitanæ cum Strabismo*; alii Strabones uno oculo vident distincte objectum e directo oculis oblatum, lusci vero ad alterutrum latus inclinant faciem & oculum ipsum, quo respiciunt, ut objectum distincte vident.



Quis videant; *visus* dicitur *rectus*, cum linea ab objecto in faciem respicientem protensa, est perpendicularis. plano ambas pupillae conjuncti, secus *visus* est *obliquus* objectum visuri semper faciem illa versus illud convertimus, ut *visus* sit *rectus*, simulque oculos ambos ita dirigimus, ut incident axes optici in medium objecti. Luscus vero dum objectum respicit quod est v. g. ad dextram, oculum & faciem convertit ad sinistram. Strabo oculum quidem unum & faciem convertit ad objectum quod intuetur, sed non alterum oculum, qui huc vel illuc vagatur.

Visus rectus est clarior lusco, quia in visu recto major ingreditur pupillam radorum numerus quam in visu obliquo, ut patet ex Geometria. Nec non est distinctior visus rectus, quia facilius per radios uterque perpendiculares judicabitur de objecti distantia & magnitudine, quam per obliquos ut *P. de Chales* geometricè demonstrat *Optic. prop. 2.* adde quod in statu sano polus opticus, seu locus retinæ directe pupillæ oppositus, gaudet pluribus filis nervis, & sensu exquisitiori quam ejus latera; & demum radii oblique in pupillam illapso focum habent magis diffusum in lateribus retinæ, quam qui in polum opticum recte perveniunt.

Inde fit ut librum legendo, oculis quæque vocabula percurramus; distinctius enim videmus quæ sunt e directo oculis oblata, confusus vero quæ oblique posita.

Lusitas ergo accidit vel 1. quia oblique posita est pupilla, ita ut radios obliquos plures accipiat quam directos; 2. vel quia alterata est convexitas corneæ, aut ejus pelluciditas; ita ut radii plures e latere alterutro admittantur, quam si directe accederent; 3. vel quia oblique locatus est crystallinus, ejusque axis non idem est cum axi oculi; 4. vel demum quia polus sensibilitate nativè destitutus est, unde cogimur aliorum dirigere visum, ut acutius cernamus.

Hinc principis luscitatis originem præbet quandoque aneblyoblepharum, seu palpebrarum partialis adhæsiō, synecchia ac transversa pupillæ positio, quibus sola Chirurgia moderari potest; strabismus variæ species sæpe cum luscitate combinantur; si a leucomata, pupillæ parcem regente, a panno vel prerygio, corneam hinc vel inde opacante, fiat, auxilia his affectibus propria sunt adhibenda.

Si luscitas a strabismo pendeat, utendum est vel 1. perspicillis quorum vitria inæqualem habeant latitudinem; vitrium angustius oculo straboni est offerendum. 2. Si strabismus pendeat ex eo quod alteruter oculus sit debilis, vitrum fortius refringens oculo debili respondeat. 3. Si a muscularum vitio conspicilla vulgarè dicta *Besicles*, *manſque à louchette*, sunt usurpanda.

6. *Amblyopia absoluta* & *Amblyopos* Hippocratis; *Amblytes* Aretæi; *Visus obtusus* Boerhaave pagin. 271. *visus confusus* ejusdem *pa-*  
*Sauvages Nosologia Methodica. Tom I.*

gin. 279. Gallice *Vûe basse, foiblesse de vûe, mau-*  
*vaïse vûe.*

Myopes, Presbytzæ, cæterique Amblyopes supra memorati, in quadam objecti distantia vel positura distincte vident, & eorum visus non est nisi relative ad alias distantias, horas, posituras confusus; ista vero species absolutam, in quovis loco, tempore, situ, visus hebetudinem importat. \*Myopes, presbytzæ, &c. cum acute cernant perspicillis tuto carere possunt, sed amblyopes absoluti non possunt.

Pendere videtur a retinæ minori sensibilitate, qualis sæpe omnibus hominibus post quinquagesimum annum accidit ac senescendo incrementum, maxime illis quiminuta opera tractant, noctu scribunt, oculis suis abutuntur. Illis horopter seu terminus visionis distinctæ in dies decurritur, duobus, tribusve pollicibus intra quolibet decennium, illis objecta attente considerata consula apparent, characteres librorum duplicari, moveri, decussari videntur; oculi defatigati identidem fricantur, clauduntur; objecta ab oculis removenunt ut in presbytia, maxime si operationem cataractæ passim fuerint ægri. Pupilla, seu ut rectius loquar, uvea vix mobilis est, facto a tenebris ad lucem transitu subitaneo; quod signum est immunitatis retinæ sensus.

In hoc morbo, quem plebs repetitis phlebotomiis, mulieres, frequentius puerperio, pauci vero ætati ingravescenti tribuunt, vana a variis proponuntur remedia, sibi invicem contraria; alii enim oculari Medici spirituosâ resolutentia laudant, alii meram aquam frigidulam extollunt, & ab spirituosâ retinam ulterius excitari contendunt. Uius vero perspicillorum, nemine contradicente, necessarius est. Perspicilla vero utrinque convexa seu biconvexa conveniunt, cum enim horum ope collecti radii fortius retinam afficiant, indeclaritas visui restituitur, & cum ea distinctio, quæ sola comoda a perspicillis sunt expectanda.

Potissimæ regulæ in eligendis perspicillis sunt. 1. Ut vitra sint ad uniformem curvaturam elaborata, pura, perpolita. 2. Ut focum amblyopi convenientem habeant. Quæ focum habent breviorē *seniora*, quæ longiorē *juniora* dicuntur, quæ longissimum ut 4. 5. 6. pedum, *conserva*; quæ vero brevissimum, ut 4. 3. pollicum, *catagasta*, Gallice *loupes* & *biloupes* nominantur.

Focus seu distantia ad quam radii post duplicem refractionem ununtur in biconvexis est semidiameter convexitatis. Detegitur autem si vitrum foraminis pollicari camera obscuræ applicetur, & charta excipiat imago objectorum; ubi imago fuerit distinctissima, ibi focus est. Inde ad vitrum distantia pedibus, pollicibus, lineis expressa, vulgo dicitur *focus*, re-  
*ctius distantia foci.*

Horopter, seu terminus visionis distinctæ, est minima distantia ab oculo ad objectum ubi distincte videtur: ea distantia eo major est,



quo objectum majus & lumen intensius. Vulgo horopter sumitur pro distantia assueta inter oculum & characteres quos scribere solemus, & ea apud ætopas est circiter octo pollicum; sed horopter pro majoribus objectis, ut hominum facie distinguenda, est aliquot pedum.

Quia assuescunt perspicillis senioribus, seu brevioris foci, illi quolibet decennio coguntur sensim seniora adhibere, quod valde incommodum est, quippe visus tanto magis decuratur; scilicet qui conservis utuntur v. g. sex pedum, illi optime legunt in distantis inter octo pollices, & sex pedes mediis; qui vero utuntur perspicillis sex pollicum, illi ultra sex pollices positos characteres distinguere nequeunt, nisi multo majores.

Hinc emanat summi momenti regula, ut scilicet perspicilla juniora primum adhibeamus, seu conservas, & non nisi coacti ac sensim ad seniora transeamus. Perspicillis nondum assueti debent plura experiri, & illis uti; 1. quæ objecta clara & distincta exhibent, non vero quæ ea sensibilibus adaugent, si biconvexa, vel minuant, si biconcava, myopibus necessaria; 2. quæ visum minime desatiant.

Præter perspicilla, vel *vasalia*, quæ commodiora, vel *manuaria* (*monocles*) dicta amblyopes utiliter adhibent *tubus Hollandicus*, vulgo *Lunettes à Opera*, ex objectivo biconvexo, & oculari biconcavo minoris diametri confecti; sed tubus ut brevior pro myope, longior pro presbyta; omnes æqualiter oculi ab hisce tubis juvantur, cum objecta clariora, distinctiora exhibeant.

7. *Amblyopia hydrophthalmica* & *Hydrophthalmia*; *Mydriasis* quibusdam; *Hydrophis de l'œil* L.

Est ea quæ cùm oculi solito majori protuberantia conjungitur. Initio visus est myops, seu objecta proxima satis bene videntur, confuse vero remota; in progressu vero morbi omnia obscure cernuntur.

Volumen oculi majus, turgida tensio, corneæ promiuentia, iris profundius latet, pupilla est immobilis, aliquando amplior, aliquando vero angustior; visus initio bonus aut myops, deinde obscurior, ut in amblyopia absoluta; sæpe cornea obnubilatur, aqueus humor turbatur; accedit quibusdam dolor perpetuus, tensus circa frontem cum hemierania ejusdem lateris, stupore dimidiæ partis faciei, ejusque emphysemate; concurrunt etiam odontalgia, agrypnia, exophthalmia, epiphora, eclatium.

Si moles vitrei tantum increverit, vitreum in limbo crystallini exuberat, & strabismus errantem facit; visus imminuitur, bulbus induratur, obtuse dolet, accidit sæpe synchysis, seu confusio omnium contentorum in oculo; sed pupilla minus est profunda, quam si aqueus humor exsuperet.

Principium est major affluxus humoris aquei, vel vitrei, quam est reparatio; & corneæ, ac scleroticæ contrahitas.

Indicationes curativæ sunt, 1. ut fluidi congestio a vegetatæ vesicatoriis, seraceis, catharti-

cis, diureticis; humor mature foras educatur paracentesi oculi, acu in corneam, vel albugineam immissa. 2. Bulbi contrahilitas augenda tonicis, sacculis aromaticis.

Accedit hic morbus melancholicis, a suppressa quadam evacuatione, gravidis etiam, & aliquot menses durat, dein sæpe sponte sanatur.

Distinguitur ab exophthalmia, de qua vide *ophthalmiam*.

IV. AMAUROSIS; *Gutta serena*: Arabum; *Cataracta nigra*: Germanorum; *Offuscatio*: Cornarii in Aetium; *Cecitas*: Moroni Director. *Amblyopia* Rumphii, Compend. Medic.; *Goutte serine*.

Est morbus cujus præcipuum symptoma est visus suppressio, & pupillæ immobilitas sine sensibili oculorum opacitate.

Dicitur ab *Amauros*, obscurus; *Gutta*, quia a destillatione lymphæ oriri putantur; *serena*, quia non obnubilat oculum, ut cataracta, & sæpe caligo.

Ab amblyopia absoluta differt per integram visus suppressionem; si visus nullatenus revocari possit, *absolutus* merito dicitur; secus, *suppressus*.

In amblyopia absoluta in caligine æger saltem lucem a tenebris discernit, non in amaurosi inveterata.

Amaurosis principium est in cerebro ad thalamus nervorum opticozum, in horum nervorum tractu, vel in tota retina; deest itaque sensibilitas in oculo; in cataracta præpeditur lucis ingressus in oculum.

Amaurosis est accidens syncopes, & comatum, ex eo quod anima, periculo cordis, aut cerebri traxerit commota, non percipit lucis impressiones: in aliis casibus principium amaurosis est nervorum opticozum immobilitas, sive in tota retina, sive in tractu nervus sit obstructus, compressus, resectus, &c.

Si oculus sanus claudatur, & cæcus luci obijciatur, pupilla istius nedum contrahitur, quandoque dilatur, & hæc est sola mobilitas, quæ superest, atque amaurosim perfectam indicat.

Quo minor est mobilitas pupillæ in amaurosi, eo major est visus imminutio, ita ut si ad lucem superstit quæta tertiave pars motus pupillæ, quarta vel tertia pars visus superstit.

1. *Amaurosis traumatica*, vide Ant. Maitrejan; L. *A vulnere oculi* Hildani, obs. 17. 18. centur. 3. *A commotione capitis* Hildani, centur. 5. obs. 8. Schenckii, obs. pag. 169. *Ex bombardæ explosione* Schenckii pag. 168. *Ex vulnere capitis* Marcell. Donat. Hist. Mirab. lib. 2. pagin. 76.

Vel subito accidit amaurosis post vulnus, idumve, & tunc ab inflammatione, compressione a sanguine facta oritur, aut distracto introrsum blobo, vel nervi sectione. Vide *Hist. de vulneribus oculi*. Hildani centur. 1.

Si vero deinceps sensum accedat amaurosis,

per-

pertinet ad paralyticam, quæ diversam, medellam expululat.

A sternutatione ortam vidit *Hildanus cent. 1. 2. Amaurosis pituitosa: Amaurosis a catarrho S. Yves; Ab aqua in cerebri cortice, sinibus Boneti Sepulchret. de oculorum affectibus observ. 9. 12. 15. 7. L.*

Ea apoplexiam, paralytism, hemiplegiam pituitosam comitatur sequiturve.

Indicat cathartica, emetica vesicatoria, setacea, cauteria nuchæ inurenda; excipiat oculis vapor spiritus vini, electrificatio vehemens ad lachrymas fundendas.

3. *Amaurosis serophulosa* Philosoph. tranfact. tom. 9. pag. 257. *Ex stentatione in cerebro Bonet. obs. 10. Ob vesicam nervi optici incumbentem.* Id. obs. 2. *A tumore globoso nervi optici insidente.* Id. obs. 1. *A calculo iuxta nervum opticum.* Id. obs. 2. L.

Ipse vidi bis in puerulis serophulosis amaurosism etiam subito ingruentem; secundo cadavere inveni glandulam strumofam nervi optici incumbentem.

4. *Amaurosis plethorica* Nenter Tabul. L. *Gutta serena a menstiosa S. Yves p. 343. Amaurosis gravidarum S. Yves ibid. A suppressio hamorrhoidum fluxu ibid. menstruo, &c. A febribus acutis ibid. pag. 338.*

Ea est stipata signis plethoræ; quandoque incipit a gravi dolore capitis, eoque profuodæ, vel gravitas dolorifica in oculi fundo residet.

Sanatur quandoque hæc species. Judæus Medicus Burdigalæ plures sanabat secta vena frontis, & effluxum sanguinis permittendo usquequo sponte flitteretur; profuit non raro venam jugularem aperire post febres acutas sanatas.

Phlebotomia e pede, & medicamina menses moventia a *S. Yves* laudantur; deinde iuscula viperina, millepedes, aquæ ophthalmicæ adhibeantur. Huc referenda est species amauroseos, quæ apoplexiam sanguineam, febresque acutas subsequitur.

5. *Amaurosis congenita* S. Yves ch. 27. pag. 345.

Nascuntur etiam infantes cæci, quod procedente ætate tantum cognoscitur; singulari est in hac specie pupillam, licet immobilem, non esse magis patulam quam in hac ætate est apud ætrotas; est itaque velut torpor organorum.

Sanari sunt etiam bimii usu aquæ ophthalmicæ, quæ partibus spirituosissimum tonum oculis restituit.

6. *Amaurosis a synchysis. Ab nova phlogosi* Mastrajan. *Ab oculi interna suppuratione ejusdem.* L. Synchysis est confusio, seu dissoluti vitrei mixtio cum aqueo.

Ea est quæ incipit a doloribus internis oculi vividis, perinacissimis, cum cephalalgia, vel hemerania, perriligio, febre, quandoque etiam exophthalmia, visus obtenebratur, vitreum dissolvitur: ille dolor quandoque plures menses perseverat, immo annos integros, nec visus restituitur, immo omnino aboletur. Ea amaurosis insanabilis est.

Verum sæpe accidit ut sic ubius oculi visu

amisso, post alterum annum alter oculus doleat, rubeat, lachrymetur dolente capite, & sic idem infortunium alteri imminet oculo; quod vitari posse præsumit *S. Yves*, extirpato oculo tæco.

Hæc oculi extirpatio, seu excisio corneæ cum effluxu vitrei & crystallini, periculo miime caret, & vidi bis inde ortam hemeraniam insanabilem, semel vero maniam.

7. *Amaurosis a myosi* S. Yves, pag. 346. L. In omnibus aliis speciebus amauroseos pupilla est patens, immo dilatata & immobilis, excepto quod clauso oculo sano, pupilla cæci luci exposita dilatetur; aut in ista amaurosi, quæ myosin habet comitem, pupilla est arctior solito, & simul immobilis, nec ad lucem arctatur, ut sanis, nec dilatatur altero clauso, ut in aliis cæcis, sed eadem ad solem & ad umbram permanet.

Myosis enim est pupillæ contractio permansens; vocatur etiam *myosis*, necnon *phthisis pupilla*. De myosi & mydriasi vide *susceptionem inter-veniens*.

8. *Amaurosis a spasmu*. L.

Ea est quam excitat spasmodica aut dolorifica contractio annuli moderatoris Valsalvæ.

Notum est ex Anatomicis quatuor musculos rectos, & obliquum majorem enasci ex apice orbitæ circa nervum opticum, quem amplectuntur; illi vero spasmu contracti ita arctant nervum opticum, ut fluido nervico imbecilis evadat, & hæc est species amauroseos, quæ subito accidit: 2. a dolore incipit; 3. quæ spasmodicos, hystericos affectus committit; 4. quæ a læso nervo alterutro orbitali, & inde convulso annulo moderatore oritur, ut observavit *Valsalva, dissert. 2. n. 11.*

Gravis cephalalgia induxit hanc speciem, *Selenekii de cæcitatis obs. 5.* Calculosa sympathica nephralgia hanc excitavit, *Adolph. in Ephemerid. Nat. Curios. Dolorifici morbi etiam diverſi concurrunt, Morgagni, Epistol. anatôm. 18. n. 4. 5.*

A morbis convulsivis *Vicq. Rous. Neurograph. lib. 3. cap. 2.*

Ab epilepsia *Collett. Acad. tom. 3. pag. 261. Hildan. cent. 5. obs. 50.*

Amaurosism quam unguis suis in nervum ophthalmicum impactis excitaverat gallus gallicus sanavit *Valsalva* pressione nervi ipsius, unde resoluitur est, seu laxatos annulus moderator, qui sua contractione nervum opticum stringens cæcitatem inducebat.

9. *Amaurosis foricaria* Ramazzini de morbis artificum, csp. 13. L.

Quilatraxis expurgandis incumbit, cum per horas quatuor in clavis remanere, nisi domum suam repetat, ac oculis a luce omnino averſis, & clausis per viginti quatuor horas domi se recondant, & aqua tepida oculos abluant, cæci illico evadunt; & cum hac cautela nihil est frequentius apud Paravinos quam foricarii se excutere; oculi quidem ipsi in clavis dolent, rubent, & paululum obnubilantur; sed nec odor

ille teter nares ferit, nec nauscam movet, nec ullam aliam partem lædit præter oculos.

— Ut hoc infortunium vitetur, perspicilla convata oculis arte applicata prætendi debent, quæ adhibentur ad lusciam et strabismum, sed vitris accurate clausa.

20. *Amaurosis venter* Zacuti praxis Cent. V. obs. 49. Ballonii Paradigmatæ 7. vel Bonet. Sepulchr. obs. 4. item Boerhaave de morb. oculor. L.

Illæ species vel inducit hydatides in retina, quibus visus tollitur, & eam litu mercurialis sanant fuisse censet Boerhaave: vel exostoses nervum opticum prementes excitat, quæ insanabilis; vel sciatoma in cerebro procreat, ut Ballonii observatio fidem facit. Vidit Zacutus hanc speciem paucis post concubitum impurum horis supervenire cum ulcusculis & varis faciei. Angulus ope salivationis mercurialis ab amaurosi sanatus per aliquod tempus omnia objecta geminata vidit Smith. optie. Dolore & per vigilio stipatur hæc species.

21. *Amaurosis exanthematica* A scabie suppressa Baglivii p. 215. Ephem. Nat. C.; Ab Achoribus repressis Hoffmanni tom. 3. p. 229. A plica retellæ, vel retenta Stabel. hist. 6. 5. L.

Est ea species quæ a morbi exanthematicis, vel repulis, vel retentis exoritur.

In hoc casu reponi potest amaurosis, quæ pender ab humorum falsedine; & acrimonia, in qua proinde balnea, aquæ acidulæ, julecula diuretica & diluentia laudantur, ut serum lactis, millepedes; &c.

Ab herpete faciei suppresso ortam amaurosim dicunt s. Yves, restituito herpete per julecula aperientia & sudorifica, pituitas, &c.

22. *Amaurosis a nargosis* Ravi synopsis. plantar. de stramonio. D.

Succus, foliaque stramonii oculis applicata mydriasmum & amaurosim creant.

In Moluccis insulis amaurosis est familiaris advenis, quod tribuitur esui hordei calidi, quod in hisce regionibus vaporem narcoticum gerere creditur: Vido Bentin pro de Medicis a Indorum, qui in hac specie pro eximio medicamine topico laudat secur aquam, lamizæ distillatam.

Notum est aq. ut acetum intus sumpsum, esse eximia horum venenorum antidota.

23. *Amaurosis intermittens* Storch. Annus medicis pag. 75. L. P.

A quotidiana febre quotidie revertebatur amaurosis, & recedebat post aliquot horas. Curatur ope kinkinæ.

A febre intermittenti ardenti ortam vidit Felix Platerus.

Quæ vero pender a syncho, ad plethoricam pertinet, cum phlebotomia curetur, raro tamen sanatur, teste Saint Yves.

24. *Amaurosis rachialgia* Spangerbergii de colica saturnina; Cl. Bonet Journ. de Med. Nov. 1761. pag. 207. Avril. p. 346. ex colica, D. Fabre.

Est ea species quæ rachialgiæ vegetali & fa-

turninæ supervenit, quæque pender ab eodem principio ac paralyti ejusdem originis. In hac topica inutilia sunt; emetica vero profunt, etiam teste Saint Yves, post præmissas phlebotomias, in pluribus speciebus, ut in ferofa, seu hydrocephalica, in intermittenti; hæc species sere semper somnolentia vel stupore stipatur: prodest hæmorrhagia superveniens.

25. *Amaurosis hysterica* S. Yves p. 347. ch. 28.

Fugax est accidens in hysteria, quod vaporibus in caput ascendentibus tribuitur vulgus, quia præ oculis nubem vel fumum videre sibi videntur hysterice, atque non semel vidi quod accedente illo phænomeno, subito convulsiones aliarum partium cessant; hæc species paucas horas, raro dies perseverat.

26. *Amaurosis exanthematica*, Lommii Obs. de tabe dorsali.

27. *Amaurosis arthritica*, Journ. de Medec. Tom. XXI. pag. 227.

Rachialgia affinis est; verum ab ea potest distingui per prægressos arthritidis paroxysmos, curatur phlebotomiis, epispasticis ad pedes, doloris podagrici reditu.

Nota. Ut judicemus de quantitate visus oculi, sanus claudatur, & invalidus luci oppositus inspicatur; si manu runc præsentia, nunc ablatæ, aut si nunc demissa palpebra, eaque digito leviter confricata, nunc vero subito aperto oculo; uvea ita constringatur ad lucem, ut dimidio minor evadat pupilla, dimidia superest visus quantitas; si tertia parte minor evadat pupilla, superest tertius facultatis visivæ; si omnino immobilis sit, ut plurimum nullus superest visus, nisi in casibus rarissimis.

V. ANOSMIA; Chasemio Haly-Abbatis; Osfalsani amissio Sennerti; Parte a' qderat.

Est imminuta, vel suppressa facultas percipiendi odores, hujus morbi symptoma præcipuum: Ab osmo odor, & a privatio.

Effluvia salino sulphurea e corporibus exhalantia, si ope inspirationis in nares deducantur, illa humiditate membranæ pituitariæ soluta, agunt in nervum olfactorium, & inde nascitur perceptio eorum; multiplici itaque modo amittitur odoratus, ut siccitate membranæ pituitariæ, ejus mucositate nimia, ut in coryza; ejus infarctu, ut in ozæna; obstruptione narium, ut in polypo, aliisque circumstantiis.

21. *Anosmia catarrhalis*. B.

Est ea quæ coryzam vulgarem comitatur, quæ tamen, si coryza contumax fuerit, illa sanata perseverat.

2. *Anosmia ab ozæna*. L.

Qui fuerint narium, sive ab ulcere membranam pituitariam exedente, sive ob putrefactionem muci & aeris, ob limitatem diutius in antris Highmori, sinubusque aliis retenti, necnon qui cadaveribus foetidis infuscandis incumbunt, qui latrinas, cloacas, macellæ, officinas alias

alias fecitissimas incolunt, tam tetrīs, validifque odoribus percussuntur, & iis affuecunt, ut alios odores non percipiant.

3. *Anosmia a polypo*, Morgagni Ep. XIV. 17. L.

Quorum naribus accrescit polypus, cum ea excrefcencia eo devenit, ut rimam utriusque naris, vel vomere depresso, vel utramque narē subeundo obturet, aer nequaquam fobire potest, nec proinde odorifera effluvia adduce- re, unde anosmia.

Polypī *cutisissimi* sunt ex substantia inter glandulosam & carnosam media; dantur *vesicu- lares* ex vesiculis oblongis sero plenis, quibus scetis exstillet humor; sunt quoque facit membra- nę pituitarię *propterea* seu prolapsus, ex *Mau- charia*; alii *cyfici*, seu ex membrana unica seu capsula humore limoso & viscoso turgida, *Ruy- selii*; dantur ex *pituita* concreta vel inspissata *Palsii*; nec defunt *cartilaginei* a *Meckrenio* memo- ratī: horum verum verō curatio diversa est, ut cuique appareat.

Vide *curacionem polypī-narium apud Heisterum*.

4. *Anosmia syphilitica* Ballonii Paradigma n. 7. L.

Est ea quę in tertio syphilidis gradu exesit & ulcerosis naribus interioribus supervenit; ex- cedunt autem non solum membranę, sed et- iam ipsę cartilagines narium, destruiturque organum olfactus.

5. *Anosmia verminosa* Fernellii. B.

A vermibus rhinaris nares obfidentibus & obturantibus, sternutationem, hemicraniam, quādoque furorem, simulque anosmiam exci- tari docent observationes plurimę. Vide *Hemi- craniam suam*.

6. *Anosmia a siccitate*. B.

Notum est in febribus morbisque inflammato- riis exsiccari ut plurimum membranam pituita- riam, non secus ac ipsa lingua, maxime si sum- mus calor addit: non mirum si anosmia, simul- que ageustia sint horum morborum accidentia.

Si quis adverso vento iter faciat, maxime æsti- vo tempore, tenuissimumque & aridum viarum pulverem inspiret, ille odoratum amittit, ita & qui pulvere tabaci potissimum Hispanici abutun- tur, & ea enim omnia fibrillas nervas exsiccant, & percipiendę impressionibus impares reddent.

Huc referatur anosmia a calculis rhinaris *Binet. Sepulch. cels. 4. pag. 443. tom. 1.*

7. *Anosmia paralytica*. L.

Ea est quę morbos soporosos, paralyticosque comitatur, quęque ab contumaci nervorum olfa- ctiorum obstructione, compressione procedit.

## VI. AGEUSTIA; *Dégout*.

Est suppressio facultatis, quā diversis sapo- res percipimus.

Diversa quidem est ab anorexia, cuius sæpe comes est; in ageustia lingua afficitur, aut in anorexia ventriculus, discrepat etiam ab caco- sitia, seu cibi fastidio, nam aliud est non per- cipere saporem alimentorum, aliud petceptos saporis fastidire & averfari.

Principium ageustię vel est in cerebro, vel in lingua ipsa, vel in tractu nervorum lingua- lium, qui quatuor sunt, utrinque scilicet *magna*, qui inferior & internus ex pari nono, & *parvi*, qui superior vel externus & lateralis ex quin- to pari procedit; hisce quatuor funicularis ner- vosis linguae accedit etiam utrinque ramulus ex nervo sympathico medio, seu octavo pari.

An nervus noni paris solus sit gustatorius, adhuc sub iudice lis est.

Organum immediatum gustus est in papillis villosis vel pyramidalibus, de semilenticulari- bus & capitatis non conveniunt Physiologi.

1. *Ageustia febrilis*. B.

Suppressio gustus vel comitatur febres arden- tes & malignas, duplici de causa, vel scilicet ob summam linguę siccitatem, & ariditatem, cum lingua scilicet arefcit, nigrescit & inflat, ligam aspera est; vel ob delirium & soporem quo ægri quādoque obdormunt. L.

2. *Ageustia paralytica*. L.

Est illa quę vel linguę paralyfim, vel mor- bum quemcumque soporosum comitatur.

VII. DYSECCEA; Gręciis *Dyscece*, & *Hypo- cephia* auditis *difficilis* Frid. Hoffmann. Diss. *Durct d'oreille*; Latinis ægri *surdasit*, Gall. *Durs d'oreille*.

Dysecceā a Gręco *Dys* difficultes, & *Acusis* audio, est audiendę difficultas ob obscuritatem sonorum.

Differt a cophosi incipienti ratione sedis; in dysecceā scilicet undę sonorę non possunt libe- re transmitti ad labyrinthum alias bene consti- tutum: in cophosi nervus acousticus immeabilis est fluido nerveo. Defunt characteres distincti utriusque generis a longiori observatione & do- ctiori theoria expectandi. Differt a paracusi quod soni sint obscuri, debiles & propter ob- scuritatem confusi, in paracusi vero non com- plicata soni clari sint, sed confusi.

Dysecceā responderet calligini; cophosis amautosi, paracusis amblyopię, tyrimus suffusoni.

Ea organi vitiosa structura, quā debilitatur, aut impeditur undarum soni transmissio ad la- byrinthum est principium dysecceę, quod ex specierum censu patet; experimento *Schellha- meri* etiam distinguitur dysecceā a cophosi. *Vide de experimentum in 3. dysecceā*.

1. *Dysecceā Menetes*, seu *Malcorum*. L.

*Menetes*, Gallice *Menantes* dicuntur illi quibos alterutra, vel utraq; auricula deficit, si- ve quia præcisę sunt ut Malco, si ve quia ab ortu deficiunt.

Auricula colligendis radiis sonoris ita utilis est, ut monotifciter succurreret *Bornave* ef- fista ad auriculę modulum cera expressum tuba acoustica, & ut monotes manu auri appres- sa & in tubum inflexa sibi consulat; acousti- ca organa parabola vel hyperbolica ex argen- to vel aurichalco fabricata, infra cæsariem re- condenda, videtis delineata inter machinas Acad.

Acad. Parisiensis. Aliæ sedili, aliæ baculo inferuntur; tubus acoustici organi foto parabolæ respondens meatui auditorio inferitur, pars antica lamina tenui eribiosa obvelatur.

Cornua acoustica quæ manu tenentur auri inserta ex cornu nativo, argento, cupræve parantur, pelle exterius obducta, orificio parulo versus loquentem directo; eadem vero organa cæteris dysectæ speciebus utilia sunt.

2. *Dysectæ a meatu obstructo*, Duverney, part. 3. Morgagni Epist. XIV. n. 11. L.

Meatus auditorius obstruitur multiplici de causa. 1. Intumescitis glandulis alvearii. 2. Collesio & indurato cerumine. 3. Peregrinis corporibus in eum illapsis.

1. A glandulis alvearii intumescitis observavit C. Hoffmannus, alias a parotidibus compressum meatum refert; alias a crustula excrementitia intus obductum *Virlingius*: quandoque ex crescentiis fungulis post exulcerationem exortis obturatum. De eorum vitiorum cura consulatur *Hæsseri Chirurgia*; is duplicem myringam observavit seu ex crescentiam membranaceam in meatus fundo.

2. Cerumen in crassatum, induratumque in propria uxore cum lapillis & arenulis observavit Bartholinus. Lapidem duritiem ceruminis vidit *Cassarius*. Ego gypsum & albescentem, partim auriscalpio extrahi, & residuum aquis thermalibus per aliquot dies injectis dissolvi: tales sunt surditates vulgo dictæ, quæ sæpius sanantur; hic conferunt injectiones oleosæ, saponosæ, ex aqua fraxini, &c.

3. Meatum subeunt lapilli, pisa, nucleis, in ipso generantur vermes seu larvæ insectorum, ingrediuntur insecta, quæ vel otitigiam, vel syngium creant, aut a piscis, globulis vitreis, nucleis inducitur dysectæ, quæ Chirurgicis artificiis curatur.

Harum varietatum singulates curationes vide apud Duverney *Traité de l'organe de l'ouïe*, in 12.

In casu vermium laudantur olea & spiritus vini in meatum insula.

3. *Dysectæ a myringæ atonia*. Duverney p. 175. L. Myringa dicitur *Seauverio* tympani membrana. Ea vero peccat laxitate & atonia.

Atonia cognoscitur ex prægressis, ut ab excepto vento humido, prægresso catarrho, otirhoe serosa, obstricta a Platone, Langelote, Stalpartio, ab plures libras: cognoscitur etiam ex eo quod flans horea minuat; cam atoniâ præcessit quandoque catarrhus glandulas ceruminosas infarciens. Rendet etiam ab eroso musculo tuba; *Valsalva* p. 112.

Curatur resolventibus exsiccantibus, forma suffitis, injectionis adhibitis, nec non vesicatoriis pone aures excitatis; tempestate aultrinis, vntres gossipio mofchato, vel ambrato obtinentur. Spirituosi liquoris, aqua Regine Hungariæ rite injiciuntur, nec non fumus succini, olivani, si otirhoe adit vide *obs. Platone*. 735.

Puella ab aliquot mensibus dysectæ labora, bat, pallida, parum menstruata, mente hæbit;

sumpsit per tres menses extractum hyoscyanæ albi, incipiens a triente grani, & auda quotidie dosi, usquequo septem grana quotidie voraret, ex intra mensem & semissem clare audit, colorem & adipem recuperavit.

4. *Dysectæ a myringæ duritie* Duverney p. 176. Bartholin. centur. 6. L.

Ille induratio fit vel ob senectutem, & infanabilem, vel ob glandulas myringæ tumidas, quod acititis accidere notat Bartholinus; vel ob virus syphiliticum, quod ex squamulis & rubedine auriculæ alisque signis habetur: vel a volatiliis & calidiorum injectionum abusu, ut notat Hoffmannus. Illæ varietates læte tepido, decocto althææ immitti possunt. Si syphilis adit, remedia huic morbo propria advocanda.

5. *Dysectæ a myringæ perforata* Duverney p. 176. Morgagni Epist. XIV. to. 1. L.

Rumpitur myringa ab auriscalpio fortius adacto, ab ære tortiter inspirato clausis ore & naribus observante Duverney; a stertuatione, *Tulpio obs.* 34. Eroditur a pure intra tympanum collesio observante *Fabricio Hillano*, *Schæckio*.

Cognoscitur hæc species ex facili emissionem aeris inspirati per aures, ita ut candelas extinguat status. Auditus non nisi gradatim decrescit ob exsiccationem membranæ fenestrellæ utriusque & musculorum ac ligamentorum catenulæ ossæ. Si vero adacto stylo rumpatur myringa, ut tentavit *Valsalva*, sæpe auditus recuperatur sanato vulnere. Bombardarum explosores huic morbo sunt obnoxii, ut qui ad catarractas Nili habitant.

6. *Dysectæ a tympani fistula*, Duverney. p. 138. L.

A carie ossium tympani. Vide *Historiam & curam loco citato*. Cognoscitur fistula auris, stertore, pure exeunte, ab otirhoe purulenta in infans sponte sanata. Vide *Brassavolum* & *Stalpartium*: Morgagni Epist. XIV. 7.

Si ossicula elabantur, sequetur necessario paraculis, apophysim mastoideam in his casibus stylo aperiri suadet *Riolanus*, aut non consentit Morgagni.

7. *Dysectæ ab hyarotympano* Morgagni Epist. anat. VI. n. 6. L.

Sorditatem, gravem auditum in acutis morbis supervenientem, sæpe conjunctam, invenit *Valsalva*, cum aqua ditingue in tympano redundante. Auditus hebetudo cephalalgia superveniens sæpe solvitur aquis guttis & capite inclinatum, per os, nareque destillantibus. Surdum ab ortu sanatum refert *Fontanelle* (*Hist. de l'Ac. R. des Sc. Ann. 1703*). aquam ex aure emisisse, *Steno* & *Morgagni* existimant quandoque congeri in tympano sanguinem, cujus effluxu liberatur cerebrum ab infarctu, congeri etiam serum, quod per tubam Eustachianam sibi viam parat.

Curatio specialis hujus morbi, ex quo & tinnitus & dysectæ inducitur, repentina est ab instrumento tubæ Eustachianæ injicendæ apto, quod describit *Histoire de l'Ac. R. des Sc. Ann. 1724. obs. anat. 6*. Fit ex fistula plumbæ soler-

reg inflexa per nares immittenda, hujus interventu medicamina resolventia in tubam & aurem immittuntur, & hydrops referatur. In eodem morbo si æternatoria, apoplegmatisimi, cathartica, foniculi occiput, fumisique non prosint, aperientem styloapophysim mastoideam suadet *Rosbaciur*.

2. *Dysæcæa a tuba obstruâ Morgagni Epistol. anat. 7. n. 19.*

*Cheseldennus* observavit aqua per tubam in aures injecta surditatem, id est dysæcæam, per aliquod tempus procreari, unde firmatur theoria dysæcææ prioris. Polypo narium tubam premente audiendi magnam difficultatem afferri testatur autoprota *Morgagni* cum *Vassalva* & pluribus Chirurgis. *Tulpinus* vidit gravissimè eos quibus tuba quovis modo in ore obturabatur sive a palati tumore narium, sive ab angina & timore narium, & illa dysæcæa sine ulla stipatur.

*Diamerobocobius* idem accidere testatur, cum a coryza, mucus, obturatur tubæ, in quo casu, si utraque aure accurate obturata, baculo dentibus apprehenso, chordas fidium impellas, nec sonum percipias, signum est tubas obturari, ibi præter tinnitum, & difficilem auditum; datur dolor ab ore ad aures extensus.

1. Si a polypo aut excrecentia in naribus pendeat hæc species, remedia adversus polypum ex Chirurgia repetantur.

2. Si a coryza, sive grævidine, quod ipse expertus sum, usu aquæ calidæ, porus sudorifici, diætæ tenuis, vaporis laetis calidi inspirati & tempore solvitur: si leve sit malum, æternatoris mucus auferatur, & dysæcæa tollitur; huc pulvis asari seu pulvis capitalis dictus, Catheterem tubæ Eustachianæ delineatum habes in *transact. Philosoph. Abridged. anno 1741. a Chirurgo Cleland.*

3. Si ab ulcere syphilitico, curatur hydrargyrosi. *Dysæcæa syphilitica.* Vid. Cophosim syphiliticâ. *Dysæcæa a kinquina* Morton Pyretolog. de cortice peruviano. Fugax est, & sanatur sponte: *Dysæcæa febrilis.*

Surditas critica aut accidentalis febribus acutis superveniens. Vide *Cophosim criticam*.

VIII. PARACUSIS; Hippocratis *paracoe*, a Græco adverbio *para* vitiosè, depravate, & *acono* audio; obauditio Latinis; Græcis *paracousis* *paracousis* *Gortzi*, *Caussis* *oult*.

Est auditus confusus, vel difficultas distincte audiendi sonos, & voces articulates, licet votum perceptio clara sit, ita ut paracusis sit relativa ad sonos externos, qui licet distincte proferantur, confuse in labyrinthum transmittuntur. Hoc genus se habet ad dysæcæam, ut myopia & presbytia ad caliginem & cataractam. In paracusis quidam soni audiuntur distincte, alii vero confuse, ut in myopia objecta proxima distincte, remota confuse videntur.

In paracusis clare percipiuntur soni verborum, syllabæ vero seu partes soni in certis circumstantiis

non distinguuntur, ut myopia luce afficitur videt, sed objectorum distantia partes non discernit.

Ideo distincte audimus voces articulates & contentus, quia aptamus myringam tympani, catenam & membranam fenestellæ ovalis, ad harmonicum tonum notæ tonicæ quæ prædominatur in cantu, in loquela, adeoque paracuseos causa est difficultas aptandi hæc organa ad tonum præcipuum alloquentis vel canentis.

Quatuor hujus species mihi sunt cognitæ, scilicet *Barycoja*, *Oxycoja*, *Paracusis duplicata*, & *Vvillissiana*.

In barycoja soni vehementes confuse audiuntur, debiles distincte, maxime si interpolati: in oxycoja est intolerantia sonorum acutorum, maxime vero dissonantium, ita ut non solum confuse audiuntur, sed etiam cum dolore & cephalalgia; in duplicata una auris audit sonum distincte qualis est, altera alium percipit a priori dissonum aut diversum, quo auditus confunditur; in Vvillissiana soni pacati & mediores non distinguuntur, sed loquela magno strepitu comitata distinguitur.

Differt a syringismo, in quo auditus est confusus propter sonos tantum internos, in paracusis confusus propter sonos externos, ad causam externam excitatos.

1. *Paracusis barycoja, gravitas auditus* *Auct. L.*

Est ille affectus in quo quæ paulo vehementius seu altiori voce proferuntur aures confuse & vehementer percipiunt, at non intelliguntur, quia syllabæ non possunt distingui: ratio est, quia ex sono externo excitatur alter internus; sed cum internus dissonet: seu non consonet cum externo, inde exurgit strepitus meatus in aure, seu confusa auditio.

Non consonat sonus internus cum externo altiori, quia musculi mallei & stapidis ob rigiditatem, crassitiem, infarctum rheumaticum nequeant myringam & fenestellam ovalem aptare, tendere ad eum gradum, qui responderet tono chordatum vocalium loquentis, nec cuicumque ex illius harmonicis altioribus tonis loquentis.

Audiuntur tamen distincte verba submissa & graviore voce pronuntiata, quia ad harmonicos graves sonos aptari potest myringa sine labore & dolore musculorum.

In hoc morbo crediderim thermas sulphureas, leniterque resolventia medicamina convenire, salutas vero thermas, quibus siccitas & rigiditas musculorum angeretur, nocere, sed desunt observaciones prædictæ.

2. *Paracusis oxycoja, l'Onie tendre. L.*

Ea est confusa auditus, quæ stipatur intolerantia soni, ita ut vel minimus strepitus aurem lædat; sed illud symptoma est accidens otalgia, phrenitidis, ut aerophobia est accidens rabiei.

Datur altera oxycoja quæ cephalalgiam committat, quamque nuper observavi in Marchionissa Parisina, quæ cum cephalalgia & tussi hysterica laboraret, a voce & loquela adstantium dolebat illico capite & pedore, ita ut nullis a sono illo mire exacerbaretur.

3. *Paracusis duplicata; La double ouïe.*

Ex duplici observatione hanc singularem speciem eruo; prima hæc est. Quidam eximius musicus cum tibiam germanicam inflaret, percipiebat quidem sonum proprium & ordinarium suæ tibiæ, ac simul alterum sonum ejusdem rhythmici seu mensuræ, sed diversæ toni audiebat, qui proinde auditum duplicabat, non tamen erat cæcus, quia eodem ipso tempore ambo soni audiebantur, nec erant toni consonantes & harmonici, nam inde suavitas percepta fuisset; ille vero iterato per aliquot dies tentamine, semper ægro tulit hunc sonum, & tibiæ abiecit; is vero vespere sub cælo frigido & humido aliquandiu ambulaverat pridie hujus affectus, & catarrho lateris dextri afficiebatur, unde verosimile est tonum nativum myringæ ejusdem auris graviores & dissonum cum sinistra evasisse; soluto catarrho auditus distinctus restitutus est.

Nuperrime peregrinus accesserat collegæ militissimum, consilium petens circa similem morbum; conquirebatur scilicet se a pluribus retro mensibus molellari ex eo quod cum aliquentem auscultaret, sonum huius proprium, & simul, quod tolerare vix poterat, alterum octava altiore perciperet; verum si posterior fuisset exacte ad octavam prioris & ejus synchrona, auris eam vocem pro unica habuisset, & suavitatem concentus perciperet; verosimile est itaque vocem postremam cum altera non fuisse consonam: huic vero præscriptæ sunt solitæ adversus morbos chronicos formulæ; videatur tamen topica tantum: uni auri admovenda esse, ut, quæ toni gravioris erat, laxaretur; interna vero in utramque aurem agentia non indicari.

4. *Paracusis Villisiana, l'Œite engourdie.* L.

Est ea species in qua verba prolata non intelliguntur, utcum alia voce proferantur; verum si strepitu vehementi stipata sint, tunc distincte audiuntur.

Hujus morbi quatuor prostant exempla, primum a Villisio, alia ab Anglica Transalpinibus petita. Mulier loquelam non intelligebat nisi cum circum crepante tympano; tympanicam domesticum conducere coacta est, ut cum marito colloqueretur. Idem accidit nobili ab ore surdastro; is a tergo submississimè loquentes capiebat, sonante tympano, secus vero ne quidem clamantes intelligebat. Tertius prope campanile degens tacentibus campanis nil distincte audiebat. Quartus nisi rheda velata veheretur cum adstantibus colloqui non poterat, eorum verba non capiens.

Sic somnolenti oculos non aperient, nec proinde aprant ad visum, nisi magna lux oculos commoveat; sic organa genitalia gæneonum a torpore excitantur quandoque per flagra, de quorum usu in re venera scripsit Meibomius; in hac denique specie licet organa auditus bene se habeant, organa auscultationis torpida erant, & magna commotione indigebant, ut agerent.

IX. COPHOSIS. *Surditas Latinis; deafness Anglicis; Sourdité ou surdité, dureté d'oreille.*

Cophosis est obscura sonorum omnium perceptio, seu impotentia sonos debiliores percipiendi, quibus cæteri homines afficiuntur.

Absoluta surditas est, si fortissimi quos homines proferunt soni ab ægris non percipiuntur: minor erit surditas, si nonnisi alta voce & proxime loquentes audiant.

Ut visus obscurus etiam confusus est, ita & obscuritas auditus confusum simul auditum involvit. Interea cophosis a paracusis distinguitur ut amaurosis ab amblyopia respectiva. Surdastri distincte & dato rogo loquentes distincte audiunt, surdi vero quocumque tono utentes eo minus audiunt, quo submissiori voce loquuntur.

Aer internus, qui intra labyrinthum est, constat ex moleculis infinite diversis, uti lux ex radiis omnigenis colores continentibus; quæque molecula dati ordinis subsistit, & resonat, cum dati ordinis fibræ, vel fides sonoræ extus vel in aure media vibratur; sic si clavicymbali chordæ quæ tonum datum resonat, vibratur, alterius organi musici chorda huic harmonica consonat, & eo fortius vibratur, quo magis est harmonica; unisona v. g. fortius vibrat quæ ad ejus octavam est aptata, & sic deinceps. Transmittuntur itaque eo modo soni externi ad aurem mediam & a media in internam seu labyrinthum.

Si itaque ossiculorum catecula, quæ inter tympanum & ovalem fenestram protensa est, abrupta aut inters sit, & si aer qui in cavo tympani debet adesse, vel deficiat, vel elasticitate careat, impossibile est vibrationes externas ad labyrinthum pervenire, nisi per ossium vibrationes, adeoque nisi magna vi polleant externi soni.

In quocumque sono duo sunt spectanda, tonus scilicet seu vibrationum numerus, & visio soni seu vibrationum extensio; tonus determinatur a fibrarum vibratilium exilitate, brevitate, & tensione. tonusque est eo acutior quo diameter, quo longitudo minores sunt, & quo radix virium tendentium major est; crassities & longitudo in organis solidis vix mutantur intra aurem: sola ergo vis tendens fere mutabilis est, & residet in musculis auri internæ & externæ.

Vis major soni externi impetit plus minusve tympanum, cujus impetus, mediante aere tympani & cateculæ ossiculorum, fenestram ovali, inde vero organa labyrinthi, communicatur; inter organa acoustica labyrinthi sunt canales semicirculares ossi duri, & in cochlea radii flexiles, laminæ spirales, alii aliis breviores, crassiores, magis tensi. Duo itaque sunt in labyrintho organa acoustica, quorum unum tubis affine est, scilicet canales semicirculares; alterum clavicymbalis seu sibilus respondet: Galli vocant *instrument à vent*, & *instrument à corde*.

Duplex est pariter in organis loquelæ, seu vocis instru-



instrumentum; nam tubus tracheæ, rima glottidis, cavum narium & oris, respondent instrumentis statum transtissuris, & chordæ vocales, velum palatinum, labra tremula, *obstruunt* instrumentum referunt.

Duplex est vox hominis, altera quæ potissimum ab instrumentis secundi ordinis dependet, & vox infantilis est, seu stridula immoderata, emmehoram, *quis tubæ, citharæ*; altera debet instrumentis primi ordinis, & vox *organifata* dicitur, quæ vox adultorum. Vox *citharæ* una octava acutior est, & altius assurgit quam *organifata*; sed intervalla habent continua citharæ & organifata; hæc ultima priorem vi superat, ad plures octavas descendit, & ubi invicem concordia est & excurrit utraque, citharæ obstruitur, quia validior, vox autem ex utriusque concursu exurgens *plena* vocatur.

Lamina spiralis citharæam potissimum representare apta est, & organifata representant canales semicirculares; amborum instrumentorum concentus vocem plenam animæ exhibet.

Ut organum capitulum semicircularium resonet non secus ac tubæ, tibie, debet aer intra illius tubos adigi, quod præstat alterna intro-pressio membranz fenestræ, ovalis intra vestibulum, quo impetu unde sonoræ canales perstringunt, canalium trium longitudine, diametereque sunt continuo diversæ, ita ut zonæ circulares suis numero plurimæ, quarum quælibet suum tonum obtinet, quælibet itaque cum suis harmonicis ad sonum extorsus supressum fortius resonat, & datum sonum animæ representat.

Fibræ sonoræ laminæ spiralis variatæ ab apice cochleæ ad basim, & continuo longiores, crassioresque evadunt, ut chordæ clavicymbali; nullus est itaque tonus quem sua vibratione referre nequeant: hæc duo instrumenta vocem citharæam, organifatae formam, & plenam simul exhibent, unde auditus perfectus, qui eo sine nobis potissimum concessus est, ut vocem humanam potissimum clare & distincte caperemus.

Ex dictis intelligimus debitam structuram cochleæ ad vocem citharæam, & canalium sanam dispositionem ad vocem organifata, distincte audiendas inservire; imperfectus itaque erit auditus, si alteruterum ex hisce organis deficiat, sed non ideo aderit cophosis; atque ut surda sit auris, necessum est, vel 1. ut impressiones externæ vel debillime transmittantur ad aurem internam, quod fit vel obstruendo canali auriculæ, vel obstruendo tuba Eustachiana; & si ambæ illæ viæ omnino obstruantur, aderit perfecta surditas, ut obstruata omnino pupilla datur cæcitas. 2. Vel ut impressiones illæ ad fenestram ovalem non deferantur, aut delatæ ad labyrinthum non perducantur, impressioesque ad tympanum deficiant, illæ interveniunt cæcæ: officulorum transmittuntur ad fenestram ovalem: ergo rupta cæcæ aderit cophosis, sed tantum imperfecta, quia radii sonori, sine cæcæ interveniunt, ut debilitati, tamen possunt hanc fenestram percutere, necnon fenestrâ

rotundam, sive canalis auriculæ sit obstruendus, quod tuba Eustachiana patet; verum si utraque fenestra, ovalis scilicet & rotunda, sit obstruata, ut cum excolloso cavitatis repletur, aut mucro infarcitur, tunc necessariæ cophosis absoluta sequetur. 3. Denique si labyrinthi structura omnino sit eversa, destructa ulcere, excolloso, carie, omnium absolutissima erit surditas; necnon si nervus acusticus, tum in origine, tum in tractu suo, fuerit obstruatus, compressus, erosus, quæ quidem vitia in vivis dignoscere & distinguere sæpius est impossibile, unde patet prognosin cophoseos.

1. *Cophosis a meatu Philosophi. Trausact. 1741. pag. 124. l.*

Est ea quæ a meatus auditorii externi obturatione dependet, sive corpora illa ipsam obturaverint, sive quod frequentius accidit, cerumen aurium cophosius & infissum obturaculi vices præstat, sive quod etiam in febribus malignis evenit; a glandula parotide intumescens, meatus partim compressus sit, quod tamen non sufficeret, nisi simul inflammatio quædam auris mediæ, quæ deinceps suppuratione terminari solet, concurreret.

In illa surditate æger ut loquentes audiat, ore parulo eorum verba excipit, per tubam Eustachianam transferenda, & simul non recta loquentem aspicit, quod solemne est sanis, ut utraque aures sonos excipiant, & ex labiorum motu, oculis, gestuque sensa loquentis interpretentur, sed aurem sanam loquenti obvertunt, & quoniam vi sibi sequitur rationem proximitatum duplicatam, propius accedunt ad os loquentis qui surdi sunt, ut clarius audiant; nec enim in hoc casu, licet aures ambæ obstruatur forent, datur perfecta surditas.

Quomodo quæ in aurem illapsæ sunt, extrahuntur, docet *Histopsi in Chirurgia*.

Si cerumen viscosius & induratum obturet canalum, nihil est aptius quam ope syringæ aquam Bellilucanæ, vel Bagniolensem, vel sapone, melle, selse, similive dissolvant. Scam calidam injicere, & deinde ope auriscalpi sordem detergere.

Surditas quæ in statu febrium acutarum supervenit, boni ominis est; excitatur enim a metastasi materię morbosæ, quæ antea delirium aut soporem excitabat, atque vicem gerit parotidis criticæ, & est

2. *Cophosis critica: Cophosis fibrifera* de Meysery T. 2. n. 244. l.

Surditas in acutis post septimum diem, cum aliis bonis signis reconvalescentiæ indicia præbet: *Baglivi*.

Quibus in febribus ardentibus aures obstruuntur, iis non solata febre necessum est delirare; solvit autem inter alia vel hæmorrhagia narium, vel diarrhæa biliosa: *Hippocrates*.

Surditatem criticam vidaliquando, deinceps terminatam oborto sudore.

3. *Cophosis a tuba*, Haller. Physiol. I. 12. p. 236. l. a *polypo tubæ*, Valsalva pagin. 112. a *mucro*



mucosa talem replente, Guiot Hist. de l'Acad. des Sc. 1724. ab angina tubis obstrictis Boerhaave; a tumore palati tubas obstrictas. Tulpii Obs. 35. a catarrho, Haller Physiol. ibid. ab aphthis, Boerhaave.

Si tuba Eustachiana obturetur, illud vel accidit ob tumores in ejus exitu versus nares posticas, quod accidit non raro in angina nasali; sed fugax est, & cum syngismo bombo conjungitur; vel accidit in antiqua syphilide ob exulcerationem, & deinceps coalitionem, aut solummodo incrustationem parietum hujusce tubæ; necnon a sordibus mucosis, viscidis eam infarcentibus; hic vero affectus sensu quodam confuso agrotantis, & aliis signis cognosci potest.

Chirurgus Londinensis Cleland in Philosophicis Transactionibus anno 1741. pag. 124. proponit syringam catheteris instar fabrefactam, flexibilem; quæ per nares deducta ad utrumque tubum Eustachianum pertingit, facto prius in cadaveribus tentamine ad catheteris directionem, & flexuram determinandam; hujus vero intervencu injectiones deterfivæ in hanc tubam instanti possunt: hunc catheterem adhibent Chirurgi Non-Pelienenses.

Idem Cleland proposuit ibidem speculum concavum, ante quod est candela accensa, ejus interventu in fundum canalis auditivi externi indagari possit, & inquiri principium surditatis. Vide Philos. Trans. & notes. adjectas.

Ista vero cophosis est imperfecta, nisi obturatio tubæ Eustachianæ procedat a muco, pure, aliove fluido crasso tympani cavitatem obtinente, in quo casu injectiones per syringam Clelandianam utiles esse possunt.

#### 4. Cophosis a tympano.

Tympanum, seu membrana tympani multilici modo peccare potest, & surditatem imperfectam inducere. 1. Si surditas a magno fragore, ut bombardæ explosione, originem duxerit, verosimile est eam membranam introrsum depressam fuisse, acque ideo pristino situi restituendam esse, quod ut assequatur Clelandius duplici modo se gerit; vel enim ope catheteris in tubam Eustachianam statim injicit, seu jubet ut æger naribus & ore obturatis aerem fortissime expiret, & in tubam transire cogat, vel ope tubi, qui auri externæ accurate applicatur, & epistomio instruitur, aerem e canali auditorio fortissime exigit, unde subito, ut ait, auditus restituitur.

2. Si vero membrana tympani rigeat propter siccitatem, ut a suscepto aere frigido, & fluctibus increfcat, dum ventus septentrionalis fiat, tunc temporis conveniunt laxantia, emollientia, oleosa, in aurem injecta, lac, oleum, lardi insilli frustulum.

3. Ast si a laxitate ejus membranæ pendeat surditas, quod ex prægressis & concomitantibus dignosci potest, maxime vero ex eo quod aultro flante soni obscurius percipiuntur, evidens est, injectiones ex comicis, spirituosas, aromaticas, aquis Bellilucanis, fumo tabaci, vapo-

re spiritus vini, aqua ipsa vitæ, cum ambra & moscho, utiliter adhibeantur.

5. Cophosis syphilitica Astruc de morbis venereis, lib. 4. cap. 2. n. 8. L.

Non raro virus syphiliticum inveteratum inficit auriculam & ductum auditorium, ibique herpes excitat ficosos, cerumine infissato tympani membranam obducente auditum hebetat: sed quod pejus est, tubam Eustachianam exulcerat, obturat, obliterat, exosteses in aure media & interna inducit, quæ vitia difficillime distinguuntur, unde fortuito & raro sanatur; convenit autem hydragryosis: ast sæpe accidit, ut qui in hydragryosi consueti aeri frigido, humidove se exponunt, potissimum auri- bus non bene tectis, in surditatem incident, quæ minime syphilitica est.

6. Cophosis serena Surditas ab atonia Frid. Hoffmann. L.

Ea non raro sequitur affectus soporosos a sero exundante ortos, in subjectis pituitosis, catarrhosis, atque tempestate aëstrina humida ingravescit, maxime afficit eos qui calentes se exponunt, nudo capite, ventis frigidis; suppressa enim perpiratione retrocedit, & aurium membranas internas relaxat.

In hoc casu caput probe derafum, bis In septimana, scopula deterfum, lanco tegmine, bennet de Sigovie, caute cooperiatur; gossypium ambra, vel moscho fortum in aure detineatur, maxime hyemali tempore; vesicatoria mitia, volatilia dicta, pone aures identidem applicentur, quæ feri exundantis exitum proritent, si quores spirituosos, aromaticos in aures infundantur, aut vapor auribus excipiantur, irrigationes aquis thermalibus, prius expurgato corpore, & præmissis jusculis diureticis, aut pituitosis sudorificis, adhibeantur, aqua ex ovis formicarum destillata in aurem injiciatur.

Nota. Species accurate determinare difficillimum est, quia non satis cognita, unde tam raro inausa est hujus morbi, licet frequentissimi, curatio.

Si cophosis a repressis herpetibus, tinea, aliiisque exanthematis exoritur, indicantur juscula ex cancris, uillepedibus, herbis diureticis, pituitans sudorifica, aquæ sulphureæ.

Si cophosis sympathica sit, acque hypochochriacis flatulentis superveniat, vicio stomachi obviam eundem est.

Si cophosis plethorica sit, seu procedat ab infarctu valorum sanguiferorum, auri internæ, ut plurimum præcessit mensruorum, hæmorrhoidum suppressio, victus lautus, voracitas, vita otiosa, hanc speciem vertigo, syngismus, cephalagia præcedunt; si vero cognoscatur principium, indicationes sponte patebunt: De his consulatur Frid. Hoffmann.

#### 7. Cophosis a comate. D.

Est ea quæ apoplexiæ, epilepsiæ, auri, hemiplegiæ, similiaque morborum comæ est; & quæ hic etiam sanatis sæpe succedit, et ut plurimum est perfecta, & vitium in labyrintho, vel.

vel in cerebro ad nervi acoustici originem supponit, non satis cognitum, ac proinde utrumque insanabile.

Idem judicium est de copiosi, quæ sit a suppurata aure interna, ut accidit in gravi otalgia, in variola, in cephalicis, in erizyophya, maxime ob metastasim materis morbosæ in aurem, præmissis delirio, sopore, convulsione, subsequente fistula, suppuratione, ossiculorum clapsu.

3. *Cophosis congenita*; *Surditas congenita*. L. Ægri surdi & muti ab ortu sunt.

Ea est quæ ab ortu advenit, aut quæ ab infantia fere adultus dixerat, ut ab abcessu varioloso in auro, &c.

Malum certe miserabile, cum ægri, quæ ad salutem scito fere necessaria sunt, vix addicere valeant, & nisi ex difficillima informatione brutorum fere conditionem exuere possint. Interea illi & ægri cæplarium visu, gustu, tactu gaudent, inde acumen ingenii augetur, unde fit ut si periculum magistrum sortiantur, loquelæ usum possint sibi conciliare. Vide *mutitatem*. Qui dudum surdissimi, pronunciationem sensum dediderunt, quam olim didicere, cum illis, si visus periret, digitis colloqui facile est, si alphabeti litteras digitis expressas addiscant. Qui vero surdi, muti, & cæci sunt, ut Presbyter de quo *Mauretus*, illi litteris extrinseco digito supra brachium, exaratis aliorum sensa possunt intelligere.

Alphabetum digitale sic se habet. Quinque vocales exprimunt totidem digiti; A designatur pollice; E indice; I medio; O annulari; U triculari manus finitæ; B bucca; C molle & S sinu; D durum, K & Q collo; D digito indice manus dextræ; F fronte; G durum gutture, vel pmo Adami; G molle & F consonans gena; H halitus horis explosio; L lingua; M mamma; N naso; P pede; R aure; T allis invicem pollice & indice; V indice & medio digito divaricatis; X digitis decussatis exprimuntur; immo *Petrus alphabetum suum manuale* unica manu absolvit.

Cophosis quidem hac arte non curatur, sed quod verba loquentium non possunt efficere, id signa præstant, scilicet ut a surdis intelligantur; mutitas vero hujus omnes assidua quomodo curetur, vide in *mutitatis*.

9. *Cophosis a strumate*, Bonet. Sepulchret. T. I. pag. 123. Obs. 53.

A strumate pugni magnitudine in basi cerebri enato furditate & demum mortem apoplecticam observavit. *Dresincurtius*. Signa desiderantur.

Cophosis differt a dysæcœa in eo quod organum immediatum auditus, seu labyrinthus, vel ipse nervus acousticus, afficitur in cophosis, sive primario, sive consequenter ad obstructionem tubi, tympanive infarctum; in dysæcœa vero alterutra ex viis ad tympanum ducentibus tantummodo vitatur, non vero labyrinthus omnino vitatur.

X. ANÆSTHESIA; ab *an* privatio & *æsthesis* sensus.

Est sensus omnis privatio, superstitibus motu musculari, & rerum necessariorum appetitu, sed imminutis; ægri minime dormire videntur: unde differt hic morbus a comatosi affectibus, sensu habere convenit cum caro, aut differt ex motibus necessariis ad manducandum, bibendum, alvum deponendam, quibus gaudent anæsthetici, non comatosi.

1. *Anæsthesia ab spina bifida* Ruyschii observ. Vide *Hydrorachitidem*. D.

Morbus hic sexies intra decem annos Montpellier observatus est, quem adeo rarum putant Auctores, ut ante *Ruyschium* vix nomine tenus fuerit cognitus; sic vero se res habet: infantes hoc affectu recens nati nullo sensu gaudere videntur, nec videre, nec audire, quod non mirum, sed nec tactu quidpiam sentire ullo signo produnt, nec tamen solito magis somno indulgent; pigri sunt ad omnes motus, tamen lac sugunt, motusque ad hoc opus utiles exerunt, alvum & fæces deponunt, si vero dorsum investigetur, apparet circa ejus medium; aut paulo inferius tumor mollis castaneæ magnitudinem, immo figuram cordiformem & colorem, satis reterens, si aperitur ut aliquoties accidit, & ipse *Huxhamius* expertus est, cito moriuntur, secus quandoque ultra annum vivunt; cadaver bis explicatus sum; in his cerebrum est intus fero turgidum, eodem quod ex tumore dorsi aperto effluit, illudque serum ex cerebro ad dorsum, ex dorso ad cerebrum libere refluit pro diversa corporis positura, datur via intra ipsam medullam spinalem a calamo scriptorio incipiens, quam hoc serum sequitur; elapso sero hic tubulus evanescit; in tumore hiant vertebrae lumbares, & ibi datur saccus & vagina medullæ spinalis dilatata factus fero turgidus; hujus feri sens est hydrocephalus, unde erecto corpore, tumor ab hac feri altitudine pressus extenditur.

2. *Anæsthesia plethorica* D. Ludovici, Collect. Academ. tom. 3. pag. 184. A.

Adolescens macer & stomacho debili, subito mane loquela orbat, sine prævio affectu, ex quo mutitas oriri potuisset, vel prævideri; punctus in quibusvis corporis partibus nullum tactus sensum præbuit, licet acus alte infigeretur capiti, collo, humeris, dorso, pectori, brachiis, abdomini, &c. ridebat æger, cum admiratione hujus phaenomeni, cum quod nullum incommodum præter mutitatem experiretur, quippe cæteras suas functiones, per bideum facie obibat; scissis ranulis, & inde misso cruore, loquela restituta fuit, & sensus tactus rediit, excepto levi stupore, qui cinnabaris fimsicrupulo assumpto, & potu sudorifico, omnino recessit.

3. *Anæsthesia nascentium* Janckeri tabul. 137. n. 2. de affectibus infantum. A.

Occurrit interdum ut infans recens natus; im-

immobilis, adeoque nulla sensus signa præbens, & tanquam mortuus jaceat.

Excitatur (a) inspiratione in os & intestinum rectum, mediante siltula clysteris; (b) fumo croci narium immisso; (c) adspersione aquæ frigidae, vel vini; (d) suctione mammillarum, (e) capis dissectis, & narium admoris; (f) vapore cinnamomi masticati in ejus os & nares insufflato.

Hic morbus ab asphyxia differt colore rubro infantis, ejus calore, immo pulsu vasorum, procedit autem a labore partus disiciliioris, pabuli interea defecto, & sæpius asphyxiæ speciem refert, attamen ab *Ilustr. Juncker* ad anæsthesiam refertur.

4. *Anæsthesia melancholica*, *super Ulrici Togenburger Dissert. Argentor. 1760.*

Sutor adolescens ex gravi merore incidit sensum in insensibilitatem fatuitatis analogam, ita ut nullo plane objecto commoveretur, palii ad instar lecto insideret, oculos solo affigeret, & interrogatus ne verbum quidem responderet: pulsus simul tardus, languidus, debilis, non nisi invitatus, potum & cibum assumeret; minis tentatus, virgis cæsus, ambustus, punctus, vix levem doloris sensum indicabat: a biennio ita erat affectus anno 1756. in Nosocomio *Recolitensi* *D. Mutzell* frustra tentaverat phlebotomiam, salia media, tartarum tartarizatum, silia volatilia, camphram, olea destillata, emetica, vesicatoria, balnea frigida, glaciem capiti raso admotam, ea momentaneam tantum sensationem excitabant. Demum viru scabiosum sacro vultu sculo brachio ejus incoctum *D. Mutzell*, quod vix sensit æger, sed post biduum febris accessit, quæ quarta die fuit omnium intensissima, cum pulsu celerissimo, anxietate, dyspnoea, suspitiis, septima die paululum remisit febris, sudor accessit, minima in cute pustulae rubrae apparuerunt; nono die æger loqui ac respondere cepit, antea totum immemor; febris evanuit, pustulae exbecatae sunt, & post tres ab inoculatione septimanas omnino sanus nosocomio valedixit. Hæc Berolini in Nosocomio Charitatis præstitit *Excellent. Medicina Professor Mutzell*.

## ORDO SECUNDUS.

### ANEPITHYMIA.

**E**PITHYMIA est appetitus sensitivus, seu cupiditas. Anepithymia est debilitas, vel abolitio illius cupiditatis, ut famis, sitis, libidinis, &c. citra soporem.

Quæ sunt ad vitam & sanitatem vel necessaria, vel utilia, vel dudum assueta, eo vehementius cupimus, quo ipsorum necessitatem urgentiorem percipimus; eo major eorum est necessitas, quo longiori tempore his caremus, & quo magis his assueti sumus, atque de eorum utilitate magis persuasi, sive id ratio & experientia docuerint, sive præjudicium & mos,

aut morositas nos deludat, de quibus consulantur historiae boulimi, polydipsiæ, picæ, nymphomania, aliarumque velaniarum.

Percipimus autem horum sanitatis præsidiorum, ut alimentorum, veneris, tabaci, necessitatem ac utilitatem, vel directe per sensum partium his appetitibus simulantium, vel per memoriam voluptatum, quas horum præsidiorum usu percipimus, adeoque si sensu careant organa famis, sitis, libidinis, debiliior, vel nullus exurgit appetitus esculentorum, potentiorum, veneris, &c. Si vero, licet hi sensus vigeant, anima aliis vehementibus pathematibus detenta hæc præsidia respuat, denegat, omittat, eadem sequetur anepithymia, ac si sensu careant hæc organa.

Præsidia sanitatis generalissima sunt esculenta & potulenta, quorum usu scilicet vita debet conservari: particularia veti, quibus etiam ad vitam individui minus utilis, plurimi vel mire delectantur, vel ob consuetudinem & præjudicium carere vix possunt, sunt bene multa, ut usus veneris, certorum alimentorum, ut vini, cælicæ, cocolatæ, tabaci, laudati.

Harum cupiditatum minoris momenti immunitio, aut mutatio, qualis observatur in graviditate; in morbis non solum febrilibus, sed etiam febrilibus, inflammatoriis, velanis, &c. summam Medicorum attentionem meretur; verum tamen inter morbos non debent recenseri, sed tantum inter morborum accidentia. Sicut itaque sequentia anepithymiarum genera.

### XI. ANOREXIA, *Inappetence, Perit d'Appetit.*

Est morbus, cujus præcipuum symptoma est notabilis immunitio, vel cessatio famis in jejuniis.

Si vero morbi alterius comes sit, vel accedens minus præcipuum famis cessatio, rectius *Inappetentia* dicenda est, ne morbus cum accedente confundatur.

Accidentia anorexiæ comitantia sunt *anorexia atrox*, seu cacochia, quæ tamen ab anorexia distinguenda est; aliud enim est cibos non appetere, aliud eos fastidire & aversari; sensus plenitudinis, aut gravitatis in ventriculo, vitiosus sapor oris, inedia, seu abstinencia pertinax, unde asthenia, dolor animi & corporis.

Nomen derivatur ab *oregma* appetit, & a privativo.

*Dysorexia* est immunitio famis, *asthenia* vero, vel *aposthenia* est abstinencia a cibis.

Fames est appetitus sensitivus, seu cupiditas esculentorum, ea certis intervallis primos afficit, quia cibos identidem sumendos esse sentimus ad vires reparandas, & voluptatem percipiendam, simulque consuetudini satisfaciendum; tria enim illa motiva nos ad edendum impellere solent. Si perceptio distincta horum morivorum nos excitet, tunc fames vere non est, sed voluntas edendi, seu appetitus ciborum rationalis, qui sæpe insperet in anorexia, cum,

non

non fame, sed ratione, ut ajunt ad manducandum invitamur.

Perceptio confusa vacuitatis in stomacho & primis vis, voluptatis & cibis expectatio, consuetudinis etiam energia, famem determinant; adeoque si anima, tum ob causas mechanicas, ut saburram, laxitatem, phlogosim in ventriculo, tum ob causas morales, ut merorem, ærumnam, erotomaniam, dolorem, bifce motibus non afficiatur; exsurgit inappetentia, quæ perperam apud Scholasticos solis causis mechanicis, physice tribuitur.

1. *Anorexia paralytica* Boneti Sepulchret. com. a. obs. unica. Ob resolutionem nervorum stomachi Sennetti. G.

Si ea resolutio sit symptoma apoplexiæ, cataplexis, cari, aliusque morbi soporosi, hoc accidens ad hos morbos pertinet. Si vero sola sit nervorum ventriculi paralytica laxitas, vel perfecta, vel imperfecta; inde exsurgit inappetentia pertinax, constans, iisdem principiis tribuenda, quibus artuum paralysis tribuitur; emeticis, catharticis, aquis Bellilucanis potu assumendis, impugnanda.

Huc referenda anorexia, quæ a narcoticorum abusu procedit, circa quod narrat ex usu atropæ belladonæ leviter degustatæ illico tolli famem, inmo desolandi facultatem; verum experientia aliud docet: Vnde erotomaniam, Vini quidem & liquorum fermentatorum abusus, necnon fumus Nicotianæ, famem sustinunt; sed vel quia inebriant, aut quia spiritus vini sæpius haustus nervos indurât, adeoque sensationi impares reddit. Sic vidi spiritus vini potatores denum incidisse in anorexiam pertinacissimam; idem observat Ettmullerus.

2. *Anorexia puerilis* Eßmæ glairæx. G. Est ea quæ a viscosis, adiposis, lentis humoribus in stomacho contentis exierat, quod cognoscitur ex sensu gravitatis in ventriculo, tussibus insipidis, vomitione puerilis insipida, glutinosa, ex assumptis oleosis, pinguibus, sensu repletionis, absentia signorum alia principia indicantium.

In hac specie indicantur eadem auxilia, ac in paralytica, & potissimum emetica, ut ipecacuanha, quæ gluten incidit, resolvit conungue stomacho, redditurque plus valet, ait merito Ettmullerus, in morbo vinum emeticum, quam docem cathartes; aquæ thermales Bellilucanis affines, etiam recte usurpantur; dein ad pilulas aloeticas, vinum absinthii, elixirum proprietatis, similiaque stomachica amara deveniendum est.

Vide Boerhaave de morbis a spontaneo glutinoso.

3. *Anorexia plethorica* Plateri prax. lib. 1. c. 3. *Anorexia catamenialis* Halleri. B.

Ea est quæ a copiosiori cruore, seu a plethoræ ortum ducit; ea scilicet gravatur stomachus, & vasa distensa impediunt ejus corrugationem, cui forte annectitur sensatio, famem determinans. Huc referenda anorexia catamenialis supprellis, quæ certe sæpe phlebotomia tollitur: Anorexia a desidia & defectu exercitii, aut Sauvages Nosologia Methodica, Tom. I.

quod eodem recidit, a suppressa perspiratione; cum enim nihil magis famem excitet, quam vacuitas ab uberi perspiratione excitata, nihilque magis perspirationem excitet, quam exercitium & labor moderatus, ita famem extinguit plethora a perspiratione suppressa, seu a vita otiosa & inertis pendens. Et observatis *Sanctorii* patet eos cibos qui famem minuunt, ut viscosos, frigidos, boleti, caro suilla, fructus aucubacei, eos ipsos perspirationem inhibere; ergo huc referenda anorexia ab his cibis oriunda.

4. *Anorexia febrilis* Boerhaave aphor. 641. B. Est potius accidens quam morbus, & eodemine venit illa species, quæ omnes morbos inflammatorios & febriles comitatur, tum ob plethoram commotam, quæ his adjungitur; tum quia natura, negotio morbo desente, minus percipit ciborum necessitatem, & potentia tantum frigida, subacida appetit; unde in his casibus ægri videntur, cremoribus panis, oryzae, avenæ, potius cibandi, quam esculentis, quæ solidantur ab ægro, quæque deglutitis difficulter digerantur, ventriculumque gravant; sæpius enim in febribus impuris adeo saburra biliosa, putris, aut alia similis, quæ ventriculum & os obducit, adeoque & famem, & gustum tollit; ut in febribus puris phlebotomia, potus diluens, refrigerans optime convenit, ita in impuris cathartica primas partes tenent ad famem restituendam.

5. *Anorexia melancholica* Ramazzini de princip. valetud. pag. 757. Baglivi Pr. Med. lib. 1. cap. 24. §. 3. L.

Ambitiosi, aulici, mercatores, alique qui fortunæ, aut honoribus inhiant, qui litibus implicantur, qui jacturas bonorum aut honorum metuunt, vel experientur, necnon qui studio acris litterarum, scientiarum incumbant, huic anorexiæ sunt maxime obnoxii; quæ melancholica ideo dicitur, quia omnes velanias merore stipatas, ut erotomaniam, nymphomaniam, ipsam melancholiam, maniam, alioque morbos ejus ordinis comitari consuevit.

In hujus speciei cura plures falluntur Medici, qui languore ventriculi, oris amarorem, sitim circa horas matutinas, flatus & hypochondriorum tensionem videntes, malum vigile digressioni, tanquam principio morbi tribuunt, cum ipsa dyspepsia, ut anorexia, animi pathematis sit tribuenda; errant itaque illi, si nonstem stomachum catharticis & emeticis, calidifque medicamentis divexent, ac remedia moralia negligant. Optima *Anglici* hac de se monita loco citato videantur, & inde discant Scholastici non in omnibus anorexiis esse putredinem incusandam, nec species hujus morbi confundendas, ut theorizæ præconceptæ vellicemus.

Huc spectat anorexia ex delictitudine veneris *Galen* lib. 6. de levis.

6. *Anorexia biliosa* Foresti obs. 7. lib. 12. Ettmulleri cap. 2. *Inappetentia a bile* Riverii, &c. Bonet. Sepulchr. obs. 13. B.

Cognoscitur ex sapore amaro, nausea, & vomiti

vomitione bilis, calore, siti, ægrique temperamento.

Præmissio leni emetico, catharsis lenis est usurpanda in sero lactis, vel superbibendo aliquot libras aquæ mineralis acidulæ; dein ad acidam, ut syrupum granatorum, ribeliorum, limonatam deveniendum est.

Huc videtur referenda anxietas antricularis, seu quæ ætate sæpius adolescentes, virosque afficit, cum totius corporis calore vires frangente, agrypnia, urinæ rubore, siti, &c. in qua præmissa catharsis, refrigerante, ut ex aquis Alesiensibus, ad balnea, aut ad limonatam, emulsionem, potum nive frigidatum, acidus fructus, recurrendum.

#### 7. Anorexia cachectarum. C.

Est ea quæ scirrhus & obstructions viscerum abdominis, ut splenis, hepatis, ventriculi comitatur. Vide *Salmuth. centur. 2. & Bonet Sepulchret.* In omnibus quidem morbis, sed potissimum in cachecticis, inappetentia semper mala, semper suspecta, semper timenda: post curatos morbos, insperantes recidivam præannuntiat: nulla alia bona signa me exilarant, ait *Baglivus*, si desit fames.

2. Anorexia exaustorum Sanctorii Medic. Stat. sec. 6. *Frigiditas stomachi* Prosp. Alpin. de *Ægyptiorum* morbis. C.

Venus immodica nocet stomacho, unde rufus, apæpsia, status, hypochondriaca pathemata, moror, languor, macies, asthenia, perspiratio imminuta; inde lipitudo, palpitatio, hippus.

Maxime nocet venus ante digestionem peractam æstivo tempore, non satis cupita, frequens, stante corpore, apud senes, ab imaginatione, non a natura excitata, &c.

Curatur alimentis liquidis facilis coctionis, usui lactis, abstinencia a venere, usu ambaræ, cocolatæ, ginseng, &c. *Ægyptiis* hæc species familiaris est, & ad hypochondriacum duxit.

#### 9. Anorexia a saburra. B.

Ea est quæ a reliquis alimentorum indigestis, in stomacho hærentibus, crudis, provenit, sive quia copia major est assumpta, quam quæ viribus coëstribus digeri potest, tum quia qualitas dyspeptæ alimentorum cum ventriculi debilitate ad apæpsiam concutit.

Curatur abstinencia a cibo, usu potus calidi, cassæ, infuso abanthii, centaurii minoris, chamædrys, quæ si non revocant famem, ad cathartica, aut etiam emetica deveniendum, indicata a capitis gravitate vertiginosa, rufibus, nausea, stomachi pondere.

Piogua, oleosa, viscosa, tenacia alimenta anorexiam præ aliis excitant. Idem efficiunt potus frequentiores emulsionum, limonæ, hordeati, esus fructuum refrigerantium, si ætas calidior, temperamentum biliosum, ætas juvenilis permiserint.

#### 10. Anorexia mirabilis. Lingue abstinencia.

Est ea abstinencia a cibo & potu, quæ, vita superflua, per menses & annos perseverare dicitur. Sæpius est iocunda simulata; verum pitui-

cosi, maniaci, nymphomaniacæ, soporosi, paralytici, &c. diutissime inedia tolerant.

Mira est inedia totius classis amphibiorum, & maximæ partis insectorum; colubrum per duos annos in vase vitreo sine cibo servavi vivum; totam hiemem fomo ioculante glies, & per novem menses dormiunt omnes viperæ, serpentes, muscæ plures, &c.

Necessitas cibi urget in ratione, 1. *Jacturæ prægressæ*; 2. *acrimoniæ sanguinis*; 3. *scissibilitatis subiecti*.

Perspiratio nulla erat, nulla fordities, induriorum per annum in virgine *Vivariensis*; quam nihil totis hoc tempore comedisset asserunt. Ovum oleo illucum per plures annos servatur edule & incubatum aptum. Mures Alpini pinguedine sua & triplici omento hieme sustentantur. *Apoplectica* viginti dies nihil deglutire potuit: ex *Baccari*. Pater *Leaut* totam quadragesimam pluries transiegit sine alio cibo potuve, quam quæ ad sacrificium adhibentur. Melancholicus se Messiam esse putans, quadragesimæ sex dies tibo & potu abstinuit. *Ad. Bonenensis. tom. 2.*

#### 11. Anorexia Neophytorum. A.

Neophyti, seu nuper nati, postquam abstinuerunt a lacte per diem, mammis admodum omni fere bihorio sugunt; qui vero parcius, rariuque papillam apprehendunt, & non appetunt, illi ut plurimum sunt quante novimelle spatium ex utero sunt exclusi; illi scilicet fœnes ad lactendum, dormitabundi, papillam oblata statim dimittunt, & sæpius sine ulla causa, eadem fere die qua nati debuisse, ob-eunt. Si vero papillam avidè quidem labiis apprehendant, & exluserint, mox gemebundi dimittunt, illi non anorexia laborant, sed vel fræno linguæ impediuntur, vel tormionibus ob meconium retentum vexantur. In hoc ultimo casu ope mellis, syrupi rosacei, vel fœnnæ, necnon olei amygdalini, meconium evacundum est.

#### 12. Anorexia arthritica; Debilitas & languor ventriculi Sydenhami de podagra, pag. 484. L.

Est præcipuum ex symptomatibus quæ podagricos divexat cum jamdudum patoxyms debilitati sunt, aut cum liquoribus spirituosus olim indulsuerit, necnon cum emplastris repellentibus usi sunt, & topicis refrigerantibus ad dolorem mitigandum: nulla auxilia expertus *Sydenham*, ut vioum Gallicum, theriacam, nullum potentius invenit quam haustus quosdam vini *Canariensis*, non neglecto tamen exercitio, sine quo æger vix diu servari potest.

#### 13. Anorexia Stovartiana; Philof. Trans. N. 414.

Ex vulnere cystidis fellæ, bile per vulnus in cavum abdominis effusente, oritur anorexia, sine febre, cum alvi collipatione, agrypnia, borborygmis, doloribus admodum a flatulentia oriundis; nulla chylificatio, nulla digestio; hæc io homine observaverat *Stovartius* hoc de arte io caulis excitavit insa styli ope vesicula fellæ.

## XII. ADIPSIA, Manquement de soif. o'

Est suppressio cupiditatis potulentorum, seu  
scis imminutio, aut abolitio morboſa.

Quoniam magna pars esculentorum constat aqua, seu succo aquoso, quo licet competeatur, nunc fit ut plurimum sint mulieres; quæ sine potu valent & vigent; aut si viduæ siccæ omnino utantur, ut quandoque hydropicus præscribitur, potus necessitas se prodet: sunt tamen qui menses etiam activos, totumque quadragesimale jejunium cibis eo tempore licitis tantum utentes a potu abinent.

г. *Adipgia primaria*.

-Pendet a temperamento, piciutofo, frigidio:  
Meritififimus Academiae Tolofanae locuf D. M.  
vir morum fuavitate, ingenij cultura, eruditio-  
ne eximius, nunquam ficit, & mentis integros  
a potu ablinet, etiam aetate fervente. Novi  
olim mulierem quae quadragefimalis temporis  
intervallo omnino a potu ablinetate fitis defe-  
ctum e tam enet temperamento vivido, ad  
iram prono, praedita.

κ. *Adiposa symptomatica*.

Ea est quæ morbos soporosos, deliros, tussim, pleuritidem, simileſque comitatur.

Adipsia in morbis acutis, ut tritæophyæ ardente, ubi servor & siccitas potum imperare videntur, delirium significat.

Adipsia in pleuritide, peripneumonia, tribuitur vulgo tussi cujus ratione lingua continuo fero humectatur.

XIII. ANAPHRODISIA; *Asthenia* Pathol.  
methodic, *Impuissance virile*.

Est abolitio libidinis, seu appetitus iustusque  
veneri ad prolem generandam necessarii; unde virorum impotentia, sterilitasque.

Impotentia virorum datur, etque absoluta, cum nullo tempore, etiam adulti sine, & aliunde sunt, nequeunt coitum celebrare; 1. defectu erectionis; 2. defectu ejaculationis; 3. defectu seminis fertilis.

r. *Asphondylia* *a. paralyti*, Ettmüller de Læsa penis erectione, pag. 460. L.

Et est quæ pendet à paralyſi muſculorum  
 thoracis, qui iſchio-cavernoſi dicti nervos à  
 ultimis paribus offis ſacri accipiunt, & contra-  
 ctæ penem offis pubis apprimunt, unde tranſi-  
 tus ſanguinis per venam libi compreſſam im-  
 peditur, dum influxus in arterias penis per libi-  
 dinem adaugetur, inde cellularum corporum  
 cavernoſorum, balani, & teſtisque urethrae di-  
 ſtenſio, penisque rigiditas, & erectio ad coitum  
 neceſſaria.

Resolutio nervorum penis accidit in paraplegia, hemiplegia, morbis omnibus soporosis, sed specialiter ex casu in dorsum, os lacrum & vicinas partes, ut vidit H. Tanner centur. 6. obs. 11.

Adolescens Rhætus, salax antea, hoc morbo  
ab aliquot annis laborans, sensus venerei & mo-

tus erectionis omnino incapax; immerso aliquoties penē intra decoctum, seminis sinapis eum sanavit *D. Chaput*.

2. *Anaphredisia genervhoica*.

Est impotentia virilis oriunda ex spontaneo seminis effluxu inter actum deponendam, aut ad initium erectionis; accidit vero masturbatoribus, frequentes gonorrhoeas passis, immo qui nimiope veneri etiam purae indulserunt. De his vide *Brachysmatismum & Gonorrhoeam*.

3. *Anaphrodia magica* Kempfer, aeminitat.  
fascic. 7. pag. 658. L.

Apud Indos, & in specie Macassaros, non solum verbis & actionibus vanis, sed præterea mediis naturalibus, vel saltem effectum intantum sæpe fortientibus utuntur, qui procum v. adulterum ligare volunt & encervare: alibi hoc præstant per feram clausam, ligulam confectam, gutturum patienti infixum, vel ligaturam tollunt mingeudo per anulum spongiosum, vel per anam lapidis sepulchralis, similisque ineptissimis phylacteis; at apud Macasaros viri conjugem aut amicum ligaturus linteum ejus mensurae eruoere possunt: comburit; ex cineribus & pauxilla terra Priapi figuram fingit urina addita, iconem caute servat: siccam; quando sicca fuerit, nil ipsi ab amica aut conjuge fide timeundum: si vero humectatur icon, & marito & aliis tamdiu patebit adeus. Hæc fabulæ *compensæ*, qui addit in Oriente nullas novitas celebrari, quin adit saga, quæ singulari modo ligaturam & fascinum avertit. Illarum ligaturarum formulandum tradit *Virgilius* Ecloga oðava

Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores;  
Necte, Amarylli, modos & , Veneri, dic,  
vincula necto.

4. *Asaphrodia a mariscis* G. Cockburn Es-  
sais d'Edimbourg, tom. 2. artic. 27.

Impotentia coeundi ab haemorrhoidibus internis in muliere, quae conjugis amplexus tolerare non poterat, ob dolorem vaginae a maricis internis oriundum, & in coitu tantum incommodum. Sanatis maricis convaluit.

5. *Anaphrodites* ab urethra vitis.

D: La Peyronie refert exempla sterilitatis ob ejaculationis defectum, semine ob pravam directionem orificiorum in vesiculis feminalibus juxta verumontanum ad vesicam urinariam retrogredi solito. Vide *Dyspermatismum*.

*D. Petit* similem sterilitatem sanavit per incisionem similem illi quæ instituitur in lithotomia per magnum apparatusum instituta.

Adart Chirurgus observatione efficit de morbo  
vestro, ostendit erectionem impeditam esse,  
proindeque, ejaculationem a duritie (cirrhosa  
latente ubi concurrunt corpora cavernosa.

Curatio utplurimum per candelas cereas vel plumbeas sæpius in urethram immiffas, & aliquot horis quotidie retentas obinetur; inde fubfequitur uber proventus muci, vel ut alii putant, puris viscofi, quo liberatus ille canalis

patientior evadit, resolvuntur obstructions, lapillulis, grumis exitus paratur; & si concutatur litus mercurialis, quippe ea vitia gonorrhœæ syphiliticæ sæpius ortum debent, virilium organorum robur & libertas restituitur; perperam in his casibus paralytice remedia adhibentur.

### ORDO TERTIUS.

#### DISCINESIÆ.

**S**UNT morbi quorum præcipuum symptoma est debilitas, immunitio aut suppressio motus muscularis in organis libertati subditis, ut in artubus, lingua, aliisque, quæ immobilitas nec dolori nec sopori tribuenda sit.

A dys difficultat, & *kineeo* moveo, unde *kinesis* motio.

Ad motum muscularem requiritur, 1. motivum quod vel voluntatem vel cupiditatem excitet ad agendum; sic defectu motivi quiescimus, etiam si motrice facultate polleamus: 2. sufficiens impetus fluidi nervi a cerebro ad partes immisi, unde deficiente hoc fluido, ut in metu, leipothymia, cessat, aut imminuitur motus: 3. permeabilitas nervorum, quos hoc fluidum pervadere debet extra vel intra musculos, unde ligatis, pressis nervis cessat motus: 3. muscularium fibrarum flexibilitas debita cum elasticitate, unde si rigescant, aut si flaccescant, omnino nullus motus muscularis.

Multum erraverit Galenicus, qui fere omnes hos morbos laxitatis fibrarum, & humiditatis tribuitur; facultas etenim movendi pendet partim ab animæ, partim a corporis statu; anima scilicet a pravo nuncio, a metu, a terrore, deliquit, licet corpus bene se habeat, hanc facultatem vel amittit, vel exereat non potest per aliquod tempus.

Quoad statum machinæ, vel vitium est interbro, inde vero sæpius oriuntur comata, seu motuum omnium liberorum, sensuumque feriatio; vel deficit actio sanguinis arteriosi in ipsis cerebri vas; unde silent omnes cerebri functiones, & tunc præter sensum & motuum liberorum feriatiorem, languent etiam, vel fere evanescent motus vitales cordis & pectoris, ut in syncope.

At si in nervis, muscularisque hæreat vitium, excitat dyscinæsiæ, quæ partialis est morbus, in quo plurimi sensus in aliis partibus, plurimique motus, ut cordis, perseverant, unde differt hic ordo a sublequentibus.

Qui confundunt potestatem agendi, seu vires potentiales, cum intensitate & quantitate actionis, seu cum viribus actualibus, illi celeberram distinctionem educcinant inter vires oppresseas, debilitatem falsam, & vires exhaustas, seu debilitatem veram, quæ reapse distinctio summi est in Medicina momenti; cum enim vires sunt exhaustæ a phlebotomia, emeticis, catharticis, cavendum est maxime ne omnino vitales vires deficient; & e contra eum sunt oppressæ, gra-

vis morbus tolli nequit sine eorum auxiliorum interventu.

Natura, quæ est vera facultas motus & principium vitium motricium, potissimum vitalium, in statu sano, pacato, cum vires potentiales maximas possidet, vires actuales exiguas exerit & impendit, hinc pulsus molles, tardus, parvus, si conferatur cum pulsu hominis syncho vel crithophya a pluribus diebus oppressi, & cujus facultas quotidie minor & minor evadit.

Cognoscitur debilitas naturæ, 1. ex eo quod vires solito majores impenderit æger, nec debita digestionem assumptorum, ac interceptata corporis & animi quiete refarcierit; ut qui febre acuta, vel phlegmasia, vel convulsione, multum de fluidi nervi copia amisit; ea enim copia dependit proportionalis est intensitati & durationi motuum, numero & magnitudini muscularum movementum, ac durationi morbi; illi reapse debilitati sunt in ipsa facultate, etiam cum vires majores exerunt, quod patet ex lassitudine paroxysmos febris, phlegmæ, convulsionis subsequente.

2. Facultas debilitatur ab inedia, aut quod eodem recidit, a vitiosa assumptorum digestionem; quippe vires quotidie reparari debent per novam fluidi nervi sanguinisque productionem, verum deficiente bona chylosi, deficit sanguinis & fluidi nervi reparatio, ergo vires naturæ pari passu faciunt; & quantum in febribus & phlegmasiis degenerationes parum sunt, nec cibi ita nutriendi adhibentur ac in statu sano, in illis ratione detrimenti virium, & defectu reparationis earum naturam reapse debilitari necesse est.

In morbis evacuatoriis, cum omnes vires violentos quibus plerique stipantur, maxime si febre pyrexia committitur, magna copia fluidi nervi cum aliis humoribus evacuat, nec pari passu reparatur; crasis enim ea bona qualitas, quæ fluido nervo reparando requiritur, minime pari passu restituitur quo novus chylus accedit, unde licet eadem fluidorum massa in cachectici superfit, non tamen eadem sanguinis qualitas, & ut ajunt, spirituscaentia vel activitas remaneat, unde afluxibus quibusvis, maxime vero sanguinifluxibus, natura debilitatur & vires exhauriuntur.

In doloribus, tum propter repetitos nifus fibrarum, tum propter motorem animæ, tum propter uberiores perspirationem, vires naturæ absumi ceterum est; multo vero citius si febre aut pyrexia stipeatur, ut in pleuritide; si animi dejectionem secum adducat, ut gastrodyniam, cardiacalgiæ; & si sanguinifluxum comitem habeant, ut dysenteria.

Magna est in viribus æstimandis habenda sexus, constitutionis, & ætatis ratio; sunt homines torosi, quadrati, qui sub eadem ætate triplo, quadruplo sunt robustiores aliis, adeoque morbum eisdem gradus sustinent diutius cum multo minori lassitudine & debilitate; acciti tamen morbi febiles & inflammatorii sunt

in illis pro gradu roboris nativi intensiores quā in aliis, & in hoc casu æque cito debilitantur ægri. Pueri & senes multo minus robusti sunt quam adolescentes & in ætate consistenti potius; & cum ultra sexagesimum annum deveniunt, a phlebotomiis & catharticis multum infirmantur, qui trigesimo ætatis anno ea medicamina sine sensibili virium detrimento sustulerunt. Mulieres demum, potissimum delicatius educatæ, & mollioribus donatæ, ab evacuationibus & commoveatibus medicamentis turbantur & enervantur, multo magis quam viris quantum verò hoc in arte Medici metiri non datum est; longus usus, sagacitas & iudicium Medici hanc estimationem approximando tantum instituant.

Quantacunque sit actualis debilitas, auxilia medica, ut phlebotomia, emetica, cathartica, necessario in usum sunt vocanda quæ a morbo indicantur, modo sufficiens sit habituale robur; nec repugnat robur habituale cum debilitate actuali consistere, sed ut vulgo dicitur vires esse oppressas & non exhaustas.

Quo morbus est recentior & levior, eo robur superius majus est seu a robore nativo minus recedit, adeoque fortiora & pluries repetita evacuantia & commovenia auxilia æger sine periculo tolerare potest. Sic carus, si cardinalia cum actuali debilitate summa, quæ adolescentem prius robustum nuperime in vaferit, phlebotomiæ repetitur, si plethoræ carum inducat, non solum non exhaurient vires ægri, immo illas resuscitant, tollendo obicem circulationi & virium exercitio oppositum. Emetica & cathartica, si cardialgia a saburra stomachi pendeat, vires reparabunt, & stomachum hac sarcina prægravatum sublevent.

Magna itaque ratio habenda est temporis a quo morbus crepit, & roboris nativi quo polebat homo antequam ægotaret; nam quo morbus est recentior & robur nativum majus, eo fortiora medicamina tolerare potest, & eoque fortiora indicantur quo morbus actualis est gravior.

In morbis chronicis, ut cachexiis, fluxibus inveteratis, sero advocatus Medicus nequaquam potest valida evacuantia & commovenia adhibere, quæ in acutorum initio necessaria sunt; quia quo diutius morbus duravit, eo magis ac magis naturæ robur nativum imminutum est; circa quod tamen observare est, non tam vim ipsorum medicaminum absolutam quam eorum actionem in dato subiecto respiciendam esse, quippe idem medicamen quod hythericam exhauriat, ut pote valde sensibilem, & ipsi hypercathartismum excitaret, ascitico, apoplectico, phlegmatico præscriptum nullam evacuationem excitaret, nec prorsus robur ipsius pessumdaret; actiones enim medicaminum irritantium sunt subiecti sensibilitati proportionales.

XVI. MUTITAS; Græcis *Anandia*; Quibusdam *Aphonia*, *Anando*, *Alalia*, immo *Cæphos*; *la Mutité*.

Est impotentia voces articulatas edendi, seu sermonem proferendi.

Vox est sonus ab ore & larynge editus animæ sensus respondens, iisque significandis destinatus: Græcis *phono* dicitur, unde *aphonia*, seu vocis privatio, quæ a mutitate multum differt; datur enim mutitas sine aphonia, non tamen aphonia sine mutitate, nisi confundamus mutationem cum loquela.

*Mutitas* est motibus oris & linguæ exprimere verba cum sono ita debili, ut vix audiri possit; sic mutissanti quibus vox extincta dicitur, & ferme sine voce loquentes audiuntur, quia dum quis idiomaticè nobis familiari loquitur, nos ejus sensu partim ex loquela sonora, partim ex gestu, nutu, motibusque oris & linguæ ejus mentem assequimur.

*Aphonia* vera est accidens morbos soporosos, & syncopales concomitans, unde pro comate apud Hippocratem passim usurpatur; penderetque tum a. ex debiliore impetu aeris in chordas vocales expiranti, ut in summa tam totius, tam pectoris debilitate, necnon ex amplo vulnere pulmonis; a. ex inertia, immobilitate, erosione chordarum vocalium.

Chordæ vocales sonum edere nequeunt, nisi tendantur; tenduntur autem actione musculorum thyroideæ cartilagineæ ab arytenoideis abducentium, maxime vi cricothyroideorum, unde immisso digiti apice intra fossulam quæ distinguitur cricoideis a thyroideæ, ex pressione digiti surdus etiam vim vocis edite potest æstimare; hinc paralyticis illis musculis aphonia accidit, ut resedens nervis recorrentibus, qui ad hoc musculos tendunt, ut experiebatur *Galenus*. Idem accidit, si ulcere exedantur chordæ, si tumore adnato premanur, distrahantur, crassescant, adeoque immobiles evadant; his positis necessario sequetur mutitas aphonia.

Loquela est vox articulata, seu ope cavi narium & oris, uvulæ, linguæ, labiorum & dentium modificata, ita ut non solum ideis confusis referendis par sit, cui scopo sufficite elamoris, suspitum, risus, fletus, aliæque voces bruto & homini communes; sed ut ad ideas distinctas & syllabarum seriem hisideis respondentem significandas sufficiat. Muti itaque illi sunt, qui licet sonos pathematicis respondentes, & brutis communes edant, mentis suæ sensu verbis distincte efferre nequeunt; differunt autem muti a balbis in eo quod nullam syllabarum seriem pronunciant muti; balbi vero tantum quasdam syllabas, vel minime, vel imperfecte pronunciant; hinc differentia inter mutitatem, seu anandiam, & pelliismum, seu balbutiem.

Mutitas est impotentia vel sincera, vel simulata sermonem edendi, pelliismus recte syllabas omnes pronuntiandi.



Tyrocinio indigemus non ad vocem, sed ad loquelam; opus enim est ut Infans, imitator matris sedulus, pronunciandis diversis, quas audit, syllabis assuecat, illasque syllabas laboriose combinando, quæ sibi necessaria sunt, jam puer petere addiscat. Hinc muti sunt, & qui audiendi facultate carent seu surdi ab ortu, & qui stupidi & hebetes, imitandi vel querendi utilia, nullo appetitu gaudent, vel qui nulla sensatione, aut imaginatione ad loquendum incitantur, ut somno detenti, quique demum loqui omnino recusant, ut in melancholia silentis & ecclasi, similibusque morbis.

1. *Mutitas a Glossolysy. Paralysis de la langue. L.*

Lingua est certe primum loquelæ instrumentum, ea liquidem non solum litteras linguales dictas proprie effingit, ut L, R, sed cum dentibus dentales, ut D, T, S, Z, format, dorso suo sursum flexo gutturales producit ærem retrorsum repellendo, ut G, K, M. Interea visi sunt quidam elingues loquendi facultate præditi; illis liquidem vel ex oris basi, vel e lateribus oriebatur, aut inter loquendum exsurgens quædam caruncula linguæ vices supplebat. Si vero resoluta sit lingua, movere caret, nil ejus vices supplere valet; cognoscitur vero ejus resolutio ex eo quod ipsam ægrimovere, nec exorere valeant, licet mentis compotes; inde etiam difficilis deglutitio, & cibum in ore volutatio.

Hæc species sæpiissime apoplexiam sequitur, & hemiplegiam plenariam comitatur.

Curatur difficillime per drasticæ, emeticæ, sæpius ab eodem principio revertitur apoplexia; salagoga optima sunt pyrethrum, radix hellebori foetidi macinata, fumus Nicotianæ, hujus masticatio, usus internus castorei; mari, pulegii, salviæ flores, semina, sub formâ theæ; ducit ex aquis Bellilucanis.

Huic speciei affinis est ratione principii mutitas partialis a P. Remolis observata in quinquagenaria hemiplegica, quæ preces suas, easque ordine assuetæ recte proferebat; sed alia verba, ne syllabam unam, unquam pronunciare poterat. *Collect. Acad. Tom. 3. pag. 398.*

2. *Mutitas traumatica* Fabric. Hildani. B.

Qui torturam patiuntur non solum muti ob atrocem dolorem fiunt, quandoque torqueri pergunt, sed etiam in epilepticum soporem labuntur ut ipse vidi, & Fabricius Hildanus recte monet. Judices quandoque falluntur, qui eos illos voluntarie silere putant, hinc miseros crudelius torquent; ast a traditione sympathica nervorum recurrentium pendet illa mutitas; vidi miserum ex duriori tortura non solum obtulisse, sed etiam omnem sensum amisisse, cum rigiditate & vibratione spasmodica totius corporis, maxillæ constrictione, & dein febre acuta, quæ omnia diem integrum perseverarunt, metuente iudice, ne mors supplicium ultimum præverteret.

Observavit Thiermairius mutitatem biennem

ortam ex contusione colli, quæ præscripto cathartico demum sanata fuit.

Mutitas a nervis recurrentibus excisis non solum observata est a Galeno, sed ab aliis Auctoribus in brutis excitata, immo in scrophuloso homine ex resectis glandulis colli producta fuit.

Mutitatem seu aphoniam a vulnere thoracis ortam observavit Mannich.

3. *Mutitas a narcotico* Mangeri Bibliotheca Practicæ, de Paralyti, pag. 757. & 758. Vide Scholia Thiermairii. B.

Quibuscumque vinum seminiibus daturæ insectum præbuere latrones circa Monspelium, superveniebat mutitas, ita ut æger per unam alteramque diem, licet vigil, interrogatis respondere minime posset.

Ab opio in aurem immisso contra otalgiam, securam esse mutitatem observavit Galenus. Vidi ipse mutitatem similiter fugacem a bacis atropæ belladonæ, a radicibus hyoscyami ingestis; idem accidit cum temulentia, immo a vini abusu balbuties orta quotidie observatur.

4. *Mutitas elinguum* Mangeri Bibliothecæ de paralyti, pag. 748. de Justieu Mem. de l'Acad. R. des Sc. L.

Lingua exeditur ab ulcere in cynanche sphacelosa & pædanchione Actii, in varicella maligna, in ejus cancroso ulcere, aliisque casibus. Præciditur non raro ejus apex in epilepsiam insulso, unde mutitas, sed fugax; nam sanato vulnere, loquela restituitur, licet balbuties quædam superest. Immo recedere linguam docent Horstius, Thiermairiusque.

In linguæ locum inungit quicquidque basis oris, & sic elingues loquela gaudentes visunt.

De hoc morbo vide Rollandi Aglossopomographiam in Mangeri Bibliothecæ-Med. Pr.

5. *Mutitas a siccatate* B.

In febribus malignis ita arefcit, & exsiccatur, quandoque lingua ut ligni duritiem emulatur cum nigredine, inde loquendi impotentia, sed fugax.

Visa est lactans mulier a longiori lactatione hunc morbum transisse, & ablato alumnio loquelam recuperasse.

5. *Mutitas spasmodica* Sen. de scorbuti signis, c. 4. *Mutitas hysterica* Patholog. methodicæ. B.

Vidi alium, ait Engellmus, loquendi potentia orbatum, nonnullis apoplecticum quid esse existimantibus, cum potius organorum vocis esset contractio, vel quædam convulsio, cum æger ipse postea referret se eo loci dolorem & contractionem quandam sensisse.

Hæc speciei laborant non raro hysterice, quæ sibi fauces quasi vinculo contractas sentiunt, & aphonia aliquandiu remanent.

7. *Mutitas protracta* Menjocii de Mutitate Dissert. Silentium Plinii.

Ea est vel simulata quæ non infrequens apud mendicos, puellas, &c. vel a melancholia, aut ecclasi ortum ducit: nec rarum est videre melancholicos, attonitos, per annum & ultra silere omnino.

8. *Mutitas surdorum*. *Mutité des sourds de naissance*. Philosoph. Trans. VVallis. L.

Qui ab ortu surdi sunt, muti etiam sunt necessario, quia loquelæ tyrocinio destituti, non vero qui aphonî, etenim voce gaudent & sua cogitata non solum solerti gestu, sed etiam voce simpliciter exprimunt, quippe ingenii acuminem, necnon cæteris sensibus, ut visu, tactu, gustu, olfactu exquisitioribus gaudent. Illi A exclamant eum gaudent, I cum indignantur & irascuntur, O cum commiserantur, &c. deficit vero loquela seu vocis articulata distinctis ideis respondentis pronunciatio.

Artem loquendi primus surdus docuit *Amma-nus* Amstelodami, & *VVallisus* celebris Londinensis Mathematicus; hodie Parisiis hanc exercet *Perreia*, his autem principiis innititur.

1. Digno inter scutiformem & annularem laryngis cartilagineum sui præceptoris motum *ry-tones* explerent, ut sentiant discrimen simplicis hiatus a voce sonora, & soni acuti a suoogradi, nam digitus eo fortius premittitur, quo vocis tonus est altior & acutior. 2. Attente observet discipulus præceptoris labia, dentes, linguam, palatum, & enram speculo hos motus imitari discat. 3. Digno ante os vel ante nares præceptoris datas litteras pronunciatis ad-moto, sentiant num. a naribus aer emittatur, ut distinguat & imitari discat litteras orales & nasales. 4. Quamcumque litteram etiam errando proferat, præceptor applaudit, & pluries huic pronunciandæ assuecat discipulus antequam ad alias litteras transeat. 5. A. simplicissimis & facillimis litteris initium sumatur, ut a vocalibus, dein a labialibus antequam ad diphthongos, ad litteras explosivas, ad syllabas, &c. deveniat. 6. Singulas litteras quas recte pronunciare didicit, delineet, & delineati ab ipso jubeat præceptor, ut ideam delineatæ litteræ, cum idea motus organorum ipsam comitantis connectere discat, immo objectum delineatum coloribus expressum, vel præsens ipsi ostendatur, cum fieri potest.

Vocales sunt, a, e, i, o, u: diphthongi sunt vocales combinatæ, & sere successive pronunciatæ, ut ai, au, ei, eu, ei, oy, &c.

A gutturalis est, depressa maxilla inferiori, lingua exporreda, ore patulo fit.

E & I sunt dentales, glottide dentali angustata, labiali patula: ad I proferendum glottidis dentalis angustior, lingua dentibus imis prior.

O, U, VV sunt labiales, glottidis labialis oblonga, angustia in U minor, angustior quam in O.

Consonantes pronunciantur sine ulla vocali antecedenti vel subsequenti, more novæ methodi alphabeticæ; secus progressus discipuli multum retardantur. Sic M, F pronunciantur non *emmo*, *off*.

Consonantes labiales omnium facillime profertur, aer a glottide labiali fere clausa ad nares repercussio, cum levi explosione diducta hac glottide sic pronunciantur M, B, P.

Consonantes *mutæ* non explosivæ sunt *j* vel *g*

molle, ch-Gallorum, S, F, V: explosiva seu quæ paululum retentum aerem cum impetu explodunt sunt kappa seu C durum necnon G gamma, & dentales D, T: atque labiales B, M, P. Ad V & F sen o requiritur glottidis ex dentibus superioribus & labii infimo facta angustissima: diductis digito utrinque labiis si P pronunciare velis, oriatur F.

Nasales sunt M, N, Gn, quas naribus digito compressis numquam pronunciabis, cum ad eas profunderas aer e naribus potissimum erumpere debeat.

Linguales sunt L & R: pronuntiatio difficilissima est R, hujusce loco Alvernî super L profertur, & Gallo-provinciales: quique lingua crassiori sunt donati, sonum raucum hujus R loco edunt.

Gutturales sunt G, Gamma, Kappa.

Nasales sunt partim quæ naribus obstructis difficulter pronunciantur, ut B, P, M, D, T, F, G, H, K, N, Q, R, X. Cæteræ sunt A, E, I, O, U, C, L, S, Z, quæ maxime orales. Maxime asinis est D & T, B & P, S & Z, E & V; Gamma & Kappa; ex gradu asperitatis & explosionis ab invicem discrepant.

Gutturales asperitatem & stertorosam redduntur cum evulsa tremulus motus concussit, necnon si cum littera R conjunguntur, ut in voce *Graca*, magis asperæ & raucæ si inspirando pronunciantur.

9. *Mutitas verminosa*, Du Saulsi: D. Med. Cadomenis: Epist. Mss.

Puer ex amphimeris verminosa mutus evaserat; sublata febre multas perstitit; ast post aliquod tempus sumptis antelminticis triginti sex lumbriçis intra viginti dies deiecit, quibus rejectis loquela rediit, ita tamen ut littera B. difficiliter pronunciaretur. De hac specie vide *Alex. Benedicium Libi V. cap. 15.*

## XV. APHONIA; *Perte de voix.*

Est plenaria vocis suppressio, citra stuporem & syncopem: differt a *mutitate* quod multum vocem articulatam edere tantum non valeant, aphonî vero nullam: dicitur ab a privativo, & *phœne* vox.

Quoniam sonus ab ore editus, seu vox, pendet a vibratione chordarum vocalium, & ad hanc edendam concurrant, 1. aeris expirativi vis sufficiens, 2. contractio musculorum laryngis chordas illas tangentium, evidens est aphoniam adventuram esse, vel si ita debilis sit respiratio ut aer non possit sufficienti impetu chordas vibrare; unde videmus in gravibus pectoris morbis vocem vel valde imminui, vel suppressi, ut in rheumate, raucedine, agone, syncopæ, &c. vel si fluidum nervum ad organa prædicta laryngis non imittatur, ut in temulentis, attonitis, scilicet, ligatis, compressis nervis concurrentibus, ut in experimento *Galenî*, magnis aërysmatibus antæ vel carotidis, vel si ipsi musculi laryngis moveri nequeant, nec proinde

chordæ vocales tendi, ut in cynanche, angina, bronchocele.

1. *Aphonia melancholica*, Ephemer. Nat. Cur. passim.

Est ea quæ melancholiam attonitam, anæsthesiam etiam melancholicam comitatur, quas videt de sua loco: Ex amore occulto, Ephemer. Nat. Cur. Dec. 1. Ann. 6. Op. 7. ex terrore occulto, Dec. 1. Ann. 3. Obs. 121.

2. *Aphonia ab antipathia*, Ephemer. Nat. Cur. Obs. 143. 185.

Visa est orta a cancri costis & a crudis sanata: Collect. Acad. Tom. 3. pag. 163.

3. *Aphonia temulentorum*, Hippocrat. Aphor. 5. sect. V. Morgagni Epist. XIV. 34. 35.

Hanc vidi excitatam ab ossa, in qua folia hyoscyami cocta fuerant, maritus & uxor velut fatui hac ossa assumpta ne verbum proficere poterant. Quietiam assumpserant vinum semini- bus stramonii venenatum, simili modo rupidi & mente capti, per plures horas, sine ullo sopore, omni voce orbiati erant, ut Monspelii vidimus: Post emetica nihil utilius est in hoc casu accidit, ut aceto, oxycrato, &c.

4. *Aphonia catarrhalis*, Boneti Sepulchretum, Obs. 2. *Anginosa* Morgagni Epist. XIV. 37. *Extinction de voix*.

Homburgius catarrhalem aphoniam infuso theiformi vulnerariarum herbarum sanavit: in angina, phlebotomia & emetica, si indicata fuerint, vocem restituit.

5. *Aphonia aneurysmatica*, Morgagni Ep. xvii. 22.

In observatione Morgagni Aphonia pendebat a pressione tracheæ arteriæ illata a corde, bubuli magnitudinem adepto, & ab aorta similiter aneurysmatica bubulæ æquali.

6. *Aphonia traumatica*.

Ea est quam inferunt sectio, vel erosio nervorum recurrentium, sive artificialis a Galeno instituta, sive in exstirpatione glandularum colli in strumis, bronchocele, cancro, &c. idem tortura præstat & amplum pulmonis vulnus.

7. *Aphonia hyberica*, Ephemer. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 133.

Ea pendet a contractione spasmodica laryngis, & a respirationis interceptione aut summa tarditate.

8. *Aphonia paralytica*.

Ex hemiplegia ea vulgarissima est, & apoplexia recidivam potendit. Curatur remediis hemiplegiæ, nec non fumo tabaciore attracto, masticatione seminum aromaticorum, ut carvi, anisi, thymi, radicis pyrethri, electratione, oleo caryophyllorum.

9. *Aphonia pulmonum*, Boneti Sepulchr. de Voc. vitii Lib. VII. sect. 22.

Ab abscessu pulmonum, eorum vomica, stomatite, phthisi scirrhosa, thymo intumefacto tracheam premente, abscessu pericardii.

Cæteræ viciis interceptiones, vel fugaces sunt ac in Epilepsia, vel apoplexiæ, cari, syncope, symptomata, aut paraplexiam comitantur, & ad eam attinent.

## XVI. PSELLISMUS; *Agayement*.

Est difficultas vel impotentia quasdam syllabas litteraræ recte pronunciandi. *Ægri Bradyglossi, atipeli* Græcis.

Illud vero vitium vel ex vicio mentis, vel ex vicio organorum loquæ, vel ex vicio organorum vocis procedit. Ex vicio mentis dependet, cum vitiosa educatio huic ortum dedit, & a prava consuetudine dependet. Sic ut placeant, litteras sibilantes duras, ut S, pronunciant lenius ut Z, aut cum vi consuetudinis Vascones pronunciant *vivre* pro *libere*, & *angelus* quasi *angelus*; cum etiam per præcipitantiam inter loquendum hæsitant & offendunt adversus K, D, T, ita ut illas litteras vel omittant vel cum labore tantum proferant, quæ fusius in speciebus apperebunt. Natio, patria, affectatio, moribus, mala conformatio his aniam præbent.

1. *Psellismus ichnophonia*, *Hæsitatio* Latinis. *Agayement*, *Ægri bumbulones*.

Est vitium eorum qui in certis litteris pronunciandis illico sistuntur & hærent quasi offensaculo quodam vox inhiberetur.

Hoc vitio *Demofones* se liberavit lapillis in ore retentis dum declamaret. Illud vero vitium pluries locum habet dum litteræ gutturales ut K, G occurrunt, quas ut pronuncient, veluti singultiunt: videtur aerem in illis litteris proferendis explodi, & ad os mitteri, cum a velo palatino, uvula, & basi lingue paululum fuit cohibitus; difficultas ideo horum organorum movendorum est pshellismi illius principium, quæ difficultas repetitis conatibus & præceptoris periti auxilio potest vinci; rectius dicitur *ichnophonia*, ab *ichno*, reprimis, inhibeo, & *phona*, licet vox minime lædatur, sed solum loquela ægri; v. g. loco *Cæsar* dicunt *Caca/sar*, & *pro/sama* dicunt *samama*, ac cum impetu pronunciant, additis faciei distortionibus conatum loquendi designantibus.

2. *Psellismus rotacismus*, Gallis *Grassayement*, *parler gras*.

Est species qua littera R vel repetitur vel cum stridore & asperitate proferitur.

Hoc vitio apud Græcos Eretrientes, apud nos Gallo-provinciales endemic laborant, & hæreditaria: labe ab Azava Gallo-provinciali ad nepotes transire visa est. Sic affecto linguae apex deorsum versus basim dentium maxillæ inferioris affigitur in hac littera pronuncianda, qui deberet sursum ad palatum tendere & leviter tremere, basi vero lingue sursum versa æræ versus mares reprimitur: hinc rauca & aspera pronuntiatio. Vuigo tamen tribuitur linguæ crassitudini & tarditati. Hoc vitium puellis non indecorum videtur, quippe plures hoc affectant. Alverni rustici pro voce *malin*, pronunciant *marin*, seu R loco L: a palato male efformato litteram R vitiose pronunciari docet *Amman*; Chibonenses, quibus dentes superiores prominent, litteram R non habent, nec etiam Mexicanæ.

3. *Pfelleismus lamdacismus*. Lallatio Latini-  
bis. L.

illi lallare dicuntur qui litteram L vel inop-  
portune geminant & emolliunt instar LL. His-  
panorum, vel *la* Vascorum, vel loco litteræ  
R litteram L, ut *maliarum* pro mariarum pronun-  
ciant. Vidi sic affectos linguam habere tenuem,  
& os salivofum; sed huius vitii principium  
est accuratius investigandum.

Sunt qui litteram *ll* Hispanorum, vel *glis-  
lorum* non proferunt, aut in ejus locum voca-  
lem I substituant, ut *myse* pro *mogist*, quod vi-  
rium *jesacismi* nomine videtur Græcis designa-  
rum. An difficultas pronuntiandæ litteræ R a-  
deoque lamdacismus oriatur quandoque ab an-  
chiloproso, ut *Pater Fabri* iudicat, inquirent alii.

Qui ob linguæ laxitatem litteram L male pro-  
nunciant, linguam antroforum & sursum pro-  
ducere assuescant, ut id vitium emendent. Cum  
ob frenuli stricturam litteræ L & R male pro-  
nunciant, hoc vitium resecto, freno sanatur;  
idem vitium exsurgit a lingua nimis pondero-  
sa aut flaccida, littera scilicet L læditur, &  
non liquide exprimitur: Syloglossi debilitas e-  
tiam concurrit.

4. *Pfelleismus transtotes*. Latinis *Blasphæ*. Sy-  
rigmus Græcis, Occitanis *parler blés*. *Ægri*  
*Transfantes*. L.

Hæc est species qua cæteræ consonantes ex du-  
ris in molles sequuntur, & sic pronunciantur,  
*angelus* pro *angelus*, *capitolium* pro *capitolium*,  
*seta* pro *seta*, *gamma* pro *gamma*, & sic de aliis  
litteris asinibus, cujus vitii affectio quidam  
sibi venustatem loquendi conciliare putant.

Hoc autem a debilitate pronuntiationis apud  
pueros delicatulos ortum ducit sine affectatione,  
adeoque ætate crescente & conatu repetito tol-  
litur: dentium defectus etiam facit ut litteræ  
dentales, ut D, T, omittantur vel leniantur.

Qui D & T pro K pronunciant, depressa di-  
git lingua, ne ad dentes alliceret, rectam pro-  
nuntiationem restituit, quod animæ impê-  
rium in adultis potest. Nimis lata lingua bla-  
sus etiam facit, quod medicabile non est; in  
hoc casu T pro K pronunciantur & R de-  
struitur, quia linguæ apex non potest celeri-  
ter attolli & tremere. A lingua longiori TH  
Anglorum recte exprimi non potest, & muta-  
tur in S; nimis vero brevis mutat ipsum TH  
in D, ex *Heldero*.

5. *Pfelleismus habuitus*. Græcis *mutacismus*;  
& proprie *pfellisma*. Quintiliano *plateasma*. L.

Est difficultas recte pronuntiandi verba siccis  
labialibus constata, ut B, M, P, ita ut ille  
litteræ sæpius repetantur, aliarum locum in  
sermone ingerantur; geminantur.

Hoc vitium vel infantibus familiare est, quia  
dentium defectu, labra fere sola consonantes  
omnes effingunt, unde habuitus necessum est:  
aut dedecor eos qui tumulentius indulgent; ob  
tremorem enim labiorum & linguæ sæpius lit-  
teras labiales occurrunt quam par est: negligén-  
tia etiam in ore sufficienter diducendo apud

Labeones huic ansam præbet: quo autem regio  
quam inhabitant homines frigidior est, eo stric-  
tiori ore loqui solent.

6. *Pfelleismus mogilalis*. *Ægri mogilali* Aetio. L.

Est impotentia pronuntiandi litteras labiales  
quæ viciosa a balbis, minime a mogilalis pro-  
teruntur, vel harum loco aliæ substituantur.  
Sic cui labium alterum deficit, ut in labro  
leporino, vix pronuciare potest B, P, M, ma-  
xime si dentes simul anteriores desint; littera  
V loco F, vel F loco P proferitur, maxime si  
labrum inferius moveri nequeat.

Ad paraphoniam videtur referenda difficultas  
pronuntiandi litteras nasales ut M, N, Gn,  
neque gutturales ut G, Gr, R, K, quam  
quisque experiri potest, si naribus obstrudis eas  
proferre velit, quocirca ob vitium foni magis  
evidens nascitur inter paraphonias dimittimus.

7. *Pfelleismus metallisus*.

Est pfelleismus deauratorum, pidorum, &c.  
Hanc speciem multiplici observatione curari  
constat ex *Ill. de Haen*, part. 3. cap. 1. per  
electrifationem.

8. *Pfelleismus jotacismus*. L.

Est difficultas pronuntiandi litteræ guttula-  
res, quæ sunt *seta*, *j*, consonans & g molle Gal-  
lorum. Illud vitium familiare est apud eos qui-  
bus palatum est perforatum, quod in duobus ab  
ortu factum vidi, in aliis ab ulcere syphilitico  
ortum; in quo casu si quis incante bibat, po-  
tius per nares rejicitur; vox illa ingratiissima  
est, & apud rebus natos hoc foramen impedit  
lactis deglucitionem, nisi prælonga sit papilla,  
quæ ultra foramen extendatur. Lamina argen-  
tea solenter applicata & firmata potest hoc fo-  
ramen exacte claudere & huic vitio mederi.  
Illud vitium quilibet potest simulare.

9. *Pfelleismus nasæus*. *Le parler du nez*.

Est illud vitium in tono vocis, quod accidit  
ex narium obstruptione, ita ut quasi naso loqui  
vulgo dicuntur, illi sint præciso qui naso non  
loquuntur, seu apud quos deficit voci ille re-  
sonitus qui ab aere nares subeunte dependet,  
& qui harmoniam voci conciliat; illa vero na-  
rium obstruptione pendet a diversis principiis; v.  
g. a calculo intra nares genito, unde coryza  
multum pituitæ suppeditatur cum sensu corpo-  
ris peregrini avellanæ magnitudine. *Gabr. Clau-  
deri Collect. Acad. pag. 699. Tom. III.*

10. *Pfelleismus lappetatorum*.

Lagottoma est labium leporinum, ex qua vi-  
tiani pronuntiationem aliquot litterarum labia-  
lium credibile est; ut B, P, M, P.

11. *Pfelleismus a runcula*: Vide Runculam Au-  
chorum, Gallis *Grenouilliste*.

XVII. PARAPHONIA, a *para*, vitiose, &  
*phono*, vox: *Vito de la Peix*.

Cognoscitur hic affectus ex vocis vitio, seu  
insinayitate, adeoque est impotentia vocem sua-  
rem edendi tamen cantu, cum in loquela, ita  
ut vox sono suo aures lædat aut defasiget.

Re-

Rectius diceretur *enophonizans* a *Manjetis* de vocis vitiis *trachophonizans* nomen inditum est, quæ in potissimis speciebus vox est aspera. Differt admodum paraphonia a pssellismo quocumque sæpe combinatur; in isto affectu sola pronuntiatio, in illo vocis tonus vitatur.

Ergo *Galeno* dicantur *Trachophonizans* hoc vero genus Auctores nullo nomine proprio inter vitia vocis & loquelæ, vel ad brochum aut raudedinem referunt, seu raudedo hujus species est;

Loquela, si perfecta & concinna sit, est species cantus submissioris, lenioris, nec ab eo differt nisi quod cum minori labore, minorique laryngis conatu exeratur quam cantus; ut vero cantus jucundus sit, debent tria concurrere, scilicet *melodia*, seu sonorum jucundorum series; soni autem successivi tantum placeant, quorum est inter vibrationum numerus ratio quam minimis primisque numeris exprimitur, adeoque facillime a mente percipitur, ut demonstrat *Illustr. Eulerus* in suis *Musices Elementis*; secundo *symphonia*, seu concursus sonorum simultaneorum, non successivorum; soni autem simul auditi illi jucundi sunt, ut in melodia successivi, qui varii sunt & harmonici, seu consonantes; consensus enim in varietate semper placet, & ad perfectionem requiritur; in loquela humana adeo semper quedam consonantia inter sonum ab ore editum & sonum a cavo narium repetitum, vel reflexum; illi soni cum tono chordarum vocalium debent aliqualem harmoniam servare, licet remotam.

Denique ut in poetis, si pedum variorum series & ordo convenient, seu si breves & longæ syllabæ rite combinentur, modulamen jucundius evadit; ita si notarum brevium & longiorum recta sit series & combinatio, cantus suavior est.

Ratione itaque contrariorum paraphonia exsurget ex defectu melodiæ, symphonizæ, & rhythmi; adeoque si vox sit dissonans, tenuis, aspera, homotona; & quo plura simul vitia concurrant, eo vitiosior futura est, & ingratiore.

Larynx est potissimum vocis organum, saltem primarium; ex vitioso motu ejus musculorum, & dissonantia chordarum vocalium primario pendet paraphonia; verumtamen & nares, ut in nasitate, & os & nula, aliquæ oris partes vocis tonum mutant, adeoque vitare valent, ut in speciebus patet.

## 2. Paraphonia puerum; *Mut. de la voix.*

Subiecti vocantur *Hirguinalli* Latinis; *Tragionæ* Aristoteli.

Vox puerorum, antequam pubertatem attingant, est acutior, & magis dulcisiora quam vox virorum; unde castrantur apud Italos pueri cantationi destinati, ne scilicet vocem puerilem amittant, & *non castrato* idem significat vulgo ac cantor; mutatio autem vocis accidit circa decimum quartum ætatis annum; rarius circa decimum octavum incipit, atque nonnisi intra aliquot annos, ut tres, quatuorve perficitur; durante vero vocis mutatione, non evadit rauca, inæqualis, ingrata, scabra & discors; ita rauca

est sæpius, ut nequidem cantare valeant; minime suavis est, sed scabra; auribus insonda, subimicipi non consonans, sed inæqualis; mirum autem est quod ex mutatio eodem tempore accedat, quo semen fertile in testiculis producit, quo lanugo menti in barbam mutatur; & tanta est connexio inter generis feminis & vocis mutationem, ut si evitentur infantes, elisis, vinculis, vel resectis testiculis ante pubertatem, vox eadem in viris remaneat, que fuit ante castrationem; immo si jam adulti testiculis orbentur, vocem virilem amittant, imberbes evadant, & succulentis, adiposi, debiles, seu vere effeminati fiant, quod in gallis gallinæis castratis etiam observatur, ita ut capones vocem galli cum fertilitate deperdant.

Peracta mutatio, vox virilis sensim accedit, que est gravior puerili, simulque ex rauca evadit suavis, ex discordi concors, & quatuor vel quinque tonis musicis gravior, simplicior, fortior.

Ex dictis intelligitur ab eodem principio pendere virilitatem, barbam & vocem virilem; nec enim ulla sit vocis mutatio in fœminis; cum vocem fœminæ semper retineant, qualem sortitæ sunt a pueritia, validiorem certe, sed tamen minime a priori diversam; si vox humana ad tres octavas extendatur, & prima cum semisse pertineat ad pueritiam, intra illos limites excurrere poterit vox puerilis & fœminæ, diversæque illius intervalli tonos edere; ad gravior res octavas viris destinatas nunquam attingit.

Tonus vocis haud dubie pendet a tono chordarum vocalium III. Perrenii, atque tonus omnium chordarum ab earum diametro, longitudine & tensionis gradu est determinatus; cum itaque chordæ vocales in pueris acutius sonent, certum est quorum ex vi tendente divisa per chordæ diametrum & longitudinem esse majus quam in viris, cum acutius tōni, seu vibrationum intra datum tempus numerus sit in ratione composita ex directa radicum virium tendentium, & inversa tum diametrorum, tum longitudinum chordæ.

Chordæ vocales accedente pubertate magis crescunt quoad crassitiem & longitudinem, quam quoad tensionem, ex dictis necessarium est; crescunt autem verosimillime ab eodem principio; quo barba & quantitas feminis fertili, cum barba, fertilitas & vox virilis eodem passu procedant & recedant; verosimile est itaque auræ seminali tunc temporis genitæ, & per corpus diffusæ tribui posse, & vocis virilitatem, & barbam, ac feminis fertilitatem; datur itaque æstinitas inter solida chordarum vocalium, bulbos pilorum, barbam, & testiculos, ratione cujus adhæret liquor ille hisce organis, eaque expandit, nutrit, incrassat.

Suavitas toni in chordis supponit uniformem in earum toto tractu tensionem, æqualem crassitiem; & si de duabus chordis agatur, illæ chordæ debent esse ejusdem crassitiæ, tensionis & longitudinis; ut unisonæ sint, nisi crassitiæ & lon-

& longitudo a radice virium tendentium vindicetur; in chordis vocalibus eritque dissonantia, tum si alterius crassities in toto tractu non sit eadem, tum si crassities unius differat ab alterius crassitate, ceteris paribus; tum si sub pari crassitie & tensione longitudines sint inæquales, vel demum sub pari crassitie & tensione longitudines differant; horum vero alterutrum, vel plura simul reperiri in mutatione certum facit sonorum doctrina physico mathematica, & experientia, quæ docet in hoc morbo vocem rauam, scabram, discordem esse per aliquot annos.

*Curatio.* Tanti momenti censetur apud quosdam vocis infantilis conservatio, ut ipsi parentes eam filiorum suorum integritati & virilitati anteponeant; non parum itaque de genere humano metetur egregium monitum, quod hactenus experimento constat, salva virilitate & integritate, pueros vocem suam servare posse, & nullam pati mutationem: artificium itaque in eo versatur, ut impediatur ne vox quatuor vel quinque tonis gravior fiat; id vero obtinetur pueros impuberes statim atque mutationem incurrant cantare iubendo, seu eos sæpius in die ad cantandum excitando; quippe hoc exercitio magis ac magis tenduntur chordæ vocales in majori ratione quam si quiescerent, adeoque ratione tensionis plus servant de tono suo, quam ratione crassitie, aut longitudinis amittunt; si cantor exerceatur, cum ad tonum la vox delapsa est, in huius toni extensione eam detineto; si jam ad tonum sol descenderit vox, non quidem potest effici ut acutior evadat, sed impediri ne gravior fiat; adeoque mature exercitatus in repetito cantu juvenis per paucos annos, nullam unquam allatoniæ patitur, nisi quæ simili ætati annexa & immediabilis est; quæ vero a morbo convalescentibus accidit, ea restitutis viribus evanescit.

2. *Paraphonia nasalis* & *Nasitis* Latinis, vulgo *parler du nez*; subjecti *Nasillard*. L.

Vox nasalis illa vox invenusta, ad quam non satis, vel minime concurret nasus, seu quæ ex gutture & ore, non, vero ex faucibus editur, qualis efformatur si nares anticæ digitis, vel pollicæ velo palatino obturentur, ut penes nos est; & ut quidam Religiosi humilitatis gratia afficiant.

Ideo vox est jucunda, quia pars aeris nares pollicis subiens in cryptis sinuum frontalem, & antris Hygromi repercutitur sonum harmonicum edic cum glottide, & vocem pleniorē magis sonorem facit, ut fides sonum jucundiorē edunt; si supra capsum lineam elasticam resonent, quam si in aere solum vibrantur; narium itaque resonitū delictura vox est minus plena, magis rudis, & ingrata.

Si nares mucō nimio obducantur, ut in coryza, minus clare resonantiatione textus mollioris vomer & laminæ turbinate, angustiorque est aeris meatus, unde repercutitur versus fauces, unde etiam sonus nasalis ingratur; sic in organis ecclesiasticis ad sonum nasalem (*jeu de*

*nasard*) adhibentur tubuli ex plumbo fabrefacti, superne obturati, ad duodecimam lodianitiei, aptati. Qui uvulam nullam vel divivam habent, illi vocem clangorā, incouditam & nasalem edunt, ut litteræ K, T, P male reddant. Sunt qui L, S, R & CH ex hac causa male pronuntiant; a narium nimis patulis etiam hæc paraphonia deducit *Ammann*.

3. *Paraphonia catarrhalis*; *Bronchæ Græcis*; *Rauco* Latinis; *Gallis Enrouement*; *Ægri Rauci*, *Rauco* Græce *Branchialis*. L.

Vox raua: est gravis simul & dissonans, unde differt a *trángola*, quæ est dissonans, sed acuta.

Veteres uno ore asserunt rauedinem pendere ab exasperata superficie interna tracheæ arteriæ, & Neoretici hanc aspritudinem tribuunt glandulis miliaribus hujusce partis, quæ frigore interduerunt, ut accidit cuti, cum frigore asperina evadit; an res ita se habeat, dubito: si enim hñtulum Germanicum prius madescentem, injecta & volutata arena intus exasperem, sonus dein edictus minime gravis, nec raucus evadit, ut illi Physiologi contendunt. Verosimilius est vocem in broncho gravem evadere, ex eo quod textus cellularis muscularis laryngis cingens lymphā inspissata & cumulata est turgidus, idemque vitium in chordis vocalibus adest; hinc musculi chordas vocales tendere non possunt; hinc & chordæ crassiores graviorem sonum edunt, atque cum non æqualiter ubique, ambæque sic turgent, impossibile est alteram cum altera uniformem esse, unde dissonantia, maxime cum deficit mobilitas plurium musculorum, qui in loquela debent nunc chordas vocales laxare, nunc tendere, prout in eodem verbo pronuntiando quosdam syllabas altius vel remissius proferendas habemus, aut accentu gravi, vel acuto notandas.

Si eousque difficilis evadit musculorum laryngis motus, ut minime tendantur chordæ, vox extinguitur, & non nisi valido & sæpe dolorifico laryn- is conatu editur; quod cum accidit, acutus, stitiduloseque sonos producit; inde nassor, inferri potest non esse remolitas; ut putant alii, chordas vocales, sed tantum non satis tensas, defectu mobilitatis in musculis, cum rauedine laboramus, adeoque majori conatu tendi posse, & acutum resonare, quod non heret, si œdematosæ & flaccidæ forent.

Simili rauedine afficiuntur anginosi, & qui cancerum, vul ulcus, vel vulnus in hisce organis patiuntur; sed inde exurgit altera species, quæ non ita sponte perspicando sanatur.

Ex vociferatione etiam oritur rauco, sed fugax.

4. *Paraphonia ulcerosa* & *Ulcus gutturis*, *Laryngis*, *tracheæ*. L.

Est vox acra, clangosa, quandoque exilis & extindta, quæ pendet ab ulcere pulmonum, tracheæ, laryngis, imho pharyngis; nec enim signa distincta sunt quoad vocem in his diversis affectionibus. Nuper vidi mulierem ulcere laryngis & faucium laborantem cum febre lenta, & sputo

sputo purulento, cui vox fere deficiebat, non alia, ni fallor, de causa, quam quod inflammatio ulcerosa ad laryngem serpsit, unde sensio chordarum cum earum immobilitate; hinc vox debilissima, & quandoque clausa, seu acuta & rauca; & vox est phthisicos comes assidua. An corde vocales emaciatae exiliores tonum acutiorem reddunt? Ita se res haberet, si nullae aliae conditiones impedirent: si ulcere exedantur chordae vocales, inde aphonia & mutitas insanabilis.

5. *Paraphonia gutturalis, le parler du gosier.* L. Pluries vidi hanc speciem procedere a foramine palati, vel adventitio, vel connato, aut a velo palatino deficiente, eroso; quod syphilitidi saepe supervenit. Cognoscitur haec species faucium inspectione, potus & cibi in nares regurgitatione; recens nati hoc vitio affecti vix possunt lac deglutire, nisi pupilla nutriticis praelonga lac ultra foramen deducat; vox autem illa est rauca, gutturalis, & perficitur cum distortionibus faciei, quales ad nares obtinendas requirantur: vitium illud insanabile est, nisi possit, lamina argentea solenter apposta, foramen illud obcurari.

6. *Paraphonia stertens, vulgo Stertor; Græcis Ronches; Ronflement; Râlement; le Rôle.* L.

Est strepitus rauceus & asperitimus, qui inter inspirandum & etiam expirandum editur a dormientibus, apoplectis, & agonem ducentibus, necnon a quibusdam asthmaticis; in moribundis vocatur *Râlement*; in apoplecta quem nuper examinabam, cum os valde haret, observavi hunc strepitum fieri & tremulo motu veli palatini penduli; an in aliis casibus idem viget mechanismus, ignoro. Si chordae vocales ultra modum flaccescent, docent experimenta Ferreriana tunc nullum sonum editum iri; fieri potest ut viscosa phlegmata gutturis aerem expiratum partim intercipient, & similem sonum edant, ut gargarisando quisque imitari valet; horum omnium theoria haecenus in obscurio latet; vocatur Græce, & fere vernacule apud nos *Roncher*, quasi *narum* sonus.

7. *Paraphonia sibilans; Sibilus vulgo; Græcis Syryma; Gallis Sifflement.*

Est accidens rheumaticis, asthmaticisque, acanaginæ: crediderim effingi a rima quadam inter uvulam, vel velum & linguam efficta, ut a rima labiorum sit glottis brevis, quæ acute resonat, & sibilum labiale effingit; sibilus enim est vox acuta, qualis a chordis brevissimis, aut a calamis pollicem longis editur.

Vocem tenuem fieri, immo fere extinguji in vomitu bilioso, colica biliosa, similibusque morbis aliquoties observavi.

8. *Paraphonia a polype.*

Præcipuum polypi narum symptoma, & ex quo primario a Medicis cognosci potest, est singularis paraphonia quæ ad nasalem accedit successu temporis; cum excresecientia & naribus anicis, posticisve propendat, aut ossa narum luxat, & extollit, polypus sensibilis se prædit;

is non raro a viru syphilitico fovetur, ut nuper observavi. Curam vide apud *Heisterum*, alioque Chirurgos. Si polypus sit mucosus, is illinendus est sebo candelarum, quo solo medicamine, intra duos menses, sanatum paraphoniam & resolutum polypum vidit *Cl. Dumesni Journ. de Med. Nov. 1763.* alii succum heliotropii Europæi adhibent.

## XVIII. PARALYSIS, *Paralyse.*

Est unius tantum artus, aut articuli, ut manus, pedis, &c. immobilitas, sæpius sine sensu tactus, absque dolore.

Differt a paraplegia & hemiplegia ratione extensionis; a dysaisthesia, quod organum motus, ut musculus artuum, tantum afficiat.

Sedem ut plurimum habet causa morbifica extra cerebrum & medullam spinalem, nervosque, & eorum ganglia extra has thecas ossæas afficit; prout vero nervi muscularis solis, vel etiam cuti, prospectientes resolvantur, vel sola contractio muscularis, vel simul tactus aboletur, aut stupet, seu obtusus evadit.

Resolutio retinæ ad Amaurosum, nervi acoustici ad Cophosim, linguae ad Mutitatem, palpebræ superioris ad Caliginem, penis ad Anaphrodisiam referatur.

Ad sensationem omnino requiritur, ut fluidum nervum quod intra nervos continuo a cerebro ad partes movetur, vibrationem ressum a parte ad cerebrum patiatur: illud autem fluidum est vapor electricus, subtilissimus & elasticus; non potest itaque vel leviter premi nervus, quin vibrationem patiatur columna fluidi illius, non secus ac videmus fieri in filo ferreo electrificato, in ejus altero extremo præcipue papus lucidus, qui illico retrahitur, dum alterum sili extremum tangitur: si vero scintilla ex filo illo procul a globo vitreo educatur, quod levis attractus excitat; illico in vitro ipso scintillæ igne micant; si filamenta parva vapore electrico turgida supponamus, quod verumissimum est, facile intelligemus quare ex levi attractu impressio ad cerebrum ulque velocissime transferatur.

Ad contractionem muscularem influxus fluidi nervi in musculos movendus requiritur; verum si attendamus ad demonstrata *Borelli*; quæ evincunt vires maximas requiri ad muscularem motum, intelligemus non exiguas vires requiri in fluido nervo; ut motum muscularem exsequatur, quæ ad sensum tamen sufficienti; adeoque non mirum esse, si in artubus paralyticis persæpe sensus tactus insperit, cum contractio muscularis nulla viget, ob auctam musculi resistentiam, aut nervorum ejus majorem immobilitatem. In Hemiplegia rheumatica, seu quam fovet acrimonia rheumatismalis, sæpius vidi brachium, licet omnino immobile, muscæ repletum satius exquisitis sentire.

Ex 310. paralyticis vel hemiplegicis, qui intra decem annos Nosocomio excepti Bathoniensis



tes aquas diversas sub forma usurpauit, 37. facti, 151. subleuati, 45. nec melius nec pejus habuere, 42. pro incurabilibus derelicti & 12. mortui; ex illis 310. aegris 42. erant hemiplegici, quorum 4. sanati; 13. optime subleuati, 14. parum subleuati, 2. minime, 4. incurabiles, 3. inepti suscipiendo auxilio, & 3. obierunt: hæc *Jaane. Summers* observauit.

1. *Paralysis plethorica. L.*

Ea est quæ inducitur a pressione nervorum facta per vala sanguifera cruore turgida; in artubus aneurysmate affectis non raro hæc paralysis obtinet; alias vero cognoscitur ex plethoræ signis, ex suppressis catamenijs, hæmorrhagijs affluetis; usu vini, crapula fouetur: cora vero phlebotomijs, sobrietate, exercitio obcinetur.

2. *Paralysis rachialgia: Parafsi VVilhelmi Bonet Journ. de Med. Mars 1668. p. 305. C.*

Ea est potissimum inueniæ & brachia; incipit a stupore & formicationis sensu; subsequuntur rachialgici dolores atroces in abdomine, al. vi siccitas, aliaque. Hic morbus est familiaris artificibus; qui fumos arsenicales diversorum mineralium excipiunt, qui pigmenta trahunt, qui vino per lithargyrum edulcorato utuntur; de quibus vide *Rachialgia*, quæ sanatur, vel demulcentibus, vel drasticis catharticis; sed parafsi illa coratur emollientibus & leniter resoluentibus, sudorificis diluentibus; potus aquarum acicularum ab omnibus laudatur, balnea maris frigida, sudorem dein mouentia; thermæ sulphuræe profunt; nocent veto sudorifica calidiora, omnia nervina & exsiccantia, quippe siccitas nervorum cum superfluitate eorum sensibilitate est morbi hujus principium; sicca sunt articulationes, ita ut, cum ægrum motum recuperant, crepitum in genibus experiantur.

3. *Parafsi metallarum, Spangenbergii & Suzchlandii. C.*

Ea est species quæ rachialgia & arthritidem rachialgicam subleuat, vel eumca alternat; solus interdum motus partis affectæ sensu remanente, sæpe & sensus & motus evanescunt; redit vero plerumque pepodice sensus; circa tempestatis mutationes acutissimis doloribus manifestans, quandoque paralysis manū dolenter accipit; ad paralysis demum confirmata, ægri a doloribus immunes sunt; ex dolore acutissimo artuum paralysis per foribus adesse indicatur; cum hæc paralysis sæpe jungitur contractura. In rachialgia *vagari*: perimotus; sed sensus tactus remanet exquisitus, in *metallica* soli artus superiores paralyti continentur; in *scorbutica* artus etiam inferiores sæpe afficiuntur; in *arthritica* paralysis minus tenax est quam in alijs speciebus & electrificatione curatur.

3. *Paralysis rheumatica: scorbutica Ertmalleri. E.*

Ea est quæ doloribus arthriticis, rheumaticisve succedit; in hac superest sensus partis, simulque ejus rigiditas; exacerbatur aquis thermalibus salinis, scilicet *Bullucanis*; iuvatur aquis sulphureis de *Lamalon*, *Bugisli*, &c. maxime

vero lacticijs & electrificatione; ut sæpius expertus sum.

4. *Paralysis traumatica. L.*

Ea est quæ fit a vulnere, alicere, idu nervum partis solvenne; sic vidi a phlebotomia brachii, secto nervulo, pollicem & indicem sensu orbiri, quia nervus ille cutaneus sectus erat; si ressecentur nervi musculis propinquant, horum musculorum perit motus; in illis vero casibus evidens est electrificationem, & cætera auxilia incassum adhiberi.

5. *Paralysis serophulosa, De Haen tom. 3. cap. 6. obs. 16. L.*

Ea est quæ pendet a viru serophuloso, aot a glandulis nervos vicinis prementibus; raro oblevata. Curatur electrificatione, attenuantibus, martialibus; antimonio tenuissime trito, &c.

6. *Paralysis scorbutica, De Haen; Ratio mendicis, tom. 3. obs. 17. C.*

Ea est quæ a viru scorbutico, non vero quæ sic dicta fuit *Ertmalleri*. Illa vero electrificatione minime iuvatur.

7. *Paralysis Polonica, Stabel. de Plica Polonica, histor. 6. C.*

Ea est quæ resecdis imprudenter capillis trichomate affectis supervenit. Vide *curam trichomatæ*.

8. *Paralysis febrilis, Boneti Sepulchret.*

Ea est quæ morbis febrilibus acutis, necnon quæ plegmatis potissimum eruptivis, ut petechiis, supervenit; non rara est in morbis pectoris, immo empyematis sæpe comest, quæ brachium lateris morbo afficit.

Indicantur remedia morbo primario convenientia: in miliari frequens stupor, vel crampus accidit, aut paralysis nondum observata.

9. *Paralysis biliosa, Fernelii; an rachialgia? Parafsi a colica biliari Bianchi Fistor. Hepatica, par. 3. pag. 375. & 393. Parafsi VVesperii, VVilhelmi. Clar. Bonet Journ. de Med. Nov. 1761. pag. 407.*

Ea est quæ colicæ biliosæ succedit; a *Draliscurtio*, immo olim ab *Ægineta* recensita est, & pro sinibilibus quæ alie species indicator: in hac refrigerantia *Simos Pauli* suadet, & adhibuit feliciter *Forsberg* in adolescente extenuato, qui vesicantium medicaminum usu in pejus ruerat. Vide *Fernel. de Febris. lib. 2. cap. 10.* ejus observatio paralytum febrilem respicere videtur.

Ea species paralyticos rachialgiæ vegetabili sæpe succedit, & brachia afficit: in hac motus solus deficit, tactus exquisitus adesse, pars cito enaciatur, articuli crepant, eaque doloribus insenscentibus succedit.

10. *Paralysis a venia, de Haen Rat. Med. part. 3. L.*

Ea paralysis alterotrius brachii ob vomitum, vel similem pulmonis tumorem, quo ganglia thoracica, præsertim superior nervos brachiales ingrediens, comprimuntur; rupta & expurgata hac vomica sponte sanatur hæc paralysis; a simili pressione pendet stupor brachii in hydrothorace observandus.



11. *Paralysis nervæ*, Clatiff. Lorry de Melancholia pag. 188. L.

Ea, non in hemiplegiæ modum invadit, sed in ipsa sua origine aliquid convulsivj habet, & pristina mobilitas nervorum in dolores, vel ipsa sua impotentia sese spectandam præbet. Raro absoluta atque perfecta, cum mere nervea est, occurrit, hinc peraguntur sæpius actiones ab hominibus illa paralyti affectis, sed convulsive & quasi per saltum; vicum novi pluribus ab annis hoc malo affectum, post convulsivos halitus, laboreque assiduos, eo redactum, exacta in laborioso Magistratu ætate: hic, antequam cujusvis musculi possit motum in fines propolitos determinare, tremore universali corripitur, qui in parte mota ad usque convulsionem progreditur, nec abest aut oris deformis tortura, aut maxillæ motatio, unde blæsus balbusque incautus, & ridiculus pueri videatur. *Hæc Asthetæ.*

12. *Paralysis serosa*, L.

Ea est quæ a sero stagnante, & nervos emolliente, sive spisso & pituitoso, sive fluido pendere creditur; ab hoc quidem principio omnes paralytes oriri putavit antiquitas; nos vero eam vere serosam dicimus, quæ a sero exundante, mora in locis humidis, recenter exstructis, potu aquarum mineralium intempestivo, lotricibus, piscatoribus, similibusque attentibus supervenit.

Ejus cura pro cura Paralyseos generatim traditur, istic non repetenda, aut ex alia generibus mutanda, ut ex hemiplegia serosa.

**XIX. HEMIPLEGIA;** *Apoplexia Hippocraticis* Prorrhetic. l. 50. *Hemiplegia* Castelli Lexic. *Hemiplegia* Doveri; *Hemiplegia*.

Cognoscitur ex summa debilitate aut suppressione motus muscularis ac tactus, in dimidia laterali corporis parte, citra dolorem, ac soporem. Distinguitur ab apoplexia, aliisque morbis soporosis per integritatem mentis, aut saltem aliqualem libertatem functionum animæ. A paralygia quod alterutrum tantum latet, ut sinistram vel dextram, sensu tactus motuque libero careat. A paralyti per extensionem; in hemiplegia scilicet sæpius a capite ad calcem dimidia pars corporis motu, sensuque orbatur, adeoque visu, auditu, immo adest diastrophæ seu oris, in partem fangum distorsio, loquelæ impedita, linguæ distortio ad latus sanum, &c.

Principium proximum est restitutio nervorum in latere opposito, vel medullæ oblongatæ, vel medullæ spinalis circa cervicem, prout partes faciei & capitis læsæ sunt vel intactæ.

Perfecta est si immobilitas dimidii corporis, ejusque anæsthesia sit omnimoda: imperfecta si difficulter tantum moveatur aut sentitur.

Diffræpat ab immobilitate quæ in rheumatismo, arthritide, luxatione, fractura, &c. per dolorem; ab ea quæ in morbis febrilibus acutis, malignis, syncopæ accidet, per signa his

propria ut acutiem, universalitatem, &c. Hemiplegia scilicet est chronicus morbus, alterutrum latus tantum debilitans; successu temporis artus inferior roboratur, parum claudicat, superior diutius, magisque laborat.

Frequentissima species est ea quæ apoplexiæ sequitur, & in ea veluti salutaria, atque sanguinea utplurimum est, ut morbus cui succedit: Apoplexia enim pituitosa utplurimum mortem infert.

Immobilitas nervorum, utpote fluido nerveo imperviorum, est hujus causâ, si sedeat in origine nervorum: dimidiæ corporis. parti prospectum.

In hoc genere cum dimidia pars capitis corporisque linal afficitur, adest & latere affectu, cophosis, amaurosis, claudicatio, vel asthenia omnimoda; lingua vero dum exierit, & committitur labiorum, versus latus sanum trahitur, inde balburies vel mutitas: si vero caput immune sit, tunc resolvitur residui tantum corporis pars dextra vel sinistra, ita tamen ut brachium gravius afficiatur quam artus inferior.

Immobilitas fluidi nervei est semper relativa ad vim quæ propellit, & resistentiam quam in tractu nervi vel musculi experitur; eadem posita nervorum resistentia, si fluidum nervorum debita vi non immittatur, nec immitti possit, partes sensu vel saltem motu carent. Verum in hemiplegia verosimile est majorem esse in origine nervorum resistentiam sive ob compressa obstructa fila nervea, sive quia lymphæ viscidæ ipsos insarciens ejus est crassior quæ vim electricam extinguit, absorbet, & non transmittit.

Sic videmus filum ferreum vi electricæ transmittendæ sese impar evadere, si aqua humectetur; sic yaponæ stidus lithantracis, sulphurisve fumus electricitatem intrinsecit; quam multa certe nos latent circa illa vitia fluidorum, quæ sine obstructione mechanica valent fluidum nerveum intercipere: repetita hinc docuit experientia sensum & innotum restitutum fuisse artubus electricis, qui a multis retro annis nullum sensus vel motus indicium præbuerant.

Hemiplegia morbus est chronicus, raro sanabilis, ætati ingravescenti familiaris, sæpe a cerebro, vel apoplexia aut epilepsia ortum sumens, & in hisce morbis veluti criticus ac salutaris: quocumque plures annos vivitur; sed si lingua afficiatur, adeoque cerebrum vitio laboret, periculum est apoplexiæ recidivæ.

Curatio generica videatur apud Rivinum, Sæcunctum, ut theoria apud Wæsserum, Libr. de Apoplexia.

Insuffulta est theoria quæ serum luxurians semper & in omni specie dissipandum, & calidis ac exsiccantibus medicamentis expellendum proponit; nam dantur species in quibus & contra siccitas, & nervorum & fluidorum acrimonia corrigendæ sunt; initio quidem eadem generalia auxilia indicantur ac sit apoplexia, verum elapso periculo ne cerebrum insarciatur specificæ auxilia sunt adhibenda.

Præ-

*Praxis Deperi in Hemiplegia spontanea*, ut serosa, est frequens. 1. Applicentur vesicatoria brachio, cruri, tibie affectis. 2. Sumat æger per quinque dies mercurii dulcis, & cinnabaris, ana, gr. octo. 3. Sumat quotidie drachmas duas electuarii ex conserva abinthii. 4. Superbibat coctilegia aliquot tinctura ex angelica, eaula, foliis marrubii, abinthii, chamædryos, centuarii minoris, &c.

*Praxis D. Jansen de la Chene Journ. de Med. Sept. 1673.* Sumat æger quarta quavis hora salis alcalini volatilis, ut cornu cervi, gutt. vi. sudor superveniens promoveatur per aliquot dies.

#### 3. Hemiplegia transversa. L.

Paralytis brachii unius & pedis alterius lateris, dyentericis familiaris. *Conradi Fabricii Professoris Helmstedtensis Dissertatio 1760.*

Post dyenteriam malignam epidemicam adstringentibus & opiatis præmatute suppressam, hæc species hemiplegiæ frequenter accidit; jam convalescentes & orthostadii immobilitate brachii unius & pedis oppositi simul laborant, adjunctis tamen ut plurimum doloribus arthriticis; secus integram tactus facultatem amittunt: priores autem facilius sanantur posterioribus. Hujus phænomeni ratio latet in obscuro.

Curatio exigit 1. ut vires labefactæ restantur per analeptica & cardiaca, cum ex dyenteria multum fluidi nervi perditum sit: hæc vero corroboratio multum temporis exigit, & hoc singulare explicat, cur aliæ paralytes quo recentiores sunt eo facilius sanantur, ista vero quo vetustior. Laudantur essentia succini, liquor anodynus Hoffmanni; spiritus & salia volatilia ex sale ammoniaco, & cornu cervi parata, animi tranquillitas, & hilaritas commendanda. Paralytim læticia sanantur notat *Cassianus in Vita Patrescii*; ira aliam & terror (notant *Pariola*, lib. 2. cap. 4.) eam sanare. 2. Si phlegmaticus adultusque sit, æteris phlebotomia e pedis lacinia sanguinis feliciter immitte. 3. Tonus natus fibrarum restituitur spiritui vini camphorato & crocato cum oleo lambicorum terrestrium, & spiritu salis ammoniaci; unguentum nervinum *Sydeham Processu de Paralyse*, dorso & artubus affectis applicatum prodedit. 4. Spasmi concurrentes leniuntur pulveribus nitrosis, lumbicalibus, hezardicis, cinnabarinis, liquore cornu cervi succinato cum regimine diapoico; levis enim sudor in parte affecta sanitatis redeuntis signum est. Hæc sumi ex gummatibus aromaticis panis excepti, motus & frictus partium repetiti, embrochationes ex aquis thermalibus, & vestimenta hyeme calida & sicca omnino necessaria, referenda sunt.

2. Hemiplegia spasmodica. D. Pomme, *Essai sur les vapeurs*, obs. 3. An contrariata? L.

Ea supervenit magnæ cephalalgie in hypochondriaco; præiussit affectus soporosis, & illi co dimidia pars corporis, eaque dextra, riguit

(ait observator) & paralytica fuit; seu sensu, motuque orbatâ, quod oculo & auri etiam ex eodem latere accidit.

Suastr Medicus magni nominis juscula pulli, dein testudinis, serum lactis, aquas acidulas, nec non apientia, cathartica & antispasmodica; sed ab opiata cephalica ex millepedibus, calcarilla, pulvere de guttata, valeriana, enula campana, æger pessime habuit, unde confugit ad centum sexaginta balnea tepida, totidem juscula pulli, aut testudinis, ad clysmata ex aqua frigida, rhedam & equitationem, quibus convaleuit.

3. Hemiplegia syphilitica Astruc de Morbis venereis, lib. 4. cap. 11. §. 9. Journ. de Med. Oct. 1758. L.

Est hemiplegia flaccida cum paucis tactus sensu superstiti, aut paraplexia, ejus vide historiam. Video adhuc ægrum ea specie laborantem, omnino insanabilem meo iudicio; & alterum qui hemiplegicus a Medicis habetur, sed immerito, cum labore contractura artuum totius lateris sinistri cum rigiditate, genu anguloso, sensu exquisito, & crampis frequentibus, juxatur dura læta oleosis, & cito electrificationes experientur.

4. Hemiplegia scrophulosa Ill. de Haen tom. 3. cap. 6. obs. 16. L.

Ea est quæ a scrophulis nervos prementibus ortam ducit. Ea vero electrificatione diu repetita sanatur.

5. Hemiplegia arthritica Musgrave de Arthritide. Cap. 163. C.

Ea est quæ arthriticis, rheumatismo antea affectis supervenit, quæque a lymphæ aeri & viscosa produci censetur; in ea sensus tactus sæpe superest, artusque extremi paralytici rigent, difficile flexuntur, arescunt; est omnium frequentissima. Ingravefcit a sudoribus, calidis, thermis salinis; miscet a sero lactis, lacte asinino; maxime vero dolore arthritico reverent, ut accidit Prædici Fonbon Montpeliensi, qui dum insanabilis putabatur, dolore in pedibus oborto, subito sanus evasit; sequatur etiam morbus sulphureis balneis, & non raro perbellesanatur repetitis electrificationibus. Vide meam de hoc argumento Dissertationem *Alia Dissolutionibus, & Diario Occasionibus insertam*. Præter electrificationes sudorem viscosum ex digitis affectis deducunt, sebrum si adhuc mitigant, somnum conciliant, & sensum, cuilibet dicto, manui flexibilitem, & sensibilitatem restitunt. Bimeltri spatio ad machinam electricam sanitati integre restitutus est æger, quem memorat Ill. de Haen, P. 1. cap. 8. Obs. 1. & 7.

In hac specie contractura manuum noctu sponte remittit.

6. Hemiplegia exanthematica. Vide de Haen, Part. 1. cap. 8. L.

Ea est quam scabiei, achorum, seu tineæ, similiumque cutis exanthematum expressio, aut suppressio excitat.

Ele.

Electrisatio non solum hemiplegiam sanavit, sed etiam achores restituit.

2. *Hemiplegia purpurea Junckeri* Tab. 145. de Hemiplexia.

Est quæ miliari morbo supervenit, quamque fugacem exillimo; sed nec vidi, nec cujus historiam ullibi invenio.

7. *Hemiplegia ex apoplexia* De Haen, part. 4. pag. 245. obi. 6. 7. C.

In illa specie plus profunt aquæ Bellilucanæ quam electrisatio; utrumque læpe votis nostris deest; ast tentandum. Electrisatio aliquoties teste de Haen, hic successit. Vide Dissert. meam de Hemiplegia Inter desput. Medicas Ill. Halleri, tom. 1.

8. *Hemiplegia intermittens*. D. Cl. Chaptal, Doct. Mcd. Monf.; Illust. Torti de Febr. cap. 4. pag. 227. A. P.

Est species quæ singulis diebus accedit, & post aliquot horas recedit cum accessu quotidiana febris.

9. *Hysteria*. Quinquagenarius, per menses cephalalgiam levem expertus, vespere mense Julio 1760. calore uretici circa frontem afficitur, quo cessante simili dolore corripitur occiput, cum paulo frequentiore & pleniore; somnus nocturnus insomniis terrificis & vertigine turbatur; post octo horas accessus ille omnino desinit; verum hora quarta pomeridiana eadem symptomata revertuntur cum magna virium prostratione, & post quatuordecim horas desinunt, & sic deinceps per novem dies, eo discrimine quod post quartam diem non solum calor principis & dolor subsequens occipitis intenduntur, sed quod debilitas paralytica latus corporis sinistrum in quo vis accessa occupat, cum crisi distorsione ad partem oppositam; loquendi difficultate, labiorum tremore, & cruris sinistra tero immobilitate, quæ omnia accedente apyrexia evanescent, revertente pyrexia revertuntur.

Cura. Post phlebotomiam & cathartism primam non melius habuit æger, & a catharsi iterata reijus; verum ter in die hausto decocto ex kinkina, radice angelicæ cum pulvere de gutteta, & nitro, quarto die convalescit æger.

Accessus singulis diebus hora quarta vespertina accedebat, sexta matutina sequenti recedebat, cum pulsu non frequentiori quam in cæteris hominibus sanis, sed frequentiori quam in illius ægri apyrexia. Huic pyrexia additur pulsus tensio, extensio, ardor solis frontis persistens, sed ardor subito recedit, huiusque relicto succedit dolor lancinans solius occipitis; in accessu æger vix caput movere potest, & simoveat, experitur strepitum in collo cum frigore dentium. Arteria temporalis cum radiis minime consonabat; æqualis erat pulsus in radiali, verum in temporali inæqualis erat, per intervalla tremulus & leviter reduplicatus. Hic morbus a catharticis exasperabatur, licet materies biliosa multæ evacuetur.

9. *Hemiplegia traumatica* Tulpii, obi. 1. lib. 9. A. Ea est quæ a casu, ictu, vulnere, fractura

capitis ortum ducit. Si vulnus ipsam medullam spinalem in cervice lædat, mors subitanea supervenit, ut experientia saniorum quotidie docet; si inferior sit læsio medullæ spinalis, inde paralyxia oritur, non hemiplegia.

Coratur ut apoplexia, ab eodem principio oriunda, votis frustra impugnat electrisatione.

10. *Hemiplegia senilis*. Boneti Sepulchret. C.

Ea est quæ aëro luxuriante in cerebro produci putatur, qualis est quæ cachecticos, pallidos, cædematosos, frigidus, senes, vel sponte, vel post aquorum potum, balnearum abulum, ex suppressis effluxibus serosis, ortum ducit. Nec in hoc censu reponendæ sunt illæ, quæ apertis post longum morbum cadaveribus, serum quoddam in sinibus cerebri reliquunt; illud enim serum circa mortem effundi solet in quamcumque hemiplegia specie, & uberius est, quo tardius a morte cadavera aperiuntur.

Hæc species existit iterata initio morbi metuetica & cathartica, quibus succedant pisanæ diuretica, sudorifica, vesicatoria, setacea, ducia, balnea ex thermis salinis, diata efficiens, opiata, cephalica, nervina, capillitii frequens rasura, capitis frictio ex pannis siccis, scopulis setaceis, &c. tandem ad electrisationes repetitas confugiendum, quæ in recenti morbo nihil, in inveterato aliquid boni, præstare. Videjss curam apud Baglivi, pag. 214.

11. *Hemiplegia anæsthetica* Schenckii. C.

Quæ ab atelecto cerebri dependet, insanabilis, & lethalis: tres tamen paralytes puris anæsthetici solutas vidit de Haen.

12. *Hemiplegia ex epilepsia*. C. Vide dissertationem nostram de Hemiplegia per electricitatem curandam.

Insanabilis est omnino, sed non tollit ægros e medio, sæpeque cum inutilitate conjungitur; artus in ea specie nunquam rigeant, sed flaccidi manent. Vidi hemiplegias quibus superveniebant paroxysmi epileptici, in quibus nunc latus sanum, nunc vero ipsum latus hemiplegicum per intervalla tremore convulsivo agitabatur; illa vero species periculosior est, & mortem portendit non ita remota. Ex hac observatione liquet aucta vi fluidi nervi convelli partem jam dudum resolutam, quæ elapso paroxysmo epileptico rursus resoluta manet; ergo obstructio nervorum non ea est quam fingunt Scholastici. Vide Schenckii Observat.

13. *Hemiplegia simulata* Borelli in Disputationib. Chirurg. Halleri, Tom. 1. pag. 177.

Nobilis quædam mulier, quæ fortunam prius sanam, dein adversam experta, voluit testari num sibi veram amicam superesset, finxit se subitò hemiplegicam, & ita finxit ut phlebotomias, emetica, cathartica, ducias Bellilucanas, cæteraque remedia consuetæ adhibere non recuset, ac fere ipsum Medicum in errorem duxisset, nisi perspicax fuisset.

14. *Hemiplegia saturnina* Brendelii M. S. C.

Ea est quæ mineræ fossoribus, potissimum plumbum tractantibus, accidere dicitur. Vidi certe aliquoties paralytes tremulas manuum & brachiorum in hisce artificibus, verum hemiplegias ab hoc principio me vixisse non memini. Verum a rachialgia in hemiplegiam perfectam cum mutitate & athenia lapsam vidi Ill. D. De Mandajors, parisiæ Numismatarum Academiæ Socium; sed an rachialgia saturnina laborasset, non rescivi.

In thermis Bathoniensibus ex 310. ægris paralyti vel hemiplegia affectis fuere 57. sanati, 151 sublevati, 45 qui nullatenus mutati, 42 insanabiles pedibus habiti, & 12 mortui. Ex illis 310 erant 42 hemiplegici, ex quibus 4 sanati, 27 sublevati, 9 vel insanabiles vel non mutati, & 3 obierunt.

## XX. PARAPLEXIA; *Paralysis universalis* Auditorum; *Paraplexia*.

Est summa debilitas sensus & motus vel alterutius in dimidio corporis transversim sumpti, vulgo extremorum inferiorum, cum enuresi continua, anaphrodisia, &c.

Causa est immixta fluidi nervi per imam spinalem medullam circa immo dorsum vel lumbos obstruam, aut quovis modo læsam; inde fit ut homo lædo semper affixus maneat, unde quantum differat ab hemiplegia quisque videri; si tamen imperfecta sit paraplexia, æger pedibus paupis insitit & claudicando progreditur, nec urinam involuntario mittit.

1. *Paraplexia rheumatica*. *Paralysis scorbutica* Ettmuller. pag. 440. C.

Nauta quadragenarius, ex tertiana ante annum habita paralyticus omnibus artibus paulatim factus est; cruribus, genubusque molesta fornicatio inest, brachia & dolescent & marcescunt; perpetuo sudores nocturnos patitur, veluti plumbeam molem circa umbilicum persequitur, ubi tamen nullus tumor; digiti manuum pedumque dolent, vires omnes collapsæ, facies plumbea.

In hoc mense Septembris optime successit electrisatio, quæ estate nihil profuerat, D. de Haen, obs. 12.

2. *Paraplexia sanguinea* Junkeri, tab. 115. *Paraplexia* & *Apoplexia partialis* quibusdam; *paralysis corporis inferioris* Fel. Plateri. A.

Est ea species quæ plethoræ vel impetui sanguinis ejusque anarthritis tribuitur; quod judicatur ex calore, rubore faciei, pulsus plenitudine & velocitate, præteritis sanguinem moventibus vel augmentibus. Tribui solet distentioni reit vasculosi quo circumdatur medulla spinalis; cerebrum illæsum est, unde differt a cæto, apoplexia: morbus est multo periculosior & minus diuturnus quam hemiplegia. Curatur initio ut apoplexia sanguinea, deinceps ut hemiplegia.

Paraplexia etiam dicitur hic morbus, licet quædam capitis functiones lædantur, ut memoria, auditus, vel visus, vel loquela, modo parces infirmæ sint resolutæ, si morbus ab apoplexiæ insultu inceperit, in quo casu ipsam cerebrum

affici haud dubium est. Sic *Forestus*, *Fernelius* vocant paraplexiam eam paralysem universalem quæ apoplexiam sequitur. Vir robustus & eufarces catharism expertus eadem die, eaque frigida & pluviosa in domo exierat, frigus passus incidit subito in paraplexiam imperfectam quam per multos annos vixit; hinc & inde claudicans & ægro pedes trahens, nec ulla profueret remedia.

3. *Paraplexia a spina bifida* Huxfan Philosoph. Transact. an. 413. March. 1730. Tulpins, cap. 29. 30. *Hydrarachiitis* Morgagni. A.

In casu *Huxhamii* infans recens natus imperforatum gerebat os sacrum, adeoque supra illud os vagina medullæ spinalis incutimur ac pugni periculis magnitudinem, & extrema inferiora motu erant orbatæ ac decussata. Verum in casibus a me observatis, non solum partes infra tumorem spinæ posita, verum & superiores sensu & fere motu erant delituitæ. *Vide Anasthesiam*. Notum autem est hunc morbum esse cito lethalem, citius vero si tumor aperiat. Huc paraplexia ex gibbere *Biblinh. Med. Manger.* pag. 760.

4. *Paraplexia traumatica*. Fel. Plater. cap. 3. Morgagni Epist. LIV. ubi plurima exempla, & Boneti Sepulch. Sect. 3. D.

Nihil est frequentius hoc morbo in eis qui ex alto delabuntur, sive incident in spinam dorsum, sive eam vehementi trunci inflexione distrahant; quotannis Nosocomium Altesienle ingrediebatur paraplegicus unus vel alter, qui ex morbo, cujus solia ad homines colligantur, lapsus fuerat. Extrema sensu, motuque subito orbantur, urina sponte effluit, raro alvus, successu temporis nates gangrænalescent; hæc species ut plurimum lethalis est.

5. *Paraplexia rachialgica* Riverii, observ. 93. cent. 2. nomine *paralytes spuria*. C.

Recte notat post *Trallianum*, l. 7. c. 16. & *Foress.* lib. 10. obs. 97. dari paralytes quæ exaccantibus & calefacientibus exasperantur, humectantibus vero & laxantibus curantur, quæque non a pituita & sero nervos laxante, sed a bile, ut aiunt, eos excicant & premente producantur. Illa mulier cujus historiam refert *Riverius*, patiebatur motus omnimodum impotentiam in artibus infimis, sed non omnimodam sensus privationem; hoc autem singulare fuit, quod cum tibis a ministris extendebantur, statim vel rigescebant, vel convellebantur cum quodam in ipsis hypochondriis motu; præterea ægra doloribus vagis, fugacibus potissimum, in thorace erat obnoxia, quæ omnia rachialgiam satis manifestant. *Vide Rachialgiam*.

Huc videtur attinere paraplegia ex terrore & ira oriunda, & altera ex doloribus rheumaticis. *Vide de Haen, observ. 121 & 20. Tem. III.* ubi cum modico successu chestillationem adhibuit. Extimio vero effectus quondam vidi apud militem simili morbo prostratum.

6. *Paraplexia intermitteus*. Obs. D. Cl. Chapral. D. Med. Monip. p. cerelebris. Torri de Feb. c. 4. P. A.

D D

E E

Est species paralexia artus totum isoperes motu musculari & sensu oimode orban-  
tis, cum harum partium phlegmatia & frigiditate ac pyrexia, quæ omnia symptomata post aliquot horas omnino evanescent, sequentidie reversura, & sic deinceps.

Historia. Mense Julio 1756, infans quatuor annos natus corripitur dolore utriusque talia vivido, ut oculis auxiliis levare posset; et post semihoram pedibus, tibisq; intumescens sedatur dolor, & tunc illi artus ac erura omni motu musculari, sensuque orban-  
tis intumescunt, frigidæ ac tactum Medici, dum ceteræ corporis partes calefcebant solito magis; post septem horas ea omnia symptomata evanescent, & infans omnino sanus est; verum sequentidie eadem hora revertitur dolor in talis, tumor pedum huic succedit cum paralyti perfecta horum extremorum, eorum frigore, oedematia, febre, quæ intra septem horas recedunt, & sic deinceps; sed sensim minora usque ad octavam diem, qua medicamentis cessit morbus.

Curatio. In intervallo secundæ diei purgatus est ex manna & syrupo Glauberiano, & vomuit; iterum purgatus est sequenti intervallo, atque deinde usus est ter vel bis in die opiata ex kinkina & radice pæonia, accessus tum retardati, tum breviores sensim fuere, & sic æger omnino convaleuit.

#### 7. Paralexia syphilitica. C.

Vir quadragenarius a multis retro annis syphilitica pudendorum ulcera passus erat; yperphesia imprudenter gonorrhoea virulenta, & hydrargyrosi perperam adhibita, successit aliquot abhinc annis paralexia imperfecta, ita ut vix pedibus insistero posset. Quasi Chirurgus semicupium ex aqua liquore saturni dealbata, inde paralexia perfecta evasit. Tentavi usum sublimati corrosivi per duos menses more Illust. van Swieten; sed frustra: frustra etiam in hac specie alias vidi hydrargyrosim adhibitam.

#### 8. Paralexia equina.

A comestio phellandrio & simul deplutito euculione ejus hospite, equi multi apud Suecos incidunt in paralexiam, infecto illo per spioam medullarem, ut vulgo creditur, exitum quærent: vide Iter Scanicum D. Linnæi pag. 184.

### ORDO QUARTUS.

#### LEIPOPSYCHIA. Défaiillance.

A *Leipo*, linquo, & *Psyche*, animus, quasi animi deliquia.

SUNT morbi quorum præcipuum symptoma est virium vitalium notabilis imminutio, adeoque pulsus & respirationis debilitas.

Vires vitales sunt vires cordis, arteriarum & pectoris; ex horum organorum motu mensurantur, ita ut quo pulsus simul plenior, velocior & firmiter, eo fortior sit, quo respiratio similiter amplior, velociorque est, eo fortior. Sed

vis actualis pulsus & respirationis maxime discrepat ab eorum viribus potentialibus, seu a robore facultatis vitalis; quo eorum robur facultatis majus est, eo parcius vires suas impendit, nisi urgeat necessitas. Sic homini sano & pectus pulsus est minor, mollior, tardior, rariorque multo quam eidem labore violento, pathemate vivido, febre, exercitiis jam debilitato.

Omnis origo virium est in cerebro, inde enim fluit liquidum cerebrum ad cor & ad omnes musculos corporis, adeoque ad omnia organa motus tum naturalis tum liberi; in cerebro residet motor illius fluidi, qui licet vitalibus motibus assiduo invigilet, eosque nunc intendat, nunc remittat, vix unquam eos intermitte, quasi eorum necessitas ad vitam conficiat; aut ille motor in quibusdam circumstantiis, in quibus ipsa vita est aliis bonis, ut salutis, honori, pro diversis judiciis aut præjudiciis, postponenda, opus vitale ita negligit, ut vili sint qui a gravi pathemate affecti vitam cum morte commutaverint: Vide *Dissertat. Ill. Nicholli de Anima medica*, Quotidianum est in gravi morore homines, potissimum sequioris sexus, animo liqui omnino, & ægros, qui soli sibi reliqui omni spe abjecta mortali forent, adstantis hortatu, præsentia fulevatos, moniti ut bono animo essent, refocillatos esse; quotidie Medicus, cui æger confidit, ex prognosi gravi metum ipsi incutit, ex quo pulsus summe debilitatur; ex aspectu læto, animum ægro addit, ex quo pulsus antea debilis, illico resurgit & roboratur. Circa imperium animæ in organa vitalia legi meretur *Illust. Kleibsch de Morbis animi*, p. 35. & segg. item *Englivi, de Morbis animi & Fianus de Imaginatio*. Illi Materialistæ nimis favent, qui omnes actiones animæ ex prævia fibrarum cerebri dispositione determinari putant; nonne corporis & animi differentia hinc sit evidens; quod animus, ægre quidem, at possit tamen actiones edere contrarias illis in quas corporis conditione fertur, nonne qui virtutem voluptatis anteposuit; vix ignorant Epicuri de grege porci.

Virium cordis imminutio, quæ a corporis mutatione dependet, est vis fluidis vel organis tribuenda; si deficiat fluidum nervum vel vaporem lechifero destructurem, ut in mepticis locis, vel longa inedia, gravi labore morbo, evacuatione immodica exhaustum, vires deficiunt quæque videt. Organa fluido nerveo possunt transmitti denegare, si prematur cortex cerebri, ut in comatosi morbis, si in ipso nervorum tractu sit læsio, si in cordis ipsius textu sit obex. Mors cordis est æquilibrium ejus organi cum resistentiis ab eo superandis, inde & motuum vitalium languor, debilitas, quod vires ejus morrices non satis superent cordis, vasorum, sanguinisque promovendi resistentia. Hinc duplex origo debilitatis in morbis cordis, hinc multiplex leipopsychiæ principium, cõtplexque curandi modus.

Retardato maxime per eroris motu minuitur calor, & frigus artus occupat: quod uno alterove

torove gradu auctam subito sensus acerrime percipit. Si cordis impetus, qui pulsationem ejus facit, cesset, licet perisset ejus ventriculorum systole & diastole, sine motu conversivo ad costas, circularis motus perseverat quidem, at nulla in arteriis pulsatio percipitur, nec proinde excitantur in cerebro illae pulsationes quae ideas vigilantibus proprias determinant; inde somnus vel somni imago syncope, apoplexiamque concomitant: error debilis adactus in arterias cutaneas earum asfrictus non superat, nec proinde eas subire valet, sed per majusculos ramos in venas procedit insalutatis capillaribus, hinc cutis pallor, frigus atque anæsthesia.

Notari dignum est primos musculos qui a frigore rigescunt, esse musculos mandibularum: tollentes, frigore hiberno mandibula contracta retinetur, ut verba proferre possimus; frigore synoptico idem sæpius accidit sine influxu spasmodici fluidi nervi ad hos musculos; inde rotas cernimus in synopca mandibulas libi ita appressas, ut ægerne deduci possint ad potus cardiacos hauriendos: necad morbos convulsivos morbus hic recensendus est, cum cætera omnia symptomata contrarium suadeant.

**XXI. ASTHENIA;** a Græco *astheneia* debilitas; Latinis *Langueur virium*; *Debilitas habitualis*; *Epuisement*; *Feiblesse des membres*, *des nerfs*.

Est debilitas omnium artuum, superfluit actio-nem vitalium tenore, seu major est debilitas musculorum liberrati subditorum quam ex debilitate pulsus foret expectandum; sicque differt asthenia a syncope & apoplexia, in quibus musculi artuum quidem debilitantur maxime, at pari passu debiles sunt motus vitales.

Cognoscitur asthenia ex pigritia ad actiões etiam consuetae & necessarias, earum raritate, tarditate, cum membrulis interjectis, tremulisque conatibus; ex sensu gravitatis artuum, ex prostratione corporis, maxime vero ex supina ejus positura, nam illum sicum affectant ægri debiles, in quo minima virium impensæ requiruntur, major autem requiritur ut in latius alterutrum decumbamus, quam ut resupini jaceamus; majorem autem in trunco erecto vel inclinato, quam ut toto corpore horizontali decumbamus; hinc signum maximæ debilitatis, si ægri versus ima lecti rejecto pulvinari delabantur contra assuetudinem, si sponte sicum non mutant, si vocatissimam tantum & rardam loquuntur; vox est potissimum debilitatis indicium, unde qui se debiles simulant, voce tenui, invalida utuntur; major est debilitas, si e lecto surgere nequeant ad alium deponendam, urinamve mittendam, qui sinu munditie licabant; de hoc morbo ferre silent Auctores, tum quia illum pro mero accidente morbos omnes fere concomitante reputant, tum quia theoriam virium pauci norunt, aut a veris principiis repetunt, licet ea omnino in praxi sit utilissima.

Summi momenti est in praxi astheniam a virium vitalium debilitate distinguere; prior enim a morte multo magis distat quam posterior, adeoque minus multo ominosa est.

Differt hic morbus a typho & a paraplexia signis horum generum propriis, nondum tamen satis distincte propostis: differt a lassitudine, quod lassitudo sit sensatio inmensa complicata cum asthenia.

Qui asthenia laborant, dolores vagos sed leves in artubus experiuntur a quovis motu, quia sensus exquisitioris sunt ob debilitatem.

1. *Asthenia Pannonica;* *Langueur Pannonicus* Tob. Coberi & Thomæ Jordani de phænomenis pestis; *Morbus Hungaricus* Mangeci Biblioth. Medic. Pr.

Est debilitas spontanea castrensis, seu epidemica, militibus potissimum familiaris, quæ, paulatim ineptitudinem ad functiones inducens, non prius malitiam suam prodit quam homine jam prostrato diurno decubitu, aliando quasi mutatis præsidis, victor evadens ad mortem deducat. An a typho differt?

Hic morbus, qui perniciosissimus dicitur, ita metaphorice describitur ab Auctoribus, ut eum a consimilibus generibus discernere difficillimum sit; plures autem varietates hujus tradit *Colemanus* scilicet 1. A carnibus bubulis, duris, sole potius quam igne coctis, quibus utuntur milites, unde cardiacæ, colicæ, nausæ; 2. Ab aquis paludosis, limosis, potu assumptis; 3. A visis & cerevisiis turbidis ac læsculentis; 4. Ab animi commotione, indignatione, &c. 5. Ab aere calidiori & sicciori per æstatem.

2. *Asthenia Virginica* Coldenii de plantis Coldinghamensis.

An a calore regionis pendet hic morbus? Aque racemose radices in hoc specificè judicantur.

Calore assiduo ejus etiam gradus qui apud nos æstate est familiaris, ut 25. circiter graduum, vires exsolvi notissimum est; inde per vigiliam, sudor, anorexia, macies, quod advenæ in Americæ diversis regionibus experiuntur, maxime quia calor ille noctu, dum fere idem perseverat, nec hieme remittitur; hiems etenim apud nos nihil aliud est quam tempestas pluvia, vel humida.

Apud natiuitates similis asthenia balocis frigidulis, potu glaciato, fructibus acidulis, limonata, similibusque sublevarur.

3. *Asthenia ab hydrocephalo.* Vide anæsthesiam a spina bida. C.

Vidimus infantem hydrocephalo portento affectum, capite pellucido, in quo sinus meningum majores rubore quodam se probebant, quique per Galliam circumferebatur; is erat asthenos; & paululum somnolentus, de cerebro bene se habens, sensu, motuque gaudens licet debilibus.

Duo pueruli Nufocorii generalis febricula & gastrodynia affecti jacent, purgati resurgunt, sicut per paucos dies languidi, febricula recedente;

dente, iterum decumbunt; accedit vomitio jussulorum, gastrodynia, febris; pungantur alteris diebus, sexta die subito asthenia correpti suot, caput proprio pondere inclinat, brachii & manubus uti non possunt ad poculum ori admovendum, pedibus insistere nequeunt, sensu superfluit; noctu delirium, febris, & octava die mors. Sexto cadavere ubique macro, nil videtur mutatum in abdomine, pectore; nulli lumbrici, status in intestinis vacuis, nullum oedema; sexto cranio aquae diffundunt limpidae, & in ventriculis cerebri rubellae, nil ultra. Hæc Augustus 1759.

Differt ab apoplexia & carox eo quod nullo sopore stiper hic morbus; a paralyti, hemiplegia, paraplegia, quod sit universalis debilitas, sensu superfluit.

Nil pueruli nunquam porrigebant manum, nisi brachio ad costas appresso hinc & inde, quia secus porrectum brachium difficilis sustentari potuisset ex legibus mechanice; unde brachia secundum totum humerum ad latus appressa hunc morbum significant.

Cum hæc scribo, tertius puerulus Nosocomii subito iniecit in eundem morbum convalescens a dysenteria, in qua aliquoties purgatus erat, polydipia insatiabili simul affectus, mihi videbatur postmodum moriturus; præscripta iterata dosi pulveris de gutteta intra paucos dies convaleuit, vino simul usus & cardiacis.

4. *Asthenia scorbutica* Lind de scorbuto; *Languor scorbuticus* Bartholini. C.

In prima scorbuti periodo, facies est pallida, subtumida, exercitii aversatio, labia ac carunculae lachrymales virescunt, cæteroque ægri cibum, potumque appetunt, & sani videntur; ast crescit mæror & dejectio animi, color evadit obscurus, ex flavescere sublividus, pigritia abit in lassitudinem cum genuum stupore & debilitate a levi exercitio; inde dyspnœa a motu, quæ cum lassitudine constanter scorbutum comitantur.

In tertia periodo astheniam comitantur syncope. Vide *Syncope scorbuticam*.

5. *Asthenia cachectica*. C.

Infantes a parentibus senibus, infirmisve orti, potissimum puellæ ab ortu ad decimum circiter ætatis annum non raro pallidulae sunt, carnibus mollibus præditæ, ventre tumido, artubus tepes, macilentæ, debiles, voraces, tamen corpulæ, somnolentæ, segnes ad loquelam, & omnia exercitia, tardæ, ingenio hebetes, unde a rachitidis valde discrepant, sæpe glandulas colli tumidas gerunt, quæ tamen sponte resolvantur multo citius quam scrophulæ, nec ita indurescunt: in illis vidi sæpe ortas verrucosæ faciei, quæ intra paucos menses sine rubore & calore albescunt omnino & remollescunt, ac in crustam exsiccatæ labuntur, nulla relicta cicatrice.

Præstat in hoc morbo per hiemem cum ossa deglutire quotidie aliquot grana radicis Chinæ pulverisatæ, vino uti aquato, abstinere a cro-

moribus, & farinaceis non fermentatis, exercitium suadere, frigus arcere.

6. *Asthenia chlorotica*. Vide Chlorosim, cujus est accideos. C.

7. *Asthenia a pathematibus Virium debilitas ab animi affectu* Frid. Hoffmann. de virium lapsu, cap. 9. cautela 1. B.

Nihil magis subito vires frangit, & quandoque difficilior cognoscitur, quam mæror, diu celata iracundia, gravis ærumna, contumelia, bonorum, bonorum immerita jactura, amicorum, parentum mors, &c. iode profunda tristitia, animi dejectio, somni jactura, anorexia, stupidum silentium, immobilitas, solitudinis amor, cæterum fuga.

Alimenta boni succi, sed liquida, coctu facilia, vium, liquores fermentati, oærotica, & auxilia moralia indicantur.

8. *Asthenia febrilis; Debilitas febrilis* Boerhaave; *Lassitudiner spontanea* Hippocratis. B.

Alia est debilitas, vel lassitudo spontanea, quæ graves morbos anteit, eosque præcunctat, ea est sine febre, cum fastidio omium rerum, inclinatione ad iracundiam; ægri dicunt crura sibi, & brachia fracta esse; oñdum tamen se lecto adducit, donec accedat horripilatio, dein calor.

Alia vero est debilitas febrem potissimum continuam ac remittentem concomitans; quæ in vigore omniom est maxima; ast inter varia genera februm nullum est quod vires magis proternat ab initio quam typhus, hemitritæque, vulgo malignæ febris dictæ, in quibus parciore fluidi nervi secretio e cortice cerebri & sere quiddid est, impenditur in obicibus superandis, qui circulationi sanguinis opponunt, iode artuum summa debilitas.

9. *Asthenia effragia* Simon. Paulli de graminis ossifragi Linæzi flore Lapponico 236. C.

Mirum est quod de viribus Ancherici ossifragi Simon Paulli promulgavit, scilicet si pecoribus pabulo intermixta detur hæc herba, ipsa eorum ossa inde emolliantur, ita ut pedibus insisterent nequeant.

10. *Linnaeus* cum copiosam vidit in Smolandia, ubi dicitur ejus esu pecora statim impinguari, sed anno sequente in ipsorum hepate nasci vermem *Ular* dictum, unde herba *Ular* vocatur & cito perire animal. Verum hæc omnia inter errores plebis reponit Auctor.

10. *Asthenia ab ossifrago* Mem. de l'Acad. des Sc.

Ossifragus est ossium remollio; hic morbus primum Tolosæ, dein aliis locis observatus est; immo sub diversis schematibus suse describitur in *Act. Soc. Londinensis*, num. 459. a *Chirurgo Peto*. Ossibus viru scorbutico, aut alio remolitis, statuta corporis decrevit, æger stare non potest, artus contorquentur, totum corpus in glomerem flaccidum humilatum abut.

*Sylvanus Bevan* *Act. Soc. Londin.* n. 470. hujus morbi speciem debet supervenientem describit; huic

huic diabete comites erant hædica, polydipsia, anorexia, oſtoporus; urinæ erant calcaræ, turbidæ; pars scilicet calcaræ oſium acido quodam corrola huic colori, hiſce ſymptomatiſanſam præbebat; parenchyma ſcilicet fibroſum oſium ſue calce deſtitutorum flexibile & elatiſcum remanebat, unde decrevit moles totius corporis ita remolliuit ut ſedto ſe movere æger non poſſet; longitudo, quæ fuerat 5. pedum, fuit tantum poſt mortem, extenſis etiam artubus, 3. pedum & 5. pollicum; oſſa artuum & pericranii erant membranæ, peritonæo non ſtrictiores, exceptis articulationibus ſeu geniculis, & plenæ fluido molleſe quodam conſiſtentiam ac rubello. *Vide Rachitiam ab oſteofarſi.*

11. *Athenia ab inanitate. C.*

Eſt debilitas quæ ſupervenit cuicumque morbo evacuatorio, maximo hæmorrhagico, alvi fluxibus, dyſenterie: curatur analepticois, ſucculentis, ſpirituoſis, aromaticis, curato poſſimum morbo a quo pendet.

12. *Athenia hystérica. L.*

Mulier quadragenaria, phletorica, florida, ubertim & regulariter a duobus annis menſtrua, conſtipatæ, mororibus, anxietatibus, cramphis, muſculorum diſtractionibus, hystericis quæ aliis ſymptomatis a duobus annis diſsecta eſt, inter quæ poſſimum conqueritur de laſtitudine, aut debilitate totius corporis, ita ut brachium ſupra caput attollere nequeat pro debilitate; illa vero noctes inſomnes, cramphis & extremorum inferiorum ſudoribus aſſicta tranſigit; in ſuris & in imis femoribus ſunt tumores colore cedematosis, ſed digitorum impreſſionem minime retinentes, qui interdum tantum obſervantur, vera cedemata hystérica Raulini; juvatur, & appetitus poſulem reſtituitur, a pulvere purgante quem decies ſumpſit; ea menſe Julio tres Medicos Monſpelienſes conſuluit. Conſilium verum ſequens fuit, 1. ne præmiſſa exigua phlebotomia, ſi pulſus plenus fit, juſcula ex colli vervicini uncis quatuor, & cichorii manipulo per triduum ſumat; dein purgetur ex duobus cyathis decocti polypodij, infuſis duobus vel tribus ſennæ drachmis, additis primo cyatho mannæ uncis duabus, alteri vero uncia una & ſemiſſe. Hi præmiſſis decem juſcula ſumat ex pullo, radicis pæoniæ drachmis duabus, cichorii manipulo: deinde decem balnea domeſtica adhibeat, & ad cuiuſque exitum ſerri laſis libram bibat, infuſo prius ſtorum hyperici pugillo; deinde juſcula, iterumque balnea, & ſerum laſis repetat; demum cum ad menſem Septembrem deveniat fuerit, lac aſinum per duos menſes uſurpet, alterniſque diebus bolum devoret ex pulvere de guttæ, coralliorum, & cretæ, ana grani quindecim, ſyrupo quodam exceptis, ſomnumque ſibi conciliat ſingulis noctibus ope ſyrupi de karabe, vel laudani liquidi.

13. *Athenia ſyphilitica. L.*

Hannoveranus quinquagenarius a ſex annis & ultra debilis erat toto corpore, & macilentus, *Savvages Noſologia Methodica. Tom I.*

de cetero bene ſe habens: eum curaverunt *Albinus & Hoffmannus* per quatuor annos, Medici Pariſini per duos annos, Monſpelienſes per oſto menſes præſcriptis edulcorantibus, incaſſantibus, laſciniois, &c. ſed in caſſum. *D. Fixi* poſt tot vana tum ſua, tum aliorum tentamina, quæſivit num æget, ejuſve parens aut nutritrix ſyphilitico quodam morbo laboraſſent; reſponſum ei fuit minime gentium. Interea diſſata lactea inſtituta ſine balneis, hydrargyroſis ſuit caute celebrata, atque poſt menſem vires ægri, atque carnes paulatim rediere, & ſanitas reſtituta eſt. An athenia ea ſyphilitica fuit, quia per hydrargyroſum ſanata? An hydrargyroſis in morbis minime ſyphiliticis valet? Antea hydrargyroſum intumuerat unus testiculus ſine dolore, fluctuationem in eo dein adeſſe putantes Medici, tumore incifo nihil viderunt; teſtis biſarum diviſus quotidie ſanguoſas excrescentias præſerebat, illis ſine dolore reſectis ſuccreſcebat alix, adhibito in emplaſtris millepedum pulvere vulnus coaluit.

14. *Athenia abſinentium* Journ. de Med. May 1756. Hilior. de l'Acad. des Sc. 1713. 1719. 1739. L.

Poteſt homo ultra 7 dies nullo aſſumpto alimento vivere. Religioſa Monſpel. maniaca per 14 dies ſine potu & cibo vixit. Nymphomaniaca per 25 dies; nunc vero cutis arida, flava, rugoſa, os areſcebat, lingua & dentes nigreſcebat, vox rauceſcebat, macies magna, nulla perſpiratione, deſectio, miſtio; ea abſinentia bis vel ter in anno revertebatur cum deſirio vividiori, frequentiori perſivio, vere poſſimum & autumno. *Vide Anorexiæ 10. & dyſpæſiam.*

15. *Athenia inſanſum* i. C. le Scorbis Pariſienſium Chirurgoſum; Puzos, Malad. des enf. pag. 300. qui ſic loquitur.

Scorbutus inſanum non eadem ſigna præbet quæ ſcorbutus adultorum; poſterior maculiſcutaneis & gingivarum viſio ſtipatur; prior vero his ſignis deſtituitur, niſi cum ad ultimum gradum pervenit; exiſtit multo ante ea ſigna, & in primo, ſecundoque gradu cognoscendus eſt, ut ſanari queat. Cognoscitur ſcorbutus inſantum, cum de doloribus muſculorum conqueritur, & progredi ac pedibus inſilire potius non eſt; antea ſanus videbatur, jam ſubito uſum tibiæ amittit; ſedere, cubare, vel quieſcere nunquam deſinit, motum localem averſatur, ejulat ſi ſtare cogatur, aut ſi ſuræ ipſi comprimentur; alias cum ſine adminiculo progredi ſolitus foret, quavis data occasione, & ob ſolam curam debilitatem labitur & cadit; non macule cutaneæ, ut adultis, ſed tubercula dura ganglionum inſtar hic vel illic apud eos obſervantur: hæc ſunt inſalubilia hujus ſcorbuti ſigna. *Medicinis Puzos.*

Athenia inſantum in primo gradu non diſſiciliter ſanatur; ſi vero neglecta fuerit, aut cum aliis ſpeciebus aſſiniſis conſuſa, ſuneſſos eventus inducit; oſſa ſcilicet inſicit, & cario corrumpit, maxillas ita devaſtat, & exodit, ut

Did ; alvorum



alveorum ordines omnino absumat; videntur non raro qui languore & marasmo conficiuntur, quorum morbum serius aggressa est ars medica, optimis licet medicamentis armata.

Ad curam infantis adhuc dum lactentis, lactis nutritric indolem probe examinare necessum est, illudque si vitiosum fuerit, altero mutare; secus ad antiscorbutica confugere, quæ sanguinis ipsius ægri vitia corrigant; adeoque utatur infuso cichorii, cochleariæ, taraxaci, beccabungæ, nasturtii aquatici, scolopendrii in aqua pulli, neque non levi decocto radicis chinæ; identidem purgetur ex syrupo de cichorio composito; & locus humidus, paludosus migret in salubriora.

Si infans nondum progressu assueverit, ac proinde loqui nesciat, hic morbus in primo gradu, necdum maxillas afficiens, difficillime cognoscitur; verum ex parentum, nutritricis scorbutica dispositione, tempestive & regione aliquid luminis affulgere potest; si vero ablatus sit infans, eo facilius cognoscitur hic morbus, quo ætate procehor infans, qui facilius sensationes suas exponit, & in quo mutationes in viribus tibiarum clarius percipiuntur; immo medicamina facilius admittunt, adeoque major sanitatis recuperandæ spes est; præstat quovis mane per aliquot tempus infusi rhei cyathum bis in die propinare, & adhibere gargarisma ex decocto agrimonæ, salviæ, bistortæ, rosmarini, nasturtii aquatici, additis post colaturam spiritus cochleariæ aliquot guttis, vel succo limonum, vel optimi vini pauillo; confert præ cæteris vinum antiscorbuticum: *batheus Aulher citans.*

Hæc asthenia non raro cachexiam, & phlegmasiam insanabilem inducit, diarrhœa, hæctica & marasmo terminandam; vel quod sæpe etiam vidi sine febre acuta, sine ulla inflammatione prægressa, vel vulvam in puellis, vel genas & gingivas in utroque sexu subito livore, subitaque mollicie, gangræna & sphacelo ita corrumpit, sine ullo dolore, ut non rarum sit intra paucos dies labia exedi ad aures usque, & infantem quinque annos ætate circum exspirare, hoc terro sphacelo exesum in ore, vel in yulva; maxime vero hoc vitium eis accidit, cum a rubecula convalescunt.

16. *Asthenia Americana; Obstruente viscerum naturalium.* Gill. Pison. cap. 6. C.

Hic morbus sine ullo fere dolore sensu invadens, ob perspirationis suppressionem, cruditateque multas, ob ventriculi calore ortum debilitatem, maxime apud juvenes & advenas observatur: adde viru scorbuticum ab advenis in itinere contractum, & usum arach, seu vini ex saccharis sacchari & aqua confecti; hinc ebrii humi decumbant, & totas noctes malignos humores potis patulis combibunt. Hinc dolentia cum tanto labore & lassitudine spontanea, atque nausea oritur, ut ferendis cibis & medicamentis impares existant; hinc magna respirandi difficultas, perpetue querelæ; accedunt sudores frigidi in partibus superioribus,

summus virium languor, canina appetentia, durities, atque murmur utriusque hypochondrii, denique febris, sitis & inflammatio. Hic morbus raro curatur, nisi accedente diarrhœa biliosa.

*Cura.* Strictam & diu servatam dietam exigit ex cibo & potu recentibus; eupeptis, accedente mane & vespere motu corporis liberali, quem ob dispnciam ægri refugiunt; phobotomiam, si non præiens febris, saltem futura sæpe polulat; sæpe enim hepatitis supervenit: apozemata leviter identica & antiscorbutica præmittantur; huc radices limonum, liquiritiæ, braccia marina, portulaca aceto condita conferunt; nux cocos, mala aurantia, citriæ, citrulli, ananas, graudilla conveniunt.

Dein cathartica mitia usurpanda; vel ipecacuanhæ drachmas duas infunde in aqua, ut vomitio excutietur; denique ad eximium huius morbi antidotum per mensem recurrendum est, scilicet:

R. Corticis guayaci & scorci ferri, ana, unciat ij. maydis unc. 1. fabarum minorem & foliorum fenna, ana, unc. 1. pulvis exhibeatur ad drachmas duas vel quatuor mane & vespere in liquore convenienti.

Huc succedat cursus aliquot passuum, in dies major, a quo redeuntes cibis eupeptis refocillentur, ut pulve & farina manihoc cum saccharo.

Inter topica emplastrum ex gummi elemi & balsamo copaivæ cum melle, ventriculi & hepatis regioni applicetur, demum decoctum salis parillæ addendum.

17. *Asthenia nativa; Foiblesse naturelle.* Diction. de Santé: L. cum signis & curatione quam vide.

## XXII. LEIPOTHYMIA *Apathyia* Dioscoridis; *Animi desiquium* Mercati Lib. 3. *Lipothimia*.

Est subitanea & brevis virium dejectio, superflite pulsus vigore, & cognoscendi facultate.

Differt a syncope, 1. quia in syncope pulsus valde minuitur, vel evanescit cum sensuum obscuracione, immo, in graviore casu, seriatione: in leipothymia vero pulsus plerumque manet illæsus, nisi affectio adeo gravis sit, ut syncopei adducat. 2. Quod in leipothymia ægri vel aurium tinnitum cum subito eorum calore, vel vertiginosam capitis turbam simul percipiant cum virium artuum dejectione, atque sentiant & sæpius dicant se animi deliquium pati: in syncope vero subito & citra præludium concidunt. Differt a cardialgia quod non ab epigastrio male habeat æger, seu affectus ad stomachum non relesatur initio, nec sint signa saburæ.

Merito *Mercatus* & *Mercurialis* refragantur illis qui leipothymiam a syncope tantum gradu differre putant, atque ideo ejusdem veneres esse varietates, cum verosimile sit ex aliatis symptomatis magnam esse differentiam, atque diversam originem. Sic *Mercatus* syncopei fieri putat

potat a fluidi nervi cor moturi defectu, dispendio; leipothymiam veto ab ejus fluidi in cerebrum motu retrogrado, ex quo motu, dum de sanguine agitur, feri tinnitum & vertiginem alibi docuimus; sed quæcumque sit theoria, non minus differunt symptomata essentialia, quorum explicatio deinceps venit inquirenda.

#### 1. *Leipothymia a pathemate. L.*

Memini me leipothymiam esse passum, dum cujusdam nefarii crucifragium spectarem; sensi scilicet in corde molestant cum subitanea crurum & brachiorum debilitate, simulque calore, ac veluti vapore sursum ascendente aures corripere, atque tinnire; pulsus interea exploratus erat vegetus; his symptomatibus ingravescentibus vix pedibus insistere potuissim, & pallor faciei successisset, forte etiam supervenisset syncopæ; verum etiam, ut ait *Mercatus*, in omni syncopæ sit animi deliquium, seu leipothymia, in omni leipothymia non est syncopæ, & ea genera non solum gradu, sed etiam symptomatum diversorum specie discrepant.

#### 2. *Leipothymia stomachica Mercati de syncopæ lib. 3. B.*

Male *cardiaca* ab aliis vocatur, quæ ab stomachi molestia & cardiagia ortum ducit, omnium frequentissima. Vide *Cardiagiam*.

Inquirant Medici limites syncopes, leipothymia, cardiagia; certe syncopæ est morbus brevissimus & periculosissimus; cum leipothymia multo diutius vivitur quam cum syncopæ, cui ipsa præludit; in leipothymia nullus est dolor, sed tantum sensatio quædam, quam *morbum stomachi* vocant ægri, dum aiunt, *l'estomach me meurt*.

Mirum est quod aer frigidus, frigida potus leipothymiam avertat, non vero mirum quod vinum, spiritus, aromata, cardiaca vires resolvent.

**XXIII. SYNCOPÉ**, a *syncopé* concido; *Leipopsychia* Hippocrati, *Asychia* Galeni: Italis *Svanimento*; Hispanis *Desmayo*; *Syncopé*, *Evanescentia*, *Pamison*. *Ægri Syncopici*; Gallis *Evanois*, *Pamée*.

Cognoscitur subitanea virium omnium vitium, animaliumque imminutione; pulsus scilicet, respiratio, omni musculorum motu, necnon sensu quovis, & calore admodum imminuitur, ita ut æger per aliquod tempus sui conscius non sit, & vita eclipsim patiatur.

Differt a leipothymia quod affectus primo in præcordiis sentiatur, leipothymia vero a capite incipiat. A cardiagia quod nullo stomachi dolore stiperetur, nisi ipsi cardiagia se adjungat: in syncopæ sensus omnis fere aut penitus evanescit, & æger resurgens non meminit semper hoc tempus existisse; aut dicit se adstantes quasi in somno percepisse, trans nebulam vidisse, & sonos quasi debilissimos audivisse; quæ omnia in cardiagia simpliciter non observan-

tur. In asphyxia ægri tamdiu frigidi, sine ullo signo vitæ remanent, ut pro mortuis sæpe habeantur; aut syncopici sudore, pulsus obscuro, aliquali interiorum calore, leni saltem respiratione, ab asphyxiis distinguuntur, & intra minutum unum aut alterum ad se redeunt.

Omnes morbi terminari possunt debilitate lethali, quæ cum successive accidat, non dicitur syncopæ, sed asphyxia finalis, si sit cum frigore, pallore, sine stertore; apoplexia finalis, si cum stertore, & somno; orthopnea finalis, si cum stertore, sine somno.

Hi quippe sunt diversi modi, quibus vita terminatur, de quibus mirum est nullum Auctorem expresse differuisse. Nemo tamen dixerit morbos lethales non differre, nisi gradu, a syncopæ. Quorum itaque plures continentur leipothymiam, syncopem & asphyxiam esse morbos ejusdem generis, & non nisi secundum majus & minus discrepare, quæ consensio si admittatur, pari jure ad singula cujusque classis genera posset extendi, ut ad pleuritidem, peripneumoniam, paraphrenesim, phrenitidem, hepatitidem, &c.

Principium syncopes proximum videtur esse motus cordis systalticus adeo debilis, ut nullo subfultu stiperetur. Duplex etenim est motus cordis; alius *systalticus*, seu systoles & diastoles, quo axis cordis loco non mutatur, nec ullius pulsus in arteria producitur; alter est *subfultorius*, seu alterius cordis accessus ad costas, & recessus versus mediastinum, quo tamquam malici percutu pulsus cordis & arteriarum sensibilis evadit; adeoque in cerebro pullantibus arteriis excitantur idææ ad vigiliam necessarii, in toto corpore calor generatur, atque vis electrica sustinetur. In syncopæ prior motus permanet, unde vitæ pabulum; aut posterior deficit, unde sensum, pulsus, caloris feriatio, & æsthenia artuum; æger subito proprio pondere, laxatis omnibus artibus, deorsum labitur, pallor, frigus, pulsus & respiratio evanescunt, aut maxime minuuntur.

#### 1. *Syncopæ ab inanitione Sennerti.*

Est illa quæ subito in morbis evacuatoriis, cachecticis, post longas anorexias, viribus jam exhaustis, subito supervenit, & a debilitate habituali diversissima est; natura, quæ vires suas infumit, in cordis motu perennando, a conatibus suis subito cessat, cum debilitatis extremæ conscia est, aut nova confuse perentit obiacula; magnam itaque partem vitium quæ in subfultu cordis producendo requiruntur, ea supprimit, ut motum tantummodo systalticum diutius protrahat, qui secus multo citius sufflaminaretur.

Patet ex *Halesii Experimentis hæmorrhagicis* frequentiam pulsus & respirationum crescere in summa debilitate quàm hæmorrhagiæ profusæ excitant, pari passu quo pulsuum & respirationum amplitudo decrevit; eo fine, ait *Halesius*, ut vis quæ ratione amplitudinis deficit, frequentia seu velocitate motus refarcitur, & lethum procrastinetur.

Idem observat vires cordis superfluites non esse residuo in vasis sanguini proportionales, nam in tubo verticaliter carotid adaptato, cruor quandoque altius ascendebat, cum plus sanguinis efflueret. Habet ergo natura imperium in cori non vero mechanice movetur iuxta vires sanguinis ad illud accedentis, sed a fluido nervoso quod vitale principium pro diversis motibus in id immittit. Cum jugulantur sues, multo prius offuso cruore, cum vires exhaustæ videntur, validos non raro illos conatus edunt, quo vires cordis fatiscientes exsuscitantur, & ad ipsam sanguis ex artubus expressus mittitur.

Cum e. quadraginta libris sanguinis quas equa primi experimenti habebat, effluerent triginta, sudor frigidus toto corpore permanere cepit, laxatis fibris cutis, quæ durante vita ipsam constringunt, hincque apertis vasculorum sudoriferorum osculis, eodem mechanismo ac mortui, alvus sæpius effunditur.

Ad vires in inanitione refocillandas juscula consummata, gelatium aromaticis conditæ, ovi vitæ, vino & cinamomi pulvere commixta, vinum merum, liquores spirituosus, fumus nucis myristicæ accensæ naribus exceptus, sunt præsentissima auxilia.

Quæ a paracetesi oritur, præcavetur vinctura abdominis.

2. *Syncope a dolore* Jonstoni Idea med. illustr. Sennac. pag. 553. A.

Ea est quæ atrocibus doloribus, potissimum colicis, supervenit.

Cranab. puellam quæ per diem & ultra dolores colicos ita atroces pariebat, ut pulsus phlebotomiam non admitteret, & ut laudani dosi maxima morbum non sedaret, adhibui pilularum de cynoglossa grana duodecim; quippe non raro accidit, ut diversa hæc omnia aliis melius succedant, licet non majori dosi adhibita; sed frustra; tandem subito accedit syncope, & non solum doloris accessus illico evanescit, verum sibi restituta ægra deinceps omnino ab hoc dolore. vixit immunis, non secus ac optima crisi solutus fuisset; nonne ea colica a fluidi nervi appulsu validiori & quasi ab spasmo pendebat? anne, ut putat *Sanctorius*, in syncope copiosa fit perspiratio quæ materiem morbi cum eliminet.

3. *Syncope febrilis* Ill. Senac. de Corde, lib. 4. cap. 12. pag. 548. A.

Ea est quæ morbis acutis febrilibus, vel inflammatoriis tum initio, tum in vigore accidit.

Initio pleuritidis syncope superveniens lethalem sæpe morbum prægignit; qui ob humorum crudorum copiam febricitantes in Syncope incidunt; si ventriculus vel hepatis in his inflammatum fuerit, desperata salus est: *Galen. Methode med. cap. 3.*

Syncope quæ in æstu tritaphoyæ aut altius febris ardentis accidit, est periculi multo minoris, & phlebotomia ac refrigerantibus prævertitur. Vide ulterius *Asphyxiam febrilem*.

4. *Syncope a phlebotomia*. Ea.

Sunt qui a metæ phlebotomiae, a sanguinis aspectu, animo loquuntur, quod qui mechanice & sine imperio animæ in cor explicare contendunt, absurda proferre mihi videntur. Illa syncope prævertitur sita horizontali, aqua in ore decedente, interpolatione phlebotomiae, digito venæ appresso, avertione oculorum a patella, &c. *Parcius & rarius est mittendum sanguis apud eos metuculosos, maxime si febris vel pyrexia desint.*

Si in amphimerinis, aut hæmimericis jam contractis, a phlebotomia aliunde indicata superueniat leipothermia, cum pulsu statim exiliiori, intermittente, frequentissimo, aut syncope, signum est morbum materia putri, verminosa, vel mali moris foveri, monente *Sarboeracis*, & confirmante experientia; licet itaque in hoc casu delirium, paroxysmi vigor, pulsus robur phlebotomiam sudeant, ab ea abstinendum est.

Syncope a phlebotomia largiori ob laxatam ligaturam apud robustos non est ita periculosa, ac quæ pendet a principio interuo; æst apud debiles, ut phthisicos, corbuticos, cachecticos intra paucas horas ad mortem ducit, pulsus exili, molli, frequentis, intermittens.

5. *Syncope plethorica* Riolani Anthrop. Ill. Sennac. lib. 4. cap. 12. pag. 548. D.

Ea est quæ a nimia sanguinis copia excutitur corde velut obruto, cujus signum est pulsus succellive varius, nunc obcurus, depressus, nunc plenus & elatus, nunc frequens, intermittens, nunc rarus & regularis, si cum facie rubra sublivida ante syncope; signum certius est, si phlebotomia parva, iterata, sensim pulsus plenior, velocior, fortior evadat, & æger sublevetur; judicatur ulterius ex voracitate prægressa, suppressis evacuationibus; si plethora sic commota, ea species coincidet cum febrili.

6. *Syncope hysterica* Ill. Senac. lib. 4. c. 12. p. 544. *Syncope epileptica* Helmontii de Athmate. D.

Ea est quam hysterica, hypochondriacque patiuntur, a levi animi affectu, ab odore suavisimolchi, ambræ, rosæ, ab iteratis catharticis, ab imaginatione læsa, &c. cum fugacibus spasmodicis, doloribus diversarum partium, aliisque heteroclitis symptomatis, multum terroris ægræ incutientibus.

Curatur antihystericis foetidis, castoreo, fumo pennarum, cori, spiritus salis ammoniaci naribus admoto, &c.

Epilepticam & ecstaticam syncope admittere ill. *Archiatr.* In paroxysmo epileptici sensus quidem seriantur, ut in syncope, & maxilla est rigida; verum pulsus plenus, vehementer, color faciei cruentus, lividus, &c.

7. *Syncope a paralogo*. A.

Cardiogni nomine intelligo cordis aneurysmaticam dilatationem, tum in ventriculo, tum in auriculis, tum in aortæ initio; concurrunt pectoris oppressio, pondus in regione cordis, animi deliquia, palpitaciones vehementiores, quandoque pulsus inæqualis, parvus, alias vero plenus, vehemens, palpitans: Vide Ill. Senac. de Corde, lib. 4. cap. 8. Morgagni *Epist. XXV. 2.*

11. *Syncopé a polyppa* Ill. Senac. de Corde, lib. 4. cap. 10. n. 17. Morgagni Epist. XXIV. 13. An a veribus cordis detus? De Meyferey T. 2. n. 190. A. P.

Ea est quam concrectiones polyppæ cordis excitant. Sufpicamur ex *insu pendoris* & oppressio- nis in regione cordis, unde anxietas cordis; *palpitationes* habituali, quæ in tremorem cordis & in succussus frequentes degenerat: pulsus in- equalitate variabilis, quæ signum est optimum.

9. *Syncopé ab antipathia* Ill. Senac. ibid. pag. 544.

Ea est quam excitant felis, mutis, cafei, &c. præsentia & horror præconceptus. Certum est multiplici experientia, vel a lateure in arto- ereate anguilla aut simili-objecto, quod exhorte- rescant, plures ita nascutos esse & mobiles, ut in syncopem constantem incidunt, nec suble- ventur nisi objecti molesti-remotione. Qui ex sede morbos differunt, hunc morbum a ce- rebro primario pendere, & ad cerebrum refe- rendum esse, judicare debent. Removenda quantocius objecta, & si deglutita sint, ea vo- mitione rejicienda.

10. *Syncopé a veneno* Ill. Senac. ibid. p. 545.

546. A.

Vapores putridi ex Nolocomiis, ex cancri- bus, ulceribus, ex cadaveribus: Vapores mephitici ex tabernis, cellis, tumulis arctius clausis, ex puteo & fossa pæraliana juxta Monspelium, ex- halationes minetarum: Arsenicum etiam ulceri- bus, cariebus admotum, ut observavit *Saviard*: Venena acria genita in corpore ipso, in peste, tritaphia, sphacelo, hunc morbum excitant.

12. *Syncopé ab asphyxia* Ill. Senac. ibid. p.

554. Morgagni Epist. XXV. 17. ulcere cordis. A. Non solum rupto intus apostemate superve- niunt syncopes, ut secto abdomine in ascite, aut pectore in hydrothorace, verum etiam ab alia causa non satis cognita; abicellum in he- pate, pancreate, pulmone, a fortiori in stoma- cho latentes, declatant syncopes frequentes; a pulmonem & hepatis putredine ortas vidit *Bal- lonius*, ex ovariis & utero suppuratis Ill. Senac. An a cerebro suppurato oriuntur, inqui- rendum restat.

12. *Syncopé ab hydrocardia* Vieussien Obf. A. Hydrocardia seu collectio aque in pericardio cognoscitur 1. pondere in regione cordis: 2. pec- toris oppressione quæ crescit a decubitu supino, sublevari inclinato pectore ad anteriora: 3. lei- pothymia in syncopé, palpitatione frequentibus: 4. subita a somno excitatione cum suffocationis periculo: 5. signis generis hydrothoracis: 6. pulsu debili, molli, inæquali, ex Ill. *Schreibero*. Curatur ut hydrothorax diureticis, bóraco, paliuri fructibus.

13. *Syncopé stomachica*. Vid. Ill. Senac. ibid. p. 545. *Vermiosa*, De Meyferey T. 2. n. 190. A. Ea est quam cardialgia sæpius excitat, attam- en sine dolore stomachi ex sola illius anxietate sæpe oritur, ut 1. ab inanitione, seu longa fa- me, unde calor, & sensus tractationis, quæ syn- copem subito inducunt: 2. oritur etiam a ilo-

machi repletionem, infarctum, cum nausea: 3. ab irritatione a materiis emeticis, nausæosis, vene- natis: 4. a lumbricis, taeniis: 5. a dyspeptis: ut lacte coagulato, adipè, fungis: 6. a saburra acri, putri, maligna. 7. Frequentes etiam sunt syncopes in gastritide, & diversis speciebus gal- lrodyneis, cardialgiæ, &c.

In syncopé stomachica 1. naribus amovenda aromatica; spiritusosæ, ut aquæ cinnamomi, Lu- cie; 2. aqua tepida, infusum chamæmeli, car- dii benedicti, affatum bibenda, ut vomitio cie- atur. Vide *Cardialgiæ*.

14. *Syncopé ab sphacelo* D. Senac. pag. 553. A.

Cum pars quædam, potissimum interna, sphacelo correpta est, cum foetus in utero mor- tuus later; cum ichor, puris alieubi hæret, syncopes sæpius sobolescant, natura sensu quod- am incitio id percipit, exhorteat, & non secus afficitur, ac cum quid foetidum aut cada- verosum nares afficit.

15. *Syncopé scorbutica* Lind. de Scorbuto. P. D.

In tertia periodo a minimo motu scorbutici lei pothymias, immo syncopes patiuntur, in qui- bus pulsus, licet sit exilis & intermittens, tam- en per intervalla evadit plenior & duplica- tus, ut in pectorali, observante *Eugaleto*, ite- rum exilis evasurus.

16. *Syncopé arthritica* Musgrave de Arthriti- de anomala. P. D.

Ea est quæ in veteri podagra supervenit, re- mittente aut cessante dolore pedum, frequen- tior post indigestiones, crapulas.

Cathartica, dein stomachica & anthelminti- ca in hac convenient.

17. *Syncopé febrilis*. Fabri syncopalis vulgo la *fevre syncopale*. Vide Torti. A. P.

Est tertia vel hemipterica syncopalis Castel- lanis & Madritenlibus familiaris, ut refert Dr. *Burnet*, in *Thesi Parisiæ*. Rigor in initio, typus tertianæ, profusus sudor in declinatione; car- dialgia, horrenda vomitio, summa debilitas, pulsus contractus, frigus extremorum, mors se- cunda aut tertia accessione, ni succurratur.

Præmissis præmittendis kinkinam profuturam puto, ut in hemipterico soporosa, scilicet ad un- ciæ ante tertium paroxysmum. Vid. *Morton Hy- retolog.* pag. 74. & rectius Torti de *Febris*.

Huc spectat febris syncopalis tertiana Torti de *Febris*. pag. 126. 192. Amphimerina syncopa- lis Raim. Fortis: Tritzophya syncopalis *Parthol.* method.

Est syncopé quæ funestus reddit paroxysmos febris tertianæ simplicis, duplicive, quos co- mitatur; sive sit cardialgiæ succedanea, sive pri- maria & solitaria, sed febris comes, vi nempe cujus æger nullo scilicet dolore percussus, fre- quenter, graviter, & absque causa manifesta languet, exolvitur, & anima deficit; sive de- latere in latum se velit convertere, aut manum tenet loco movere; concurret pulsus depressio, & vicissim ejus defectio cum parvitate & fre- quentia; sudores minuti circa collum & fron- tem, oculorum cavitates, caligatio & languor,

ac denique universalis virium languor, ut continuus odoribus & irrationabilibus æger recreari indigeat, ne deliquium crebris patiatur.

Si hæc in febris augmento vel statu accendant, licet tranquilla sublequatur intermissio, res ægri male agit, nisi provida Medici cautela futuros accessus mature præcaveat. Si enim Medicus transactæ procellæ immemor sit, brevi percurrente ægro incidet in illud turpe *non putaram*. Eiusdem census est algor qui in *tertiana pernicio* seu *algida Mortoni*, incipienti paroxysmo jungitur, quod non, ut affloret in benigni paulatim evanescit, sed protrahitur ita ut nec pulsus resurgat, nec calor erumpat, ita ut post multas horas ægrum in paroxysmi initio diceret; siticulosus est, gemebundus, anxius, cadaverosus, si evadat, nec moriatur, pulsus tamen depressus remanet; cum calor mitti accedit, vox est clausa, lingua scabra, urina vel copiosa & pellucida, vel pauca & lateritia; in hoc statu durat æger per tempus intermissionis cum pulsu exili & frequenti, subsequenti accessu ut plurimum moriturus; sit vero calor & pulsus sint meliores, vegetiores, diuturnioris morbi potius quam mortis erit præfagium, sed ista discrimina vix aliud quam usus docere possit.

18. *Syncope Lanczoni*, A. P.

A calculus in corde frequentes & lethales syncopes, observavit *Lanczoni*. *Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. 7. Obs. 73.* calculi erant subvirides; unus uncias duas ponderabat.

19. *Syncope exanthematica*, De Meyserey T. 7. n. 191. A.

Ea est quæ a scabie, herpete, erythemate, variola, rubella, &c. repulsi supervenit. Curatio, exigit diætam tenuem, potum diaphoreticum, phlebotomiam, sudorifica, &c. remedia quæ hæc miasmata in cutem revocant.

20. *Syncope metastatica* De Meyserey Tom. 2. n. 191. A.

Ea est quæ a suppressis effluxibus ulcerum, fistularum, foranellarum, carcinomatum, leucorrhæarum, &c. succedit: Curatur ut exanthematica, & potissimum restituitur his effluxibus;

21. *Syncope pathetica*, De Meyserey Tom. 2. n. 194. B.

A terrore, gaudio, aliisque pathematis animæ Vide *Asphyxiam* 7. qui semel animi deliquium passus est ob nimium terrorem, iterum minima data occasione animi linquitur; immo vidit *foemina* *Ut. Larry* qui ita huc lepythymizæ affueverat, ut pluries in die spasmo in plenariam corporis solutionem ineideret, de qua etiam contradicentes mirabatur, Pansis abhinc diebus, ait ille, scemina nobilis & honestis moribus prædita, dum cultu parum modesto in hortu publico spatiaur, procacibus juvenum liberiorum disertiis læcessita, vehementem iram concepit, qua concidit exanimata & mortua.

Spasmus exipit hujus intensitati respondens atonia, hinc adeo sæpe spasmi resolutio sit per animi deliquium: vide ego, pergit Ill. Auditor,

mulierem delicatulam, quæ per tres aut quatuor horas spasmis ita afficeretur, ut eunc maris inflat obrigesceret, nunc quasi furis agitata ita convelleretur, ut vix hominum fortissimorum obnixis viribus contineri posset; nunquam & paroxysmo exire, quin totis artibus relaxata, mortuæ ad instar consideret, unde rursus vel potentissimis cardiacis oporteret excitari.

XXIV. ASPHYXIA ab a privativo & *sphigmos* pulsus: *Apoplexia Cerebelli* Villisi; *Mors apparent* vel *subitanea* Lanciisi; *Æstasis* Brendelii; *Apoplexia flauientia* Morgagni; *Asphyxia*.

Phænomena mortis apparentis, subito ut plurimum supervenientia, valde terribilia, asphyxia characterem præbent. Si æger sensum in pectus abiens, demum, factu succubuerit, ejus status asphyxia non est, nec quemquam ex hoc statu revivisse docet observatio. Ad hæc accedit, ut ægri subito interempti vix sint, immo ex his quidam sepulti, quos vel arte vel sponte inde evasisse certum est. Talis vero status live a cerebro live a corde aut pulmone potissimum affligitur, *asphyxia* dicitur, obcurissimum morbi genus, quod ratione atrocitatis Medicorum diligentissimorum inquisitionem exigit. Videatur autem de hoc *Lanciisi* circa mortes subitaneas.

Ex illis qui subito mori visi sunt, nullus provere morruo habendus est, ut fusc dante *Vinslov* & *Rubier*, nisi qui biduo triduoque servatus, jam putrescere & sœtere incipit, aut saltem qui ferrum candens pedibus insutum non sentit; quæ dida in genere valent respectu Medicorum qui morbi principium rescire non poterunt. Si enim signa aneurysmatis rupti, apoplexiæ imminentes, vomitiæ antiquæ hanc subitam mortem præcesserint, Medicus horum gnarus certius judicaturus est an mors sit vera vel tantum asphyxia.

1. *Asphyxia immerferum* Morgagni Epist. XIX. 40. A.

Qui ex aquis pro mortuis extrahuntur, affligendo reviviscunt, docente experientia. Vidi puellam quæ, cum e puteo in quem se proiecerat, extracta fuisset, pro mortua habebatur, utpote omni motu, sensu, pulsu, calore destituta; ea vero suavia *illustr. Dom. Gibert*, Præceptoris mei in Praxi colendissimi, in lectulo reposita, linteis calidissimis omni minuto renovatis testæ, demum ad se rediit.

D. Moulin, D. Med. *Monspel.* in simili casu ægram cineribus calidis operiri jussit, quæ vitæ restituta est.

Falsum autem est eos qui per horam unam aut plures aquis immergi latuerint, unquam revivisse: si paucos excipias aquis gelidissimis immerfos, ut notat *El. Segner. Profess. Göttingensis*, qui hæc de re multa cum animalibus experimenta iteravit; ut plurimum ignoratur quomodo in aquis omnino demersi latuerint, qui identidem caput extra extulere atque iam succubarent.

Ego.

Ego quidem sat recens ex aquis edoctus, ut post horam immo semi-horam ad immersione, quatuor adolescentes curare suscepi, atque omnia, quæ vulgo laudantur artificio & auxilia adhibui; nec ullum ex hisce in vitam revocatum vidi.

2. *Asphyxia a fumis.* Ess. d'Edimbourg, Tom. VI. art. 35. A.

In minerarum fodinis dantur vapores, in hoc a mephiticis discrepantes, quod a calore ignis subterranei auram arsenicalem extrahant pendant; flamma candelæ in vulgaribus extinguitur, in arsenicalibus dilatur; liquor spumosus e rupium rimis exudans, gubæ dictus, hujus signum est; erumpens cum impetu hic vapor quandoque fulgurat, arborum folia defecit, hominibus asphyxiam excitat; minovi vi agens tussim siccam inducit; hæc in recessibus & cæcis fodinarum cuniculis sæpius eveniunt. *Junkerii Chemia de mineris.*

In fundo mineræ lithantracis, ob conceptum ignem immo insectæ, Rusticus vitam amiserat; post semi-horam educitur, frigidus, pulsus, sensuque omni destitutus; nulla vitæ signa supererant, cum Chirurgus G. Tossach, tanquam alter salvator, ipsi ore suo, oaribus ægri contrictis, intra os fortissime inspiravit, unde pectus ægri paululum dilatur, & cor pulsare cœpit; paulo post pulsaverunt arteriæ: tusa est vena brachii, unde sanguis per quadrantem horæ stillavit, dein effluxit libere; interea æger frictione, concussionem agitabat, facies aqua eluebatur a fumo, nares, & labia sale volatili inspergebantur, post semi-horam movebatur leuissime pectus sine suspitio oculis & ore apertis, post horam occitavit, oculos, pedes, manuumque movit, aquam, aliquorque guttas spiritus vitalis hausit, post alteram horam sensus recuperavit, omnium antestatorum immemor, post quadri-dium domum suam reversus est.

3. *Asphyxia a musso.* Petr. Borelli observ. 4. cent. 2. A.

Quotannis fere pereunt in cupa in qua mustum recens fermentescit, qui in eam descendunt ad mustum extrahendum, vel usas ulterius calcandas; subito vero sine voce, sine motu coeidunt, se suffocari sentientes, & nisi prompte extracti sint, pereunt: qui vero ad se reveruntur, eventus illius immemores sunt; hic effectus tribuendus est spiritui, qui vocatur *Gas sylvestre*, a musso exhalanti, quo fluidi nervi electricitatis, adeoque omnis ad vitam extinguitur.

Optimum remedium est, citissime illos hamis extrahere, extractos ægri frigido exponere, frigida aqua irrorare faciem; dein spirituosis excitare.

4. *Asphyxia suspensorum,* Morgagni Epist. XIX. 40. A.

Est mors appàrens eorum qui recens stranguati, vel ut mosci, sunt suspensi sunt, similis modo suffocati; illi certe, nisi simul colli quædam vertebra luxata fuerit, quod periti carnes norunt, facile ad vitam revocantur, at

expertus sum aliquoties in brutis, semel in homine qui e patibulo allatus in templum, tribus phlebotomiis intra duas horas institutis, non solum vitæ, sed satis commodo statui restitutus est; ita ut ipse sedens, & aquam ex urceolo quem manu gestabat, assatim bibens bene se habere mihi diceret; vox autem rauca, initioque tenuis erat, nec eam edere potuit, nisi expectorato cruoris paucillo, & multa frigida copia haulta; ardebat enim siti & simul frigido aere continuo afflato indigebat, utcumque minime calida foret tempestas; post tertiam horam collo a fune impressum velligium paulatim evanescente etiam intumuit, & quartam ejugulo quasi phlebotomia, apprimè percipiens regressum sanguinis e cerebro mox impeditum iri, unde catus, sed Chirurgis præ metu fugientibus non instituta fuit hæc phlebotomia, unde æger sensim obdormivit, pulsus rarior sensim evasit, ita ut vix quadragesies pulsaret in minuto, minorque evasit, quem post primam phlebotomiam videram sensim apparere, & æque raro micare, dein paulo frequentior & fortior gradatim evasit; sicobiit miser ille quem nullum scelus ad patibulum duxerat.

5. *Asphyxia congelatorum.* A.

Est ea quæ frigore summo detento occupat, quamque Gallicus exercitus antea aliquot annos e Praga rediens misere expertus est, ut accepi a conjugis meæ fratris D. d'Olimpies, in arce & urbe Monspelii hodie Regis locum tenente, qui frigus & illum affectum passus est. Mirum dictu! illi miseri per nives iter vel pedestre vel equestre facientes, quorum aliis natus, aliis digiti pedum, manuumque sphecule corrumpebantur, quinque proinde atrocibus doloribus erant expositi, dormiendi tanta cupiditate tenebantur, ut vitæ suæ periculo huic indulgerent; alii itaque sub arbore, illi sub plastro derelicti, omnes fere supra oivem prostrati obdormiscebant somno ut plurimum æterno, nisi ab amico quodam excitarentur. Nihilquidam sub plastro jacens nivo tectus erat, alter eundem locum dormituri occupat, & priori inscius incumbebat; calore superincumbentis inferior reviviscens alterum excitat, & sicambo evadunt, secus somno perpetuo premendi. Quanta medicinx Scripserim socordia fuit olim? omnes se fideliter exscribunt, nullus morbum haud dubie omni ævo familiarem notavit. Hujus nuper *M. Hallerus* meminit.

Qui frigore summo deprehensi possunt deglutire quidpiam, illis exhibendo cardaca & sudorifica, quæ præsto sunt, ut vinum calidum, aqua vitæ, pulvis viperinus, theriaca, aqua cinnamomi; si præsto sit fimum calidum, eo sunt immergendi. Sunt tamen Septentrionales Medici, in his morbis magis versati, qui suadent lenissimas tatiens corporis frictiones, & lotiones ex aqua frigida, immo nive, nec non balneum frigidum, quo artuum resuscitantia sensim fiat, antequam ad tepida deveniatur; non secus ac agendum diximus dum de *Gangrana a gelu*, quam vide in *Class. X.*

6. *Asphyxia cataleptica* : An Congelatio An-  
 thorum? An a congelatione? Lanciſi de mor-  
 tib. ſubitaneis. A.

Vidi olim adoleſcentulam catalepticam, quæ  
 in paroxyſmo tam tardum & depreſſum habe-  
 bat arteriæ & pectoris motum, ut ſerine eva-  
 neſceret; erat autem frigida, omni ſimul  
 ſenſu, motuque deſtituta, ita ut ſi non obſer-  
 vaſſem coram omnium artuum flexilitatem, &  
 catalepti eam laborare ignoraviſſem, eam aſphy-  
 cticam judicaviſſem; tuſa vena cruor non eſſue-  
 bat, aſt ea ſimul in vulnus expreſſa, columna  
 vermiformis & cruento coagulato ſenſum delabe-  
 batur; numquid hic morbus impoſuit Veteribus  
 pro congelatione ſanguinis, quam tribuebant  
 ſuppreſſis catameniiſ, hæmorrhoidibus, herpe-  
 tibus repulſis, & circa ſoliſtia & æquinoctia  
 frequentioreſſe profeſſebant; in ſimili caſu  
 ſanguinem revera frigidum, qualiſſet in piſci-  
 bus, tetigit e vena ſtillantem *H. Morgagni*, in-  
 tectadum corpus calebat ſatis, multaſque ſimi-  
 lia reſert exempla *Epiph. XXIV.*

7. *Asphyxia a pathemate. A.*

Subito gaudio aſphyctos evaſiſſe quodam,  
 alios a tetrore, quodam a gravi contumelia,  
 a funeſto nuncio, docent hiſtoriæ medicæ. *Di-  
 vus Auguſtinus* vidit Monachum qui pro lubitu  
 omnem ſibi ſepum & motum ætiam naturalem  
 adimebat. *Aluſter. Chryſoſtomus* vidit Chiliarcam  
 Tovvſhend, qui pro lubitu ſe vere aſphy-  
 ctum, & mortuum ſimilinum, Medicis attente  
 examinantibus præbæbat; ſed multo major eſt  
 eſſicacia pathematum, quam voluntatis in cor-  
 dis & pectoris motu ſuſſaminando; forte etiam  
 evenit, ut qui hos motus vitales in ſeipſis ſu-  
 ſpenderent, in ſe prius excitent vehementes quod-  
 dam animi pathemata: haud dubium eſt quin tra-  
 pædiarum Auctores, cum iram, metum, amor-  
 em exprimere conantur, ſequæ ſi pathematis  
 perſictos ſimulant, ſæpe recipiſſe hiſiſpſis vete-  
 ſticiantur; atque ſi fides eſt *Kloſchoſſio libr. de  
 morbis animi*, viſi ſunt qui cum mortuos ſeſſe  
 fingerent, obierant; quod ſi intelligat de Mo-  
 lerio, errat.

In his omnibus caſibus phlebotomia eſt pri-  
 marium auxilium, etiamſ pulſus nullus micet;  
 nec metuendum ne augeatur debilitas, cum in  
 hoc caſu, ſacilitas cordis ſit oppreſſa, atque ni-  
 hil aptius ſit ad cor ſublevandum ipſa phlebo-  
 tomia.

8. *Asphyxia hystericæ.* Lanciſi de mor-  
 tib. ſubitaneis; Bruchieri Mém. ſur les étiologies;  
*Suffocatio uterina Sennerti. Aſtruc. L. II. pag.  
 83. 97. A.*

Eſt ſubitanea omnium motuum vitalium, ſen-  
 ſuumque ſeriatio, quæ hystericis a principio  
 procataſtlico externo, ut animi pathemate, vel  
 interno, ut catameniorum retentione, ſuperve-  
 nit, dentibus invicem appreſſis, pulſu obſcuriſ-  
 ſimo, extremorum frigore, faciæ ſæpe pallo-  
 re, reſpiratione ſere inconſpicua, & qua ægræ  
 vel reſtitutæ, vel etiam in debilitiori paroxyſ-  
 mo ſignificant ſibi ſauces veluti laqueo contriſ-  
 gi; animasque ſimul eſt proſtratus, non raro glo-

bus quidam circa regionem uteri provolvi vide-  
 tur; præcedunt quandoque ofitationes, pandi-  
 culaciones. Diſtinguitur aſphyxia hystericæ a  
 morte, 1. ex ſignis hysteriæ habitualiſ; 2. im-  
 miſſio in vaginam digito motus quidam uteri  
 percipitur; 3. admotis cantharidibus excitantur  
 phlyctænæ in hystericis, nullæ in cadaveribus;  
 4. ullo talo excitantur hystericæ, ſi aqua Lu-  
 ciæ puriſſima nihil eſſecerit.

In paroxyſmo cardiacis, ſpirituofiſ, naſes,  
 tempora, carpi irrorantur; palmæ manuum ſe-  
 riuntur, pilæ avelluntur, ad aures inclamatur,  
 corpus etiam ſuccutitur, axillis hine & inde  
 ſuſtentatum; ſumi ſparguntur ex corio accen-  
 ſo; vena tundiſtur, ut liberior fiat circulatio;  
 frictiones calidæ ad eam promovendam adhi-  
 bentur; calor lineis & lateribus exaleſcaciſ  
 revocatur; potus cardiaci, antiſtyſterici, ſi poſ-  
 ſint deſiderari, propinquantur; huc aqua meliſſæ  
 compoſita, elixirum garus, ſal volatile ammo-  
 niacum, viperinum, karabæ, tinſtura caſtorei.

Si vires vitales revocari nequeant, in lectu-  
 lo calido tamen retineantur æræ, nec ullo mo-  
 do vinciantur collaris, cingulis pericelidibus,  
 nec demum ſepellantur, vel humo committantur,  
 ulque dum ſectore cadaverolo mors in du-  
 bium revocari nequeat. Docet enim obſervatio  
 non tato ſponte pro mortuis habitas, ad viram  
 rediſſe, reſoluto ſanguine quem cauſa morbiſi-  
 ca coagulaverat, vel ſexato, ſpſmo qui circula-  
 tionem intercipebat.

9. *Asphyxia a mephitis.* Collect. Acad. T. I.  
 p. 9. 421. Plomb. Mephete, A.

Mephitis eſt locus e quo vapor oculis incon-  
 ſpicuus, nec naſes ſerens, ſed ita leſtheriſ pro-  
 manat, ut quodvis animal ipſi immerſum intra  
 aliquot ſecunda temporis, nequidum clamore ul-  
 lo edito, moriatur. Cognoviſci mephitis ex eo  
 quod candellæ accenſæ in hoc vapore ſubito ſi-  
 ne fumo, ſine crepitu extinguntur; in illo pul-  
 vis pyrius accendi non poteſt; nulla ſcintilla  
 electrica ſiſi ferrei optime electriciſiſi micat;  
 vapor videtur acidus, vitrioliſ, ſpiritus ma-  
 xime rarcfactus, unde chartæ cæruleæ hic loci  
 detentæ rubelſcunt; aves in hoc convulſæ mo-  
 riuntur, exenteratæ pulmonem habent poſſice  
 lividum, cruore ſarſum; aves deſuper volan-  
 tes ſæpe ſubito conſidunt, unde hæ ſpecus *Aur-  
 ni* dicuntur: talis eſt ſpecus canis apud Neapo-  
 litanos. Tiberius in duobus ſervis experimen-  
 tum cepit; depreſſis intra vaporem capitis  
 ſervi illico mortui ſunt. Juxta Monſpelium in  
 loco *Peraule*, magna pars ſoliſi mephitis, bul-  
 litque frigide dum pluit in ſovea cuius aqua ſta-  
 gni vicini, vel pluvioliſ ſervatur, plures ægri  
 doloribus calidis detenti curantur; bullæ illius  
 aquæ a vapore mephitico exeunte ſunt, & ſine  
 periculo hauritur ille vapor ſubito expaſius,  
 qui ſi coerſceatur ope dolii utriusque paruli, tunc  
 leſtheriſ eſt omnino, ut expertus ſum juxta ſo-  
 veam: ſunt putei, quorum aqua eſt potulenta &  
 uſitata, in quibus ad unum alterumve pedem ſu-  
 pra

præ aquam est vapor mephiticus lethifer. Tribus à Memauo leucis est locus Bernis dictus, ubi lacus dictus *Bouillens* simili modo ebullit continet & frigide, eadem, nil fallor, mephitis.

In omnibus templis, ut B. Mariæ, S. Annæ, S. Mathæi, sunt cellæ subterraneæ, tumuli dicuntur, quæ vapore mephítico turgent; si quis statim atque operculum ablatum est ingreditur, is illico moritur, ut vidit aliquoties: vespillonnes pridie sepulchrum tumulum referant, & vapor mephiticus successively avolat, superficie semper ad libellam composita, & sensim depressa, usquequo vespillo ad genia tantum illi immergatur; is modo caput incineratum non demittat, periculo caret, ac feretrum verticaliter detentum delabi sinat, ne caput inclinaans vaporem lethalem hauriat.

Merito damnat *H. Professor Haguenot* usum cadavere in templis sepeliendi; tecti enim vapores, inde per simas exhalantes, possunt morbis epidemicis efficacissimis ansum præbere.

Tres rustici, vespillonum munus obeuntes, aut alter alteri opem latuci, illico simili tumulo extincti sunt; quartus qui fume vinciri se curaverat, illico extractus mortem vix vitare potuit, in aere frigidus constitutus, frigida coloris; cæteri licet intra aliquot minuta educti & tumulo, qui quidem clamorem moriendo ediderant, omnino & vivis intra aliquot secunda excefferant, quasi in ictu oculi.

1. *Asphyxia sideratæram; fulminis ictu & enecatæ* Boneti Sepulchret. de Apoplexia obs. 59. 60.

Fulmine icti minime apoplectici sunt, sed velut mortui aut syncopæ sine respiratione & pulsu, cum apoplectici stertant. Vide observationes in locis citatis.

2. *Asphyxia foricæarum*, vulgo *le Plomb* Hist. de l'Acad. R. des Sc. 1756.

Parisiis ubi amplæ & hercore refertissimæ sunt foricæ domuum numerosa plebe scatentium, crusta darur in foricis oceanum illum foetidissimum supernatans, quam si incaute superit foricarius, illico tanquam mortuus & asphycticus coëcidit.

Remedium est aer purus, & magna aquæ vitæ ingurgitatio. Apud Mutinenses non asphyxiæ, sed amaurosim incurrit hi miseri.

3. *Asphyxia statulenta, Apoplexia statulenta* Morgagni Epistol. V. 17. 30. Villis Anat. Cereb. Cap. IX.

Est mors subitanea, apparet saltem, quæ vel debetur aeri ventriculos cordis distendenti, vel statui arteriolas cerebri distendenti: ultimum casum bis videri observavit Morgagni: primum vero in hominibus, præter Morgagni videre Brunnerus, Hæderus, Albrechtus, C. Fabricius & in brutis factis experimento vidit Bergerus injectus scilicet aer in venas animalia subito enecat.

4. *Asphyxia Valsalviana* Morgagni Epistol. XXIV. 12.

Ea est quæ pendet a ligamentis in morbo genitis, quæ cordis superficiem, mucronem vel auresculas cum vicinis partibus colligant, ægri

hæc corpepi, quoties in latius alterum se vertunt, toties animi deliquo corripiuntur, pulsus in illis nullus; hæc vero ligamenta sunt fibræ ex gelatina concreta per calorem peripneumoniz, & ex cordis textu exsurgunt; similes fibræ cordis superficiem quandoque quasi villisam reddidere; nulla vero sunt ejus signa.

5. *Asphyxia traumatica.*

Est subitanea mortis imago superveniens ab ictu, casu, vulnere, commotione corporis capitisve; unde sæpe mors reallis accidit. A valido calcis ictu in abdomen ortam vidit Morgagni: ab ictu in epigastrium videre plurimi, quod scilicet ictu cordis mortis intercipitur; a lapsu in caput subleidet cerebrum, ut refert Hist. de l'Acad. R. des Sc.

6. *Asphyxia spinalis.* Duhamel Hist. Acad. Par. pag. 274.

Cum vir quidam illustris apoplexia obisset crederetur, in cadavere nil invenit *Duverney* pro causa morbi, præter quædam fluxum sanguinis in medulla spinali extravasati, unde coniecit in hac medulla a sanguine compressa nervos cardiacos & intercostales, qui vitalibus manibus inserviunt; resolutos fuisse, quod mors fere subitanea, quæ nova species, notatu digna; nulla est parcius læsio promptiorem mortem inferat quam medulla spinalis juxta primam vertebam.

7. *Asphyxia a carbonis*, Hist. de l'Acad. R. des Sc. an. 1701. & 1710.

Ea est quæ fumo carbonis vel suffocati, vel igne aperto accensi, in conclavi angusto & clauso inspirantur: *Hoffmann*, Obs. Phys. Chym. XII. van Swieten de Apoplexia §. 1010. Journ. de Med. Tom. XII. pag. 109. Tom. XXII. pag. 314.

8. *Asphyxia neoplytorum*, Feible des enfans nouveaux nés, Mauriceau Cap. XXVI. Lib. III. A.

Illæ debilitas vel pendet ex eo quod præcox & immaturus est partus nec terminum vitalem attigit; illi vero infantes, non asphycti, sed debiles quandoque sunt, atque ut plurimum sine ægritudine obeunt eo tempore quo nasci debuissent; calore debito, lacte selecto, molli cultitra, curæ assidua resocillandi sunt.

Si vero ob partus laborem intensiorem, longiorem, recens natus, qui pridie signa vigoris in utero materno dederat, jam non ejulet nascendo, sed immobilis, sine respiratione, sit, & cum obcurissima cordis & funiculi umbilicalis pulsatione, illico igni est admovendus, in molli lectulo jacens, ore & naribus omnino liberis, & a forde omni exemptis, ut facilis aeri pateat aditus; obsterit vinum ore detinens leniter supra os infantis calide insufflavit; plenaria vino madida naribus offerret, supra pectus & epigastrium apponeret; caveat ne cæpa bifariam secta, ut mos est, naribus admoda respiratio cohibeatur, ne abdomen placenta aggraveretur, ne expresso funiculo umbilicali sanguis residuus intra corpus retrudatur.



## ORDO QUINTUS.

COMATA, Aphonia Hippocrati; Morbi soporosi vulgo; *Assompiement, Lethargies, Affection soporeuses.*

**MORBI** quorum præcipuum symptoma est sensuum omnium, non raro etiam imaginationis, feriatio, vocantur vulgo morbi soporosi, vel affectus comatosi, seu comata.

Qui coma pro genere, non vèrò pro classe reputant, illi duas ejus species, coma scilicet vigil, & coma somnolentum statuunt, qua divisione a genere suo & vigiliam & soporem excludunt, interea dum coma morbis soporosis accensent, adeoque sibi contradicunt; quidquid enim generi tribuitur, id omni speciei conveniat, necesse est.

Veterini etiam dicuntur hi morbi; nam veterinus, ignaviam, segnitiam, aut torporem & otium, necnon somnolentiam, aut gravem aliquando somnum significat, & commune quiddam carn, comati, cataphoræ, torpori, atque etiam fatiditæ, necnon lethargo.

*Græci defin. de lethargo.*

Lethargi nomen Græcum, nomine Veterini Latino vertitur, & vulgo Galli morbum quemvis soporiferum Lethargiam vocant.

Sunt qui diversos morbos soporosos gradu tantum differre contendunt, adeoque ad unum reducendos genus, cujus species sint carus, lethargus, cataphora, apoplexia, &c. verum ipsi metum cum aditantes diversas curi, lethargi, apoplexiæ, &c. species, aperte consentit carum, lethargum, &c. esse totidem genera, cum genus morbi id sit quod diversas species sub se comprehendit, adeoque peccant in regulas Logices, sibi que contradicunt; plus autem vel minus, seu gradus, cum species minime mutet, genus a fortiori mutare non potest.

Diversis horum generum nominibus & Veteres & Neoterici varios significatus tribuerunt, ita ut in tanta loquendi inconstantia, Pathologus necessario debeat alerutrum significatum seligere, & cæteros repudiare, secus æquocationem nullus esset finis, unde perpetua confusio; hanc ut vitemus, cujusque vocabuli generici significatum definitione propria circumscribere debemus.

Feriatio sensuum & motuum liberorum, quæ hujus classis character est, non semper somni apparentiam repræsentat; si enim æger sensu omni motuque libero orbatus, solum priorem stantem aut sedentis servat, ut ecstasticus, catalepticus, vix pro dormiente habendus est; si vero humi procumbat, artubus flaccidis, nec siueum ab aditantes impressum servet, sed illi concutatur, is pro dormiente habetur, apoplecticus, caroticus; verum si sensu omni destitutus interea imaginationis suæ præbet indicia, & identidem dormiendi in seipso loquatur, gelu vario suum somnium prodat, is pro somniante

potius quam pro dormiente habendus censetur, & tales sunt lethargici, typhomaniaci, aut veterinosi: hos omnes ægros comatosos nuncupamus, licet non exigue sint inter eos differentia. Discrepant autem a syncopeis, quod vires vitales in illis superant; in syncopeis vero maxime languescant, calore in extremis sæpius deficiente, & colore in pallidum mutato.

Comata itaque in summa sensuum omnium debilitate, seu impotentia percipiendi objecta ambientia consistunt; immo in lethargicis & veterinosis, licet imaginationis vires vigeant, memoria saltem debilitatur; aut in caroticis, apoplecticisque & memoria & imaginatio, necnon omnes sensus obscurissimi sunt & suppressi.

Eo itaque redit comatum theoria, ut intelligamus quorsum sensus saltem feriantur, aut obsecurentur maxime, cæteræque etiam animæ facultates admodum debilitentur; sed tam parum hæcenus est exulta psychologia, tam obscura cerebri anatomia & physiologia, ut nihil certi de his pronuciari queat; ipsa pressio corticis cerebri, quæ pro causâ soporis hæcenus habita est, hodie a D. Lorry experimentis rejicitur, ita ut prudentius foret judicium suum de hac theoria retinere, quam interponere, nisi per meris conjecturis tradatur. Vide Comment. Ac. Paris. Mémoires des Étrangers, tom. 3. & de Lorry.

Omnis sensatio tribuenda est mutationi sâcæ organis nervosis; nec hoc sufficit, nisi mutatio illa transmutetur ad cerebrum, ut patet ligamentis, sedivis nervis; atque ulterius requiritur, ut anima ad hanc mutationem attendat, nec aliorum valide distrahatur ejus attentio; hinc concludere pronum est fluidum nerveum esse medium, cujus interventu transmittitur hæc impressio; fibræ enim nervosæ, utpote omni elasticitate destitutæ id non possunt; ergo hujus fluidi nervei, velut vaporis electrici, refluxibus idem alligavit fumus Creator; cum itaque nullum e cortice cerebri secerit nervum fluidum nerveum; nullus in nervis refluxus, nulla sensatio oriri potest, quod accidit etiam si secretum non transmittitur, aut transmissum non refluit, aut si fortis animi pathemate, aut terrore, vel profunda meditatione in cerebro retineatur, nec nervis suppeditetur; ergo nervi ligatura, excisio, substantiæ medullaris cerebri pressio a vasis vicinis, corticis compressio a tumore, osse fracto, visus turgidis, meningibus contractis, æquore effuso, ac demum vehementes animi pathemata valent sensationem suppressim; sed nisi suppressimatur transfluxus in omnes nervos organia externis famulantes, non dabitur anæsthesia illa generalis, quæ somnum constituit, & quæ cum libero transfluxu per medullares fibras cerebri; partibus internis tantum respondentibus, somnium ponit; certe partialis cerebri pressio non sufficit, nisi hujus occasione vehementer detenta anima, ut accidit in terrore & ænore, simul suppressimatur influxus in alios nervos. Cur autem nervi cardiaci tandiu recipiant fluidum nerveum, quando vita superest, licet quælibet pars cerebri vel

cere-

cerebri lædatur, modo spinalis medullæ initium interdictum sit? Nonne natura vitæ conservantem invigilans necessarium illum in cor & pectus influxum sustinet, organis ad vitam minus necessariis neglectis? Nonne organum ad motus vitales sustinendos maxime necessarium est illud quo nullum animal oritur, scilicet initium medullæ spinalis, quod datur in insectis, quæ cuncta carent cerebro & cerebello? Nonne certe laniones superesse vitam bovi, in juncu cephalum malleo fuit attritum, & cruro e corde ubertim effusus; aut subito & in oculi ictu pereire, si tenuis cultri lamina inter vertebrae colli supernas adacta fuerit, nec illico defungi capras, oves in macellis. A impressione anidi nervi pendet debilitas & sensationum & contractionum muscularium; verum principium quod sensationis suspendit in ecstasy, in catalepsi, non supponit in illis muscularem contractionem, unde non corrumpit homo ecstasy ad catalepsi deprehensus; ubi vero omnino artuum vis muscularis supprimitur, ut in apoplexia, caro vel multum minuitur, ut in lethargo, cataphora; corpus procumbit humi, nec se sustinere valet; nam ad orthostadum sensum stantem necessarius est actio fere omnium muscularum, qui truncum, crura, tibias, & pedes movent.

Ex positura corporis gradus facultatis motricis æstimari potest, nam orthostadi sunt majori facultate præditi; qui vero decumbunt semi-erecti, illi minori pollent; qui horizontaliter omnino decumbere coguntur debiliores sunt semi-erectis; atque inter illos, qui alterutri lateri pro lubitu incumbere possunt, majori facultate gaudent quam, qui supinum situm continuo affectant; ægri etenim isti suæ debilitatis consilium posturam servant, in qua minima vis omnium requiritur, seu vix ullius musculi contractio desideratur; talis est supinus & horizontalis decubitus; crenibus & brachiis exensis. Talem sitam præscribimus syncopictis, tum ne vires musculis contrahendis necessarias frustra impendant ægri, tum ne circulatorius motus sanguinis gravitate impediatur.

## XXV. CATALEPSIS; *Catalepsi.*

Est sensuum omnium motuumque muscularium suppressio superfluo pulsu & respirations obcurtissimis; & mira ad quovis situm retinendos, & suscipiendos, artem flexilitate.

Ægri subito corripiuntur paroxysmo per intervalla redeunte; præcessit mentis & corporis torpor cephalalgia; subito sensui omni, motuque orbantur, & posturam primam corporis, arthumque constanter retinent, sive erecti, sive fidentes; & post aliquot minuta plurimum, rarius post horas quasdam velat e somno exsurgunt, capite sublevato a gravamine & ad munia sua aptiores, sed temporis in paroxysmo transacti omnino immemores: quædam sunt in paroxysmo, atque quamvis posturam ex legibus mechanice & structura anatomica possibilem ab adstanti-

bus impressam conservant, maxime si catalepsi absoluta sit, seu perfecta, ut aiunt; sic manus erecta non delabitur, faciei musculi ad risum, ad lætum compositi, risum, vel lætum constanter expriment. Morbus hic chronicus est, & more epilepsie periodice recurrit; interdum simplex qualis descriptus est; interdum aliis morbis, ut hysterice, somnambulismo, rarius spasmo combinatus.

1. *Catalepsi hysterica.* Observat. Medico-practica, Pat. 1743, pag. 248. observ. 108. P. C.

Est quæ hystericas feminas aggreditur, cum flexilitate omnium artuum, & mira constantia in servandis quibuscvis posituris a vi externa impressis, excepto quod ob averationem medicamentum foetidum, ut spiritus volatilis salis ammoniaci, vel nares manu stringant, vel aliorum caput deflectant ægræ.

*Hysterica.* Helena Renault annos septemdecim, & ejus soror Oliva natu major, hysteriam ab menostasia patiebantur; Oliva post sex accessus emmenagogis & antihysterici sanata est. Helena vero ab istidem pejus bavit, & post duodecim accessus hysterice incidit in catalepsi, in qua tamen odorem spiritus salis ammoniaci ad decem pedum distantiam percipiebat, & manu naribus admota arcebat, immo auditu hujus medicamenti nomine sibi cavebat; si per vim admoveatur naribus pluma hoc spiritu tincta, illa horrendos clamores edebat, ita & furore percelleretur, & quæ antea ne loqui poterat præ debilitate, jam tribus viris se coerceri vix patiebatur. Hi accessus catalepticos plurius decies in mense recurrerant, sæpeque succedebant angina hysterice, cujus opprobrio decretescente cataleptica immobilitas subsequeretur, & catalepticos insultu levanescente ægra vertigine tenebrosa correpta, in pulvinar suum procumbebat. Quandoque tamen insultus epilepticos subibat; angina hysterica, cui violentæ convulsiones succedebant, cum delirio ingeniosiori quam ab ea ægra expectasses. Immo durante insultu epileptico sæpe somniabat Helena, (quod Magdalenæ Vincent catalepsi somnambula detentæ accidisse vidi); tunc volupe erat observare hanc puellam lecto insidentem, tranco immobili, capite inclinato, oculis pro aditantiu lubitu huc vel illuc converteris, brachiis flexis & insensis, ut in statua cerea, risu sermonem suum pronunciare; finito accessu apyrexia plena fruebatur, (id est, sanissima erat,) nec recidivam meruebat; sed vel a levi terrore, ingrato nuncio, quavis pathemaris occasione data, quovis odore ingrato, ut castorei, rutæ, in catalepsi inciderebat.

Sumpto lacte caprino, adhibita nasticatione, & exercitatione per duos menses a catalepsi immunis vixit, sed in urbem reversæ cataleptici accessus, cujus paroxysmos præcedebat summa asthenia, vel syncope; si tunc pungeretur, vel odorem foetidum olfaceret, illico catalepsi oriebatur dimidium corpus occupans, demum

TAMEN

tamen illi tres apoplexiæ cataleptici, vel epileptici: paroxysmi succedere, atque restituti per multos annos catamenii Helena radicatus sanata est.

*Cura.* 1. Frustra omnia emmenagoga per hos annos fuerunt adhibita; catamenia enim sponte demum redire. 2. Omnia foetida anthysterica nocere, minus tamen fumus chartæ accensæ. 3. Quindecim saltem sanguinis libræ e pede, brachio, jugulo in decursu morbi missæ sunt. 4. Aquosa emollientia feliciter succedere. 5. Syrupus de karabe hystericos insultus mire sedavit. 6. Ægram diarrhœa per duos menses detinuit, cathartici excitata, cui salutem suam ipsa tribuit.

2. *Cataleptis verminosa* Marcelli Donati Hist. Med. mitab. cap. 7. & Schenckii Observat. P. A.

Mense Julio anni 1757. puella octennis Nosocomii generalis plures catalepticos insultus passa erat; cum eam vidi, conquereretur de cardialgia, dolnibus vagis in abdomine, & de sensu corporis a ventriculo in œsophagum repentis. Præscripti aquilæ albæ grana decem; hoc assumpto medicamine insultum catalepticos passa est per duodecim horas perseverantem; sequenti mane eam inveni gemebundam, oculis clausis; cum vellejn digito palpebram attolere, retinebatur illa cum nictatione frequentissima, seu nyctagmo; maxilla inferior superiori firmiter erat appressa, brachia & crura quœlibet situm impressum servabant, immo motum paululum perficiebant; seu flexionem a me impressam paululum continuabant; de cætero nullus sensus, nullus motus, responsum nullum.

Repetita aquila alba convaluit, nec post hunc gravem paroxysmum ullus alter rediit. An verminis in abdomine tribuenda sit hæc cataleptis judicent alii.

3. *Cataleptis a fumo* Plateri lib. 1. obs. 18.

Est species a carbonum fumo hausta.

4. *Cataleptis a menostasia* Fonseca l. 2. Consultat.; *Sanguinea* Ballonii conf. lib. 2. hist. 1.

Illæ singulis hebdomadibus recurrebat, paroxysmo sex horas perseverante, & cum mensium suppressione; in illa specie faciei color bonus, & tristitia gravis præcessit; Hippocrates 2. *Præheritorum* malum hoc esse pronunciavit. De cataleptis a menostasia prostant observationes D. Pessant de Tour Journ. de Med. Juill. D. Michel Aculst. 1759. in utroque casu mensium eruptio morbum abstulit, quæ eruptio in altero casu post duos menses excitata fuit pediluvii calidis, frictionibus pedum, & litu mercuriali pluries iterato, sine syphilidis suspitione.

5. *Cataleptis melancholica* Ballonii Confil. lib. 2. hist. 1. P. L.

Talis erat puella, quæ cum nubere cogetur, in cataleptim incidit: Forest. obs. 41. lib. 2. Talis etiam bypochondriacus ab H. derheim memoratus, si tamen artus flexibiles remanserint. Mater, ex matris sui obitu ve-

hementissime afflicta, nullam lachrymam effudit; sed fixis oculis, immobilis tota die & sequenti permansit: Medicus accedens eam perfecte catalepticam cognovit, artus enim impositum quemvis statum servabant; tusa jugulari unicum clamorem edidit; immissa in balneum frigidum etiam signum sensationis protulit, sed ex hoc cito educta obiit. In Magdalena Valetta observaveram olim balnea etiam tepida catalepticis nocere.

6. *Cataleptis delirans.* Aq. Acad. Upsalienfis, ann. 1743. pag. 41. rectius dicenda *cataleptis somnambulans*. P. L.

Magdalena Valetta, puella multis sollicitudinibus prius vexata, hunc morbum per plures mentes passa est in Nosocomio generali anno 1737. primo quidem mense cataleptis erat simplex, sed pericla, pluries in septimana revegens; cum pulsu rarissimo, depresso, respiratione ita placida & obscura, ut vix perciperetur, calore exiguo, pallore nativo; paroxysmus aliquot minuta tantum perseverabat, quo tempore illam ita infleximus, ut brachiis, tibisque sursum versus totum corpus summis natibus insisteret, & æquilibrio servato, ibi remanebat ægra statum ceræ instar immobilis, & non minus sensu omni destituta; falsum est catalepticos stantes si impellantur progredi, saltem alio modo quam progredieretur statua; paroxysmo soluto ægra a capitis gravitate quam prius experiebatur, immunis erat. Altero mense Magdalena in quovis paroxysmo miram scenam ludebat, triplici actu, nam illico in cataleptim incidebat, post pauca minuta sui omnino compis videbatur, & ea peragebat, quæ sana, ingeniosa, & faceta agere potuisset, in statu summæ lætitiæ, quæ tamen ipso tempore quoad omnes sensus externos dictis non differebat ab statu in quo ab illis ludicris homuncionibus, quos pueris ostentant histriones, & marionettes vocant, quippe cantans, sibilans, facete narrans, lætitia exultans, & currens per cubiculum, visu, tactu, auditu, olfactu, gustu erat omnimode destituta, ut multis experimentis compertum habeo; post semi-horam alter catalepticos persectæ paroxysmus scenam claudebat; hæc suse recensita in *Actis Upsalienfis & Parisiis*.

Tusa vena cruror viscidis, non nisi expressus per vim effluebat; balneum tepidum extra paroxysmum tolerare non potuit, pulveres antiepileptici antea adhibiti paroxysmos frequentiores adduxerant, jusculli temperati nec noccebant nec proderant; sibi relicta convaluit, & rursus familiarium exercevit, eam post biennium interrogavi, & tenuit se ab hoc morbo non omnino immunem esse, sed paroxysmos esse mitiores, ita ut si corripere, dum dormit everberet, aut passim manibus versaret, opus suum quidem non intermitteret, sed visu, audituque sere careret, aut adstantes obscurissime perciperet; quasi somnio quodam detineretur.

7. *Cataleptis quartanaria*: a resolutione Ballonii conf. 2. P. C.

Anno 1727. in Nosocomio Alefienfis curabam militem annosum, qui quartana laborabat; & secunda ab accessu die non maniacus, sed stupida & delirus erat; tertia vero cataleptica, ita tamen ut licet omni sensu foret destitutus durante hoc paroxysmo, brachium quod sursum inflexeram, in eo situ constanter non retinebat, sed gradatim & sensim labi sinebat.

Opae emetici duo primis catalepticos paroxysmi sublatis sunt, tertius noctu superveniens ægrem & medio fustulit. Ea *cataleptis ferosa* mihi visa est multum discrepans a melancholica & a somnambulante, in quibus sanguis viscidus, & veluti coagulatus observatur.

Testis oculatus mihi retulit se olim vidisse Parisi mulierem perfecte catalepticam per meliores dies, quo singulis diebus hora secunda pomeridiana exiguam, digito suo supra lectum suum Dei nomen exarabat, quo facto rursus in cataleptismum relabebatur.

Cataleptis sæpe intermittitibus longis tertianis & quartanis supervenit, observante Ballonio, eamque lethalem censet ob virum resolutionem. Facies eil in hac specie pallida, edematosa, & serum luxurians eam inducit; in hac conscrunt carlatica, hydragoga, diuretica.

Quatuor cataleptens species statuit Ballenius, sed cum eas a causis seu principiis abditis deducat, nec character proprio insigniat, hujus diviso minus utilis est.

## XXVI. ECSTASIS; *Extase*.

Differt a catalepsi ex eo quod ægri artus non retineant situm quemvis ad adhaerentis impressum; æger tamen eam, quam initio insultus habuit, postquam constanter servat, & omni sensu motuque artuum oratur. Differt a catoccho ex eo quod a profunda contemplatione aut mentis attentione, vel gravissimo pathemate oriatur, nec artus omnes ita rigescant spasmodice, ut in catocchomenis.

1. *Ecstasis catoccha*. *Cataleptis* Henrici ad Hærs & Tulpii.

Convenit cum catoccho ratione rigiditatis corporis.

Capucinus inventus est aphonus uno genu terzæ insilens, dextra manu sursum exporrecta, & marmoris instar, utraq; frigida; oculis patebant, sed palpebris immobilibus, os habat cum respiratione libera & pulsu sat magno; cæterum statum Mercurii referebat; *Henricus ad Hærs, obs. 3.* Hic post viginti horas ad se rediit opo clysmatis acris, stupor calidissimæ, vini aromatici spinæ applicati, conditi cardiaci cum theriaca sæpe assumpti, cum revertebatur paroxysmus, quod ex colli rigiditate persentiebatur, statim oleo calido spinæ illito, eam prævertebat.

Juvenis Britannus, impense amoris indulgens, inopinata matrimonii repulsa vehementer per-

cessus illico instar Aspidis riguit, sedens in sedili suo quasi congelatus, retinens per integram diem eundem situm; jurasses certe res illatam potius quam hominem cernere, adeo fuerunt omnia non modo rigida, sed plane immobilia; Verum ubi exclamaretur alta voce, rem ipsius meliori esse loco, & cupitum habiturum amicum, modo ad se reverteretur, prosilire consilium & sedili, & quasi excitatus, e profundiori somno, rediit aditum ad se. *Nic. Tulpius, obs. 12. lib. 1.*

2. *Ecstasis resoluta*. A.

Ea eil quæ artuum rigiditate nulla stipatur, quæque a gravi terrore, aut mentis consideratione procedit.

Miles desistor cum audiret se a Tribuni capitalis satellibus cito correptum iri, incidit in ecstasim, & sic in Nosocomio delatus, nec interrogatus respondebat, nec quous membra retraheret, silens & immotus persistebat, oculis semi-clausis; atramentum samentis & sitim dato tempore compellebat; secta saphena, emeticum sumptis, rursus phlebotomia reperita est, & convaluit. Hoc viis anno 1728. Monsipelii.

Athenis est huic morbus relatus *Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1702.* de fabro lignario, qui audiens alterum, quem verberaverat, perisse, incidit in cataleptismum, forte ecstasim; quæ per quatuor menses diversis auxiliis restituit, & denum balneo frigido cessit.

Tulpiæque observationi similis est casus adolescentis Monsipeliensis, qui cum perdisse amare mulierem, & ab ea repulsum matrimonii literis acciperet, subito his peractis concidit omni sensu, motuque deliratus, superstitit pulsu, sed debili, oculis clausis, respiratione placidissima, frustra præmissis cardiacis, emeticum sumptis, post decem horas obiit. Observabat *Ill. D. Fizes, Med. Prof. Regius.*

Differt ecstasis vulgaris per flexilitatem artuum ab ecstasi catocche.

S. Augustinus refert se vidisse Sacerdotem, qui, quando ei placebat, & vadit S. Augustini conspectum, ad imitatas lamentantis hominis voces, ita se auserebat a sensibus, & jacebat simillimus mortuo, ut non solum vellicantes atque pungentes minime sentiret, sed aliquando igne ureretur sine ullo doloris sensu, nisi postmodum ex vulneribus. *Lib. XIV. Cap. 24. de Civitate Dei.*

3. *Ecstasis cataleptica*.

Puella pagi St. Sebastiani juxta Alefiam, 13. annos nata, per menses duos his morbo sequenti afflicta fuit, observata a D. Privat Med. Decatore Alefienfi, a quo historiam accepi. Sedebat ea toto illo tempore noctu & interdum, nulli interrogationi ullo signo, aut verbo respondens, parum cibi sumens, unde macilentia, cum pulsu parvo, raro, frigidula; alternis minutis noctu & interdum brachia in crotis formam extendebat, prolaris his verbis vernacula lingua: *Joannes, Joannes, Paradisum peto*; mox per minutum ululabat, atque demissis in ges-

E e nua

nona manibus pro du minuta quiescebat, idemque deinceps iterabat; cum autem brachia erant extensa, ea rigida erant; ad digitum cataleptici flexibiles impressum a Medico situm servabant: a primo insultu ejus morbi usus lactis eam liberaverat, in altero obiit; parentes hunc mortuum, ut solemus est inseri rusticis, fascinationi adscripserunt. Hæc anno 1738. An hac species differt a catalepsi melancholica? Vix credo.

A summo terrore syncope, immo asphyxiam lethalem subito oriri probant plures observationes. D. F. & Fanville, Doctores Medici juniores, ut rusticum ludibrio habentem, eum deduxerunt in amphitheatrum; rusticus ad conspectum sceletorum & instrumentorum suspensus, sine resistentia, & nequidem prolato verbo, supra anatomicam tabulam extensus est; tunc Fanville prælectionem anatomicam simulans, cultri anatomici manubrio incisionem cruralem in rusticum abdomine delineavit, atque statim miser in syncope incidit; terribi ipsi Doctores eum summa cum cura, ope cardiacorum, e syncope excitant, & ad se reversus æger gratias ipsis agens quod vitam sibi non abstulissent. D. Hagnon in simili casu olim carbonarium metu reapse exilans esse asserit, & culpa in Chirurgia alumnos refuendatur.

XXVII. TYPHOMANIA, Græcis *Agrypnos Coma*, *Coma* vigil Auditorum; *Marcus* Linacri; *Veterinus* aliis; *Modray* *Modrilla* Hispanis J. Peredæ; *Typhomania*.

Est simulatus aut apparens sopor cum pervigilio reali, vel sopor levis e quo ægri facile excitantur, cum delirio comitante.

Coma insomne, ait *Gerrans*, lethargicis proprium, est illud in quo ægri vigilantes manent, clausis tamen sere semper oculis, nisi excitentur; tunc enim oculos attollunt, & tangentem respiciunt, libereque tum sentiunt, tum moventur, atque etiam desipiunt, quod ipsi variae imagines obversentur, quæ illorum mentes movent.

Dicitur typhomania a *typhos*, febris maligna, & *mainomai*, insanio.

1. *Typhomania febriosa*, A. P.

Est ea species quæ tritæphæ, vel tertianæ accessum tertium, quartum vel quintum comitatur, de qua fuit *Torti*, *VVierthofus*, *Mortonus* quo egerunt, quamque primus observavit *Marcatus*.

Epidemica dicitur apud Hispanos, saltem Castellanos; viguit circa Nemaufum anno 1761. Unicam observationem referre sufficiat.

D. de la Calmette, Præfès Senatus Metensis, quinquagenarius, per sex dies febre remittente alternis diebus, & cum frigore exacerbante corpore, somnolentus erat, & ad delirium pronus; septima die paroxysmus fuit solito major, delirio coëctum, obscuro, cum sopore, quem per intervalla stertor comitatur, extremis frigidis, pulsu debili, accessit Nemaufum ubi degebat æger, paroxysmus desierat, & quartus imminabat, quem tertio periculosiorem prædixi, &

quem cardiacis, potissimum illo Paracelsi cochleatim exhibito, superare conatus sum; adebat enim per quinque horas frigus extremorum, pulsus exilis, sopor continuus cum stertore quasi apoplectico, facie cadaverosa; sed facile excubebatur sopor, atque tunc æger in seipso continuo musitabat; periculum augebat debilitas, paroxysmi sexdecim horas excedebat, sudoreque terminabatur; lingua erat nitida, nulla nausea præcesserat; his ita se habentibus, attripui intervallum a paroxysmo quarto ad quintum, quod in vorandis kinkina drachmis duodecim fuit insumptum; hac enim sola methodo quintus & hand dubie, lethalis paroxysmus præverti potuit; quo facto superfuit quidem pyrexia, sed cum pulsu magis evoluto; undecima die accessit aurigo critica; leve catharticum præscriptum est, & decima quarta morbi die, æger apyretos fuit, & convulsi, cum summo omnium bonorum, pauperumque gaudio.

Is morbus non est reapse diversus a tritæphæ apoplectica, seu tertiana carotica *VVierthofii*, si curationem attendamus; verum hoc singulare est, quod æger, cum sopore & stertore dormiret, facile tamen excitaretur, & tunc ad quæsitæ sæpius responderet, moxque obscure delirans in somnum & stertorem relaberetur; cum in caro & apoplexia æger alto sopore obrutus jaceat, nec quidquam audiat, loquaturve.

Ille eadem species stipatur quandoque febre intermittenti. Sic alter æger Nemaufensis, quem eodem autumno adivi, sopore cum hemiplegia, aliisque symptomatibus laborans alternis diebus, surgebat & lecto apyretos; quinto tamen accessit agrypnos-comatus obijt; urina in utroque affectu erat intense rubra; post adhibitum kinkina, stranguria fere imminabat.

Hic morbus differt a lethargo, quod sit acuta febre stipatus, & delirio non oblioso.

Tam variis sub formis attentis etiam Medicos deludit hic atrox affectus, quod patet ex historia Cardinalis Barbadoi apud *Morgagni* *Epist. XLIX.* 30. 31. ut ad genera diversa eum referre non dubitaverim, quippe periculum in mora, & si Medicus enim in prima invasione non cognoscat, de ægro fere conclamatum est. In casu illius Cardinalis primus paroxysmus intoluit stertorem, tendinum subsultus, pulsum perobscurum, nihil digito prementis resistentem & soporem. Signum diagnosticum singulare tradit *III. Fortis lib. 3. cap. 1.* quod scilicet interdum æger balbutiens verba mutilat, & onum pro alio proferat, non sœns ac si levi apoplexia, in paralytism degenerante, faret decensus.

2. *Typhomania continua*, Lethargus Hippocraticis; *Coma lethargicum* Rainaldi Fortis Consult. tom. 1. cent. 3. A.

Differt a priori, quod continuo, non per accessus, aut paroxysmos redeant symptomata soporosa.

In comate lethargico, ait R. Fortis, non abolerentur actiones principes, nec sensus & motus; & interrogatis patientes respondent.

Typhomania continua vulgo habetur pro symptom-

promate febrium continuarum, ut typhi, synochi; necnon remittentium, quarum paroxysmus a frigore non incipit, quæ proinde ope kinkinae non sanatur.

Hic morbus delirio & somnolentia continua stipatur; cum febris ad incrementum & statum pervenit, ægri continuo intra se debilitant, & somniant; alii interrogati respondent sæpius, sæpius sese loco movent, magis tamen somnolenti, & quieti quam in paraphrolyse febrili, ita ut si male vertat morbus, æger caroticus evadat, nec expergehi queat.

Has omnes species Medici vulgo febres malignanter nuncupant, & distinguere recusant; alii historia typhomania febricosa docet ipsoerrare quam periculosissime, cum in febricosa kinkina ex ore faucibus ægros eripiat in continua vero vulgaris auxilia, ut phlebotomia, hirudinesque sanguinem & cerebrum revellentes, præstare nitratæ, cathartica pro re nata solummodo profunt.

Parotides supervenientes, & suppuratio aurium in hoc morbo salutaria sunt.

3. *Typhomania agrypnocoma* Subeth sahara Africæ. *Coma vigil* Sennerti de somno præternaturali cap. 2. Riverii lib. 1. cap. 3. *Phrenitis comatosa* Heurnii cap. 17. Journ. de Med. Juill. 1766. A.

Est ea species in qua ægri, ad dormiendum continuo propensi, dormire videntur, clausis oculis, situ ad somnum composito; attamen vigilant & delirant, ita ut si eos tetigeris, statim oculos aperiant, & torve aspiciant, aut irascantur, iterumque delabantur in somnum qui variis somniis impeditur, ita ut vigilare cogantur.

Hanc speciem semel observavi, forte tamen pluries vidi; raram esse intelligi; morbus est acutus, exigua febre stipatus, seu pulsu porius frequenti, non valido; juvenis ea laborans intra paucos dies obijt.

Curatio Riveriana optima videtur; cathartica & emetica nociva sunt, ni fallor, & cerebri phlogosis incusanda est, non vero ejus atonia.

Typhomaniacum Heurnii, qui caput Monacho juxta ipsum dormientem abscidit, suribundus erat; alii sunt pacati; quæ diversitas a temperamento & circumstantiis repetenda est, nec exigit divisionem typhomania in veterosam & phreneticam.

4. *Typhomania verminosa* Breudeli. A.

Est species infans verminosis, & febricitantibus non infrequens; somniat, seu delirant, sæpius dormiant, & multum negotii Medicis facillunt; morbi acuti infantum sunt periculosi; quippe, ut constat ex Actis necrologiciæ Paræciæ B. Virginis Monspelii, ex centum infantibus eodem die natis vix tertia pars, seu 33. quintum annum attingit, & contra a decimo anno ad quinqueagesimum vix dimidio major pars moritur; adeoque mortalitas infantum esset odiosæ major, si intra quique annos dimidia tantum pars natorum moreretur, & cum moriantur duæ tertiæ partes, mortalitas est duodecies major infantum quam adultorum; magnam vero infantum partem morbis acutis occumbere

certain est, & periculum mortis, in diversis ætatibus, diversitate morbis, est in ratione complicita ex mortalitate hujus morbi, & mortalitate hujus ætatis; ita v. g. si typhomania verminosa sit duplo periculiosior quam est pleuritidis, prior in infante involvet periculum 24. vicibus majus, quam posterior in adulto: cujus scilicet ætatis mortalitas 12. minor est.

5. *Typhomania Martinicana*. A.

Ea est quæ a scolopendria morfu supervenit, cum sopore, delirio, & tumore partis demum, quo tumore aperto, seu suppurato, morbus sanatur. Scolopendriae ea species est, quæ Martinicanis *Galera* dicitur.

## XXVIII. LETHARGUS, *Lethargie*.

Convenit cum typhomania continua, ratione soporis levis ex quo æger facile excutitur, interrogatus respondet, & se loco movet: ab ea vero discrepat ratione delirii mere oblivisi; lethargicus enim somnolentus est & torpidus, omnium, utut recentium, obliviscitur, & præ signitie nihil curat.

Ad idem typhomaniæ & lethargum reduci posse crediderim, maxime cum lethargus in ore omnium frequens, in praxi sit rarissimus morbus, nisi pro morbo soporoso quovis sumatur. *Alienus* definit lethargum encephalum delirii continui, febris, soporis & oblivionis, *Conf. l. 2. 1. Lethargus a febre* Villisi obs. 2. A.

Est ea species quæ febrilibus ut plurimum continuis male indicatis supervenit, vel eas sequitur, quam videre mihi contigit in vetula synocham passa in hunc continuo jacente, segni, oblivisæ & somnolenta cum amphimerina.

Hic affectus certe diversus est a lethargo Hippocratis, qui intra septem dies ægrum medio tollit, & qui per empyema, id est, parotidum suppuracionem, aut similem apostasiam terminatur, observantibus *Mercenariis & Rivar.*

Vesicatoria occipiti admodum sunt præstans in hoc morbo remedium.

2. *Lethargus pulmonicus* Ballonii conf. l. 2. Baglivi de raris pulmonum morbis, pag. 91. 371. *Pulmonia lethargica* Hippocr. l. de morbis. A.

Invadit pulmonia cum lethargo statim in ipso morbi initio; oritur a putredine putri, & viscida pulmones siderante; tussis tenet cum sopore; cum morietus est æger; alvus liquefcit; non est propiciendum huic lethargo pro cephalica, aut per spirituosam, sed per expectorantia, putrem lympham & viscidam educantia; phrénici sæpe in decursu morbi lethargici evadunt, ut vidi post *Baglivum*.

3. *Lethargus a narcoticis* Villisi de Lethargo. A.

Diversi sunt effectus venenorum narcoticorum pro dosi veni, pro hujus specie. 1. Pro dosi. Nuper Monspelii plures nefarii capri sunt, qui viatores expoliaverant propinato vino, in quo semina daturæ stramonii contrita & insula fuerant; fassus est autem eorum dux plures ab eo veneno interceptos esse, cum ve-am veneni dosim ignorabat, atque ea dosi nimia lethargum indu-

inducebat; dosi vero minor tantummodo paraphrosynem minime lethalem in bene multis, quorum aliquot ipse interrogavi, creaverat. A majore dosi opii lethargus etiam inducitur, non raro lethalis, cum pulsu debili, facie livida, stupore & sopore summis; minor autem dosi, potissimum assuetos, quandoque exhilarat, reficit, leviter inebriat; quod etiam de vino dictum sit, ut norunt omnes.

2. Quo diversa specie veneni, diversa sunt symptomata, alia datura, alia hyoscyamus, alia belladonna, opium, vinum, conium, seu cicuta major, physalis somnifera, odor mandragoræ, narcissi, &c. producunt non satis adhue dum observata, aut distincte descripta. *Epist. ad v. apoplexiam, Villifus paraphrosynem*, alii duos morbos ab iisdem venenis inductos viderunt.

In his autem casibus venenum emeticis est expellendum e primis viis, dein tinctura, aut pulvere caustore, cum vino; lilio Paracelsi, alisque cardiacis, necnon aceto utendum est.

*Lethargus traumaticus* Villifus, seu a capite istum, vulnere, ad carum videtur attinere, & *lethargus typhodes* Villifus idem est morbus cum typhomania continua, seu febrem acutam, aut synochum comitante.

4. *Lethargus cephalicus*. Vide Foresti obs. 11. lib. 10. de cerebri morbis. *Lethargus apoplexialis* Pathol. method. *Lethargus Hippocr.* L. II. de Morbis. A.

Est lethargus acutus a cerebri inflammatione gangranæ dependens, seu cephalitis soporosa. Puer profundissimo somno detentus, hemiplexia lateris dextri videbatur laborare, neque movebatur, neque sentiebat, nec respondebat; alii subinde garrire videbatur mottando quæ nemo intelligebat, quarto die obiit; secto crani verò, non vermes inventi sunt, ut putabant, sed cerebri & cerebelli pars dextra laminis, putrida, corrupta, sphacelosa. Dissert hic morbus à cephalitide per altitudinem soporis, & absentiam oblivionis, quæ oblivio supponit aliquam vigiliam, demum valde affinis est cum typhomania verminosa. Vide *Lethargum mentis* Clar. Preysingeri.

5. *Lethargus arithmeticus* Villifus. *Lethargus periodice repetens* seu *hydrops cerebri*, Car. Pilon. Morbi a serosa colluvie, pag. 93. A.

Præful arthritidis paroxysmis quotannis obnoxius cum febre versus septimum diem patiebatur lethargum, qui unam aut duas hebdomadas perseverabat, doloribus somno locum accedentibus, ex quo non excitabatur, nisi ad potum, cibumve sumendum. Huic sopori se adungebat tremor totius corporis, sed jam latens ut pulsus tantum convulsivus proderet; ille vero tremulus motus fposito accedebat, vigilantissimo; oculi erant conualescentes, immobiles, ac madentes; facies tumida ac decolor, nisi ratione sobriogenæ ruberent; corpus erat enerve & elumbæ. Præterea ingens mentis stupor, perpetua sui negligentia, & necessariorum rerum oblivio; nil agebat aut annuebat æger, nisi perpetuo ex-

citatus aut compellatus, per tres vel quatuor annos arthritidis recursus hic morbus comitatus est, usque ad mortem: hic sopor depingitur ab *Hippocrate Concorum sect. 1. a. sent. 26.*

Mihi autem evidens apparet principium hujus morbi fuisse materiam arthriticam cortici cerebri impactam, & sensim intra quindecim dies resolutam; & gratis hydropem cerebri a *Carolo Pifone* accusatum fuisse.

Diffrat hic afflicto a caro quod erat tantum magna dormiendi cupiditas, non profundus & insuperabilis sopor; a cataphora per febrem comitem.

6. *Lethargus a frigore* Petr. Borelli cont. 1. oblect. 32. A.

Arnardus Coquus Castrensis, qui erat vitivox, seu impune vitrum vorabat, frigora nivis in itinere perpelus, incidit in lethargum. (*Vide syphmaniam a frigore*.) Per plures dies inlar mortui & cum metu suffocationis non medipici fuit. *Borellus* a thiburi vesicatoria, cucurbitulas scarificatas, lernutatoria & tandem caitorei scrupulos duos, & scammonii scrupulum unum, cum oxymelire pro duabus dosibus, & sic sanatus fuit. Utrum vero lethargus sit, an carus, dabium mihi videtur; cum Veteres hæc nomina indifferenter usurperint.

7. *Lethargus litterarum* null. van Svvietsen. 1010.

Qui libris diu impallefecit, vitam agentes sedentariam, mente continuis studiis detenta, nec exercitiis corporis recreata, cerebri sui tonum enervant, hinc debiles corpore, quietis & otii amantiores, vires etiam animi sensim amittunt, ipsi demum mens hebetet, vacillat memoria, stupidi, oblivisi, verbo apoplexia corripuntur. Nihil est utilius ad scientias adipscedas, quam experimenta lectioni & studio immiscere, & sic Hydraulica, Mechanica, Dioptrica experimentis iteratis ad pauca principia applicatis sine fastidio susceunt mentem, exercitio corpore vires resarciunt corporis, atque multo majores sine sanitatis damno sunt in dotrinis progressus.

## XXIX. CATAPHORA. Coma somnolentum Auctorum. Subris Arabum.

Cognoscitur ex somnolentia continua, sine febre; sine delirio, ex qua æger excitatur, respondet, oculos aperit, se movet, rursusque obdormiscit.

Diffrat a *typhomania* & *lethargo*, quin cataphoricas non delirat, & *apoplexia*; quia non stertit, nisi morti proximus; a *caro*, quia carotus febricitat, non cataphoricus.

1. *Cataphora somnolentia*; *Somnolentia continua* Villifus cap. 4. *Dianthesi* *soporosa* quibuldam; *La Somnolence*. L.

Hac species est habitudo dormiendi interdia ultra quam fert ætas. Infantes siquidem quojuniores sunt, eo plus dormiunt; seors vero vigilem magis degunt vitam; unde adagium *juvenes vigil, & vetus soporiferus*, utroque morti proximus, quod quandoque falsum est. Somnolentia quoad reliqua, satis valent, bene edunt ac

bibunt, foras obambulant, res domesticas medicriter curant, atramentum inter loquendum aut ambulandum aut edendum etiam nec saturas subinde nutant, & ni ab aliis fuscitentur, mox somno obruantur, atque hoc modo non solum dies aliquot aut menses, sed per plures annos, ut de Epimede fertur, somnum fere continuam dormiunt.

Humiditas non alce insidens cortici cerebri vulgo incofatur: hic affectus quandoque ad ultimum sensum sine ullo periculo comitatur; interea quia dimidia pars vitæ ab hoc frustranea evadit, & inde, ni obviam eam, peiora subsequi possunt, huic medendum est, selectu præsidiofum sanitatis, ut potiù calidæ, alimentis licet, odoratu spirituosum, ut salis volatilis ammoniaci, potu corvæque diureticis onustis, infuso theiformi florum salvia, betonica, pteleolis aromaticis, tabaco, similibusque, præmissis etiam phlebotomia & catharsis.

2. *Cataphora comata* China somnolentum Auctorum; *Leibargus* vulgi; *Subeth asarem* Avicennæ; *Le Subeth* A.

Sopor est gravis, ore hiant, maxilla inferior demissa, oculis clausis, facie sæpius pallida; pulsu raro, quandoque depresso, artubus omnibus flaccidis; mortuus similes Juncæ ægri quam vivis; a vesicatione fortiori aut punctione fuscitati oculos aperient, adstantes circumspiciunt, interrogatis respondent, atramentum quo iterum dormientes nihil curant, & non nisi acriter excitati oblata desolantur. Hinc multum discrepare a somnolentis, nec enim per intervalla obambulant, aut colloquia miscunt.

Ex his comatosi, alii, ni succurratur, intra aliquot dies moriuntur, accedente respiratione sterotia, quæ in reliquis morbi decursu fere inconspicua est & placidissima; alii vero per menses aut per annos dormiunt, qualem memorat *Humbertus Hist. de l'Acad. R. des Sc. Ann. 1707.* quæ quidem varietas *cataphora chronica* nomen meretur; verum quo modo ab initio discerni possit, a priori inquirendum restat.

Hinc morbo acuto obnoxii sunt senes, etiam si nulla causa evidens saltem sufficiens cognoscatur; & nulla crapula, nulla utinæ, formæ læ suppressæ; in hoc magnus est sanguinis lentor, qui per mechanicas corporis succussiones discutitur aliquandiu, hoc plebs ipsa novit, quæ comatosi hinc, & inde humeris comprehensos ambulare, & saltare cogit, aut fasciis infra lumbos trajectis mollius exagitant sursum deorsum: huic auxilio par est & utilior vomitio per artem excitata, catharsis acris huic succedens, iulapia cephalica & cardiaca interpolata, frisiones, vesicationes, sternutatoria, antispasmodica, ut calidiorum, karabe, vesicatoria, spiritus cornu cervi, fuliginis, salis ammoniaci, &c. Varietates hujus speciei sunt:

3. *Cataphora scorbutica*. *Coma somnolentum scorbuticum* Frider. Hoffmanni observat. 2. A. Cognoscitur ex urina rufescente, absque siti, ex prægressa corporis lassitudine, crurum dolore, scribis intermittentibus, pulsi debili, &c.

*Savantus Nosologia Methoica*. Tom. I.

verum ea signa cachexiam potius quam scorbutum designant.

4. *Cataphora arthritica*. *Coma somnolentum chronicum a refulsa podagra* Frider. Hoffmanni, observat. 9. A.

5. *Cataphora exanthematica*. *Coma somnolentum a refulsa erysipellate* Frider. Hoffmanni, observat. 3. A.

6. *Cataphora hydrocephalica* Schneider. de Affectibus soporosis pag. 24. Boneti Sepulchret. obs. 9. pag. 157. Tom. I. item 7. 8. 10. 11. 12. 13. &c. Schwencke vari casus explicatio, in quo Boerhaave aquas Spadanas, sed infeliciter, præscripsit.

Est species quæ a feri exundantia in diversis capitis partibus dependet, siue ille hydrocephalus externus vel internus sponte accessit, siue a suppressis alvi fluxibus, urinis, fontanellis, &c. ortum duxerit.

7. *Cataphora chronica* *Hamburgii* Hist. de P. Acad. R. des Sc. ann. 1707. C.

Vide Suidam de Epimede. Semelster *Cataphora* sine sensu & motu narrat *Humbertus*. Somnolentia durat non raro præcedit a pervigilio nocturno, quod observandum est, ita ut hic affectus sit tunc somnus inordinatus.

In convalescencia a morbis acutis somnolentia est salutaria, ut initio febrium periculosa est.

8. *Cataphora simor* Spigolli de Semicertiana. A. *Timor* est morbus in Germania & Pannonia frequens, quem sic vocant Austriaci, Moravi, & Styrii; ille inter apoplexiam & epilepsiam quodammodo ambigit. Cadunt enim ægri vel apoplectici sine sensu, non tamen motu priuantur, sed non convelluntur, ut epileptici, nec discussio morbo paralyfim alicujus partis incurrit: hunc morbum ipse bis vidit *Werbstus* Hanoveræ: cum sopore artus anxie judantur. Hic affectus se comitem dederat accessibus febris intermittens, eumque opo kinkinz de bellavie ille illustris vir.

XXX. CARUS; *Carus* Græcis dicitur, a *carosus* gravari; *Marci* Celsi; *Pressura* Cæli Aurellani de Acutis c. 2. *Periculis* Pollidoni apud Actium; *Gravis dormitatio* Rhasis; *Gravitas* Theod. Gazæ; *Sopor* Mercurialis; *Torpor* Latinis; *Stupor* quibusdam; *Apoplexia minor* Auctorum; *Assompelement* caretique.

Carus cognoscitur ex somno altissimo, vix excitabili & respiratione tacta pacatissima.

Differt a *cataphora* 1. quia carotici vix acie vix quidem penitus excitari possunt a somno, nisi sanentur. 2. Quod excitati per aere vesicationes oculos aperiant, sed nec moveantur, nec interrogatis fere respondeant, rursusque in soporem delabuntur. 3. Quod carus sit morbus acutus paucorum dierum, sæpius cum febre, faciei rubore, oculis semi-apertis.

Ab *apoplexia* discrepat in eo, quod carotici non sterant, sed pacatissime, rarissimeque respiciunt, unde desinitur a *Mercuriali* somnus longus.

E e 3



gus, profundus, negre excitabilis, cum facultatum principum, & præsertim imaginationis læsione, sine respirationis detrimento. Notate vero in typhomania & lethargo imaginationem lædi, cum detur in ipsis delirium; minime vero in cataphora, caro & apoplexia. De cætero ægri omnino prostrati, & flaccidis artibus jacent, ut in apoplexia. Incipiens tamen Carus excitatur, & æger artus movet, sed non loquitur; oculi non sunt clausi, maxilla difficulter diducitur.

Qui omnes sopores ad unum genus referunt, & carum, cataphoram, apoplexiam, lethargum, & apopiam totidem ejus speciebus habent, illi maxime errare mihi videntur, cum progere habeant ordinem, & ipsi admittant cujusque speciei alias species, quod est peccare in regulas logicas, quidquidem sub se species immediate comprehendit, id pro genere habendum est. Quodam forte cognoscere Medici diversitatem sedis affectæ in quolibet genere, quodam clarius innoscentem principia & remedia cuique speciei convenientia, & clarior erit specierum, generumque distinctio; interim cavendum est ne nomina confundantur.

Theoria quorumcumque generum ita hæcenus est adhibita, ut quæ de hac profulerunt eximii aliunde Auctores, ut *Willemsius*, *Bellinus*, *Hoffmannus*, sint mete græcoita & ficticia; ab hac itaque theoria abstinendum sit ut esse putò, quæ non nisi fortuito in veram praxim manuducere possit: empirica itaque praxis ex historia morborum & theoria classica deducenda est.

#### Gari pyretici.

1. *Carus spontaneus*; *Apoplexia minor sanguinis Riserii*. *Carus* omnium Auctorum; *Apoplexia* Hippocratis, A.

Est ea species quæ a cephalalgia & vertigine initium dedit, cum pyrexia acuta, continua, faciei rubore, corporis calore, pulsu frequenti & forti; hic morbus plethoricos, crapulosos, seu imtemperantes, adultos, gravidas adoriri consuevit, nausea sæpe antecedit, quæ gravi cephalalgia tribuenda est, cum lingua aliunde nigida est, nec ullam saburram in ventriculo designet. Observandum est pulsum omnem in morbis soporosis evadere solito rariorem, ita ut pro frequenti habendus sit in caro, si nativam frequentiam obtineat.

Hic morbus vulgo exitu plutes e brachio & pede phlebotomias, interposita magna dosi tartari emetici; febris ad synocham attinet; & morbus hemiplegia quandoque solvitur, ut apoplexia, vel remediis apoplexiæ sanguineæ cedit; secus convulsionibus supervenientibus ægrum e medio tollit, aut mors apoplectica claudit.

2. *Carus febrilis* Sydenham. p. 238. & 395. *Carus* & 3. *species* Frid. Hoffmanni, can. 2. §. 7. A.

Io tritæophya & hemitritæo, quæ autumnu ludit per plures dies sopora tertiana, nec non in continuis malignis seu typhicis, cæta vigorem morbi, quandoque accedit illa species cari quæ videtur pendere a nisu naturæ ad parotidum exclusionem, aut ad sanguinis criticam ex au-

ribus, oribusve ejectionem; quippe in hoc morbo parotides nunc feliciter, nunc infelicer succedentes vidi. Ea autem species longe differat a typhomania febricola in eo quod 1. typhomaniam febricolam comitatur somnus levissimus facile excitabilis cum delirio; 2. quod typhomania febricola inducitur a veneno febris intermittens, quod kiokina ante tertium quartumve paroxysmum magna dosi assumptum valet abigere; in caro febrili sopor est profundus, lingua, labia, dentes, nigredine sicca conspurcantur, nec sopor altus tertium, quartumve paroxysmum attingit, sed longe tardius accedit; emetica initio & cathartica repetita, præmissis phlebotomiis hunc soporem ævertunt aut tollunt. Licet *Terti* & *VVerrhof* tertianam caroticam memorent, accuratori facta indagine exilimo non caroticam, sed typhomaniacam esse illam febrem.

Carus febrilis differt a spontaneo, quod in primo febris oritur cum rigore & horrore, in spontaneo pyrexia sensim accedit, sine his præludiis, & sine frigore subitaneo exacerbatur secus ac in febricola.

Videntur cari febriles cum hemiplegia & febre synocha; aut etiam typho; ægri sicin raro sentiunt; at lingua successive exsiccata, arida, dein nigrescens, motus febriles identidem crescentes, calor corporis, obsequunt a materie biliosa, acri & veluti febrili infarciri vasa cerebri & medullæ spinalis. Hemiplegia rite succedens ægri morem ad annos proteralliat; sed ægri illi emaciantur, & apud eos non ita infestandum est sudorificis, ac si pituitosa foret hemiplegia.

3. *Carus febrilifolus* *VVerlhofii* Ohl. de Febris. f. 1. & 3. *Montali* Synops. de Caro. Galen. Comm. in Prothieric. 1. Vide quæ de apoplexia febrili scripta sunt. A. P.

Casus ille intermittentium accessu primo, aut secundo prænunciatus, tertio invadit, & funestissimus est.

Cura in paroxysmo non multum soporoso, remedia tantum temperantia & rescientia, cum spiritu volatili acido & infuso theæ, ad expectandum paroxysmi exitum exigit; cathartides etiam cruribus admovere consultum est; verum finito paroxysmo remedia generalia præsto sunt adhibenda, ut phlebotomia, emeticum, cathartica, modo sint indicata; sæpius phlebotomia & pede necessaria est, emeticum ex uncia una vini emetici non ausus est ineunte paroxysmo dare *VVerrhofius* alvum, si opus est, solvit pulpa tamarindorum in sero lactis, si fervor sit, nec non elysmata cum melle nitrata cum vino emetico, aut colocynthidis & kinkina.

Io paroxysmi ipsa vesicatoria plura ad carpos, nucham & caput rasum; phlebotomia, internutamentum ex helleboro vel turpetho minerali, frictions, &c. præferimus. *Radcliff* in soporosis resina jalapæ scrupulum præbebat; alii jugularem, alii arteriam temporalem fecant; alii plantas pedum adurunt; *Engelmann* succum nasturtii aquatili potandum præbebat, cui adjungit *VVerrhofius* spiritus salinis volatiles.

Si sopor cum paroxysmo non evanescat, aut æger sit typhanicus, hemiplegicus, febre inflammatoria detentus, de eo concludatur, aut saltem kinkina non convenit; secus vero quancoculus, & tertia quaque hora pulvis ad drachmam unam est devorandus; ita ut uncia una infra duos paroxysmos sit assumpta, potu theæ superaddito; si interea phlebotomia aut catharsis necessitas interveniat, suspensus kinkinæ usus deinceps revocabitur, immixta post periculum dosi.

Observatio. Vir triginta annos natus, tertio febris triphymæ paroxysmo per octo horas anticipante in profundissimum soporem delabatur, stertens, nil deglutire valens, ore licet hiant; præscribitur phlebotomia præmissis vesicatoriis; Chirureus venam secare non ausus est; interea deglutire valuit æger, præbetur kinkinæ drachma, dein alvus sponte solvitur, sudor prorumpit; sumpto potu theæ æger oculos aperit stupefactus, quovis biberio kinam sumit, largiter sudat; finito sudore, vena pedis aperitur, vesicatoria applicantur, kinkina ex succo nasturtii aquasque cum spiribus viarum volatilibus guttis viginti mixtum deglutitur; paroxysmus cedit, nec anticipavit, cum somnolentia tantum & levi delirio, post sex horas sudore intereuto, febris abiit. *Vid. Hoffm. ibidem pag. 106.*

4. *Carnis ischuriæ* Boneti Sepulchret. obs. 15. *Carna ex ischuria* Velschii, obs. 1. & 64. Nicolai Tulpii lib. 2. obs. 45. Beverovicii de Calculo, cap. 9. Fel. Plater. obs. p. 304. A.

Illæ species est secundaria, & supervenit ischuriæ, sive veræ, sive spurie, ob urinæ refluxum; unde sopor cum siti, calore manuum, febre, subultus, dein tendinum & morte. Hoc morbo carissimus patens obiit 90. annos natus, & cum paracentesi vesicæ debuisset instituire Chirurgus, catheterismo ita imperite instituit, ut urethram & simul rectum intestinum perforaverit. De paracentesi vesicæ in hoc morbo conveniente videlicet recentiores Chirurgus, qui stylo tricuspidæ, curo, vaginato perinæum perforant.

5. *Carnis traumaticæ* Bonet. Sepulchret. obs. 22. ad 23. A.

Est ea species quæ a principiis mechanicis externis dependet, ut a vulnere, contusione, fractura capitis.

Cognoscitur ex adstantium reatu, ex capitis accuratâ inspectione, tegumentorum ejus tumore, ecchymosi, ossium crepitatione, maxime si incisus tegumentis; raso pericranio, rimosum inveniat cranium; si æger a percussione illico lapsus, in soporem incidit, vomuerit, sanguinem naribus, auribusve fuderit; accedit febris acuta, calor, secto cadavere inveniuntur sanguis, pus, sphacelus, depressio laminarum cranii, contrahiturque &c.

Curatio exigit repetitas embrasio, pede, phlebotomias, potum diluentem, antiphlogisticum, jussula tenuia, rara, si com capitis acclivem, clysmata refrigerantia, & auxilia potissimum chirurgica, trepanum scilicet, aut ope-

rationes ipsi affines, de quibus consulantur *Hellstern*, *Dionis*, alique de fractura cranii.

Egregia extat observatio cari in quam medicus inciderebat quoties paulo fortius sibi premi menagebat sineret, quas a carie denudatas ostendebat. A trepano imperite instituto, & inde compresso cerebro eorum obortum observavit *Galenus*, dein *Mercurialis*. Carotidibus obstructis ligatis statim obdormiscimus, cuius quidem periculum scissile *Realdum Columbum* Pisus anno 1544. ipse vidi in adolescente quodam, non minori adstantium terrore, quam nostrum risu, qui id incantamenti vi effici ipsis persuadebamus: *Valvardus*. Verum id carotidibus ligatis non accidit; in canibus sunt experimenta *Clar. Ernest Hybemi* quibus intertuit: sed de his vide *Morgagni Epist. XIX. 30.*

6. *Carnis arthritidis* Mulgrave de Arthritis de, cap. 16. A.

Est ille quem materies arthritica, ut ajunt, repulsa vel ascendens infert, seu qui arthritici sine causa alia evidenti, præter doloris cessationem, accidit, quippe dolore pedes iterum repente, sponte evanescent.

7. *Carnis verminosa* Sennerti cap. 31. A.

In orphnographis nil est vulgatius quam infantes caro verminosa corripit cum febricula, genarum robore fugaci, sopore profundo, odore acido-bulci, qui sumptis emeticis vel cathartici; lumbrosos effluunt; in cadaveribus sæpius inveni serum in cæcchi sinibus, & lumbrosos in intestinis; ante mortem vero convelluntur: *Vide EHamsiam verminosam.*

8. *Carnis variolosa* Sydenham de Variolis, p. 85. 98. & 395. A.

Est sopor profundus, qui in quolibet variolæ cum discretæ, cum consuetis statu supervenit a nimia sanguinis fervore; talis est sopor, ut æger ferme nunquam evigilet, nisi continuo pulsu excitatus, in quo casu sanguinis ventilatio per phlebotomiam, & potus refrigerans potissimum indicantur. Prestio discitis cerebri a sanguine fortius vasa ultima distendente videtur hujus morbi principium.

*Cari Apyrati.*

Seu qui sæpius sunt cum pulsu pacato, oon concitato.

9. *Carnis hystricus*: *Anna* Heraclidis; *Suffocatio mulierum* Plinii; *Fiatuosa refrigeratio* Sorani; *Pnix hystrica* Galeni; *Strangulatio ex utero* Roderici; *Suffocatio uterina* Latinorum; *Poniva strangulatur* quibusdam; *Aspexia spasmodica* Lorry de Melanch. Part. I. p. 115. *Suffocatio uterina* Latinorum; *Suffocatio hystrique*; *Plebi Ital de mère*; olim *l'Amarr* Joubert. B. P.

Est subitanea omnis sensus & motus cessatio, cum respiratione vix sensibili, pulsu depresso, partium refrigeratione, maxillis invicem firmiter conniventibus; paroxysmos vero præcedunt sæpius pathemata vehementia, & metus mortis, necnon sensus strangulationis, dysphagiæ, glo-

bi in abdomine voluntatis; post paroxysmum vero facpius ægre declarant se loqui, nec movere potuisse, aut prolata obscure audivisse, quod etiam gestu in insultu significant.

Hic morbus, utut frequens, a nemine fuit fideliter descriptus, quia omnes causam loco phænomenorum tradidere, Sic *Paulus Ægineta*, quem fere omnes Veteres imitati sunt, hunc definit per recursum uteri ad superiora; sensus angustiae in faucibus, de quo antea, postea conqueruntur ægrotantes, ad signum illud Medicus induxit, & ex hoc signo factum est ut *prælocatio* habita sit tamquam essentialis symptoma, licet non magis videatur prælocari mulier in hoc morbo, quam in syncope, respiratio etenim est ita pacata, ut vix percipi possit, totumque corpus immobile est; unde *Moschus* hunc definit respirations impedimentum, cum omnimoda quiete, & *Heraclides apænam* nuncupavit: majori quidem jure apoplecticos dices prælocatos, cum in ipsis respiratio sit sublimis & stertorosa; aut in caro hysterico tam quietum est totum corpus, ut ægræ mortui sint similes, observante *Mercuriali*. Factor plures morbos hysteriarum spasmodicos esse; sed etiam in caro dentes stridit invicem coherere, illud a refrigerio faciei & maxillarum pendere videtur, atque in synopticis refrigeratis accidis, *Baglivi* refrigerium in occipite pro symptomate essentiali habet; alii pulsum tensum & conflatum; multis supervenit urinae limpidæ copiosa emissio, & paroxysmus a pathemate determinatur: quibuldam oris distortio & lateris unius resolutio supervenit, sed fluentibus caramenis non raro morbus illico evanescit.

Hic morbus vulgo tam contemnitur ab adstantibus, quam exhorrescitur ab ipsis ægris, & sepius fumis foetidis, calore, ruta, &c. discutitur; verum tamen constat multiplices observatione eum in asphyxiam hysteriam abiisse, & pro mortuis habitas illas asphyxias humo mandatas fuisse, alias reapse occubuisse.

Viros etiam huic morbo obnoxios hypochondriacos scilicet, memorant *Mercurialis* & *Montanus*, quos quidem angina hysterice expositos tantum vidi; aliud est vero angina hysterica, aliud carus hystericus, licet a multis confundantur; in insultu phlebotomia, sed parca minime est repudianda, licet repetita evacuationes hysterice noceant, hac instituta pulsus resurgit, interea linteis calidis, potu cardiaco & antihysterico, fumis foetidis, residuum insultus discutitur.

10. *Carus a plumbagine*. An Varietas Cari a narcoticis?

Infestiores qui decoctum plumbaginis Europæ *Linnaei* parant in magnis lebetibus, ut colorem *paleaceum* flavum obtineant, non nisi per sex boras huic operi incumbere possunt, secus incident in eorum cephalalgia gravi designatum; folia hujus plantæ caustica sunt eximie, cicutæ venena, cancri remedia, &c.

11. *Carus a pathemate*. *Catalepsi* 2. Journ. de Med. May 1764. pag. 411. A.

Adolescens viduum amans perditæ, & ejus obtinendæ longæ pæ demum excidens, accepto repulsæ nuncio per epistolam, procubuit humi sine sensu cum lentissima respiratione, pulsu sano, sed subdebili, oculis clausis; accersitis Medicus præscripsit cardiacam, & simul emeticam potionem, incassum; eadem die æger occubuit. An catalepsi a *Tulpio* relata idem erat morbus? Sed arctum laxitas repugnat.

12. *Carus ab insolatione*, *Comp. de Jussieu*. A.

Est omnium sensuum & motuum cessatio, pulsu & respiratione pacatissimis, immo immunitis; artubus omnibus flaccidis, colore tamen & calore remanentibus, quam aliquoties observavi in puerulis qui ad solem diu steterant aut dormierant, nec poterant ab hoc sopore excitari: lethalis toties fuit hic morbus & brevissimus; phlebotomia repetita, frigida capiti admota sine successu adhibita sunt; pulsus erat minime febrilis; secto capite nihil illi inveni.

13. *Carus hypochondriacus*; *Apoplexia hypochondriaca* *modica* *Frid. Hoffmann*, consult. cent. 2. cas. 19. *Vaporis hypochondriaci*, *Pomme* obs. 9. *Ellis* 4760. *Evanescentem vaporum*. L.

Nuncupetur carus hystericus, per me licet, etiam viros aggredietur, non repugnabo. Verum ab apoplexia discrepat, quod nullo stertore slipetur: immo est vera angina hysterica latens sub cari phænomenis; etenim cum æger ad se redire incipit, gestu, dein loquela pectus, collum, linguamque laborare innuit, se nihil deglutire posse, pectus, gulam & tracheam arteriam graviter sibi contrahit significat aut scribit; in paroxysmo repente rationis, sensuumque exercitium tollitur, nec respirare, nec deglutire valet, omni movendi & vociferandi potentia orbat, sui tamen est conscius; sed adstantibus nullius sensus siena, valet edere. In casu *Hoffmanni* genæ in manibus & facie solito calidiori & rubicundiori, pedibus refrigeratis, pulsus tardus, languidus ob plethoram. In casu *D. Pomme* successit hemiplegia spasmodica ipsi dicta.

*Cura* exigit phlebotomiam, cujus opæ emittitur cruor ipsius, cui diluendo allaborandum est; vomitus levissimis emeticis concitari potest, modo aqua pulvis simul erethismus leniat, clysmata etiam in usum vocari possunt; porus ex nitro, & liquor mineralis anodynus *Hoffmanni* indicatur. De cætero vide *Hemiplegiam hystericam*.

14. *Carus a narcoticis* *Sennerti* de Caro cap. 31. A.

Venena narcotica hanc speciem inferunt.

Opiata omnia majori dosi, apud inassuetos, ore assumpta, vel in podicem clysteris forma injecta, immo, ut observavit *D. Bonillus*, opii tinctura toti pectori illita; sic notum est plures impios fidei mortem magna laudandi dosi ingesta, conscivisse; ab hyoscyami & daturæ stramonii tum seminibus, tam radicibus minoris dosi parafrosysem cum aphonia, majori dosi cataphoram, ac aliis carum accidisse ferunt, sed genera horum morborum non satis distinxere autoptæ observatores.

*Hanc Blanne Trausack. Philof. n. 429.* curavit quatuor pueros qui hyofcyami femina voraverant: hi laborabant fici, vertigine, suffufione feintillante, paraphrofyhe, & fopore cæteris fymptomatis conflantiore; adhibitis fanguinis miffione, cucurbitulis, emeticis, catharticis omnes evafere.

Mullercula Monfpelienfis hoc femine hyofcyami alibi, tanquam fpecifico antifebrili adverfus intermittentes ad fcrupulum unum utitur, nec fine fuccellu, ut audio; in horumque venenorum ufu a minima dofi incipiendum eft, fenfum adaugendo, & miræ curationes funt; certe innocue fumuntur hæc femina in pilulis de cynogloffa, philonio romano; & optimi quos præftat effectus foliorum hyofciami bijus extractum in cataracta, hysteria, cancro &c. fua dent ut femina in eodem cafu & eundem cafum adhibeantur.

A vino, cerevifia uberius affumptis certe apoplexia, aliis carus, alii paraphrofyne fupervenit; a vapore multo fermentatis, quem *Gas fylvæstris* vocant Chemicis, fubito afphyxia lethali femper effe plurimos conflat.

A carantula punctura carum accidiffe pluries allerit *Baglivi*; ab afpidis ictu Cleopatram foporatam fuiffe narrat *Plutarchus*.

A fumo carbonum extinctis, & caro prius affectus ipfe vidi; caroticos eos, non vero apoplecticos defcribit *Marcellus Denatus*, lib. 12. cap. 6. *Vide Schenckium lib. 1. cap. de apoplexia ex fumo carbonum.*

A foliis conii maculati, ex quibus extractum miris effectus producit, obfervante *M. Storchio*, ficutus fumatur cruda vel cocta, homines vertigine, dein caro afficiuntur, qui ut plurimum, præmiſſa convulfione, eos e medio tollit, obfervante *D. VVafon Trauf. Philof. n. 473.* Cum horum extractum fimo periculo ad drachmam intus fumi poſſit, evidens eſt vires medicaminum ratione doſis & confuetudinis multum variare.

*Curatio.* Si ore affumpta ſint opiata, illico vomitorio ſunt rejicienda; ſi pulfus vigeat, aut hauſtus carbonum fumus, phlebotomia inſtituenda ac repetenda, & in utroque caſu aceti vapor naribus hauriendus; oxycratum propinandum, pulſu languente ad lilium Paracelli, vinum generoſum, & cardiaca fuſoridica conſurgendum, addito calore.

15. *Carnus a frigore* Montalcii Synopſis. Vide afphyxiam congelatorum. *Lethargus ingens* Petri Borelli obſerv. 53. ætur. 1. A.

Qui in ſequentioribus per campos nive obductos iter faciunt, ut accidit exercitui Gallico dum Praga excederet, Imperiahibus retro inſequentibus, non ſolum extremorum ſphacelum patiuntur, verum etiam tanta dormiendi cupiditate tenentur, ut præſentis vitæ periculo non abſterreant a ſomno; hinc alto ſomno in media nive correpti dormiendo moriuntur, niſi amica manus eos excitet, & calor aliunde excitatus eos vitæ reſtituat; quod reſtantur ſemel torores vidiffe qui hos milites dacebant amici non

pauci: quis credidiſſet in tanta frigoris & doloris eum vulgo comitantis violentia quemquam a ſomno ſeſe expedire non poſſe.

Erraverunt Veteres, ut *Duræus*, *Crato*, alii que qui aſſerebant a ligatis carotidibus arteriis carum induci; factio pluries in canibus experimento, vidi ipſe apud *D. Smorr*, Medicinæ ſtudioſum, canem cujus amba carotides ardiſſime ligatæ fuerant, & omnino obliteratæ, per quinque dies ſine ullo fopore inſolito vixiſſe.

16. *Carnus ab hydrocephalo* Lamotte des Tumeurs obſ. 107. tom. 1. pag. 485. A.

In illo caſu præter foporem profundum aſſerit reſpiratio brevis & frequens, quæ in aliis ſpeciebus eſt rarioſoſo; ſumma erat virium proſtratio & alvi conſtipatio; fruſtra præſcriptis emeticis, phlebotomia, cucurbitulis, obiit ægra.

Cadavere aperto multum ſerum in cerebri fibulis effuſum, hydrothorax etiam & origami erant duæ treſve lupiæ ſecæ vel pure turgidæ infra aortæ curvaturam locatæ, ovi gallinacei magnitudinem adæquantes.

17. *Carnus Nyſtagmus* B. P.

Eſt carus ſubito ſuperveniens, omnem ſenſum & motum artuum intercipient, pulſu & reſpiratione pauciſſimis, cum niſtatione veloci & continua cillorum.

Hunc morbum bis obſervavi, nullibi que deſcriptum vidi. Mulier pinguis, delicatula ſubito incidebat in eum ſtatum, & tranquille ſedens per horæ quadrantem hanc eclipſim omnium ſenſum patiebatur, pulſu, colore & calore, totiuſque corporis flexilitate integris; ſed utriuſque oculi, non palpebræ, cilia tantum, motu velociffimo agitabantur; reſpiratio erat vix conſpicua, diſcuſſo acceſſu, velut e ſomno ad ſe redibat, de gravitate capitis conquella priſtinæ ſanitati reſtituebatur: remedia antihyſterica nullum effectum fortiebantur: anad hyſtericum carum referenda hæc ſpecies?

18. *Carnus exanthematicus*, *Calaleps* 1. Obſ. Journ. de Med. Maj. 1794. pag. 410. A.

A ſcabie repulſa invaſio ſubita, ſenſus motuſque liberi ſeriatio, pulſus vix febrilis: morbus acutus morte apoplectica terminandus: phlebotomiz plures, veficatoria, ſcabiei revocatio, &c. indicantur.

XXXI. APOPLEXIA, ab *apoplettin*, deſuper percutere; *Aphonia* Hippocratis aphor. 51. §. 7. &c. *Fluxio frigida*, ſeu *Nyſtæra* Ægyptiorum Haſſelquiſt. iter Palæſtinum; *Apileps* Heurnii de morbis capitis, pag. 143. *Apoplexia*. *Ægri Apoplectici*, *Siderati*, *Antoniti* vocantur.

Cognofcitur ex ſomno profundiffimo, vix excitabili, cum ſtertoroſa reſpiratione, & artuum omnium laxitate: confunditur ſæpe cum afphyxia, cephalitide, epilepſia &c.

Sive ſubito, ſive gradatim fiat morbus, non inde generis eſt diverſi. Apoplexia agonistica, ſeu quæ plures moribundos aſſigit, gradatim accedit; quæ ſubito fit, eſt apoplexia ſanguinea, aut pituitoſa, quam ſolam Auctores in

innuunt, & ab hoc genere secundarias immemore excludunt.

Ratione stertoris apoplexia discrepat a cataphora, caro, syncope, alphyxia, &c. Ratione profundissimi somni differt a lethargo, typhomania; per artuum omnium laxitatem distinguitur ab epilepsia, catacho, catalepsi, &c.

Quæ de inæquali corticis cerebri compressione docent Scholastici ad explicandam apoplexiam, non satis coherent cum legibus Phycis; an-apoplexia traumatica, v. g. a fractura cranii, certum est partem cerebri immediate a laminis ossis depressis comprimi fortius quam partes ab eo loco remotas; ergo inæqualis est compressio, & tamen subito sensus & motus omnes feriantur; mallem dicere cum *VVilliso*, & Antiquissimis ob gravissimam labem inducendam, ab anima perterrita retrahi, aut cohiberi fluidum nerveum, ut in simili casu accidit illico a gravi metu omnes artus stupere & flaccescere; crescente vero infarctu cerebri interceptur mechanice illius fluitus influxus; sed usquequo theoria satis excolta sit, fide & accuratio-ri morbi historię inebumamus.

2. *Apoplexia sanguinea* Sennerti, *Apoplexie de sang. Coup de sang. A.*

Ea est quæ sanguineos homines, sæpius sexagenarios, adortur cum signis plethoræ, sive ægri sint corpulenti, collo brevi, sive macilentis, sive plethora sit vera ab ingessis copiosis & superfluis evacuationibus sanguineis, sive plethora sit commota, ut a febris, iræ impetu, exercitio immodico: hanc comitatur initio color faciei floridus, aut atroruber, calor, pulsus plenus, licet progrediente morbo color & calor recedant; eo nomine intelligitur apoplexia à principio interno procedens, non vero traumatica.

Ille morbus vix unquam pueros corripit, non raro hæreditarius est, & tunc etiam levibus insultibus, vertiginosis, cephalalgicis præludit, unde habitualis dicitur *VVilliso*; sæpius tamen primus insultus est letalis, & qui plurimos insultus numerant, non raro epilepsiam pro apoplexia habent; sitendum tamen apoplexiæ dari insultus instantaneos ex quibus ægri convalescent hemiplegia succedente, qui insultus inter symptomata hemiplegiæ possunt numerari. Præcedunt sæpiissime erapulæ, indigestiones, viniabitus, pathemata gravia, insolatio, & quæcumque sanguinis molem augere, & in cerebro statim procreare valent. Omnis apoplexia sanguinea est fortis; quam levem vocat *Hippocrates* pro caro habemus. Apoplexiam autem fortem tollere ut plurimum est impossibile, carum vero non facile; si post primas uberesque phlebotomias apoplecticus hujus speciei ad se non redeat prima die, de eo concludendum est.

Apoplectici in positura incommoda majoris angoris signa præbent, saltem respirant cum majori stertore & conatu; ut quidam deglutiant, nares restringere opus est, & tunc etiam cum periculo suffocationis deglutiant; sumpta magna dosi emetici quandoque oculos aperiant gestu, immo loquela dolorem ventriculi. vel in-

testinorum significant, si vero nil omnino sentiunt, nulla spes est.

Insultus apoplectici qui sunt hemiplegiæ prodromi, cum oris distorsione, balbutiæ, linguæ declinatione ad latus sanum, sanantur sæpiissime, est apoplexia sanguinea, determinata, vix unquam; licet minus letalis sit quam pituitosa. Cadavera ostendunt vasa pia meningis & plexus choroidæ turgida, sæpius rupta, & sanguinem in sinibus cerebri effusum; quandoque vero, ut vidit *VVillissus*, nullum est vitium conspicuum in cerebro, nec in cerebello.

Curatio a phlebotomii largis ordini debet dein auxilia eadem conveniunt ac apoplexiæ pituitosæ; titus capitis sit paululum acclivus, corpore supino; quo respiratio magis sublimis, & pulsus magis depressus, minus æqualis, eorum proximior; pulsus vulgo est mollis, plenus, non frequens.

2. *Apoplexia traumatica* & *Apoplexia phlegmonosa* Foresti obl. 73. A.

Ea est quæ a capitis ictu, vulnere, contusione, valida commotione, cranii fractura ex alto, &c. dependet.

In ea post ictum subito æger concidit, velut exanimis; interea ad se reversus ingesta vomitu rejicit, sanguinem ex naribus, auribus, sandit; dein pulsus refurgit, frequens, vehemens evadit, calor accenditur, apoplexia inflammatoria est dicta *Beerhaave*, quæ utcumque periculi plena, minus tamen periculosa est quam sanguinea, seu à principio interno oriunda, si de cætero stertor idem sit, nam stertor est cæteris paribus mensura periculi.

Curatur largis phlebotomiis, & chirurgicis auxiliis.

3. *Apoplexia tumultuosa* Hænr. ab Hærs obl. 19. Foresti obl. 34. lib. 12. *Coma soporiferum* Foresti, Ettmuller. de Tumultu, p. 68. *Coma apoplectique*, D.

Ea est quæ ab ebrietate dependet, & sanguineam fere mentitur, ita ut Medicos incautos decipiat, ut patet ex observatione, 34. Foresti, & multis aliis; etenim qui mero, vel spiritu vini, aut cerevisia uberius epotis ebrii sunt ad hunc gradum, ita difficulter evigilant, ita graviter stertunt per plures horas, ut nisi per adstantium relatum, vel per vinum vomitione rejectum, aut odorem vinofum anhelitus species morbi pateat, illa pro sanguinea reputetur magno artis scandalo; illa vero sæpius sponte solvitur, nec confundenda cum apoplexia sanguinea, quæ vivo, utcumque acta sobrios, & abstinentes detinet, quæque immediabilis est.

Laudani liquidi drachmam & semissem puer quinquennis hauserat; intra semihoram somnolentus & stupidus fuit, hora 10. respiratio subtilis & stertorosa, pulsus plenus, æqualis, sed tardus, somnus non poterat excuti, aut æger vellicatus respexit, dolorem sensit; hora 11. facies pallens, oculi fixi & vitrei, respiratio gradatim minor, dein sublevis per minutum; postea reveria est cum profunda inspiratione suspirio.

piriosa: respirationum intervalla sensim majora evaserunt ad mortem usque; decrefcente respiratione pulsus decrefcebatur; ea interrupta, vel seriente, pulsus debilis & tardus admodum erat, sed æqualis, sine intermissione; redeunte respiratione pulsus minus debilis, minusque tardus evadebat. Ill. Rob. VVhyt of vital motions pag. 194.

4. *Apoplexia hysterica* Sydenhami de passione hysterica, pag. 400. differt. epistola:is; *Apoplexia puerperarum* Barberyacii MS. *Apoplexia vaporosa* Th. Burneti. D.

Ea est quæ a principio hysterice dependet, de qua sic loquitur Sydenhamus, „quandoque capitis arcem occupans, apoplexiam facit, quæ similiter hemiplegia solvitur, eam omnino referens apoplexiam qua rum ætate, tum mole corporis graudiores siderantur, & quæ ex eo nascitur quod, cerebri cortici piruitur; pia referro, & scateante, spiritum animalium meatus ac semitæ intercluduntur; a qua quidem causa, quæ semeliosis hystericiis accidit, apoplexia, oriri nullatenus videtur, cum eandem haud infrequens adoriatur confellum a partu, magna languinis vi simul ejecta, & vel partui laboriosiori, vel vehementiori alicui animi commotioni debeatur“.

Anne huic speciei conveniant tantum antihysterica ex karabe, Nilio Paracelsi, castoreo, cum cardiacis, & cephalicis? Quis eam observavit & descripsit præter Sydenham? Apoplexia vaporosa & hypochondriaca, quam memorat D. d'Aplos Laufannensis Medicus apud Burnetum, videtur potius arthritica.

Vide Apoplexiam melancholicam F. Foresti obs.

5. *Apoplexia arthritica* Musgraviæ cap. 15. pag. 129. A.

Ea est quæ arthriticis aggreditur dolore pedum subito evanescente, & accedentibus vertigine, cephalalgia, similibusque symptomatibus.

Ea exigit remedia sanguinea, deinde vero sinapismos pedibus admodos ad revocandam arthritidem. Vide hujus historiam plures loco citato, eam cura.

6. *Apoplexia metastasica*. An scorbutica Mangeti Biblioth. & Eusalemi apud Sennertum de Scorbutico? a Jacobo F. Hoffmanni II. 242. Ephem. Nar. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 52.

Ea est quæ morbis exanthematicis repulsis, ut erysipelati, trichomati, &c. supervenit.

Videtur Szabel. de Plica Polonica histor. 12. qui vidit a resecta plica non raro supervenisse cephalæam, febrem, delirium phreniticum, deinde vero soporem altum cum stertore. Consultarum etiam Schenkius de plica.

Vidi apoplecticos, olim herpetibus obnoxios, temperamenti calidi & siccissimi, sensibilis textus, alvo constipatos, dum sani erant, in quibus curandis dyscrasie ratio habenda erat, saltem in prophylaxi, & errant illi qui omnia laxa, inertia, frigidaque inculant in hoc morbo. Fateor illas principiorum diversitates in apoplexia a quali curanda parvi esse momenti, ob lethalityatem hujus morbi; verum, iterum dico, ad

prævertendam apoplexiam causarum præagum. narum varietas est attendenda.

Apoplexia scorbutica a Mangeto descripta ad asphyxiam magis accedit, quam ad apoplexiam.

7. *Apoplexia pituitosa* Sennerti de Apopl. Bonneti Sepulchret. ab obs. 28. ad 32. Serosa Preyngeri. A.

Ea est quæ ab ipso initio stipatur pulsu debili, faciei pallore, calore imminuto, quæque ut plurimum senes, cacochymos, debiles, pituitosos, aggreditur.

Ex eo quod in cadavere sinus cerebri aqua turgidi reperiantur, non sequitur apoplexiam ab illo sero fuisse inductam, cum ubi infarctus est vasorum sanguiferorum, ibi lymphæ facile e vasculis suis elabatur; & quo longiori post obitum tempore fit extispitium cadaveris, eo uberior est ut plurimum feri effusus copia: vidi hydrocephalos ingentes sine apoplexia, viderunt & alii; verumtamen hæc species omnium est funestissima, quæ labem inveteratam in cerebro, ac sæpius ætatem senilem supponit, in quibus casibus facultas morrix, quæ sola morbis medetur efficaciter, est efficta & languida; si tamen a potu aquæ copiosiori, ut in usu aquarum acidularum evenit, ortum ducat; si structura corporis sit robusta, & natura vegeta, tunc accedente hemiplegia, vel linguæ paralyti quidam evadunt.

In curanda hæc species vix phlebotomia potest adhiberi, aliunde præstantissimum remedium; ab emetica magna dosi adhibitis oriundum est; poriones cathartice acres, & efficaces cito post propinentur; vesicatoria, cucurbitulæ, clystres ex vino emetico, nicotianæ fumo succedunt; interea salia volatilia, elixiria, cephalica, cardiaca præscribuntur. Vide curationes Illustr. Professoris Lazermæ.

Si superveniat hemiplegia, tunc pituitas aperientibus, sudorificis & cathartics per plures dies continuandis utendum, usquequoeger rhedam ingredi queat, & ad thermas Bellilucanas, aut similes deferri, ubi aquas per triduum bibat, addito sale cathartico; dein per aliquot dies ducias in sonne, vel in cupa excipiat, capite potissimum & spina dorso; utatur pro potu deinde decocto chinæ, salsæparillæ, & similibus.

8. *Apoplexia epileptica* Lancisii de mortib. subit. cap. 8. Morgagni Epist. III. 12. A. P.

Ea est species quæ, observante Hippocrate lib. de glandulis, iniuriam ducit ab insultu epileptico brevissimo, & quæ quadam convulsione, ut non convulsiva, stipatur; illa vero sponte non raro solvitur, sed si attendat Medicus, is prospiciet vel mandibulum, vel digitum, vel abdominis musculos spasmo tentatos: darur ramen in quibus partem convulsam invenire non est obvium; erraret certe qui stertentem epilepticum pro apoplectico haberet, cum valida quæ mox præcessit concussio pectoris, & antea totius corporis satis clare epilepsiam declararet.

Ramazzini libro de morbis artificum, cap. 1. apoplexiam.

erit metalli fossiores apoplexiæ esse obnoxios; verum licet plures viderim Alesia minerarum plumbi fossiores obnoxios hemiplegiæ & tremori, nec vidi, nec audivi illos præ aliis hominibus esse apoplexiæ ab hoc principio oriundæ obnoxios; hoc itaque inquirendum restat: curatio vero per moechica, quibus utuntur Parisini in rachialgia, haud dubie in apoplexia rachialgica conveniret, omissis tamen narcoticis.

9. *Apoplexia febricula*. Vide V Verh Hof, obs. de febr. pag. 21. *periodica* Preysingeri XVI. A. P.

Ea est quæ paroxysmus febris remittentis, aut intermittentis comitatur, fopore alto, & stertore slipata.

Signa sunt prænuucia; 1. Præcedit in primo vel secundo paroxysmo suavis somnolentia, aut stupidas capitis, vel leve delirium ægrisetiam orthostadis. 2. Urina crassa, subfusca, lixivialis, scetens innatanti pinguedine, cum frequenti micuritione aut dysuria. 3. Sanguis extractus floridus interdum coloris variegati, cum crusta vel pleuritica, vel gelatinosa, quandoque vermiculos ascarides fundens, vel cucurbitinos. 4. Sæpe præcedit hepatalgia: 5. vel cardiatalgia. 6. Præcessit sæpe catharticum medicamentum præmarate exhibitum, seu ante signa cõssionis, aut materia non turgente datum. 7. Vel præcessere remedia vel potulenta spirituosa, antifebrilis calidiora, ut lilium, olea destillata, &c. Demum ex violentia insultus febrilis ob hæmorrhoides, scabium virus suppressum, errores in victu, &c.

Hæc in erizaphya & tertiana frequentia sunt, & tertius paroxysmus apoplexiæ, vel carum inferre solet sæpius lethalem.

Apoplexiæ quidem istam, maxime si febris inflammatoria sit, nec typhomaniam sanare facile est; verum aote tertium paroxysmum huius febris, ea præverti potest, non remediis generalibus, ut phlebotomia, emeticis, catharticis, vesicatoriis, ad prompto, largoque usu kinkinæ. *Vide* curam fuisse apud V Verh Hofum, eximium meritoque celebrem Prædicum Hannoverianum, & quæ de caro febrili scripsimus.

De hoc morbo legatur *Morten. Pyretologia* p. 33. & 75. Hic morbus ratione curationis non differt a typhomania febricula, & caro febrili.

10. *Apoplexia suspiciosa* D. Cusson. A.

Morbum apud puerulos Salvia: aliquot abhinc annis familiarem observavit D. Cusson; illi post fugacem eclampsiam incidebant in soporem alrum & perseverantem, in quo nulla sensus indicia, nullam artuum rigiditatem, aut motionem exerebant, respiratio erat rarissima, & qualibet expiratione suspiciosa, facies simul pallida, corpus frigidulum, turgidulum.

Phlebotomia non indicabatur, emeticum vinum ad semiunciam assumptum vomitum & diarrhæam felicem exerebat; dein cathartica & vesicatoria pone aures curationem intra paucos

dies absolvebant, ita ut nullus fato cederet. An cari suspiciosi nomine rectius insigniretur hic morbus?

11. *Apoplexia polyopsa* Oonferdyk Schachat. Inslir. Med. præct. Morgagni Epist. IV. 23. A.

Ea est quam præcedunt fremitus cordis palpitatio, vasorum coll. vibratio, pulsus maxime irregularis, vertigo teneb. icola, respiratio difficilis, præferim ad motum corporis, aerisve calorem increfcescens, quæque inde censetur oriri a polyopsa concretionem.

Curatio ad prophylaxim tantum valet, eaque reperenda videtur a phlebotomia, usu nitri, camphoræ, feri lactis; verum desunt observationes quæ diagnosim illustrent, & curam dirigant.

Apoplexiæ polyopsam Beerhaave gratis ab ipso excoGITatam puto; nec ex polyopsis gummis carotides ingressi sequeretur apoplexia, cum ligatis strictissime duobus truncis carotidum viderim canem septimanam sine ullo fopore superesse, quem tunc temporis occiderunt, ut viderent num ligatura satis arcta fuisset; vidimus alteram ex carotidibus esse ita arctatam ut a ligatura secta foret.

12. *Apoplexia atrabiliaria* Ill. Morgagni Epist. Preysinger Spec. VI.

Ea est quæ ultimo melancholiæ gradui frequens supervenit signis atræ bilis prægræssis: In cerebro substantia medullaris omnino fusca reperta est.

13. *Apoplexia inflammatoria* Ill. van Svvieten Comm. §. 101.

Ea est quæ incipit ab ingenti cephalalgia, cum pyrexia, acuta, continua, delirio phrenitico, tunc furoribus summis & aucto infarctu medullæ cerebri sopor profundus, ipsaque apoplexia breviter lethalis succedit, cum facie atro rubra, oculis inflammatis, lachrymis involuntariis, pulsi duriori, prægressis. Sanguis extractus est phlogisticus: curatur ut cephalicis.

14. *Apoplexia mephitica*, a fumo carbonum De Mezeray Malad. des arm. n. 24. cum apertura cadaveris. A.

Hac historia constat a fumo carbonis veram apoplexiæ cum stertore producti, sanguinem in cadaveribus esse dissolutum, illo vasa cerebri turgida reperiri, non secus ac vasa pulmonis, & demum cadavera diutissime calorem nativum servare: in hoc morbo aeri frigido puro æger quanticos exponendus, aceti vapor inspirandus, oxycratum potandum & phlebotomia statim instituenda.

15. *Apoplexia verminea* D. Marteau de Grand. villiers Journ. de Med. Juill. 1762. a tænia.

Signa; diarrhæa ideutem, boulimia alterans cum anorexia, tumores & tensiones sagaces abdominis eæque dolorificæ, cucurbitinorum desectio: pluries præcedunt vertigines, motus convulsivi, &c. curatur anthelminticis simul cum remediis generalibus.

